113.

611.31

家兔顎下腺々細胞ニ關スル實驗的研究

岡山醫科大學解剖學教室(上坂博士指導)

遠 藤 壽 太

[昭和7年5月19日受稿]

*Aus dem Anatomischen Institute der Med. Universität Okayama.**(Leiter: Emeritus-Prof. Dr. K. Kösaka).***Experimentelle Untersuchungen über die Zellen der
Submaxillardrüse beim Kaninchen.**

Von

Hisata Endoh.

Eingegangen am 19. Mai 1932.

1. Wenn man die Submaxillardrüse nach Fixierung in der Kopschenschen Lösung mit Hilfe der Eisenhämatoxylinfärbung untersucht, so sieht man, dass sie grösstenteils aus Zellen mit der netzartigen Struktur besteht, während eine geringe Anzahl Drüsenzellen intensiv gefärbte grobe Körnchen enthält. Die ersteren entsprechen den tropochromen Zellen von Bensley und die letzteren sind nichts anders als seine homeochromen Zellen.

2. Das Zahlenverhältnis beider Zellen aber zeigt eine grosse Schwankung je nach der Sekretionsphase.

3. Nach elektrischer Reizung der Chorda tympani oder nach Pilokarpininjektion zeigt die Submaxillardrüse eine Veränderung, indem die intensiv gefärbten groben Körnchen ihrer Zellen teilweise in Bläschen verwandeln und sich stark vermindern, während die Maschen der netzartigen Zellen gröber und spärlicher werden. Dabei erweitern sich die Blutkapillaren der Drüse stark und diese wird reich an Blut.

4. Nach elektrischer Reizung des Halssympathicus oder nach Atropin- resp. Adrenalininjektion vermehren sich die genannten Körnchen und Netzmaschen der Drüsenzellen, wobei die Drüse blutarm wird, indem ihre Blutkapillaren sich verengern.

5. Die genannte Verminderung der Körnchen und Netzmaschen ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Körnchen teilweise sich verflüssigen und je einige klei-

nere Netzmaschen zu einer grösseren vereinigen, indem die Drüse an Blut, K und einer vagusstoffähnlichen Substanz reichlich wird.

6) Dagegen ihre Vermehrung ist vielleicht so zu deuten, dass die Drüse an Blut arm, aber an Ca und einer acceleransstoffähnlichen Substanz reich wird, und die Körnchen der Drüsenzellen wegen der Wasserbeschränkung sich nicht leicht verflüssigen und sich in den Zellen anhäufen.

7. Die Mitochondrien der Drüsenzellen stellen sich als stäbchen-ketten- oder granulaartige Körperchen dar, aber die granulaartigen sind als Endformen zu deuten, da sie zu den intensiv gefärbten Sekretgranula übergehen. (Kurze Inhaltsangabe).

目 次

第1章 緒 論	第2節 「アドレナリン」注射後ノ所見
第2章 實驗材料及ビ實驗方法	第3節 頸部交感神經刺戟後ノ所見
第3章 實驗成績	第4節 「ピロカルピン」注射後ノ所見
A) 生理的狀態ニ於ケル所見	第5節 鼓索神經(副交感神經)刺戟後ノ所見
第1節 普通時所見	第4章 總括並ニ考按
第2節 飢餓時所見	第5章 結 論
第3節 飽食時所見	主要文獻
B) 實驗的研究	附圖説明
第1節 「アトロピン」注射後ノ所見	

第1章 緒 論

唾腺ノ組織生理學的研究ハ、古ク先人ヨリ報告セラレタルトコロトス。特ニ腺細胞内顆粒ハ Zellorganelle ト見做サレ、分泌物ノ前階級物トシテ重要視セララルニ至レリ。R. Heidenhain (1880) ハ漿液性腺細胞ノ Hämatoxylin 染色標本ニ於テ Protoplasma 中透明ナル基質ヲ貫通セル絲網(Fadennetz)ヲ認メ、透明物質ハ恐ラクハ處置ノ際液化セシ分泌顆粒ノ介在セシ部ニシテ、絲網ハ顆粒間ノ細胞原形質ノ壁ナリト云ヘリ。分泌ノ際ニハ透明基質ハ其量ヲ減ジ絲網ハ多少増加ス。細胞ノ透明物質ハ分泌物ヲ供給シ、絲網ハ腺細胞ヲ圍繞セル Lymph ヨリ要素ヲ攝取シ、安靜時ニ之ヨリ分泌物ノ前階級ナル透明物質ヲ作ルモノナラント。而シテ腺細胞ハ分泌時期ニハ顯著ナル形態の變化ヲ現出スルモノニシテ、縮小鋸齒狀ノ核ヲ有セル安靜時ノ大細胞ハ活動期ニ於テハ小トナリ強染シ、核ハ大トナリ圓形ヲ呈スニ至ルト。抑モ分泌顆粒ハ Claude Bernard (1856) ガ脾臓ニ於テ初メテ發見シタルモノニシテ、新鮮細胞中ニ於ケル其位置及ビ變化ハ R. Heidenhain (1868, 1875), Langerhans (1869), Pflüger (1871), v. Evner (1873), Nusbaum (1877—1882), Langley (1879—1889), Kuhne und Lea (1882) 等ニヨリテ研究サ

レシモノトス。然レ共分泌顆粒ノ Genese = 就テハ殆ド記載ナカリキ。然ルニ Altmann (1886) ハ漿液性腺細胞ノ安靜時及ビ活動時ノ形態的變化ニ就テ、猫ノ耳下腺ヲ Osmium-Bichromat 混合液ニテ固定シ Säure-Fuchsin-Pikrinsäure ニテ染色後檢索シ、腺分泌物ハ形態的ニ特有ナル變化ヲ示ス顆粒ヨリ生ズト云ヘリ。即チ安靜時ニ於テハ灰黃色ノ顆粒アリテ網狀ノ赤染スル物質中ニ包埋セラルルモ活動時即チ Pilocarpin 注射後ニハ此者消失シ網工内ニ赤染スル種々ノ顆粒ヲ見ル。蓋シ灰黃色ノ顆粒ハ分泌物トナリシモノナラント。而シテ灰黃色ノ顆粒ハ前記赤染顆粒ヨリ生ジ發育ノ際 Sekretionsstoff ノ攝取ニヨリ特有ナル染色反應ヲ呈スルニ至ルナラント。Müller (1896) ハ家兎顎下腺ヲ Kopsch 氏重「クローム」酸「フオルモール」ニテ固定シ鐵「ヘマトキシリン」ニテ染色シ、或ハ Sublimat ニテ固定後 Eisenhämatoxylin 染色ニテ檢シ、Eisenhämatoxylin 染色ニテハ濃染顆粒ヲ有スル散在性ノ細胞群ト淡染シ幾分粘液細胞ニ類似スル網狀構造ノ多數細胞群トヲ認メタリ。同時ニ新鮮材料ヲモ檢シ互ニ比較セシガ、前記濃染顆粒ハ新鮮標本ニテハ強ク光線ヲ反射シ、時ニ殆ド認識シ得ザル程度ノ小顆粒ヨリ粗大ナル顆粒ニ至ル種々ノモノヨリ成リ、又網狀構造ノ細胞ハ弱ク光線ヲ反射スル顆粒ニテ滿タサレ、前者ハ後者ノ前階級物ニシテ後者ハ變ジテ唾液トナルコトヲ確メタリ。要スルニ該腺ニハ前記2種ノ細胞ヲ染色標本ニ於テ區別シ得ルト雖モ、全ク同一細胞ニシテ分泌時期ニヨリテ互ニ異ナル形態ヲ呈スルモノニ過ギズ。而シテ唾液ハ非常ニ特有ナル變化ヲ示ス顆粒ヨリ生ズルモノナリト論ゼリ。Cohoe (1907) ハ新鮮ナル家兎顎下腺ヲ檢索シ光線屈折力ヲ異ニスル2種類ノ顆粒ヲ認メタリ。

此2種類ノ互ニ化學的構成ヲ異ニシ、種々ノ試藥ニ對シテモ互ニ異レル反應ヲ示シ、固定標本ニテハ新鮮標本ニ於テ稍々暗色ヲ呈スル部分ニ濃染顆粒ヲ認ムルモ、淡キ部ニハ之ヲ認ムル能ハズ。刺戟後ノ新鮮標本ニ於テハ乙部ハ甲部ニ比シ早く顆粒ノ消失ヲ來シ、Eisenhämatoxylin 標本ニテハ濃染顆粒ヲ見ズ。其他網狀細胞ハ固定後ニハ分泌時期ノ如何ニ拘ラズ濃染顆粒ヲ認メズ。斯クノ如ク2種類ノ細胞ノ Protoplasma ハ全ク染色性ヲ異ニシ、濃染顆粒ヲ有スル細胞ハ定型的漿液細胞ノ性質ヲ有スルモ透明網狀細胞ハ幾分粘液細胞ノ觀ヲ有スト。氏ハ更ニ2種細胞ノ位置ノ關係ニ就テモ詳述セリ。Bensley (1908) ハ粗大ナル濃染顆粒ヲ有スル細胞ヲ「Homeochrome cells」ト名ケ網狀構造ノ細胞ヲ「Tropochrome cells」ト命名セリ。

分泌顆粒ノ產生機轉ニ就キテモ意見區々ニシテ核ガ或ハ直接ニ (Mazianski, Galeotti) 或ハ間接ニ (Ogata, Garnier, Laguesse) 大關係ヲ有スルトシ、間接ニハ Basalfilament (Solger), Ergastoplasma (Garnier), 或ハ Ergoplasma (Davidoff) ナルモノノ媒介ニ由テ分泌物ガ製造サルトモ云ヘリ。然レ共最近多クノ學者ハ腺分泌顆粒ノ產生ニ就テハ Mitochondrien ガ直接ニ關與スルトノ說ヲ高調スルニ至レリ (Regard, Hoven, Kolster)。

以下主トシテ唾液ニ關スル Mitochondrien ノ文獻ヲ述ベンニ、Altmann (1886) ハ猫ノ耳下腺ニ於テ特別ナル染色法ニヨリ顆粒間ノ網狀部中ニ赤染スル小顆粒及ビ絲狀物ヲ認メ、之ヲ「Vegetative Fäden」ト命名セリ。Duesberg (1911) ハコノ「Vegetative Fäden」ハ Plastosomen ト同様ノモノナリトセリ。

Benda ガ Mitochondrien ヲ細胞體內ニ存在スル Zellorganelle ト見做セシ以來唾腺ニ於ケル Mitochondrien モ踵接シテ研究サレタリ。即チ Regand und Mawas (1909) ハ種々ノ哺乳動物ノ耳下腺及ビ顎下腺ニ於テ Altmann 1 同様顆粒間ノ網狀部ニ小顆粒及ビ絲狀物ヲ證明シ、コレヲ Mitochondrien ト命名シ、小顆粒ハ Vegetative Fäden ノ斷片ナリトセリ。O. Schulze (1911) ハ Osmium-hämatosylin Methode ニヨリ耳下腺ニ於テ同様ノ所見ヲ認メ、Mitochondrien ハ連珠狀 (perlschnürartig) ニ腫脹セル Chondriokonten ノ斷片ナリト云ヘリ。次ニ Mitochondrien ガ成熟シ分泌顆粒ニ移行スル機轉ニ就テハ Janusgrün 及ビ Neutralrot ニテ生體染色ヲ試ミタル Debeyre (1912) ハ家兎顎下腺ノ Zymogen 顆粒ハ大ニシテ赤染シ Mitochondrien ハ小ニシテ綠染ス。後者ハ漸次容積ヲ増シ内部ニ赤染スル小粒ヲ生ジ、綠染スル周緣部ヲ有スル赤染顆粒ニ變ジ、終ニ成熟 Zymogen 顆粒トナル。故ニ所々ニ小鞍狀綠色ノ Plastosomenhülle ノ殘存スルヲ見ルト。Guieysse-Pelissier (1911) ハ特別ノ方法ニテ檢シ Osmophil ノ顆粒ハ Mitochondrien ト同一物ニシテ fuchsinophil ノ顆粒ハ分泌顆粒ノ前階級物ナリ。而シテ後者ハ前者ヨリ生ズルナラント云ヘリ。之ニ反シ Levi (1912) ハ唾腺ノ細胞ノミナラズ他ノ分泌細胞ニ於テモ Mitochondrien ハ恒久性ノ Zellorganelle ニシテ分泌顆粒ニ移行スルモノニアラズ、只分泌物構成ヲ援助スルニ過ギズト云ヘリ。Milsausky (1913) モ同意見ヲ發表セシガ、Hauschild (1916) ノ如キハ家兎涙腺ノ Mitochondrien ハ全ク人工的產物ナリトシ固定藥中ノ Chrom ト細胞體內ニ存スル脂肪或ハ蛋白トノ結合物ニ過ギズトセリ。

唾液分泌ニ關スル神經ノ作用ニ就テハ遠心性纖維

ハ副交感神經系(腦神經)ト交感神經內トヲ走行スルモノト見做サレ居レリ。前者ノ刺戟ニヨリテ生ズル唾液即チ腦神經唾液 (Gehirnnervenspeichel, cerebraler Speichel) ハ稀薄透明ニシテ有機質ニ乏シク大量ナレドモ、交感神經刺戟ニヨリテ生ズル唾液即チ交感神經唾液 (Sympatikuspeichel) ハ粘稠濃厚ニシテ有機質ニ富ミ少量ナリ。而シテ腦神經ハ血管擴張神經ヲ、交感神經ハ血管收縮神經ヲ有セリト。Langley ニ據レバ腦神經及ビ交感神經內ヲ走ル分泌神經纖維ハ全ク同一種ナルモ兩神經唾液ノ異ナルハ前者ノ刺戟ハ腺內血管ノ擴張ヲ來シ多量ノ水分ヲ供給スルモ後者ノ刺戟ハ腺內血管ノ收縮ニヨリ水分供給ノ缺乏スルニヨルト。R. Heidenhain ハ神經纖維ニ2種ヲ區別シ、1ハ水分鹽類ヲ分泌スル作用ヲ有シ主トシテ腦神經內ニアリ、他ノ1ハ有機質ヲ分泌スル作用ヲ有シ主トシテ交感神經內ヲ走行スト云ヘリ。Stormont (1926) ハ電氣的或ハ藥物的刺戟ヲ與ヘ家兎顎下腺ノ組織的變化ヲ追究シ、又上頸神經節ノ除去或ハ鼓索神經ノ切斷後ニ於ケル「Homeochrome cells」及ビ「Tropochrome cells」ノ顆粒狀態ヲ比較研究シ、前者竝ニ排泄管ニ終レル神經纖維ハ鼓索神經ヨリ來リ、後者ニ分布スルモノハ上頸神經節ヨリ來ルカノ如シト云ヘリ。Cohoe (1907), Stormont (1926) ハ副交感神經ノ電氣的刺戟及ビ Pilocarpin 注射ハ濃染顆粒ヲ減少セシムト述べ且 Stormont ハ頸部交感神經ノ電氣的刺戟ニヨリ網狀構造ノ細胞內ノミナラズ管腔中ニモ分泌顆粒ヲ見出スト云ヘリ。Moloy 及ビ Smith (1930) ハ鼓索神經及ビ交感神經ヲ刺戟シタルニ前者ノ場合ニハ「Homeochrome cells」ノ sero-cymojoen 顆粒ガ排出サレ後者ノ場合ニハ此者排出サレズト報告セリ。

以上文獻ヨリ見ルニ家兎顎下腺ニ於テハ、特種染色ニヨリ粗大ナル濃染顆粒ヲ以テ充サルル細胞ト透明ニシテ淡染シ網狀構造ヲ有スル細胞トヲ區別シ得ルモノナリ。一部ノ學者ハ此兩者

ヲ全ク同一細胞ト見做シ、只分泌時期ニヨリテ其像ヲ異ニスルモノナリトセリ。然ルニ他ノ學者ハ上記2種類ノ細胞ハ全ク染色性並ニ化學的構成ヲ異ニシ粗大濃染顆粒ヲ有スル細胞ハ一定ノ位置的關係ヲ有スト云ヘリ。余ハ之等ノ問題ニ就キ興味ヲ感ジ、顎下腺ニ就テ生理的分泌ノ種々ノ時期及ビ各種人工的刺戟ニ由テ起ル上記2種ノ細胞ノ組織的變化、殊ニ其顆粒ノ消長ヲ檢シ其本性ヲ究メ、併セテ分泌顆粒ト Mitochondrien ノ關係ヲ追試セント欲シ本實驗ヲ施行シタリ。

第 2 章 實驗材料及ビ實驗方法

實驗動物トシテハ總テ體重 2 kg ニ近キ生後 7 箇月計ノ健康雄家兎ヲ用キタリ。唾腺ハ絶エズ唾液ヲ分泌ス、從ツテ種々ノ分泌時間ニ於ケル腺細胞ヲ含有スルガ故ニ余ハ次ノ順序ニ從ツテ實驗ヲ行ヘリ。

A) 生理的狀態ニ於ケル所見

- 1) 普通時所見……食物攝取後 5 時間ヲ經過セシモノ
- 2) 飢餓時所見……3 日間絶食セシメタルモノ
- 3) 飽食時所見……充分ニ各種嗜好食餌ヲ與ヘ飽食狀態トナシタルモノ

B) 實驗的研究

- 1) 「アトロピン」注射後ノ所見……1%硫酸「アトロピン」溶液ヲ體重 1 kg ニツキ 3.0 cc ノ割合ニテ皮下ニ注射シ 1 時間後ニ致死セシメタルモノ
- 2) 「アドレナリン」注射後ノ所見……鹽化「アドレナリン」1000 倍溶液ヲ體重 1 kg ニツキ 2.0 cc ノ割合ニテ皮下ニ注射シ 1 時間後ニ致死セシメタルモノ
- 3) 頸部交感神經刺戟ノ所見……該神經ヲ Du-

boisches Schlitteninduktorium ニテ 30 分間刺戟シ次デ致死セシメタルモノ

- 4) 「ピロカルピン」注射後ノ所見……1%鹽酸「ピロカルピン」溶液ヲ體重 1 kg ニツキ 2.0 cc ノ割合ニテ皮下ニ注射シ、1 時間後ニ致死セシメシモノ
- 5) 鼓索神經刺戟後ノ所見……前記感應起電機ニテ 30 分間刺戟シ、次デ致死セシメタルモノ

以上實驗動物ハ皆空氣栓塞ニテ致死セシメ、直チニ顎下腺ヲ剥出シ之ヲ銳利ナル剃刀ニテ可及的薄片ニ分チ、其 1 ヲ直チニ Zenker 液ニ投ジ、24 時間固定ス、次デ水洗 24 時間後脱水シ、4 μ 厚ノ Paraffin 切片ヲ作製シ Hämatosylin-Eosin 染色ヲ施セリ。其 2 ハ Kopsch 氏重「クローム」酸「フォルモール」液ニ 24 時間固定後 3.5% 重「クローム」酸液中ニ 3 日間保存シ毎日 1 回同液ヲ交換ス、次デ水洗 24 時間後脱水シ、3 μ 厚ノ Paraffin 切片ヲ作り Eisenhämatosylin 染色ニテ檢セリ。尙ホ必要ニ應ジ其他ノ染色ヲモ行ヒテ調査セリ。

第 3 章 實驗成績

A) 生理的狀態ニ於ケル所見

第 1 節 普通時所見

Hämatosylin-Eosin 染色所見；

既ニ弱擴大ニテ Eosin ニ良染スル一部ノ細胞群ト淡ク透明ニシテ網狀構造ヲ有セル細胞ノ大部トヲ區別

シ得。強擴大ニテ檢スレバ、前記 Eosin 良染部ハ、Endstücke ニ移行部或ハ Endstücke ノ細胞ヨリナリ、時ニ只數箇ノ細胞ヨリナルヲ見ル。此種細胞ハ其境界多クハ不明ニシテ仔細ニ觀察スル時ハ Eosin ニ微ニ染色シ多少光澤アル大小種々ノ顆粒ヲ有セリ。時ニ顆粒小ニシテ且少數ナルコトアリ。細胞ノ大サハ種々ニシテ顆粒ニテ充滿セラルルモノハ膨大シ其核ハ一般ニ細胞基底部ニ壓迫サレ不正形ニシテ萎縮濃染セリ。然レ共只少數ノ小顆粒ヲ含メルモノハ小ニシテ其核ハ多クハ細胞ノ基底ヲ離レ多少膨大シ圓形或ハ卵圓形ヲ呈シ淡染セリ。但シ核小體、染色質ヲ認メ得。他ノ大部分ノ Endstücke ニアル淡染透明ナル細胞ハ Eosin ニ染レル繊細ナル原形質網工

ヲ有シ、之ニ由テ比較的整然タル圓形透明ノ網眼ヲ顯メリ。細胞ノ境界ハ割合判然タリ。網眼大ニシテ増數セル細胞ハ膨大シ、核ハ基底部ニ壓迫サレ不正萎縮濃染セルモノ多シ。コレニ反シ網眼ノ小且減數セル細胞ハ縮小シ、核ハ基底部ヨリ離レ多少膨大シ球形ヲ帶ビ染色性ヲ減ジ且核小體及ビ染色質ヲ認ム。一般ニ多クノ Endstücke ハ上記網狀細胞ヨリ構成セラレ細胞ノ網眼ノ多少ニ從ヒ大サヲ異ニス。然レ共亦 Eosin 良染細胞ヨリナレル Endstücke 並ニ上記 2 種類ノ細胞ヨリナレル Endstücke ラモ之ヲ見ル。Endstücke ノ周圍ハ繊細ノ結締組織ニヨリ包マレ其内ニ毛細血管ヲ見ル。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

本標本ニ於テハ顆粒ノ狀態一層鮮明ニシテ、既ニ弱擴大ニ於テ前記 Eosin-Hämatoxylin 標本ニテ Eosin ニ良染セル部ハ、Hämatoxylin ニ濃染セル大小種々ノ顆粒ヲ有スル細胞群ヨリナルヲ見ル。但シ該細胞群ハ散在性ニシテ少數ナリ。他ノ大部分ハ淡染セル透明網狀構造ノ細胞群ヨリナル。強擴大下ニ檢スレバ、濃染顆粒ヲ有スル細胞ハ粗大濃染顆粒ニテ充サレ、顆粒ハ互ニ壓迫シ一部ハ互ニ融合セルカノ狀ヲ呈ス。時ニ濃染顆粒稍々減少シ或ハ少シク其染色性ヲ減ジテ周縁部ハ透明トナレルモノアルヲ見ル。其他 Endstücke ガ粗大濃染顆粒ヲ有スル細胞ト網狀細胞ヨリ構成セラルルモノ、或ハ基底部ニ粗大濃染顆粒アリテ Lumen ニ近キ部ハ透明網狀構造ヲ呈スル細胞ヲモ之ヲ認ム。

濃染顆粒ニテ充サレ、顆粒ガ相互ニ壓迫セラルルガ如キ觀ヲ呈スル細胞ニ於テハ、Mitochondrien ハ基底部核ニ近ク存在シ多クハ桿狀ヲ呈ス。之ニ反シ濃染顆粒ノ減數セル細胞ニ於テハ顆粒間ニ長短ノ桿狀、連珠狀及ビ顆粒狀ノ Mitochondrien ヲ認メ得。

淡染透明ナル細胞群ヲ強擴大下ニ檢スルニ Hämatoxylin

ニ淡染セル繊細ノ網工ヲ有シ、割合整然タル圓形ノ網眼ヲ區劃セリ。網眼ハ種々ノ大サヲ有シ其數ハ一定セズ、從ツテ網眼比較的大ニシテ増數セル細胞ヨリナレル Endstücke ハ一般ニ膨大シ一見粘液性終末部ナルガ如キ觀ヲ呈ス。之ニ反シ網眼比較的小ニシテ且減數セル細胞ハ縮小シ之ニヨリ構成セラルル Endstücke モ亦小ナリ。尙ホ同一 Endstücke ニ於テモ濃染顆粒ヲ有スル細胞ト網狀細胞ヲ混ズルモノ及ビ多少顆粒ノ染色性ヲ減ジ透明ナル周縁部ヲ有スルモノ並ニ濃染粗大顆粒ト網狀構造部ヲ兼有セルモノヲ認メ得。以上ノ如ク濃染顆粒細胞ト網狀細胞トノ移行型ヲ認ムルノミナラズ種々ノ分泌時期（安靜狀態或ハ活動狀態）ノ細胞ガ存在セルハ上記ニヨリテ明カナルコトトス。

Mitochondrien ハ上記網工中ニ多數ニ存在シ、種々ノ形狀ヲ有シ小顆粒狀、桿狀、連珠狀等ノモノヲ見ル。但シ Hämatoxylin ニ homogen ニ淡染セル細胞基底部中ニハ桿狀ノ Mitochondrien 多ク存在セリ。一般ニ網眼減少セル細胞即チ活動期ノ細胞ニ於テハ小顆粒狀ノ Mitochondrien ハ増數シ桿狀、連珠狀ノ

モノハ減少セリ。コレニ反シ網眼ノ増數セル細胞即チ安靜時ノモノニ於テハ桿狀、連珠狀ノモノ多ク顆粒狀ノMitochondrienヲ認ムルヲ常トス。

第 2 節 飢 餓 時 所 見

Hämatoxylin-Eosin 染色所見；

弱擴大ニ於テハ前實驗ト同様 Eosin ニ良染スル一部ノ細胞群ト淡染透明ニシテ網狀構造ノ一大部ノ細胞群トヲ區別シ得。強擴大ニ於テハ Eosin ニ良染スル細胞ハ、Eosin ニ淡染セル光澤アル大顆粒ニテ充填サルモノ多ク、一般ニ膨大シ、核ハ基部ニ壓迫セラレ多角形ニシテ濃染セルモノ多シ。他ノ大部分ノ Endstücke ノ細胞ハ Eosin ニヨリ淡染スル網工ヲ有シ多數ノ割合整然タル圓形透明ナル網眼ヲ圍ミ、所謂網狀構造ヲ呈セリ。此細胞ハ一般ニ膨大シ、核ハ小ク萎縮シ不正形ニシテ基部ニ壓迫セラレ濃染セルモノ多シ。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

弱擴大ニ於テハ腺ノ一小部ハ濃染セル顆粒狀構造ノ細胞群ヨリナリ、一大部ハ網狀構造ノ細胞ヨリ構成サルヲ見ル。然レ共概シテ對照ニ比シ前者ハ増加セリ。強擴大ニテ檢スレバ濃染顆粒狀ノ細胞ニハ大小種々ノ稠密ノ濃染顆粒アリ。殆ド細胞體內ヲ充填セルモノ多シ。染色性ノ減ゼル顆粒ハ周縁ニ透明部アルヲ見ル。尙ホ Endstücke ニ數箇ノ濃染顆粒ヲ有スル細胞或ハ基部ニ濃染顆粒ヲ有シ、遊離縁ニ近キ部ハ網狀構造ヲ呈スルモノノ存在セルハ前實驗ト同様ナリ。

Mitochondrien ハ一般ニ僅數ニシテ殊ニ顆粒間ニハ極少數ノ桿狀ノモノヲ認知スルノミ、然レ共 Hämatoxylin ニ淡染セル基部ニハ桿狀、連珠狀ノモノ稍々多ク其多數ハ核ニ接在セリ。

Endstücke ノ一大部ヲ構成セル網狀細胞ノ網工ハ纖細ニシテ細胞體ハ殆ド不染性部ノミナルカノ狀ヲ呈セリ。但シ細胞ノ基部ハ Hämatoxylin ニヨリ difuss ニ染色セリ。Mitochondrien ハ上記網工中ニ多數ニ證明シ得。而シテ桿狀、連珠狀、顆粒狀ノモノアリ種々ノ狀ヲ呈スト雖モ一般ニ桿狀ノモノ多シ、殊ニ Hämatoxylin ニヨリ difuss ニ染レル基部ニハ桿狀ノモノ多シ。

第 3 節 飽 食 時 所 見

Hämatoxylin-Eosin 染色所見；

弱擴大ニ於テ Eosin ニ良染スル一部ノ細胞群ト大部ノ透明網狀細胞群トヲ區別シ得タルハ前實驗ト同様ナリ。然レ共 Eosin 良染細胞ハ對照ニ比シ稍々少キガ如シ。強擴大ニテハ Eosin 良染細胞中ニ稍々光澤アリテ Eosin ニ淡染セル顆粒殊ニ中小ノ顆粒ニシテ減數セルヲ見ル。一部ノ細胞ハ僅ニ縮小シ、核ハ細胞基部ヨリ離レ中心ニ近ヅキ稍々膨大シ淡染セリ。此種細胞ハ Schaltstücke ニ接近セル部及ビ Endstück ノ全部又ハ一部ニ存在セリ。他ノ大部分ノ Endstück ノ細胞ハ網狀構造ヲ示スト雖モ其網眼ハ一般ニ減數セリ。時ニ大ナル網眼ヲ認ム。細胞ハ對照ニ比シ概シテ小ク、核ハ僅ニ細胞基部ヲ離レ圓形又ハ橢圓形ニシテ稍々膨大シ染色性ヲ減ゼリ。從ツテ Endstücke ハ一般ニ小ナリ。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

本染色ニ於テモ亦弱擴大ニテ濃染顆粒ヲ有スル細胞群ト網狀細胞群トヲ區別シ得。強擴大下ニテハ濃染顆粒細胞ハ顆粒ノ減少、特ニ大濃染顆粒ノ減少ヲ示シ、中小ノ顆粒ハ多少染色性ヲ減ジ其周縁部ハ多クハ透明ナリ。從ツテ對照ニ比シ稠密ノ濃染顆粒ヲ有セル細胞ハ減數セリ。

Mitochondrien ハ飢餓時ニ於ケルヨリ稍々多數ニ存在セリ、即チ濃染顆粒間ニ長短桿狀、連珠狀、顆粒狀殊ニ粒狀ノモノヲ多ク認メ得、就中細胞基底部分ハ前實驗ト同様桿狀ノ Mitochondrien ヲ見ル事多シ。

Endstücke ノ透明細胞ハ網工ニヨリ網眼ヲ圍ムト雖モ對照ニ比シ網工ハ稍々太ク其網眼ハ多少減數シ時ニ可成リ大トナレルモノアリ。Hämatoxylin ニ淡染セル細胞基底部分ハ稍々増加セリ。尙同一 Endstück ニ前記濃染顆粒細胞ト網狀細胞トヲ混有セルモノ及ビ兩細胞ノ移行型ト見做ス可キモノヲ認メ得。

Mitochondrien ハ網工中ニ種々ノ形ノモノ多數ニ存在スト雖モ概シテ顆粒狀、連珠狀ノモノ多シ。但シ細胞基底部分ニ多數ノ桿狀ノ Mitochondrien ヲ見ル。

B) 實驗的研究

第 1 節 「アトロピン」注射後ノ所見

本實驗ノ主眼ハ「アトロピン」ニヨリ副交感神經ノ末端ヲ麻痺セシメ依テ起ル腺細胞ノ組織的變化ヲ攻究スルニアリ。硫酸「アトロピン」ヲ前記ノ如ク注射

スル時ハ口腔内ハ乾燥シ瞳孔散大ヲ來ス。注射後 1 時間ニシテ動物ヲ殺シ顎下腺ヲ採取セシニ、腺ハ著シク其容積ヲ増シ淡紅色ヲ呈セルヲ見ル。

Hämatoxylin-Eosin 染色所見；

細胞群ノ大部ハ淡染シ透明ナル網狀構造ヲ呈ス。一部ノ細胞群ハ Eosin ニ良染セルヲ見ル。一般ニ Endstücke ハ著シク膨大セリ。上記 Eosin 良染部ノ細胞ハ強擴大下ニ檢スルニ、Eosin ニ微ニ染レル光澤アル粗大顆粒ニテ充填セラレ、顆粒ハ互ニ壓迫セル狀態ニテ稠密ニ存在セリ。本實驗ニ於テハ斯クノ如キ細胞群ノ増加顯著ナリ。一般ニ細胞ハ膨大シ、核ハ基底部分ニ壓セラレ濃染縮小セルモノ多シ。概シテ細胞ノ境界ハ判然セズ。網狀細胞ハ透明ニシテ纖細ナル網工ヲ有シ蜂窩狀ヲ呈シ多數ノ網眼ヲ有セ

リ。此網眼ハ稍々圓形ニシテ多クハ増數セリ。一般ニ之等細胞ハ膨大ノ度顯著ニシテ之ヨリ構成セラルル Endstücke モ亦膨脹セリ。核ハ萎縮濃染シ細胞基底部分ニ壓迫セラレ橢圓形或ハ稍々不正形トナツテ現ル。然レ共亦上記 Eosin 好染細胞及ビ網狀細胞ヨリナレル Endstücke ヲモ見ル。排泄管々腔ハ一般ニ狹隘ニシテ同管細胞ハ著シク其高サヲ増セリ。尙ホ Endstücke 周圍ノ毛細血管ハ縮小シ少量ノ血球ヲ含有セリ。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

主トシテ透明網狀ノ Endstücke ヲリナリ、散在性ニ顆粒狀部ヲ見ルト雖モ本標本ニ於テハ顆粒狀部ト網狀部トハ鮮明ニ區別セラレ、顆粒狀部ハ著シク増大セル觀ヲ呈ス。該顆粒狀部ヲ強擴大ニテ檢スルニ濃染顆粒ハ著シク粗大ニシテ且増數シ、稠密ニ存在

シ互ニ壓迫シ一部ハ相融セルカノ如キ狀ヲ呈セリ。然レ共亦一部ノ細胞ニアル顆粒ハ主トシテ中等大ニシテ且稍々減數セリ。顆粒ノ一部ハ染色性ヲ減ジ其周縁部ガ透明帶ニテ圍繞セラルルヲ見ル。

Mitochondrien ハ濃染顆粒間ニ極小數ノ桿狀物トナツテ現ル、但シ細胞基底部ニハ種々ノ桿狀、連珠狀ノモノヲ見ル。

大部ノ Endstücke ヲ構成セル細胞ハ網工ヲ有シ、之ニ由テ割合整然タル圓形透明ナル網眼ヲ圍ミ所謂網狀構造ヲ示セリ。一般ニ本例ニ特異ナルハ其網工ノ纖細ニシテ網眼ノ増數セルニアリ。尙ホ生理的機能狀態ノ條下ニ記載セシ如ク Endstücke ノ濃染顆粒細胞ト網狀細胞トヨリナルモノ或ハ粗大濃染顆粒細

胞ノミヨリナレルモノヲ見ル。時ニ濃染顆粒ノ染色性ヲ減ジ網眼中ニテ透明ナル周縁部ニテ取り圍マレ恰モ網眼ニ移行セントスルガ如キ狀態ヲ呈セルモノアリ。

Mitochondrien ハ網工中ニ多數存在シ、桿狀、連珠狀、顆粒狀等種々ノ狀ヲ呈スト雖モ一般ニ桿狀ノモノ多キガ如シ。殊ニ細胞基底ノ Hämatuxylin ニ淡染セル部ニハ長短桿狀ノモノヲ多數含有セリ。

第 2 節 「アドレナリン」注射後ノ所見

交感神經ノ末端ヲ「アドレナリン」ニヨリ興奮セシメタル場合、腺細胞ハ如何ニ影響セラルルカヲ検索

センガ爲ニ本實驗ヲ行ヘリ。本實驗ノ組織の所見ハ大體ニ於テ「アトロピン」動物ノソレニ酷似セリ。

Hämatuxylin-Eosin 染色所見；

Eosin ニ好染スル一部細胞群ト大部ノ網狀細胞群トヲ見ル。前者ハ Eosin ニ淡染シ粗大ニシテ光澤アル顆粒ニテ充填セラル。一般ニ細胞ハ膨大シ、核ハ萎縮濃染シ不正形或ハ類橢圓形ニシテ細胞基底部ニアルモノ多シ。後者ハ透明ニシテ Eosin ニ微染セル纖細ナル網工ヲ有シ蜂窠狀ヲ呈シ、多數ノ網眼ヲ圍メリ。而シテ該網眼ハ圓形同大ノモノ多ク一般ニ増

數セリ。之等細胞ヨリナレル Endstücke ハ其膨大ノ度顯著ナリ。然レ共 Endstücke ノ Eosin 良染細胞ノミヨリ構成セラレ或ハ上記兩細胞ヲ混有セルモノヲモ之ヲ見ル。Endstücke ノ周圍ノ毛細血管ハ縮小シ血球ニ乏シ。尙ホ排泄管々腔ハ狹隘ニシテ同管細胞ハ其高サヲ増セルモノ多シ。

Eisenhämatuxylin 染色所見；

一小部ハ顆粒狀一大部ハ透明ナル網狀構造ノ細胞群ヨリナル。但シ顆粒狀部ハ正常ニ比シ多少増加セルガ如キ觀ヲ呈セリ。強擴大下ニ顆粒狀部ノ細胞ヲ見ルニ「アトロピン」動物ニ於ケルト同様、一般ニ粗大濃染セル顆粒アリ、増數シ、原形質内ヲ殆ト滿シ、互ニ壓迫シ一部ハ相融合セルカノ如キ觀ヲ呈セリ。然レ共時ニ中等大濃染顆粒ノ少數ヲ有セル細胞ヲ見或ハ多少染色性ヲ減ジ且周縁透明部ニヨリ圍繞サル顆粒ヲモ之ヲ見ル。

Mitochondrien ハ多數ノ濃染顆粒ヲ有スル細胞ニ於テハ、顆粒間ニ僅ニ桿狀物トシテ之ヲ認ムルノミ。之ニ反シ顆粒ノ多少減數セル細胞ニ於テハ顆粒間ニ小數ナガラ桿狀、連珠狀、顆粒狀ノモノヲ見ル。殊

ニ細胞基底部ニハ桿狀ノ Mitochondrien ヲ認ム。

透明網狀細胞ハ蜂窩狀ヲ呈シ網眼ヲ有セリ。而シテ其網工ノ纖細ナルト網眼ノ増數セルヲ特有トス。一般ニ網眼ハ同大ノモノ多シ。Endstücke ハ多クハ網狀細胞ヨリナルト雖モ時ニ濃染顆粒細胞ト網狀細胞トヲ混有セルモノ、或ハ濃染顆粒細胞ノミヨリナレルモノモ之ヲ見ル。尙ホ兩細胞ノ移行型ト認ム可キ細胞アリ、即チ多少染色性ヲ減ジ透明ナル周縁部ニテ圍繞サル顆粒ヲ含メル細胞ヲモ之ヲ認ム。

Mitochondrien ハ網工中ニ多數存在シ桿狀、連珠狀、顆粒狀等ヲ呈スト雖モ殊ニ桿狀ノモノヲ多シトス。尙ホ微ニ Hämatuxylin ニ染レル細胞基底部ニハ長短桿狀ノ Mitochondrien 稍々多數ニ存在セリ。

第 3 節 頸部交感神經刺激後ノ所見

頸部ニ縱切ヲ加ヘ、氣管ノ側方ニテ一側ノ Grenzstrangヲ露出セシメ、頸動脈ニ近ク上頸神經節部ニ於テ生理的食鹽水ヲ點滴シツツ之ヲ感應起電機ニテ（捲軸距離 10 cm 電源 1 Volt ノモノ）30 分間刺激シ後上記ノ如ク標本ヲ作製ス。摘出ノ際顎下腺ハ肉眼

的ニ淡紅色ヲ呈シ容積稍々増大セルヲ見タリキ。本實驗ニ於テモ一般ニ前記「アトロピン」或ハ「アドレナリン」動物ニ於ケルト稍々類似ノ組織的變化ヲ呈セリ。

Hämatoxylin-Eosin 染色所見；

Eosin 好染細胞群ト網狀構造ヲ呈スル細胞群トヲ區別シ得ルハ前實驗例ト同様ナリ。強擴大ニテハ甲細胞中ニハ多少光澤アリテ Eosin ニ微染スル粗大顆粒ヲ充セルモノ多ク、胞體ハ腫大シ、核ハ縮小濃染セリ。然レ共亦稍々僅ノ中等大ノ顆粒ヲ有セル細胞ヲモ之ヲ見ル。此種細胞ニテ Endstücke 全部ヲ構成セルモノアリ或ハ Eosin 良染細胞ト網狀細胞トニテ Endstück ノ構成サルモノアリ。然レ共多數ノ Endstücke ハ主トシテ網狀細胞ニヨリ構成セラルルヲ見ル。此種ノ網狀透明ナル細胞ハ極メテ纖細ナル

網工ヲ有シ蜂窩狀ヲ呈シ割合ニ整然タル多數ノ圓形網眼ヲ區劃セリ。而シテ細胞ハ膨大シ從テ Endstück 全體モ膨大セルモノ多シ。斯ル Endstück ハ恰モ粘液腺ノモノニ類セル觀ヲ呈ス。核ハ濃染萎縮シ細胞基底部分ニアリ。然レ共網眼少ク多少細胞ハ縮小シ、核ハ細胞中心部ニ轉位シ稍々淡染膨大セルモノヲ見ルコトアリ。本例ニ於テモ一般ニ排泄管々腔ハ正常ニ比シ狹隘ニシテ腺中ノ毛細血管ハ縮小シ血球ノ充實度ヲ減ゼルヲ見ル。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

弱擴大下ニテハ顆粒狀細胞群ガ淡染透明ナル網狀細胞群中ニ散在性ニ存セルヲ見ル。顆粒狀細胞ハ稠密ノ粗大濃染顆粒ニテ胞體ヲ充滿セルモノ多シ。一部ノ顆粒ハ互ニ壓迫融合セルカノ狀ヲ呈セリ。然レ共中等大ノ稍々少數ノ濃染顆粒ヲ有セル細胞並ニ染色性ヲ減ジ周縁ガ透明部ニテ圍繞サル顆粒ヲ含メル細胞ヲモ之ヲ見ル。一般ニ本例ノ所見ハ「アトロピン」或ハ「アドレナリン」動物ノモノニ酷似セリ。

Mitochondrien ハ稠密ノ濃染顆粒ヲ有セル細胞ニテハ顆粒間ニ極僅少ニシテ桿狀ノモノヲ見ルコトアルノミ。之ニ反シ濃染顆粒ノ稍々少キ細胞ニ於テハ顆粒間ニ少數ナガラ桿狀、連珠狀及ビ小顆粒狀ノ Mitochondrien ヲ認メ得。但シ細胞基底部分ニハ桿狀

ノモノ多シ。

淡染透明細胞ハ纖細ノ網工ヲ有シ蜂窩狀ヲ呈シ多數ノ略ボ同大ニシテ圓形ナル網眼ヲ區劃セリ。Endstücke ノ多數ハ主トシテ此種細胞ヨリナルト雖モ亦上記 2 種類ノ細胞ヨリナリ或ハ時ニ濃染顆粒細胞ノミヨリ構成セラルルモノアリ。其他上記 2 種細胞ノ移行型ト認ム可キモノヲ見ル。即チ染色性ヲ減ジ周縁部透明ニシテ恰モ網眼ニ移行セントスルガ如キ顆粒ヲ含メル細胞アリ。

Mitochondrien ハ Hämatoxylin ニヨリ微染セル細胞ノ基底部分ニハ多數ノ桿狀物トナツテ存在ス。尙ホ網工中ニ顆粒狀、連珠狀及ビ桿狀ノモノヲ見ルモ殊ニ本例ニハ桿狀ノモノ多シ。

第 4 節 「ピロカルピン」注射後ノ所見

副交感神經ノ末端ヲ刺激興奮セシムル爲「ピロカルピン」ヲ注射シ顎下腺細胞ニ如何ナル變化ヲ惹起

スルヤヲ檢索セリ。上記ノ如ク鹽酸「ピロカルピン」ヲ皮下ニ注射スル時ハ漸次試驗動物ノ兩口角ヨリ多

量ノ稍々稀薄ナル唾液流出ス。同時ニ瞳孔ハ著シク縮小ス。注射後1時間ニシテ材料ヲ採取ス。此際顎

下腺ハ稍々暗紅色ヲ呈シ容積ハ著シク減少セリ。

Hämatoxylin-Eosin 染色所見；

Eosin 好染細胞群及ビ網状細胞群トノ區別ハ至難ニシテ基底部ハEosinニヨリ淡染シ遊離縁部ハ僅ニ網状構造ヲ呈スル細胞ニヨリテ Endstücke ガ構成サルル状アリ。而シテ Endstücke ハ一般ニ著シク縮小シ、強擴大ニテハ光澤アリテ微ニEosinニ染レル顆粒ヲ見ルト雖モ、一般ニ顆粒ハ著シク減少セリ。

顆粒ノ稠密ニシテ細胞腔内ヲ充滿セルモノハ之ヲ認知シ得ズ。顆粒間ニハ大小不同ノ不染性泡狀物ヲ認ム。此種細胞ハ萎縮シ、核ハ細胞中心部ニ轉移シ稍々膨大シ染色性ヲ減ジ核小體及ビ染色質ガ明視セラルモノ多シ。細胞ノ網工ハ稍々不正ニシテ太ク網眼ハ減數シ大小不同ナリ。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

本染色標本ニ於テモ弱擴大ニテハ2種細胞ノ區別ハ判然タラズシテ腺ハ一般ニ淡染網状ノ細胞ヨリナレルノ状アリ。強擴大ニテハ濃染顆粒細胞ハ極メテ特異ノ像ヲ示ス。即チ粗大濃染顆粒ハ著シク減少シ大小種々ノ泡狀物ヲ現出セリ。該泡狀物ハ不染性ニシテ其大ナルモノハ數箇ノ小ナルモノ互ニ合シテ形成サレシモノノ如シ。一部ノ濃染顆粒ハコレニ接在シ染色性ヲ減ゼリ。恐ラクハ溶解シ泡狀物ニ移行スルナラン。斯クノ如キ所見ハ前記諸實驗ニ於テ決シテ見ザリシ所トス。

Mitochondrien ハ原形質中ニ多數ニ之ヲ見ル、殊

ニ顆粒状ノモノ多ク桿状ノモノハ割合少シ。然レ共細胞基底部ニハ稍々多數ノ桿状形 Mitochondrien ヲ認ム。

蜂窩状透明ノ網状細胞ニ於テハ網工一般ニ不正ニシテ網眼ハ著シク減少セルモノ多シ。其大サハ不同ニシテ時ニ可成リ大ナルモノヲ觀ル。細胞基底部ハHämatoxylinニ淡染セルコト多シ。

Mitochondrien ハ網工中ニ主トシテ顆粒状物トナツテ現レ、一小部ハ短桿状或ハ連珠状ヲ呈セリ。但シ細胞基底染色部ニハ前同様多クノ桿状ノ Mitochondrien ヲ見ル。

第 5 節 鼓索神經(副交感神經)刺戟後ノ所見

顎舌骨筋ノ下ニテ舌神經ヲ露出シ鼓索神經ヲ之ニ合スル前ニ於テ可及的側方ニテ生理的食鹽水ヲ滴下シツツ(巻軸距離10 cm, 1 Volt 電源)感應起電機ニテ30分間刺戟セシ後、上記ノ方法ニ從ヒ標本ヲ作製セリ。本實驗ニ於テモ刺戟ヲ加フル時ハ一定時ノ後

唾液ノ流出セシヲ見タリ。材料採取ノ際顎下腺ハ縮小シ暗紅色ニシテ「ピロカルピン」ヲ用ヒシ時ト同様ノ状ヲ呈シ、組織的所見モ大體ニ於テ「ピロカルピン」動物ノモノト一致セル状ヲ呈セリ。

Hämatoxylin-Eosin 染色所見；

弱擴大下ニテハ兩種細胞群ヲ判別スルヲ得ズシテ Endstücke ハ基底部 Eosinニ淡染シ、遊離縁ニ近キ部ハ透明ナル網状ノ構造ヲ有スル細胞ヨリナレルガ如キ觀ヲ呈ス、而シテ細胞及ビ Endstücke ハ一般ニ縮小セリ。強擴大ニテハ少數ノ顆粒ハEosinニ微染

シ、多少光澤ヲ呈セリ。該顆粒ノ稠密ニ充滿セル細胞ハ殆ド之ヲ見ズ、顆粒間ニハ大小不同ノ不染性泡狀物ヲ見ル。核ハ細胞ノ中央部ニ存在シ染色性ヲ減ジ稍々膨大セリ。然レ共多クハ核小體及ビ染色質ハ明カニ認ムルヲ得。細胞ノ網工ハ稍々不整ニシテ太

ク網眼ハ減數シ大小不同ナリ。時ニ網眼ノ可成リ大ナルモノヲ見ル。Endstückeノ周圍ニアル毛細血管ハ擴張シ血球ニ富ミ、排泄管々腔モ「ピロカルピン」動物ト同様擴張シ細胞ハ概シテ扁平トナレリ。

Eisenhämatoxylin 染色所見；

濃染顆粒殆ト消失セルヲ以テ弱擴大ニテハ兩細胞群ヲ區別スルヲ得ズ。一般ニ稍々透明網狀ノ細胞ヨリナレルカノ狀アリ。強擴大ニテハ粗大濃染顆粒ハ著シク減少シ僅ニ數箇ノモノヲ散在性ニ觀ルノミ。濃染顆粒間ニハ大小不同ノ泡狀物ヲ見ル。大泡狀物ハ數箇ノ小泡狀物ノ互ニ合シテ形成サレシノ狀アリ。泡狀物ニ接在セル顆粒ハ染色性ヲ減ジ溶解シテ泡狀物ニ合セントスルガ如キ像ヲ示ス。泡狀物及ビ顆粒ノ間ニハHämatoxylinニ淡染セル原形質アリ。泡狀物ノ多キ場合ニハ之ニ由テ細胞ノ大部ヲ充滿シ其大サモ核大或ハ夫レ以上ニ達セルモノアルヲ見ル。

Mitochondrien ハ泡狀物及ビ顆粒間ノ原形質中ニ存シ主トシテ顆粒狀ヲ呈ス。然レ共亦桿狀、連珠狀ノモノモ少數ニ之ヲ見ル。但シ細胞基底部分ニハ桿狀ノMitochondrien稍々多數ニシテ核ニ接在セリ。

細胞ノ網工ハ「ピロカルピン」動物ノモノト略ボ同様ナリ。即チ細胞基底部分ニHämatoxylinニ淡染セル原形質ニ富ミ網工ハ遊離線ニ近ク現出セリ。而シテ一般ニ網工ハ稍々太ク網眼ハ大小不同ニシテ著シク減數シ時ニ大ナル大サニ達セルヲ見ル。

Mitochondrien ハ桿狀、連珠狀及ビ顆粒狀ノモノヲ網工中ニ見ルト雖モ殊ニ顆粒狀ノモノヲ多シトス。但シ細胞基底部分ニハ比較的多數ノ桿狀物ヲ認ム。

第 4 章 總括並ニ考按

I) 生理的狀態ニ於ケル場合

對照、飢餓時及ビ飽食時ニ於ケル組織の所見ヲ總括スルニ Eosin-Hämatoxylin 染色標本ニ於テハ腺一小部ハEosinニ好染スル細胞群ヨリナリ、一大部ハ淡染透明ニシテ網狀構造ノ細胞群ヨリナルヲ見ル。然レ共飢餓時ニ於テハEosin良染部ハ對照ニ比シ比較的增加シ、飽食時ニハ減少スルモノトス。強擴大下ニ檢スルニ對照ニ於ケルEosin良染部ノ細胞ハ多少光澤ヲ有シEosinニ淡染セル大小種々ノ顆粒ニテ滿サル。稠密ニ大顆粒ニテ充滿サルル細胞ハ稍々膨大シ、核ハ基底部分ニ壓迫セラレ萎縮濃染セルモノ多シ。之ニ反シ顆粒稍々小ニシテ且少數ナル細胞ハ稍々縮小シ其核ハ略ボ胞體ノ中心部ニアリ、圓形ニシテ淡染シ核小體、染色質ヲ明カニ認メ得ルモノ多シ。飢餓時ニ於テハ一般ニ顆粒ハ大ニシテ細胞ハ稍々膨大シ其核ハ基底部分ニ壓迫セラレ不正圓形ニシテ萎縮濃染セルモノ多シ。コレニ反シ飽食時ニ於テハ顆粒小ク且減數セリ。而シテ細胞ハ多少縮小シ、核ハ略ボ胞體ノ中央部分ニ存在シ膨大淡染セルヲ常トス。

網狀細胞ハ蜂窩狀ヲ呈シ、全ク不染性ニシテ比較的整然タル類圓形ノ網眼ヲ有セリ。飢餓時ニ於テハ網眼ハ概シテ増數シ、網工ハ纖細ニシテ細胞ハ膨大シ核ハ萎縮濃染シ細胞基底部分ニ壓迫サルルモノ多シ。之ニ反シ飽食時ニ於テハ一般ニ網眼ハ減數シ網工ハ稍々太ク細胞ハ縮小セリ。而シテ核ハ少シク中心ニ近接シ稍々膨大シ淡染セルコト多シ。對照ニ於テハ上記兩者ノ中間ノ狀ヲ呈シ種々ノ分泌時期ノ細胞ヲ見ル。Endstückeハ主トシテ網狀細胞ヨリナルト雖モ亦

Eosin 良染細胞ヨリナレルモノアリ或ハ兩細胞ヲ混有スルモノヲ見ル。Endstücke ハ要スルニ飽食動物ニ於テハ縮小シ、飢餓動物ニ於テハ膨大スルモノトス。

Eisenhämatoxylin 染色標本ニテハ上記顆粒ハ一層鮮明ニ之ヲ見ルヲ得。即チ弱拡大ニテ檢スレバ腺ノ一小部ヲ構成セル細胞群ハ Hämatoxylin ニヨリ濃染スル顆粒ニテ充滿セラレ、他ノ一大部ハ網狀ノ細胞群ヨリナレルヲ見ル。前者ハ Bensley 氏ノ所謂「Homeochrome cells」ニ、後者ハ同氏ノ「Tropochrome cells」ニ一致スルモノナリ。強擴大下ニテハ濃染顆粒細胞ノ顆粒ハ大小不同ナルモ粗大ナルモノ多ク稠密ニ存在シ互ニ壓迫シ一部互ニ融合セルカノ狀アリ。甚ダシキハ殆ド全ク該顆粒ニヨリ細胞體ガ充填セラルルヲ見ル。然レ共稍々少數ノ大小種種ノ顆粒ヲ有シ或ハ染色性ヲ減ジ且其周圍ガ透明ナル小顆粒ヲ有セル細胞ヲモ之ヲ認ム。一般ニ飢餓時ニ於テハ粗大濃染顆粒多クシテ細胞體ハ之ニ由テ充滿サレ顆粒ハ互ニ壓迫融合セントスルガ如キ狀ヲ見ルコト多シ。之ニ反シ飽食時ニ於テハ一般ニ顆粒殊ニ其粗大ノモノハ其數ヲ減ジ少數ノ中等大ノ濃染顆粒ヲ有スル細胞多ク現出ス。尙ホ各實驗例ニ於テ稍々染色性ヲ減ジ其周縁部ハ透明ニシテ恰モ漸次不染性狀態ニ移行スルカノ觀ヲ呈スル顆粒ヲ含メル細胞ヲモ認ム。

網狀細胞ハ恰モ蜂窩狀ヲ呈シ其網工ハ稍々整然トシテ圓形透明ナル網眼ヲ圍メリ。對照動物ニ於テハ網工纖細ニシテ多數ノ網眼ヲ有シ細胞ノ膨大セルモノアリ。或ハ網工稍々太ク網眼ノ減數シ比較的細胞ノ縮小セルモノアリ。前者ハ飢餓時ニ於テハ一般ニ増加シ、後者ハ飽食時ニ於テ増加スルモノトス。然レ共各例ニ於テ網狀細胞中數箇ノ粗大濃染顆粒ヲ含メルモノ並ニ染色性ヲ減ジ透明ナル周縁部ヲ有セル顆粒モ之ヲ見ル。Endstücke ハ主トシテ上記網狀細胞ヨリナルト雖モ亦粗大濃染顆粒細胞ヨリナリ或ハ兩種細胞ヲ混有セルコトアリ。

Mitochondrien ハ粗大濃染顆粒ヲ有スル細胞ニ於テハ、顆粒間ニ殆ド之ヲ見ズト雖モ細胞基底部ニハ核ニ近ク稍々多數ノ桿狀ノモノヲ見ル。之ニ反シ濃染顆粒ノ減數セルモノニ於テハ、顆粒間ニ少數ナガラ長短ノ桿狀、連珠狀及ビ顆粒狀ノ Mitochondrien ヲ認ム。殊ニ飽食時ニ於テハ飢餓時ニ比シ顆粒間ニ多クノ Mitochondrien ヲ見ルモノナリ。網狀細胞ニ於テハ網工中ニ小顆粒狀、連珠狀及ビ桿狀ノ Mitochondrien 多數ニ存在ス、概シテ網眼ノ減數シ多少縮小セル細胞ハ小中ノ顆粒狀 Mitochondrien ニ富ミ網眼ノ増數シ膨大セル細胞ハ桿狀、連珠狀ノ Mitochondrien ニ富メリ。但シ Hämatoxylin ニ淡染セル細胞基底部ニハ核ニ近ク桿狀ノ Mitochondrien ヲ稍々多數ニ見ルヲ常トス。換言スレバ飢餓時ニ於テハ桿狀、連珠狀ノ Mitochondrien 増加シ、飽食時ニ於テハ顆粒狀ノモノ多數ニ現出ス。

抑モ家兔顎下腺細胞ハ純漿液性ノモノニシテ、Nusbaum ノ認メタル如ク Osmiumsäure ニヨリ處置スル時ハ還元セラレ深黑色ヲ呈スルモノナリ。是レ Ferment ニ豐富ナルニ因ルガ如シ。一般ニ細胞中ノ濃染顆粒ハ Serozymogen-granula ト見做サレ居レリ。尙ホ該腺ヲ Kopsch 氏重「クローム」酸「フォルモール」液ニ固定シ Eisenhämatoxylin 染色ニヨリ檢スル時ハ、腺ノ

一部ハ粗大濃染顆粒ヲ有シ一大部ハ淡染シ稍々粘液細胞ニ類似スル網狀構造ノ細胞群ヨリナルヲ見ル。之ヲ新鮮標本ト比較研究セシ Müller 等ニ據レバ前者ハ後者ノ前階級ノ細胞ニシテ只分泌時期ニヨリテ互ニ異リタル形態ヲ現スニ過ギズト。之ニ反シ Cohoe ハ上記2種類ノ細胞ヲ全ク異リタル染色性質及ビ化學的反應ヲ有スル別種ノモノトシ其位置的關係ニ就テモ詳述セリ。余ノ實驗ニ依レバ上記粗大濃染顆粒細胞ト網狀細胞トハ判然區別シ得ルト雖モ飢餓時ニ於テハ對照ニ比シ該粗大濃染顆粒ハ増數シ、網狀細胞ノ網眼モ亦増數スルヲ見ル。然ルニ飽食時ニ於テハ全ク之ニ反スル現象ヲ呈ス。尙ホ各實驗例ニ於テ濃染顆粒中一部ノモノハ多少其染色性ヲ減ジ、透明ナル周緣部ヨリ圍繞セララルガ如キ像ヲ呈シ、且前記網眼中ニ僅ニ染色性ヲ減ジタル顆粒ガ透明周緣部ニテ圍繞サレテ存在シ、全ク兩細胞ノ移行型タルガ如キ所見ヲ觀ルコトアルノミナラズ、Endstück ガ或ハ網狀細胞ノミヨリ、或ハ濃染顆粒細胞ノミヨリ又時ニ兩種細胞ヨリナルヲ以テ見レバ、此兩細胞ハ全ク分泌時期ノ差ニヨリ構造ヲ異ニスルモノトシ畢竟同一種ノモノニ外ナラズト信ズ。即チ濃染顆粒ハ漸次増大シ終ニ其染色性ヲ減ジ不染性周緣部ヲ有スルニ至リ、次デ全ク不染性トナリ前記網眼ニ移行スルモノナラン。而シテ該網眼ハ Cohoe ニ從ヘバ Kopsch 氏液固定後 Mucicarmin ニヨリ良染シ、Thionin ニヨリテ Metachromatisch ニ染色スト云フト雖モ、余ノ實驗ニ依レバ如何ナル方法ヲ以テスルモ染色シ得ザルモノトス。

一般ニ粗大濃染顆粒及ビ網眼ノ増加セル場合、即チ飢餓時ニ於ケル細胞ハ多少膨大シ核ハ細胞基底部ニ壓セラレ濃染スルモノ多シ、之ニ反シ飽食時ニ於テハ細胞ハ稍々縮小シ核ハ細胞中心部ニ近在シ膨大淡染スルモノ多シ。

Mitochondrien ハ對照ニ於テハ長短桿狀、連珠狀及ビ顆粒狀ノモノヲ多ク認メ得ルモ飢餓時ニ於テハ桿狀ノモノ多ク、飽食時ニ於テハ顆粒狀ノモノ多シトス。桿狀ノ Mitochondrien ハ一定ノ時期ニ於テ染色性稍々弱キ部分ニヨリテ相連レル所謂連珠狀ノモノトナリ、次デ小顆粒狀ノモノニ分解シ、漸次發育シテ増大シ粗大濃染顆粒ニ移行スルモノナラン。然レ共細胞基底部原形質中ニハ核ニ近ク桿狀ノ Mitochondrien ガ常在セルヲ見ル。

II) 實驗的研究ニ於ケル場合

1) Atropin ニテ副交感神經ノ末端ヲ麻痺セシメ、或ハ Adrenalin ニテ交感神經ノ末端ヲ興奮セシメ、或ハ頸部交感神經ヲ感應「コイル」ニテ刺戟スル時ハ一般ニ肉眼的ニ顎下腺ハ其容積ヲ増シ淡紅色ヲ呈スルモノトス。之ヲ組織的ニ檢スレバ Hämatoxylin-Eosin 染色標本ニ於テ Eosin ニ良染スル細胞群ハ多少増加スルヲ見ル。而シテ一般ニ細胞ハ膨大シ、核ハ細胞ノ基底部ニ壓セラレ、不正類圓形トナリ萎縮濃染セルコト多シ。從ツテ Endstücke モ著シク膨大ス。網狀細胞ハ恰モ粘液細胞ノ如キ觀ヲ呈ス。尙ホ實驗例ニ於テ特有ナルハ Endstücke ノ周圍ニアル毛細血管ノ縮小顯著ニシテ血球ニ乏シク、腺ノ排泄管々腔ガ狹隘ニシテ其細胞ガ著シク増

高セルコトス。Eisen-Hämatoxylin 染色標本ニ於テハ所謂「Homeochrome cells」ニ於ケル粗大濃染顆粒ハ著シク増數シ殆ド胞體內ヲ充填シ其一部ハ互ニ融合セントスルガ如キ狀ヲ呈セルコト多シ。所謂「Tropochrome cells」ノ網眼ハ著シク増數シ且兩細胞ノ移行型ヲ認ム。Endstücke ハ網狀細胞ヨリナリ或ハ濃染顆粒細胞ヨリナリ時ニ兩細胞ヨリ構成セラルルヲ見ル。

Mitochondrien ハ Homeochrome cells ニ於テハ見出シ難ク、殊ニ顆粒間ニ殆ド之ヲ認知シ得ザルモ、細胞基底部ニハ桿狀ノ Mitochondrien 稍々多數ニ存在セリ。Tropochrome cells ノ網工中ニハ桿狀、連珠狀及ビ顆粒狀ノモノアルモ、一般ニ長短ノ桿狀ノモノヲ多シトス。但シ Hämatoxylin ニヨリ淡染スル細胞基底部ニハ核ニ接近シテ桿狀ノ Mitochondrien 多數ニ存在セリ。

2) Pilocarpin ヲ注射シ或ハ鼓索神經ヲ電氣ニテ刺戟スルトキハ顎下腺ハ肉眼的ニ暗紅色ヲ呈シ、著シク容積ヲ減ズ。Hämatoxylin-Eosin 染色標本ニテハ Eosin ニ好染スル細胞ト網狀細胞トノ判別ハ至難ニシテ、一般ニ Endstücke ノ基底部 Eosin ニテ淡染シ、遊離縁部ハ網狀構造ヲ有スル細胞ヨリナルヲ見ル。而シテ細胞竝ニ Endstücke ハ一般ニ著シク縮小シ、核ハ細胞中心部ニ近接シ膨大淡染セリ、但シ多クハ核小體及ビ染色質ヲ明視スルヲ得。Endstücke ノ周圍ニアル毛細血管ハ擴張シ血球ニ富ミ、腺ノ排泄管々腔ハ擴大シ、同管細胞ハ概シテ扁平トナレリ。Eisen-Haematoxylin 染色標本ニ於テハ所謂「Homeochrome cells」ノ粗大濃染顆粒ハ著シク減少シ、且顆粒ハ比較的小トナリ、透明ノ周縁部ニヨリ圍繞セラルルヲ見ル。而シテ大小種々ノ不染性泡狀物現出セリ。其大泡狀物ハ小泡狀物が互ニ融合シテ形成サルルモノノ如シ。加之泡狀物ニ接セル顆粒ハ染色性ヲ減ジ泡狀物ニ合シ之ニ移行セントスルガ如キ像ヲ示セリ。泡狀物及ビ顆粒ハ Hämatoxylin ニヨリ淡染スル原形質ニヨリ區劃セラル。所謂「Tropochrome cells」ノ網工ハ稍々不整ニシテ大小不同ノ網眼ヲ有シ其一部ハ互ニ合シテ大網眼トナリ著シク減數セルヲ見ル。本例ニ於テモ亦移行型ト見做ス可キ細胞ノ存スルハ前實驗ト同様ナリ。

Mitochondrien ハ所謂「Homeochrome cells」ニ於テハ泡狀物間或ハ顆粒間ニ存シ、主トシテ小顆粒物ヨリナルト雖モ桿狀、連珠狀ノモノモ小數ニ認メ得。「Tropochrome cells」ニ於テハ網工中ニ多數ノ顆粒狀ノモノヲ見ルノ他ニ僅數ナガラ桿狀或ハ連珠狀ノモノモ認ムルヲ得。但シ一般ニ細胞基底ニ於テ核ニ近キ部ニハ桿狀ノモノ多シ。

要スルニ Atropin 或ハ Adrenalin ヲ注射シ或ハ頸部交感神經ヲ刺戟シテ人工的ニ交感神經ノ作用ヲ偏勝セシムルトキハ、顎下腺細胞ノ濃染粗大顆粒ハ増數シ同時ニ網狀細胞ノ網眼モ亦増數スルモノニシテ、且細胞ハ膨大シ核ハ細胞基底部ニ壓迫セラレ濃染セルモノ多キヲ見ル。之ニ反シ Pilocarpin ヲ注射シ或ハ鼓索神經ヲ刺戟シテ人工的ニ副交感神經作用ヲ偏勝セシムルトキハ、上記粗大濃染顆粒ハ著シク減少シ同時ニ不染性泡狀物現出ス。此泡狀物ハ恐ラクハ

濃染顆粒が染色性ヲ失ヒテ變化スルニ由テ生ズルモノナラン。尙ホ網狀細胞ノ網眼ハ大小不同ニシテ著シク減數セリ。而シテ大網眼ハ數箇ノ小網眼ガ合スルニ由テ生ズルモノノ如シ。Mitochondrien ハ Pilocarpin 注射後及ビ鼓索神經刺戟後ニハ顆粒狀、連珠狀ノモノ多ク現出シ、Atropin, Adrenalin 注射後及ビ交感神經刺戟後ニハ桿狀ノモノ多ク存在スルヲ見ル。但シ一般ニ細胞基底部ニハ核ニ近ク常ニ桿狀ノ Mitochondrien ヲ見ルモノトス。

最近ノ研究ニ據レバ自律神經亢奮スル時ハ其終末部ニ化學的變化惹起セラルト。例之心臓ニ至レル交感或ハ迷走神經ヲ刺戟スルトキハ管ニ心臟内 Ca 或ハ K ノ增量ヲ見ルノミナラズ特種ノ物質ガ現出シ或ハ促進的ニ或ハ抑制的ニ作用スルコト殆ド疑ナキニ至レリ。唾液ノ分泌ガ交感竝ニ副交感神經ノ刺戟ニヨリ影響サルルハ周知ノ事ニ屬シ、生理的ニ交感神經唾液ハ粘稠濃厚ニシテ有機質ニ富ミ少量ナレドモ、副交感神經唾液或ハ腦神經唾液ハ稀薄透明ニシテ有機質ニ乏シク大量ニ泌別サルルモノトス。余ノ實驗ニ據レバ感應「コイル」ニテ副交感神經ヲ刺戟シ或ハ Pilocarpin ヲ注射スレバ顎下腺細胞ノ濃染顆粒ハ著シク減少シ、同時ニ不染性泡狀物現出シ、細胞ノ網眼ハ融合シ犬トナリ減數スルヲ見ル。是レ恐ラク腺ニ終末スル副交感神經末端ニ近ク K 及ビ Vagusstoff ノ如キ物質增量シ、一方腺ノ血管擴張シ細胞内ノ水分增量シ、細胞緩疎トナリ分泌顆粒ハ液化シ、其結果細胞内濃染顆粒ハ減少シ泡狀物トナリ、細胞内ノ網眼ハ互ニ融合シ減數シテ、多量ノ水様性ノ有機質ニ乏シキ唾液ヲ分泌スルモノナラン。之ニ反シ Atropin 或ハ Adrenalin ヲ注射シ、或ハ交感神經ヲ感應「コイル」ニテ刺戟スル時ハ、顎下腺内ニ恐ラク Ca 及ビ Acceleransstoff ノ如キ物質增量シ、一方腺ノ血管ハ收縮シ、細胞内水分ハ減少シ、濃染顆粒及ビ網眼ハ増數シ細胞内ニ蓄積シ爲ニ細胞ハ膨大スルニ至リ、從ツテ濃厚ナル少量ノ有機質ニ富メル唾液ガ排出サルルモノナラン。尙ホ分泌顆粒ガ細胞内ニ蓄積増加スル時ハ核ハ細胞基底部ニ壓迫セラレ萎縮濃染スルニ反シ、分泌顆粒ガ減少スル時ハ核ハ細胞ノ中心部ニ近接シ且膨大淡染スルモノトス。

第 5 章 結 論

- 1) 家兎顎下腺ヲ Kopsch 氏液ニテ固定後鐵「ヘマトキシリン」ニテ染色鏡檢スル時ハ、濃染スル粗大顆粒ニテ充サルル小數ノ細胞ト網狀構造ヲ有スル多數ノ細胞トヲ認ム。前者ハ Bensley 氏ノ所謂「Homeochrome cells」ニ、後者ハ同氏ノ「Tropochrome cells」ニ一致スルモノトス。
- 2) 之等兩細胞ハ分泌時期ニ從ヒ増減スルモノトス。
- 3) 鼓索神經ヲ刺戟シ或ハ「ピロカルピン」ヲ注射スル時ハ、顎下腺ハ血液ニ富ミ腺中ノ毛細血管ハ著シク擴大ス。コレニ反シ「アトロピン」或ハ「アドレナリン」ヲ注射シ或ハ交感神經ヲ刺戟スル時ハ、腺ハ血液ニ乏シクナリ其毛細血管ハ縮小ス。
- 4) 鼓索神經ヲ感應「コイル」ニテ 30 分刺戟スルカ或ハ「ピロカルピン」ヲ注射セル後 1 時間

ヲ經ル時ハ顎下腺細胞ノ粗大濃染顆粒ノ一部ハ泡狀物ニ變ジ爲ニ顆粒ハ大ニ減少ス。網狀細胞ニ於テハ網眼大トナリ其數ヲ減ズ。

5) 交感神經ヲ感應「コイル」ニテ 30 分刺戟スルカ或ハ「アトロピン」若クハ「アドレナリン」ヲ注射シ 1 時間ヲ經ル時ハ顎下腺細胞ノ粗大濃染顆粒ハ著シク増數シ且網狀細胞ノ網眼數ヲ増ス。

6) 上記ノ如ク濃染顆粒及ビ網眼數ノ減少スルハ、恐ラク腺内ニ K 或ハ Vagnsstoff ノ如キ物質増量シ、一方血管擴張シ、細胞内水分ノ増加ヲ來シ顆粒ハ液化シ小網眼ハ互ニ合スルニヨルナラン。

7) 上記ノ如ク粗大濃染顆粒及ビ網眼數ノ増加スルハ恐ラク腺内ニ Ca 及ビ Acceleransstoff ノ如キ物質増量シ、一方血管收縮シ、腺細胞内水分ハ減少シ顆粒ハ容易ニ液化セズシテ細胞内ニ蓄積スルニヨルナラン。

8) 顎下腺細胞ノ Mitochondrien ハ桿狀、連珠狀、顆粒狀等種々ノ狀ヲ呈スルモ終ニ顆粒狀ノモノヨリ濃染顆粒ガ形成サルルモノノ如シ。

撰筆スルニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導ト御校閲トヲ賜ハリシ恩師上坂博士ニ深甚ノ謝意ヲ表ス。

文 獻

- 1) Altmann, R., Die Elementarorganismen und ihre Bedeutung für die zellen. 2. Auf. Leipzig 1894. (cit. n. Handbuch d. mik. anat. d. Menschen. 1927)
- 2) Arima, H., Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 83, 1918.
- 3) Bensley, cit. n. Handbuch d. Kowdly special Cystologie. 1928.
- 4) Benda, C., Verhandl. d. Anat. Ges. Heidelberg. 1913.
- 5) Cohoe, B. A., Am. J. Anat. Vol. 6, 1907.
- 6) Debeyre, A., cit. n. Handbuch d. Mik. Anat. d. Menschen. 1927.
- 7) Honda, R., Anat. Rec. Vol. 34, 1927.
- 8) 本田, 千葉醫學會雜誌, 第 5 卷, 第 12 號.
- 9) Heidenhain, R., Physiologie d. Absonderungsvorgänge in Hermanns Handbuch d. Physiologie. Leipzig. 1883.
- 10) Handbuch d. Kowdly special cystologie. 1928.
- 11) Hauschild, M. W., Anat. Hefte. Bd. 50, 1916.
- 12) Krause, R., Arch. f. Mik. Anat. Bd. 45, 1895.
- 13) Derselbe, Arch. f. Mik. Anat. Bd. 59, 1902.
- 14) Langley, J. N., Journal of Physiology. Vol. 2, 1897.
- 15) Levi, G., Anat. Anz., Bd. 42, 1912.
- 16) Müller, E., Arch. f. Anat. u. Physiol. 1896.
- 17) Mo'oy and Smith, Anat. Rec. Vol. 45, 1930.
- 18) Möllendorff, Handbuch d. Mik. Anat. d. Menschen. 1927.
- 19) Nusbaum, M., Arch. f. Mik. Anat. Bd. 13, 1877.
- 20) Mislansky, N., Arch. f. Mik. Anat. Bd. 81, 1913.
- 21) Pischinger, A., Zeitsch. f. Mik. Anat. Forsch. Bd. 1, 1924.
- 22) Regaud und Mauvas, cit. n. Handbuch d. Mik. Anat. d. Menschen. 1927.
- 23) Szymonowicz, Lehrbuch d. Histologie. 1924.
- 24) Schulze, O., Anat. Anz. Bd. 38, 1911.
- 25) S'mont, D. L., Anat. Rec. Vol. 32, 1926.
- 26) 石川, 生理學研究, 第 4 卷, 昭和 3 年.
- 27) Takagi, K., Zeitschr. f. Mik. Anat. Forsch. Bd. 2, 1925.
- 28) Yasutake, T., Okayama I. Z. Nr. 456, 1927.
- 29) Derselbe, Okayama I. Z. Nr. 457, 1927.

遠藤論文附圖

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

遠藤論文附圖

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

遠藤論文附圖

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

附 圖 說 明

Fig. 1. 平常時ニ於ケル家兎顎下腺々細胞
Haematoxylin-Eosin 染色	Fig. 9. 鹽化「アドレナリン」注射ニヨル同細胞
Haematoxylin-Eosin 染色
Fig. 2. (同上) Eisenhaematoxylin 染色	Fig. 10. (同上) Eisenhaematoxylin 染色
Fig. 3. 飢餓時ニ於ケル家兎顎下腺々細胞
Haematoxylin-Eosin 染色	Fig. 11. 頸部交感神經電氣的刺戟ニヨル同細胞
Haematoxylin-Eosin 染色
Fig. 4. (同上) Eisenhaematoxylin 染色	Fig. 12. (同上) Eisenhaematoxylin 染色
Fig. 5. 飽食時ニ於ケル家兎顎下腺々細胞
Haematoxylin-Eosin 染色	Fig. 13. 鹽酸「ピロカルピン」注射ニヨル同細胞
Haematoxylin-Eosin 染色
Fig. 6. (同上) Eisenhaematoxylin 染色	Fig. 14. (同上) Eisenhaematoxylin 染色
Fig. 7. 硫酸「アトロピン」注射ニヨル同細胞
Haematoxylin-Eosin 染色	Fig. 15. 鼓索神經電氣的刺戟ニヨル同細胞
Haematoxylin-Eosin 染色
Fig. 8. (同上) Eisenhaematoxylin 染色	Fig. 16. (同上) Eisenhaematoxylin 染色

Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Vergr. Zeiss. Okul. K 7×, Objek. 40, Ausz. 45 cm.

Fig. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Vergr. Zeiss. Okul. K 7×, Objek. Immersion, Ausz. 30 cm.