155.

612.414:612.43

脾臓と各部淋巴腺との機能關係ニ就テ

岡山醫科大學泉外科教室（主任泉教授）

大庭九一郎

[昭和8年1月14日受稿]

*Aus der 1. Chirurgischen Klinik der Okayama Medizinischen Fakultät
(Direktor: Prof. Dr. Gorô Izumi).*

Über die funktionellen Beziehungen zwischen der Milz
und den Lymphdrüsen

Von

Kuichirô Ooba.

Eingegangen am 14. Januar 1933.

I. Über den Eisenstoffwechsel der normalen Lymphdrüsen.

Aus den Ergebnissen seiner Versuche schliesst der Verf., dass die Fassungskraft für Eisen bei den verschiedenen Lymphdrüsen des Körpers eine verschiedene ist. Verf. hat deshalb an Hunde verschiedene Eisenpräparate, nämlich Somatose, Eisenelektrolyt bzw. Ferrum Oxydatum Saccharatum intravenös injiziert bzw. auch Somatose per os verabreicht und darauf bei den Mesenteriallymphdrüsen, Retroperitoneallymphdrüsen, Axillarymphdrüsen, Halslymphdrüsen und Inguinallymphdrüsen die Hämosiderin-Reaktion geprüft.

Verf. hat bei diesen Versuchen festgestellt, dass die peripheren Lymphdrüsen als am stärksten eisenhaltig für das Eisenreservoir des Körpers angesehen werden müssen, doch scheinen die Mesenteriallymphdrüsen zu dem Eisenstoffwechsel besondere Beziehungen zu haben. Die Ursache für diese Erscheinung ist vielleicht nicht so sehr auf tatsächlich vorhandene Verschiedenheiten in den histologischen Bau der peripheren und zentralen Lymphdrüsen, als vielmehr in Verschiedenheiten in der Strömung der Lymphe oder des Chylus.

II. Über die die Milz kompensierende Funktion der Lymphdrüsen.

1) Nach der Splenektomie habe ich makroskopisch eine Vergrößerung der Lymph-

drüsen oder Vermehrung und Vergrößerung der roten Lymphdrüsen nicht beobachten können.

2) Nach der Splenektomie zeigt das histologische Bild ganz allgemein eine Vermehrung und Vergrößerung der Reticulumzellen der Lymphdrüsen, dazu sind auch die Keimzentren vergrößert.

3) Nach der Splenektomie wird durch die Vermehrung des Eisengehaltes der peripheren Lymphdrüsen deutlich, dass diese eine die Milz kompensierende Fähigkeit haben. Mir scheint bedeutungsvoll zu sein, dass diese Erscheinung bei den Mesenteriallymphdrüsen nicht in demselben Umfange zu beobachten ist. Vielleicht ist diese Tatsache so zu erklären, dass infolge der grösseren Strömungsgeschwindigkeit des Chilus bei den Mesenteriallymphdrüsen eine Aufspeicherung des Eisens unmöglich wird.

(Autoreferat).

目 次

第 1 章 緒 言	第 9 章 經口の鐵劑投與ニ據リ各淋巴腺ノ鐵攝取比較觀察
第 2 章 文献摘要	
第 3 章 正常犬ト剔脾犬ノ各部位淋巴腺内鐵反應ノ比較	第 10 章 飢餓ニ據リ各部位淋巴腺ノ「ヘモジリン」反應檢索
第 4 章 生體染色ニ據リ各部位淋巴腺ノ色素攝取比較觀察	第 11 章 腸間膜淋巴腺ノ鐵代謝ニ對スル態度
第 5 章 「コラルゴール」注入ニ據リ各部位淋巴腺ノ「コラルゴール」攝取比較觀察	第 12 章 腸間膜淋巴腺ノ鐵攝取乳糜ノ流レトノ關係
第 6 章 剔脾後鐵「エロクロイド」注入ニ據リ各部位淋巴腺ノ鐵攝取比較觀察	第 13 章 腸間膜淋巴腺及ビ腋窩淋巴腺ノ鐵攝取抑留比較觀察
第 7 章 鐵「ソマトーゼ」注入ニ據リ各部位淋巴腺ノ鐵攝取比較觀察	第 14 章 含糖酸化鐵多量注入ニ據ル各部位淋巴腺ノ鐵反應ニ就テ
第 8 章 含糖酸化鐵注入ニ據リ各部位淋巴腺ノ鐵攝取比較觀察	第 15 章 本實驗總括並ニ結論

第 1 章 緒 言

近時網狀織内被細胞系統ニ關スル研究旺盛ヲ極ム。脾ノ主要組織ノ一ハ此網狀織内被細胞ナリ。動物ニ於テ剔脾スル時ハ其ノ機能ノ或ルモノハ肝、骨髓及ビ淋巴腺ニヨリ代償セラル。是レ已ニ先人學者ノ唱フル所ナリ。

此代償關係ニ於テ剔脾後ノ肝臟並ニ骨髓ニ就キテハ詳細ナル研究アルモ淋巴腺トノ關係ニ就キテハ未ダ詳細ナル研究ヲ缺キ吾人ノ首肯スベキモノ無キヲ遺憾トス。

2, 3 學者ハ剔脾後淋巴腺ノ組織的觀察ヲナセル者アルモ其ノ淋巴腺ノ部位スラ明カニ記載シ居ラザル有様ナリ。尙ホ身體各部位大小ノ淋巴腺ヲ掻集セバ其ノ數ノ多キト容量ノ決シテ小ナラザルハ贅言ヲ要セズ。從テ脾剔出後ノ淋巴腺ノ變化ハ網狀織内被細胞系機能ノ上ニ重大ナル意義アルベキナリ。

茲ニ於テ余ハ各部位淋巴腺ノ生理學的竝ニ組織學的變化ヲ知ランガ爲メ本實驗ヲ企テタリ。

第 2 章 文 獻 摘 要

脾臓剔出後一時脱落症狀來ルモ、一定期日後他臓器ニヨリ是レノ代償作用ノ起ルハ、先人學者ノ業績ヲ觀ルモ既ニ炳カナリ。此關係ニ於ケル淋巴腺ノ文獻ヲ觀ルニ即チ次ノ如キモノアリ。

Eppinger 氏ハ剔脾後血液淋巴腺ガ脾臓ノ代償機能ヲ營ミ、赤血球破壊作用ヲナスト、尙ホ氏ハ剔脾後 132 日ノ犬ニ一般淋巴腺増大スト。

Wartbin 氏ハ脾臓剔出後淋巴様組織細胞ガ肥大シ他方骨髓細胞ノ増大ヲ來ス。殊ニ血液淋巴腺ガ赤血球ノ破壊作用ヲ營ミ後、眞淋巴腺モ代償シ、殊ニ後腹膜淋巴腺ガ主トシテ代償ヲナストセリ。

Freytag, Faltin 及ビ Stuberrauch 氏等ハ剔脾後淋巴腺ノ腫大及ビ増大ハ必須ノモノニアラズ、動物實驗ニ於テモ人間ニ於ケル剔脾、亦ハ缺脾、或ハ先天性小脾ノ場合ト同様ニ腫大等ハ必須ニ見ザルト報ゼリ。然ルニ H. Albrecht 氏ハ脾臓發育不全患者

ニ於テ、後腹膜及ビ腸間膜淋巴腺ノ腫大ヲ見タリト、亦氏ハ極度ノ脾萎縮例ニ於テ腹腔内ノ淋巴腺ノ腫大ハ認メザリシモ組織學的ニ淋巴竇上皮及ビ網狀織内被細胞ノ増殖ヲ見強度ノ貪喰アリシトセリ。

Sternberg 及ビ E. j. Kraus 氏等モ Albrecht 氏ト同様ナル臨牀例及ビ動物實驗ニ於テ淋巴腺ノ腫大ハ認メザリシモ、組織學的ニ淋巴竇上皮及ビ網狀織内被細胞ノ肥大ヲ來タセリト報告セリ。

堀内氏ハ脾臓剔出後ニ於ケル諸變化ヲ檢索シ副脾ノ發生及ビ淋巴腺ノ腫脹ヲ認メズ組織的所見トシテモ、種々ニシテ一定ナル成績ヲ見ザキト。

斯クノ如ク脾喪失後淋巴腺ノ肉眼的及ビ組織學的檢索ヲナシ網狀織内被細胞ノ増大ハ多クノ人々ノ認メタル所ナルモ、其ノ機能的檢索竝ニ各部位淋巴腺ノ系統的研究ハ、吾人ノ寡聞ナル未ダ其ノ例ヲ見ザルナリ。

第 3 章 正常犬ト剔脾犬ノ各部位淋巴腺内鐵反應比較

余ハ後述スル實驗ヲ實施スル前ニ正常犬ノ各部位淋巴腺ガ正常狀態ニ於テ鐵反應ヲ呈スルモノナルヤ亦

剔脾後ニ於テ夫ガ如何ニ變化スルモノナルヤヲ豫備的ニ檢索セリ。

I) 實驗方法及ビ材料

使用セシ動物ハ生後 4 箇月位ノ同種犬ヲ用ヒ、同一食物ヲ 3 日間與ヘ、4 日目ニ撲殺シ、腸間膜淋巴腺 (Lymphoglanulae mesentericae) 腰淋巴腺 (Lymphoglanulae lumbales) 及ビ腋窩淋巴腺 (Lymphoglanulae axillares) ノ「ツエロイジン」包埋

切片ヲ作製シ、西川氏變化「ヘモジデリン」反應染色法ヲ行ヒ、其ノ消長ヲ研索セリ。核染色ニハ「カルミン」ヲ用ユ。尙ホ「ヘマトキシリン・エオジン」染色標本ヲ檢鏡シ參考トセリ。此操作中異物の鐵ノ混入ヲ避クベク細心ノ注意ヲナシタルハ勿論ナリ。

II) 實驗成績

第1例 番號3 體重 4.6 kg ♂

組織的所見

肝臓「ク」氏星芒細胞ニ處々僅少ノ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀内被細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞間ニ輕度ニ鐵反應ヲ呈ス。腋窩淋巴腺淋巴竇ニ輕度ニ鐵反應ヲ呈ス。

第2例 番號4 體重 4.3 kg ♂

組織的所見

肝臓鐵反應ヲ呈セズ。脾臓一般網狀内被細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰淋巴腺竇及ビ臚胞間ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。腋窩淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞間ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。

第3例 番號8 體重 6.9 kg ♂

組織的所見

肝臓鐵反應ヲ呈セズ。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞内ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。腋窩淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞内ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。

剔脾犬例

第1例 體重 4.3 kg ♂

剔脾手術後 65 日經過。(剔脾, 重量 26 g)

組織的所見

肝臓「ク」氏星芒細胞ニ僅少ニ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰淋巴腺淋巴竇ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。腋窩淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

剔脾犬第2例 體重 4.1 kg ♀

組織的所見

肝臓鐵反應ヲ呈セズ。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞間ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。

本實驗例ヲ表示セバ

第 1 表

	例	體 重 kg	性	剔 後 剔 數	肝 臟	脾 臟	淋 巴 腺		
							腸間膜	腰	腋 窩
有脾	1	4.7	♂	/	±	+	—	+	+
	2	4.1	♂		—	+	—	+	+
	3	6.9	♂		—	/	—	+	+
無脾	1	4.3	♂	65	+	/	—	++	++
	2	4.1	♀	60	—		—	++	++

III) 本章總括

余ノ本實驗ニ據リ正常犬ノ各部位淋巴腺ニ於テ、鐵反應ヲ觀察スルニ正常狀態ニ於テ、腸間膜淋巴腺ハ鐵反應ヲ呈セズ。之ニ反シ腰及ビ腋窩淋巴腺ハ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。肝臓ニ於テモ正常犬ニテ僅少ノ鐵反應ヲ呈スルモノアリ。然ルニ脾臓剔出後約2箇月經過セル犬ニ於テ觀察セルニ、腰及ビ腋窩淋巴腺ニ於テハ、有脾犬ニ比シ鐵反應稍々増量ヲ示セルニ、獨リ腸間膜淋巴腺ニ於テハ依然トシテ鐵反應ヲ呈セズ。肝臓ニ於テハ有脾無脾何レノ犬ニ於テモ左程ノ相違ヲ認メズ。

第 4 章 生體染色ニ據リ各部位淋巴腺ノ色素攝取量比較觀察

正常犬ニ生體染色ヲ施シ各部位淋巴腺ガ色素ヲ如何様ニ攝取スルカ、且又各部位淋巴腺網狀内被細胞ノ色素攝取機能ノ比較及ビ剔脾犬ト正常犬トノ各部位淋巴腺ノ色素攝取量ノ比較ヲ行ヘリ。

I) 文獻摘要

淋巴腺ノ生體色素攝取ニ就キ「リチオン、カルミン」ヲ以テセルハ Ribbert 及ビ清野氏「メチレン、ブラフ」ヲ以テセルハ Goldmann, Joest 及ビ Emschaff 氏在リ。就中清野氏ハ常態淋巴腺ノ生體色素攝取ハ支柱細胞トモ目ス可キ網狀織内被細胞及ビ之ヨリ誘

導セラル可キ遊離組織球ニシテ、色素顆粒ハ淋巴腺内被細胞ニ最も多數發現シ腫胞間組織ノ網狀織内被細胞ニ至ルニ從ヒ其ノ數ヲ減ジ、腫胞内被細胞ニハ極メテ少數ノ小圓形色素顆粒ヲ認ムルニ過ギズトセリ。

II) 實驗方法及ビ實驗材料

注入ニ用ヒタル「カルミン」ハ「メルク」會社製ヲ用ヒ飽和炭酸「リチウム」溶液 100 cc ニ對シ「カルミン」4.0 g ノ割合ニ作製滅菌シ、使用時滅菌濾過紙ニテ濾過シテ一定量ヲ股靜脈ニ注入セリ。實驗動物ハ生後4箇月位ノモノヲ選ビ、色素ハ股靜脈ニ反覆注入ス。最後注入後24時間ニシテ殺シ、肝、脾、腸間膜淋巴

腺、腰淋巴腺及ビ腋窩淋巴腺ニ就キ組織學的檢索ヲナス「パラフィン」包埋固定切片ヲ作り「ヘマトキシリン」核染色ヲ行フ。網狀織内被細胞及ビ之ヨリ誘導サル可キ遊離組織球性細胞ハ一般網狀織内被細胞ト見做セリ。

III) 實驗成績

正常犬第1例 體重 4.5 kg ♂

4%「リチオン、カルミン」ヲ P. K. 2.0 cc 股靜脈ニ注入ス。

第 2 表

時 日	20/VIII	21/VIII	22/VIII	23/VIII	24/VIII	25/VIII
注入量	9.0 cc	9.0	9.0	9.0	9.0	殺ス

組織所見

肝臓「ク」氏星芒細胞ニ可成ノ色素攝取ヲナス。脾臓靜脈竇及ビ一般網狀織内被細胞ニ可成ノ

色素攝取ス。腸間膜淋巴腺淋巴竇及ビ臍胞間網狀織内被細胞ニ可成ノ色素攝取。腰淋巴腺及ビ腋窩淋巴腺モ腸間膜淋巴腺所見ト同ジ。

正常犬第2例 體重 5.7 kg ♀

4%「リチオン・カルミン」ヲ P. K. 2.0 cc 股靜脉ニ注入ス。

第 3 表

時 日	20/VIII	21/VIII	22/VIII	23/VIII	24/VIII	25/VIII
注入量	11.4 cc	11.4	11.4	11.4	11.4	殺ス

組織的所見

肝臓「ク」氏星芒細胞可成ノ色素攝取ス。腸間膜淋巴腺、淋巴竇及ビ臍胞間網狀織内被細胞ニ可成ノ色素攝取ス。腰淋巴腺及ビ腋窩淋巴腺ノ所見モ腸間膜淋巴腺ト同ジ。

別脾犬第1例 番號 3 別脾前體重 5.3 kg ♀

別脾時日 25/VII 1930, 脾重量 48 g, 別脾後 17 日目

4%「リチオン・カルミン」P. K. 2.0 cc 股靜脉ニ注入ス(體重 5.2 kg)

第 4 表

時 日	11/VIII	12/VIII	13/VIII	14/VIII	15/VIII	16/VIII
注入量	10.4 cc	10.4	10.4	10.4	10.4	殺ス

組織的所見

肝臓「ク」氏星芒細胞ニ可成ノ色素攝取ヲナシ、星芒細胞ハ稍々長キ突起ヲ出シ、色素顆粒ヲ判然ト喰喰ス。腸間膜淋巴腺淋巴竇及ビ臍胞間一般網狀織内被細胞強ク色素攝取ヲナシ、一般ニ肥大増殖ヲ病カニ示ス。腰淋巴腺淋巴竇及ビ臍胞間一般網狀織内被細胞可成ノ色素攝取シ、稍々肥大増殖ヲ示ス。腋窩淋巴腺淋巴竇及ビ臍胞間一般網狀織内被細胞可成ノ色素攝取シ、稍々肥大ス。

別脾犬第2例 番號 5 別脾前體重 3.9 kg ♂

別脾時日 14/VI 1930, 脾重量 39 g, 別脾後 60 日目 4%「リチオン・カルミン」P. K. 2.0 cc 股靜脉ニ注入ス(體重 5.3 kg)

第 5 表

時 日	13/VIII	14/VIII	15/VIII	16/VIII	17/VIII	18/VIII
注入量	10.6 cc	10.6	10.6	10.6	10.6	殺ス

組織的所見

肝臓「ク」氏星芒細胞ニ可成ノ色素攝取ス。星芒細胞稍々強ク突起ヲ出シ、攝取大量ナリ。

腸間膜淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞網狀織内被細胞ノ色素攝取高度ニシテ、淋巴竇網狀織内被細胞肥大ス。腰淋巴腺所見ハ腸間膜淋巴腺ノ所見ニ同ジ。腋窩淋巴腺ニ於テハ淋巴竇及ビ臚胞間網狀織内被細胞ノ色素攝取可成ナリ。

剔脾犬第3例 番號(新剔)剔脾前體重 4.9 kg

剔脾時日 5/V 1930, 脾重量 32 g, 剔脾後 102 日目體重 6.1 kg

4%「リチオン・カルミン」P. K. 2.0 cc 股靜脈ニ注入ス。

第 6 表

時 日	15/VIII	16/VIII	17/VIII	18/VIII	19/VIII	20/VIII
注入量	12.2 cc	12.2	12.2	12.2	12.2	殺ス

組織的所見

肝臓「ク」氏星芒細胞ニ可成ノ色素攝取ス。腸間膜淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞間網狀織内被細胞ニ高度ニ色素攝取ス。腰淋巴腺淋巴竇及ビ臚胞間網狀織内被細胞ノ色素攝取可成ナリ。腋窩淋巴腺所見ハ腰淋巴腺ニ同ジ。

以上ノ組織的所見ヲ表示セバ次ノ如シ。

正常犬

第 7 表

例	體 重 kg	性	注 入 量 cc	回 數	肝	脾	淋 巴 腺		
							腸 間 膜	腰	腋 窩
1	4.5	♂	9.0	5	++	++	++	++	++
2	5.7	♀	11.4	5	++	++	++	++	++

剔脾犬

第 8 表

例	體 重 kg	性	剔脾經過	脾重量	體 重 kg	注入量	回 數	肝	淋 巴 腺		
									腸 間 膜	腰	腋 窩
1	5.3	♀	17	48	5.2	10.4	5	++	++	++	++
2	3.9	♂	60	39	5.3	10.6	5	++	++	++	++
3	4.9	♂	102	32	6.1	12.2	5	++	++	++	++

III) 本章總括

正常犬ノ各部淋巴腺特ニ腸間膜、腰及ヒ腋窩淋巴腺ノ「リチオン、カルミン」色素攝取量ヲ比較鏡檢セシニ、各淋巴腺略ボ同比率ヲ示ス。

剔脾犬ニ於テハ各淋巴腺ノ色素攝取量正常犬ヨリ一般ニ強シ、其ノ度ハ腰及ヒ腋窩淋巴腺ハ略ボ同比率ナルモ、腸間膜淋巴腺ハ特ニ顯著ナリ。此事實ハ剔脾後炳カニ淋巴腺ノ網狀織内被細胞機能旺盛ニナリシモノト思惟シテ可ナラン。

第 5 章 「コラルゴール」注入ニ據リ各部位淋巴腺ノ 「コラルゴール」攝取量比較觀察

前實驗ニヨリ「リチオン、カルミン」生體染色ハ正
常犬ニ於テハ各部位淋巴腺同比率ニ攝取スト云フ事
實ヲ知リ得タリ。據ツテ色素ニ代フルニ「コラルゴ
ール」ヲ以テセバ如何ナル所見ヲ示スヤニ就キ實驗
セリ。

I) 實驗方法及ビ材料

1.5 g ノ「コラルゴール」(圓城商店品)ヲ乳鉢ニ入
レ念入リニ細磨シ、0.85% ノ食鹽水ヲ少量宛加ヘ、
尙ホ細磨ス。食鹽水ヲ漸次加ヘ全量 100 cc トシ、濾
紙ニテ濾過ス。80°C ニテ 1 時間滅菌ス。スク製シタ
ル「コラルゴール」ヲ P. K. 3 cc 宛 3 日間股靜脈ニ注

入シ 24 時間後殺ス。

實驗動物ハ生後 4 箇月位ノ犬ヲ使用ス。

組織標本ハ肝臟、脾臟、腸間膜淋巴腺、腰淋巴腺、
腋窩淋巴腺ヲ「ツエロイジン」包埋切片トシ「ヘマト
キシリン、エオジン」重染色ヲナス。

II) 實驗成績

第 1 例正常犬 體重 3.7 kg ♂ P. K. 3 cc 股靜脈内注入

第 9 表

時 日	15/VIII	16/VIII	17/VIII	18/VIII
注 入 量	11.1 cc	11.1	11.1	殺 ス

組織學的所見

肝臟「ク」氏星芒細胞及ビ肝細胞内ニ可成ニ攝取サル。脾臟一般網狀織内被細胞ニ可成ニ攝取サル。腸間膜淋巴腺ニハ臍胞間網狀織内被細胞ニ僅少及ビ血管内皮ニ僅少攝取サル。肝臟及ビ脾臟ト比スレバ非常ニ僅少ナリ。腰淋巴腺ニハ臍胞間網狀織内被細胞ニ僅少ニ攝取サル。肝臟脾臟ニ比スレバ非常ニ僅少ナリ。

腋窩淋巴腺ニハ臍胞間網狀織内被細胞ニ極ク僅少ニ攝取サル。頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニハ淋巴竇内ニ極ク少量攝取サル。

第 2 例正常犬 體重 6.5 kg ♂ P. K. 3 cc 股靜脈内注入

第 1 0 表

時 日	15/VIII	16/VIII	17/VIII	18/VIII
注 入 量	19.5 cc	19.5	19.5	殺 ス

組織學的所見

肝臓ニハ「ク」氏星芒細胞ニ可成ニ攝取サル。脾臓ニハ一般網狀織内被細胞ニ可成ニ攝取サル。腸間膜淋巴腺ニハ臍胞間網狀織内被細胞ニ極ク僅少攝取サル。腰淋巴腺ニハ臍胞間網狀織内被細胞ニ極ク僅少攝取サル。腋窩淋巴腺ニハ淋巴竇網狀織内被細胞ニ極ク僅少攝取サル。頸部淋巴腺ニハ臍胞間網狀織内被細胞ニ極ク僅少攝取サル。鼠蹊淋巴腺ニハ淋巴竇網狀織内被細胞ニ極ク僅少攝取サル。

本實驗成績ヲ表示セバ

第 1 1 表

例	體 重 kg	性	注入量	注入日數	肝	脾	淋 巴 腺				
							腸間膜	腰	腋 窩	頸	鼠 蹊
1	3.7	♂	11.1	3	++	++	±	±	±	±	±
2	6.5	♂	19.5	3	++	++	±	±	±	±	±

III) 本章總括

正常犬ニ「コラルゴール」注入ヲ反覆セシモ各部位淋巴腺ノ攝取スル量ハ略ボ同比率ナルモ、「リチオン・カルミン」ニ比シ非常ニ僅少ナリ。然レドモ肝臓及ビ脾臓ノ攝取量ハ可成多量ナリ。是レ清野氏ノ唱フル如ク金屬「コロイド」ノ粒子比較的粗大ナル爲メナランカ。又ハ注入量ノ如何ニ因リシカ。

第 6 章 剔脾後鐵「エレクトロイド」注入ニ據ル 各部位淋巴腺ノ鐵攝取量比較觀察

脾臓剔出後肝臓、骨髓等ノ網狀織内被細胞ガ脾臓ノ代償機能ヲ營ムト云フ先人學者ノ業績多々アルモ各部位淋巴腺ノ脾代償機能ニ關スル業績ハ余ノ寡聞ナル未ダ之ヲ觀ズ。余ハ正常犬ニ鐵「エレクトロイド」ヲ注入シ脾臓及ビ淋巴腺ノ鐵含有量ヲ組織學的ニ檢セシニ脾臓ニ於テ著シク増量セリ。淋巴腺ニ於テモ稍々増セルモ脾臓ノ夫ニ比シ極ク僅少ナリ。據ツテ

余ハ脾臓剔出後鐵「エレクトロイド」ヲ注入セバ各部位淋巴腺ガ如何ニ之ヲ攝取スルカ即チ各部位淋巴腺ノ脾ニ對スル代償機能ヲ鐵代謝ニ據リ窺知セント企テタリ。尙ホ本實驗ニ於テハ剔脾犬ヲ多數使用セリ。脾臓剔出後淋巴腺ノ増大及ビ血液淋巴腺ノ出現有リトハ多數學者ノ唱フル所ナルヲ以テ本章ニ於テ之ニ對スル余ノ見解ヲモ併記ス。

I) 文獻摘要

Ascher 及ビ Grossenbacher 氏ノ研究ニ依レバ脾臓剔出動物ニアリテハ正常動物ニ比シ日々排泄スル鐵量ハ非常ニ増加シ、其ノ比ハ 11:29 ニ至ルト云フ。是レ脾臓缺如ニ據リ生體內ニ遊離セル鐵成分ノ同化作用ガ一時不可能ニ陥ルタメナラント説明セリ。又 Schmidt 氏ハ缺脾動物ヲ鐵含有量ノ少ナキ食飼ヲ以テ飼養スル時ハ速ニ貧血ニ陥ル、是レ鐵貯藏器ナル脾臓ノ缺如セル爲ナリト稱シ、又有脾動物ニ全ク鐵ヲ含有セザル食物ヲ與ヘテ其ノ排泄物ニ鐵ヲ證明セザル場合ニ於テモ脾臓中ニハ尙ホ多量ノ鐵ヲ證明ストセリ。

Tedeschi 氏ハ成長セル家兎及ビ海猿ノ脾臓ヲ剔出セルトキ骨髓及ビ肝組織内ノ鐵含有量ハ増加スト云ヒ。Novi 氏ハ之ト全ク反對ニ犬ニ於テ脾臓剔出ヲ行フ時ハ普通ノ剔出セザルモノニ比シ肝組織ノ含鐵量減少ストセリ。

Parr 氏ハ家兎ノ脾臓剔出後ニ於ケル肝組織ノ鐵含有量ヲ 3 期ニ分チ、第 1 期ハ普通ニシテ、第 2 期ハ増加シ、第 3 期ハ減少ス。而シテ其ノ第 1、第 2 期ハ過渡期ナルガ故ニ大體ニ於テ脾臓剔出後ニ於ケル肝臓ノ鐵含有量ハ減少スト主張セリ。其ノ他 Schmidt 及ビ Lepehne 氏等ハ前章記載セシガ如ク脾臓ノ鐵新陳代謝ハ肝臓ノ「ク」氏星芒細胞ニ因リテ代償セラルト。本邦ニ於テハ西川及ビ高木氏ハ大黒鼠ノ脾臓剔出ヲ行ヒシニ肝臓及ビ腎臓ニ鐵色素ノ甚ダシク増加セルヲ證明セシモ、術後 10 週以來ハ稍々減少セシガ如ク思ハルモノ剔出前ニ比シテハ尙ホ増加セリトセ

リ。岩男氏ハ家兎ノ脾臓剔出後ニ於ケル鐵代償機能ハ骨髓ニ於テ行ハルルトイヒ、宇野氏ハ鼠ノ剔脾後鐵反應ハ術後 15 乃至 35 日ニ於テ骨髓ニ多量ニ證明セシモ其ノ前後ノモノニハ著シカラズト云ヒ、此鐵反應ノ増加ハ全部代償ノ現象ヲ以テハ證明スルコト能ハズトセリ。堀内氏ハ剔脾家兎ニ於テハ剔脾後 2 日ニシテ肝臓ニ多量ノ鐵色素ヲ示ストセリ。而シテ術後 5 日目頃ヨリ漸次減少シ 20 日前後ニ至リテ正常家兎ニ於ケルモノト殆ド相等シキニ至ル。10 週前後ヨリ更ニ多少減少ヲ來タセルガ如キモ、未ダ明カニ正常ノモノニ比シテ減少セリト決定スベキ程ノモノニアラズトセリ。加藤氏ハ恩師泉教授ノ指導ノモノニ人剔脾後糞便鐵排出如何ヲ檢索セルニ脾剔出後一般ニ鐵排出増加スト。濱崎及ビ早川氏ハ家鼠剔脾後頸淋巴腺ノ鐵反應ヲ檢セルニ淋巴管内ノ組織球及ビ腫胞周囲ノ網狀織内被細胞ニ鐵反應ヲ呈シ、時日ヲ經過スルニ從ヒテ増量スト記載ス。

上述セシガ如ク諸家ノ業績ヲ觀ルニ脾臓剔出術後一時身體内ニ鐵貯藏機能減少スルモ、後再ビ機能ハ一般網狀織内被細胞系ヨリ始リ、主トシテ肝臓及ビ骨髓ノ網狀織内被細胞ニ據ツテ代償サルトセラル。然ルニ最モ脾臓組織ト類似セル一般淋巴腺ニ就テノ檢索ハ 2, 3 アルモ、正常ノ各部位淋巴腺ノ鐵ニ對スル態度竝ニ剔脾後ノ各部位淋巴腺ノ鐵代償機能ヲ檢索セルモノハ之ヲ觀ザルヲ以テ、余ハ剔脾後鐵「エレクトロイド」ヲ注入シ各部位淋巴腺ノ鐵攝取状態ヲ比較觀察セント企テタリ。

II) 實驗方法及ビ材料

動物ハ幼強生後 2—3 箇月位ナル犬ヲ使用ス。幼弱ナル時ハ比較ノ脾臓大量ナルヲ以テ、脾臓剔出後他臟器ニ影響大ナラント思惟セルヲ以テナリ。剔脾手術ハ無麻酔ノモトニ小切開ヲ加ヘテ行フ。一定所要時日經過セルモノニ 1% ノ鐵「エレクトロイド」(國光製)ヲ股靜脈中ニ P. K. 8.0 cc 4 日間反覆注入ス。最

後注入ヨリ 24 時間後ニ殺ス。對照例トシ正常犬ニ P. K. 8.0 cc 4 日間反覆注入ス。組織標本ハ「ツエロイジン」包埋切片主トシテ西川氏變法「ヘモデリン」反應染色法ニ「カルミン」ノ核染色ヲ施ス。他方「ヘマトキシリン、エオジン」重染色ヲナシ檢鏡ス。

III) 實驗成績

剔脾後鐵「エクロイド」ヲ注入セル各部位淋巴腺ノ鐵攝取比較成績

第 12 表

剔脾後鐵「エクロイド」注入ニヨル各部位淋巴腺ノ鐵攝取比較觀察成績

	動物番號	性	體 重 kg	剔 脾 後 經過日數	剔脾重量 g	肝	淋 巴 腺		
							腸 間 膜	腰	腋 窩
有脾	8	♀	4.4	／	／	—	—	+	+
〃	95	♂	6.65	／	／	—	—	+	±
無脾	6	♂	5.4	12	40	—	—	+++	++
〃	17	♀	4.8	16	32	—	—	+++	+++
〃	10	♀	6.75	19	35	—	—	++	++
〃	15	♂	5.2	23	23	—	—	+	++
〃	12	♂	4.4	41	16	++	—	++	+
〃	19	♂	5.6	41	30	+	—	++	++
〃	18	♀	6.1	49	24	+	—	+++	+++
〃	25	♂	5.9	53	20	—	—	++	++
〃	7	♀	7.1	71	26	—	—	+++	+++
〃	3	♂	8.2	78	18	+	—	++	+++
〃	13	♂	7.7	84	27	—	±	++	+++
〃	80	♀	12.6	220	15	—	—	+++	+++

A) 各臓器ノ鐵反應所見

I) 肝臓

脾剔出後ノ肝及ビ腎臓ノ組織的變化ハ先人諸學者ノ文獻多シ (Schmidt, Lepehne, 清野, 西川, 高木, 宇野, 堀内, 永野氏等) 然レドモ本實驗ノ目的トスル所ニ非ラザレバ只各部位淋巴腺ノ變化トノ比較研究ニ必要ナル程度ニ記述スルニ止ム。余ノ實驗ニ於テ剔脾後初期ニハ鐵反應ヲ示サズ, 41, 41 及ビ 49 日 13 頭ニ於テ星芒細胞ノ原形質ニ平等ニ淡青色ニ着色ス。時日ヲ經過スル肝臓ノ鐵反應ノ出現及ビ増量ナシ。而モ其ノ存在量ハ後述スル淋巴腺ノ鐵反應出現ト比較スルニ其ノ程度僅微ナリ。

II) 腸間膜淋巴腺 腸間膜淋巴腺ニ於テハ正常犬及ビ剔脾犬ニ於テモ容易ニ鐵反應ヲ呈セズ。只 1 例ニ於テ剔脾後 84 日ノモノニ弱陽性ヲ示スノミ。

III) 腰淋巴腺 正常犬ニ於テ腰淋巴腺ハ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。本實驗ニ於テ剔脾後ニハ稍増量ヲ來セリ。其ノ鐵顆粒ハ淋巴竇及ビ臍腔間ノ網狀織内被細胞ニ出現シ, 該細胞ハ強ク青染サレ居ルカ或ハ微細ナル青色顆粒アルアリ。一般ニ組織性細胞増殖ス。余ノ本實驗ニ於テハ

剔脾後時日のニ鐵反應ノ増減ヲ明カニスルコトヲ得ザルモ、剔脾後12日ヨリ220日迄ノ12例ニ於テ正常犬ヨリ各例増量セルコトハ炳カニ之ヲ認メ得タリ。

IV 腋窩淋巴腺 正常犬ニ於テモ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。余ノ本實驗ニ於テ剔脾後一般ニ鐵反應ノ増量ヲ來ス。淋巴竇及ビ臚胞間網狀織内被細胞中ニ出現シ強ク平等ニ青染サルカ、或ハ強ク微細ナル青色顆粒アルアリ。一般ニ組織性細胞増殖ス。余ノ例ニ於テハ剔脾後時日のニ鐵反應ノ増減ヲ明カニスルコトヲ得ザルモ、剔脾後12日ヨリ220日迄ノ12例ニ於テ正常時ヨリ鐵反應増量セルコトハ炳カニ之ヲ認ム。腰淋巴腺ト比較スルニ略ボ同比率ノ鐵反應ヲ示ス。

B) 剔脾後各淋巴腺ノ組織學の所見

剔脾犬ニ於ケル一般淋巴腺ノ「ヘマトキシリン、エオジン」染色標本ノ組織學の所見ヲ記載スレバ次ノ如シ、即チ剔脾後一般ニ淋巴竇上皮及ビ網狀織内被細胞増殖肥大シ、種子中心部稍々増大シ臚胞内被細胞増殖肥大ス。種子中心部ニ Flemming 氏ノ tingiblen Körper ノ増加ヲ見タリ。尙ホ亦臚胞内細胞「ミトーゼ」ヲ現セルモノ多ク色素顆粒貪喰セルモノアリ。之等ノ所見ハ H. Albrecht 氏ガ高度ノ脾萎縮患者ノ腹腔内淋巴腺（部位不詳）ノ組織學の檢索ニ於テ淋巴竇上皮及ビ臚胞ノ周圍髓索間ノ網狀織内被細胞肥大セリト報ゼシニ一致スルモノナリ。

C) 剔脾後淋巴腺ノ腫大

Eppinger 及ビ H. Albrecht 氏等ハ剔脾後淋巴腺ハ腫大スト。Winogradow 氏ハ剔脾後132日ノ犬全部ニ亙リ之ガ觀察ヲナセルモ左程ノ腫大ヲ呈セズト。余モ剔脾犬12例（12日ヨリ220日迄）ヲ剖見ニヨリ精細ニ淋巴腺ノ腫大ヲ調べタルモ見ルベキ腫大ヲ認メザリシ。

D) 血液淋巴腺

Winogradow, Eppinger 及ビ Warthin 氏等ハ血液淋巴腺ガ剔脾後脾ノ代償機能ヲ營ムト稱セリ。余モ犬ヲ剖見スル毎ニ血液淋巴腺存否ヲ精査セルモ稀ニ帽針頭ノモノヲ見ルノミナリ。Weidenreich 氏ハ牛羊ノ血液淋巴腺ニ對シテ詳細ナル研究ヲナセリ。亦 Robertson 氏ハ此種淋巴腺ハ牛羊ニ於テハ後腹膜ニ最モ多ク存在スルモ、人間及ビ犬ニハ稀ニ存在スルノミナリト。Clacson 氏ハ犬、家兎、鼠及ビ猫ニハ少ク、Vincent 及ビ Harrison 氏等ハ人間ノ多數ノ材料ニテ精査セルニ生理的狀態ニハ血液淋巴腺ヲ見出サズト報告セリ。病的ニ於テハヨク血液淋巴腺ノ出現アリ（Rindfleisch 及ビ Weigert 氏等）、殊ニ血液疾患ノ場合ニ見出スコトアリト。Warthin 及ビ Weidenreich 氏ハ死體ニ於テ精査セシニ後腹膜ニ存在シ人間ニ於テモ稀ナラズト報告セリ。何レニシテモ犬及ビ人間ニハ只稀ニ之ヲ見ルモノナルガ如シ。而シテ尙ホ余ハ幼弱山羊（♂）體重 6.6 kg ノ脾臟ヲ剔出シ（28/XI 1929）（脾重量 13 g）其ノ節腹腔ヲ精査セシニ大網膜及ビ後腹膜ニ帽針大血液淋巴腺ヲ多數存在セルヲ觀察シ 21/V 1930 ニ殺シ（體重 17.6 kg）、之ヲ精査セシニ血液淋巴腺ノ見ル可キ増大或ハ出現ハ之ヲ認メ得ザリシナリ。血液淋巴腺ガ剔脾後脾ノ代償機能ヲ營ムニシテモ、人間及ビ犬ニ於テハ頗ル稀ニ少數アルモノナレバ、之ガ脾ノ代償機能ヲ論ズルニハ容量ト數トニ於テ重キヲ置クニ足ラザルモノト信ズ。

IV) 本章ノ總括

剔脾犬ニ鐵「エクロイド」P. K. 8cc 股靜脈内注入ヲ4日反覆シ最後ノ注入ヨリ24時間後ニ殺シ各部位淋巴腺ノ鐵過重機能實驗ヲナセシニ、腰及ビ腋窩淋巴腺ハ剔脾後鐵反應正常犬ヨリ稍々増量ヲ示セリ。而シテ其ノ増率ハ略ボ同様ナリ。然ルニ只獨リ腸間膜淋巴腺ハ鐵反應ヲ呈シ難シ。本實驗ニ據リ剔脾後各部位淋巴腺ノ内腰及ビ腋窩淋巴腺ハ脾臟機能ノ一重要ナル鐵代謝ノ脾代償機能トシテノ鐵貯藏作用ヲナスモノナルコトヲ炳カニ探究シ得タリ。然ルニ腸間膜淋巴腺ノミ鐵貯藏作用ヲナサズ、此事實ハ非常ニ興味アルモノト思ハル。余ノ前章ニ記述セル如ク「リチオン、カルミン」生體染色注入實驗ニ於テハ腸間膜淋巴腺ハ剔脾例ニ於テ正常例ヨリ稍々高度ニ色素攝取ヲナシ腰竝ニ腋窩淋巴腺ヨリ其ノ攝取機能旺盛ヲ示セルニ、鐵代謝ニ於テ脾代償機能ニ參與セザルハ余ノ最モ興味アル事實トシテ感ゼシ所ナリ。上述セシ所見ハ鐵代謝ノ場合剔脾各部位淋巴腺ノ機能的檢索ナルモ、組織學的所見トシ各部位淋巴腺（腸間膜、腰部及ビ腋窩）ハ剔脾後概シテ種子中心部ノ増大及ビ淋巴竇上皮及ビ網狀織内被細胞ノ肥大增殖等アリ。殊ニ種子中心部ニ於テ「ミトーゼ」及ビtingiblen Körperアリ。尙ホ剔脾後淋巴腺ノ腫大及ビ血液淋巴腺ノ増大或ハ出現等ハ少クトモ犬ニ於テハ認ムル能ハズ。然レドモ機能的ニハ炳カニ各部位淋巴腺ハ脾ノ或ル機能ニ對シ代償作用ヲ營ムモノノ如シ。

第 7 章 鐵「ソマトーゼ」注入ニ據リ各部位淋巴腺ノ鐵攝取量比較觀察

腸間膜淋巴腺ハ正常犬或ハ剔脾犬ニ於テモ鐵反應ヲ呈シ難シ。即チ鐵貯藏作用ヲ營マス。尙ホ鐵「エクロイド」(P. K. 8.0 cc) 注入ニ據ルモ鐵反應ヲ呈セ

ザルヲ以テ鐵劑ノ異ナル鐵「ソマトーゼ」ヲ注入セバ腸間膜淋巴腺ニ鐵反應ヲ呈スルニ非ザルカラ知ランガ爲メ本實驗ヲ行ヘリ。

I) 實驗方法及ビ材料

實驗動物ハ生後4箇月位ノ同腹犬ヲ用ヒ、食事ハ實驗前後同一食ヲ一定量與フ。4% 鐵「ソマトーゼ」ヲP. K. 4.0 cc, 2.5 cc 及ビ5.0 cc ノ3樣ニ注入ス。注入回數ハ3日間3回トシ、最後ヨリ24時間後ニ殺ス。肝臟、脾臟、腸間膜淋巴腺、腰淋巴腺、腋窩淋巴腺、頸部淋巴腺及ビ鼠蹊淋巴腺ノ組織標本ヲ作製

ス。「ツエロイデン」包埋切片主トシテ西川氏變法「ヘモジデリン」反應染色ニ「カルミン」核染色ヲ施ス。鐵「ソマトーゼ」ハBayer製ヲ用ヒ、鐵「ソマトーゼ」調製ハ0.85% 食鹽水ヲ以テ4%ニ溶解シ「エルレンマイエル」氏「コルベン」ニ入レ錫栓ヲ施シ80°C 1時間滅菌ス。

II) 實驗成績

第1例 正常犬 體重4.0 kg ♂ P. K. 4.0 cc 注入

第 1 3 表

時 日	11/IX	12/IV	13/IV	14/IX
注 入 量	16 cc	16	16	殺 ス

組織學の所見 肝臓「ク」氏星芒細胞肝細胞ニ可成ニ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀織内被細胞ニ鐵反應多量ニ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰部、腋窩、頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ多量ニ鐵反應ヲ呈ス。

第2例 正常犬 體重 4.5 kg ♂ P. K. 2.5 cc 注入

第 1 4 表

時 日	11/IX	12/IX	13/IX	14/IX
注 入 量	11.5 cc	11.5	11.5	殺 ス

組織學の所見 肝臓「ク」氏星芒細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀織内被細胞ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰部、腋窩、頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

第3例 正常犬 體重 6.2 kg ♀ P. K. 5.0 cc 注入

第 1 5 表

時 日	13/IX	14/IX	15/IX	16/IX
注 入 量	31 cc	31	31	殺 ス

組織學の所見 肝臓「ク」氏星芒細胞輕度ニ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀織内被細胞ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰及ビ腋窩淋巴腺ニハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ多量ニ鐵反應ヲ呈ス。頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

本實驗成績ヲ表示セバ

第 1 6 表

例	體 重 kg	性	注入量 cc	注入回数	肝	脾	淋 巴 腺				
							腸間膜	腰	腋 窩	頸	鼠 蹊
1	4.0	♂	4.0	3	++	++	—	++	++	++	++
2	4.5	♂	2.5	3	+	++	—	++	++	++	++
3	6.2	♀	5.0	3	+	++	—	++	++	++	++

III) 本章總括

鐵「ソマトーゼ」ハ下級「アミノ」酸ト鐵トノ化合物ニシテ之ヲ正常犬ニ P. K. 4.0 cc, 2.5 cc 或ハ 5.0 cc 3 回反覆注入ニ據リ腸間膜、腰、腋窩、頸及ビ鼠蹊各淋巴腺ノ鐵反應如何ヲ組織顯微化學的ニ檢索セルニ、腸間膜淋巴腺ハ依然鐵反應ヲ呈シ難シ。他淋巴腺ハ多量ニ略ボ同比率ニ鐵攝取機能ヲ現ハセリ。尙ホ前章實驗鐵「エレクトロイド」注入ニ據ル各部位淋巴腺ノ鐵反應ト鐵

「ソマトーゼ」注入ノソレトノ實驗成績ヲ比較スルニ、鐵「ソマトーゼ」注入ハ日數少キニモ拘ラズ鐵反應出現強シ、而シテ鐵貯藏作用ハ肝臓ヨリ淋巴腺ノ方ガ部分的ニ高度ナルコトモ本實驗成績ニ據リ炳カナルヲ得タリ。

第 8 章 含糖酸化鐵注入ニ據リ各部位淋巴腺鐵攝取量比較觀察

蛋白化合鐵即チ鐵「ソマトーゼ」ヲ反覆注入セルモ腸間膜淋巴腺ハ組織顯微化學的檢索ニ據リ容易ニ鐵反應ヲ呈セズシテ他各部淋巴腺ハ炳カニ強度ニ鐵反應ヲ呈ス。然ラバ含糖酸化鐵ヲ注入セバ如何ナル可キカラ探求センガタメ本實驗ヲ行ヘリ。

I) 實驗方法及ビ材料

實驗動物ハ生後 4 箇月位ノ同腹犬ヲ用ヒ、實驗前食事ハ同一食ヲ一定量與フ。含糖酸化鐵 (Ferrum Oxydatum saccharatum) 4.0 g ヲ 0.85% 食鹽水ヲ以テ 4% ニ溶解シ「エルレンマイエル」氏「コンベン」ニ入レ綿栓ヲ施シ 80°C—1 時間滅菌ス。4% ノ含糖酸化鐵ヲ反覆犬ノ股靜脈ニ注入シ、最後ノ注入ヨリ 24 時間後ニ殺シ、肝、脾、腸間膜淋巴腺、腰淋巴腺、腋窩淋巴腺、頸部淋巴腺、鼠蹊淋巴腺ノ組織標本ヲ作製ス。「ツエロイジン」包埋切片主トシテ西川氏變法「ヘモヂデリン」反應染色法ニ「カルミン」核染色ヲ施ス。

II) 實驗成績

第 1 例 正常犬 體重 4.5 kg ♂ P. K. 4 cc 股靜脈注入

第 1 7 表

時 日	30/IX	1/X	2/X	3/X
注 入 量	18 cc	18	18	殺 ス

組織學的所見 肝臓「ク」氏星芒細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀織内被細胞ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應呈セズ。腰、腋窩、頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニテハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

第 2 例 正常犬 體重 4.5 kg ♂ P. K. 4 cc 股靜脈注入

第 1 8 表

時 日	30/IX	1/X	2/X	3/X
注 入 量	18.0 cc	18	18	殺 ス

組織學的所見 肝臓「ク」氏星芒細胞ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀織内被細胞ニ多量ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ示サズ。腰、腋窩、頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニテハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

第3例 剔脾犬 體重 47 kg ♀ 脾 29 g 剔脾後5週間目 P. K. 4cc 股靜脈注入

第 1 9 表

時 日	30/IX	1/X	2/X	3/X
注 入 量	19.0 cc	19.0	19.0	殺 ス

組織學の所見 肝臓「ク」氏星芒細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰、腋窩、頸部及ヒ鼠蹊淋巴腺ニテハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ多量ノ鐵反應ヲ呈ス。

本章實驗成績ヲ表示セバ

第 2 0 表

	例	體 重 kg	性	注入量 cc	注入回数	肝	脾	淋 巴 腺				
								腸間膜	腰	腋 窩	頸	鼠 蹊
有脾	1	4.5	♂	18	3	+	++	+	++	++	++	++
	2	4.5	♂	18	3	++	+++	—	++	++	++	++
無脾	3	4.7	♂	19	3	+	/	—	+++	+++	+++	+++

III) 本章總括

含糖酸化鐵反覆注入後各部位淋巴腺ノ鐵攝取狀態ヲ組織顯微化學的ニ檢索セルニ、腸間膜淋巴腺ハ容易ニ鐵反應ヲ呈セザルニ腰、腋窩、頸及ヒ鼠蹊淋巴腺ニハ著明ニ多量ノ鐵反應ヲ呈シ鐵貯藏作用ヲ示ス。剔脾5週間經過セル第3例ニ於テハ正常犬ヨリ稍々鐵反應増量セリ。此例ニ於テモ剔脾後淋巴腺ハ脾ノ鐵代謝ノ代償機能ヲ炳カニ示シ、尙ホ鐵貯藏作用ハ肝臓ヨリモ部分的ニ強キヲ知ル。唯茲ニ考慮スベキハ1箇ノ淋巴腺ノ重量ハ肝臓ノソレニ比スベキモノニ非ザルモ全身淋巴腺ノ數ヲ合シタル場合ニ於テ、亦顯微鏡ノ視野ニ於テ正シク淋巴腺ノ鐵攝取狀態大ナルナリ。尙ホ含糖酸化鐵「ソマトーゼ」トハ淋巴腺ノ攝取狀態ヲ比較スルニ略ボ同比率ヲ示ス。

第 9 章 經口の鐵劑投與ニ據リ各淋巴腺ノ鐵攝取量比較觀察

鐵「エレクトロイド」鐵「ソマトーゼ」及ビ含糖酸化鐵等ノ鐵劑ヲ反覆注入シ各部位淋巴腺ノ鐵反應ヲ組織顯微化學的檢索ヲナセルニ、腰、腋窩、頸及ヒ鼠蹊ノ各淋巴腺ハ多量ニ鐵反應ヲ呈スルモ、只獨リ腸間膜淋巴腺ハ鐵反應ヲ呈セザルヲ知リタルモ、若シ經

口的ニ鐵劑ヲ投與セバ腸間膜淋巴腺ハ鐵反應ヲ呈スルニアラズヤ。且又經口のニ鐵劑ヲ投與セシ場合、各部位淋巴腺ガ如何ニ鐵ヲ攝取スルカヲ注入セシ場合ト比較スルモ亦興味アル問題ナリ。據ツテ本實驗ヲ行ヘリ。

I) 實驗方法及ビ材料

實驗動物ハ生後4箇月位ノ同腹犬ヲ用ヒ、實驗前3日間同一食ヲ與フ。鐵食トシテハ鐵「ソマトー

ゼ」ヲ用ヒ、之ヲ米飯（花經ト少鹽ノ醬油ヲ混ジ煮タルモノ）ニ P. K. 0.5 g ノ割合ニ混入投與ス。朝夕 2

同1週間投與、最後ノ投與ヨリ24時間後ニ殺ス。水分ハ任意ニトラス。肝、脾、腸間膜淋巴腺、腰、腋窩、鼠蹊及ビ頸部淋巴腺ノ組織標本作製ス。「ツエロイジン」包埋切片主トシテ西川氏變法「ヘモデリン」反應染色法ニ「カルミン」核染色ヲ施ス。

II) 實驗成績

第1例 正常犬 體重5.4 kg ♂ P. K. 0.5 gノ鐵「ソマトーゼ」投與

第 2 1 表

時 日	30/VIII	31/VIII	1/IX	2/IX	3/IX	4/IX	5/IX	6/IX
投與量 g	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	殺ス
	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	

組織學の所見 肝臓鐵反應ヲ呈セズ。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰、腋窩、頸部及ビ鼠蹊淋巴腺ニテハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

第2例 正常犬 體重5.8 kg ♂ P. K. 0.5 gノ鐵「ソマトーゼ」投與

第 2 2 表

時 日	30/VIII	31/VIII	1/IX	2/IX	3/IX	4/IX	5/IX	6/IX
投與量 g	朝 2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	殺ス
	夕 2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	

組織學の所見 肝臓「ク」氏星芒細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。脾臓一般網狀織内被細胞ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰及ビ頸部淋巴腺ニテハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。腋窩及ビ鼠蹊淋巴腺ニテハ淋巴竇及ビ臚胞間ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。

第3例 正常犬 體重5.0 kg ♂ P. K. 0.5 gノ鐵「ソマトーゼ」投與

第 2 3 表

時 日	30/VIII	31/VIII	1/IX	2/IX	3/IX	4/IX	5/IX	6/IX
鐵投與量 g	朝 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	殺ス
	夕 2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	

組織學の所見 肝臓「ク」氏星芒細胞ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。腸間膜淋巴腺鐵反應ヲ呈セズ。腰、腋窩及ビ鼠蹊淋巴腺ニテハ淋巴竇ニ輕度ノ鐵反應ヲ呈ス。頸淋巴腺、臚胞間内被細胞ニ可成ノ鐵反應ヲ呈ス。

上實驗成績ヲ表示セバ

第 2 4 表

例	體 重 kg	性	1回 投與量 g	投與數	肝	脾	淋 巴 腺				
							腸間膜	腰	腋 窩	頸	鼠 蹊
1	5.4	♂	P.K. 0.5	14	—	/	—	++	++	++	++
2	5.8	♂	0.5	14	+	+++	—	++	+	++	+
3	5.1	♂	0.5	14	+	/	—	+	+	++	+

III) 本章總括

鐵「ソマトーゼ」食ヲ朝夕2回1週間投與セシニ各部位淋巴腺ハ一般ニ鐵攝取增量セルモ、腸間膜淋巴腺ハ鐵反應ヲ呈セズ、然レドモ鐵「ソマトーゼ」ヲ靜脈内ニ注入セシ場合ノ各淋巴腺ノ鐵攝取量ヨリハ經口的ニ鐵ヲ投與セシ場合ノ方其ノ鐵攝取狀態一般ニ輕度ナリ。

第 10 章 飢餓ニ據リ各部位淋巴腺ノ「ヘモジデリン」反應檢索

飢餓狀態ニアル犬ノ腸間膜淋巴腺ハ肉眼的ニ暗赤褐色又ハ汚穢淡褐色ヲ呈シ、恰モ血液淋巴腺ノ如キ外觀ヲ呈スル場合アリ。是レ殊ニ腸間膜及ビ後腹膜淋巴腺ニ多シ。尙ホ飢餓ノ場合赤血球崩壊、或ハ其ノ他組織細胞ノ破壞スルモノアリテ、之等ガ各部位淋巴腺ノ網狀織内被細胞ニ據リ貪喰サレ、從テ「ヘモジデリン」反應ヲ現スガ如キ場合非ザルカハ吾人ノ容易ニ推測シ得ル所ナリ。特ニ斯ル際腸間膜淋巴腺ガ如何様ノ變化ヲ呈スルカハ興味アル問題アルヲ

以テ、之ヲ窺知センガため本實驗ヲ企テタルナリ。文獻ヲ觀ルニ飢餓時ノ鐵代謝ニ對シ肝、脾及ビ骨髓ニ關スル研究ハ2—3之ヲ見ルモ、各部位淋巴腺ニ關シテハ未ダ其ノ研究業績ヲ見ザルナリ。飢餓ニ於ケル肝、脾及ビ骨髓ニ對スル文獻ヲ觀ルニ肝ニ鐵量増加スルトハTuttlieb氏ノ說ヘルトコロニシテ、永野氏ハ這ハ肝臟ニハ增量ヲ示サザルモ、脾及ビ骨髓ニハ鐵量增量シ「ヘモジデリン」反應強ク陽性ニ出現スト報ゼリ。

I) 實驗方法

生後4箇月位ノ同腹犬ヲ用ヒ3/10—8/10迄5日間ノ絶食飢餓ニセシム、勿論水分ハ補給セリ。第6日目ニ殺ス。他方生後4箇月位ノ對照犬2頭ヲ用ヒ米

飯ニ醬油及ビ花鰹ヲ混ジ無鐵食物ヲ與ヘ第6日目ニ殺ス。西川氏變法「ヘモジデリン」反應染色及ビ「ヘマトキシリン・エオジン」染色組織標本作製ス。

II) 實驗成績

第 2 5 表

	例	體 重 kg	性	體量減 kg	肝	脾	淋 巴 腺		
							腸間膜	腰 部	腋 窩
對 照	1	4.7	♂	1	—	+	—	+	+
	2	4.1	♂	1	—	+	—	+	+
飢 餓	1	6.7	♂	0.95	—	+	—	+	+
	2	6.2	♀	1.1	—	++	—	++	++
	3	6.0	♀	0.9	—	+	—	+	++

飢餓ノ際ニ於ケル各淋巴腺ノ「ヘモジデリン」反應ヲ觀ルニ腰部及ビ腋窩淋巴腺ニ稍々僅微ニ陽性反應ノ増加ヲ見ルノミナリ。尙ホ「ヘマトキシリン・エオジン」染色標本ニ於テ各部位腸間膜、腰部及ビ腋窩淋巴腺ノ飢餓時ノ組織所見ヲ觀ルニ、種子中心部擴大シ「リンホチーテン」ニ「ミトーゼ」強ク該部ノ網狀織内被細胞膨大セリ。尙ホ「リンホチーテン」ノ崩壞アリテ明カニ tingiblen Körper ヲ處々ニ見、其ノ或ル者ハ網狀織内被細胞ヨリ貪喰セラレタリ。淋巴竇上皮細胞ハ稍々膨大セリ。淋巴竇中ニハ赤血球ヲ充滿ス。

上述セルガ如ク飢餓ニ於テノ淋巴腺ノ所見ハ淋巴竇内ニ血液ヲ充シ肉眼のニハ所謂血液淋巴腺樣ノ觀アリ。組織的檢索ニ於テ種子中心部ノ膨大、網狀織内被細胞ノ膨大等アリテ之等ハ別脾後ノ各淋巴腺ノ組織所見ト類似ノ感アリ。

III) 本章總括

飢餓ニヨリ「ヘモジデリン」反應ノ増量ヲ來スニアラザルカヲ各部位淋巴腺ニ於テ檢索シニ腰部及ビ腋窩淋巴腺ニ於テ僅微ノ「ヘモジデリン」反應増量セモル腸間膜淋巴腺ニ於テハ「ヘモジデリン」反應陰性ヲ示セリ。

第 11 章 腸間膜淋巴腺ノ鐵代謝ニ對スル態度

余ハ上記諸實驗ニヨリ各部位淋巴腺ニ於テ腰、腋窩、頸部及鼠蹊各淋巴腺ハ鐵貯藏作用ヲ營ムモ獨リ腸間膜淋巴腺ハ鐵貯藏作用ヲ營マザルヲ知見セシガ果シテ腸間膜淋巴腺ノ網狀織内被細胞ハ鐵ヲ蓄取セザルカ、或ハ亦 Schmidt 氏ノ云フ如ク鐵ガ此淋巴腺

内ニテ機能の鐵 (Funktionseisen) ニ轉換スルタメ鐵反應ヲ呈セザルニ至ルモノナルカ、腸間膜淋巴腺ノ鐵代謝ニ對スル態度ヲ闡明セントシ本實驗ヲナセリ。

I) 文獻摘要

文獻ヲ觀ルニ顯微化學的「ヘモジデリン」反應ノ意義ニ對シ、諸家ノ說頗ル多シ。Abderhalden 氏ハ「ヘモジデリン」反應ハ或種ノ鐵化合物ニ對シテ單ニ其ノ所在ヲ示スニ過ギズ。鐵ノ量トハ何等ノ關係ナシトセリ。E. Meyer 氏ハ「ヘモジデリン」反應ニヨリ動物體內ニ含有セラルル鐵化合物ヲ 3 種ニ大別ス即チ 1) Feste bindung 2) Organische lokaler Bindung 3) 酸化鐵、鹽、蛋白鐵及ビ其ノ他ノ有機鐵化合物ノ一部之ナリト。1) ハ「ヘモクロビン」ノ如キモノニテ顯微化學的ニ其ノ所在ヲ證明スル能ハザルモノ。2) ハ「フエラチン」「ヘマトゲン」ノ如キモノ之ニ屬ス。之等ハ試藥ノ長時間作用セル後初メテ反應ヲ現スモノナリ。但シ此部類ニ屬スルモノヲ Meyer 氏ハ

有機性結合ト稱スレドモ、其ノ關係複雜ニシテ或ハ膠質狀態ノ鐵ガ他、蛋白質其ノ他ノ膠質物體內ニ吸着シ、之ガ試藥ニヨリテ其ノ狀態ヲ變ジ初メテ顯微化學的反應ヲ呈スルガ如キ場合アルベシ。3) ハ試藥ニヨリテ直チニ反應ヲ現スモノトス。第 2 ノモノハ Schmidt 氏ノ記載スル所ニシテ、氏ハ鐵代謝檢査ノ見地ヨリ動物體內ニ存在スル鐵ヲ機能性鐵 (Funktionseisen) 及ビ貯藏性鐵 (Reserve eisen) ノ 2 様ニ分類ス。此中機能性鐵ハ所謂 Feste bindung ニ屬スルモノニテ顯微化學的反應ヲ呈スルコトナク貯藏性鐵ハ顯微化學的ニ證明スルコトヲ得ルモノニテ、食餌及ビ細胞破壞ニヨリテ來ル鐵ナリ。是レ主トシテ肝、脾、骨髓等所謂鐵貯藏ニ包藏セラルルモノニテ、

其ノ中細胞破壊ニヨリ來レルモノハ脾及ビ骨髓ニ沈著シテ顯微化學的ニハ「ヘモジデリン」顆粒トシテ現ル。之ニ反シテ食餌性鐵ハ專ラ肝ニ蓄積シテ顯微化學的ニ證明シ得ラルレドモ「ヘモジデリン」顆粒ニ非ズシテ、只平等ニ分布スル無色ノ顆粒トシテ現ルルモノナリト。第3ハHück氏ノ主張スル處ニシテ氏ハ凡ソ動物組織中ニ顯微化學的ニ反應セザル鐵化合物即チ feste Bindung ナルモノノ存在ヲ認ムルコト能ハズ。總テノ鐵化合物ハ悉ク顯微化學的ニ反應スベキモノナリ。若シ反應陰性ナル時ハ feste Bindung ナルガ故ニ非ズシテ其ノ含有量僅微ナルガ爲ナリトセリ。且又Hück氏ハ人ノ肝ニ就テ検査シ肝乾燥物質100gニ對シテ其ノ鐵量50mg以下ナル時ハ反應現レズ。之ニ反シテ鐵量50mgヲ超フレバ常ニ「ヘモジデリン」反應ヲ呈スト。且含鐵量ノ増加ト相平行シテ反應力亦益々強度トナルト云ヘリ。(永野氏ニ據ル)永野氏ハSchmidt及ビHück兩氏ノ兩説ヲ追試センガタメ、肝ノ鐵量ト「ヘモジデリン」反應トノ兩者ノ關係ヲ追及セリ。而シテ曰ク、肝臟ヲ門脈幹ヨリ生理的食鹽水ヲ以テ肝臟中ノ血液ヲ洗滌シ蓋サンコトヲ期シ肝臟靜脈ヨリ流出スル液ハ肝ニ多少

ノ壓搾ヲ加フルモ肉眼的ニハ少シモ血色ヲ呈セザルニ至ルマデ洗滌シ、乾燥鐵量ヲ測定スルニ、肝乾燥物質中100g中53mg以上アル時ハ「ヘモジデリン」反應ヲ呈シ、之ヨリ以下ノ時ハ「ヘモジデリン」反應ヲ呈セザリキト。尙ホ氏ハ附言シテ「ヘモジデリン」反應度ハ其ノ鐵量ト全ク平行比例スルモノニシテ、Hück氏ノ主張ヲ正當ナリト稱セリ。即チHück氏及ビ永野氏等ハ100g中50mg以上鐵存在セバ「ヘモジデリン」反應ヲ呈スルモノニテ鐵存在スルモ50mg以下ニテハ反應ヲ呈セズト稱セリ。余ノ實驗ニ於テ數種ノ鐵劑ヲ比較的過量ニ注入又ハ經口的ニ投與セシ場合ニ於テ肝、脾及ビ各部位淋巴腺ハ鐵攝取ヲ爲スヲ「ヘモジデリン」反應ニ據リテ明カニ窺知シ得ルニ拘ラズ腸間膜淋巴腺ノミ「ヘモジデリン」反應ノ陰性ナルハHück及ビ永野氏ノ説ク反應ヲ呈セザル程度ニ鐵ノ存在少量ナルカ或ハ腸間膜淋巴腺ノ機能ガ他部淋巴腺ト生理的相違ノタメ鐵代謝ニ對シMeyer及ビSchmidtノ云フ Funktionseisenニ變換スル作用ヲ有シ鐵貯藏作用ヲ營マザルモノナルカハ未ダ知ラレザル事實ナルヲ以テ余ハ之ヲ闡明セントシ、次ノ實驗ヲ行ヘリ。

II) 實驗方法

正常犬ニ實驗 3.5 時間前ニ牛肉 200g 投與シ、實驗前 30 分 3%「モルフィン、スコポラミン」ヲ P. K. 0.5cc 内外ヲ皮下注射シ開腹セリ。腸間膜淋巴腺ノ淋巴輸入管ハ乳糜通過旺盛トナリ膨大セルヲ以テ 4%ノ含糖酸化鐵ヲ注射器ヲ以テ徐々ニ注入ナセリ、他

方該淋巴腺ノ淋巴輸出管ヨリ注射器ニテ 10, 20, 30, 45, 60, 90 及ビ 120 分ノ間隔ヲオキ乳糜ヲ毎回 0.2cc 宛採集ス。「ベルリン」青鐵定性試験ヲ行フ。2 時間後ニ殺シ、該腸間膜淋巴腺ノ組織標本作製ス。西川氏變法「ヘモジデリン」反應染色ヲ施シ鐵ノ檢索ヲナス。

III) 實驗成績

實驗第1例 正常犬 8.0 kg ♀

4%ノ含糖酸化鐵 6ccヲ腸間膜淋巴輸入管ニ注入シ、注入後淋巴輸出管ヨリ乳糜採集ス。

第 2 6 表

採 集 時 間	10 分	20	30	45	60	90	120
鐵 反 應	++	+++	++	+	±	—	—

乳糜ノ「ベルリン」青鐵定性反應ヲ時間的ニ採集試験セシニ、淋巴輸入管ニ含糖酸化鐵注入後既ニ10分ニ可成ノ陽性率ヲ示シ、20分最高ニシテ最早90分後ニハ陰性ヲ示セリ。

腸間膜淋巴腺ノ組織學的所見 淋巴竇及ビ臍胞間網狀織内被細胞殊ニ組織球性細胞ハ著明ニ鐵攝取ヲナシ居レリ。

實驗第2例 正常犬 10.5 kg ♂

4% 含糖酸化鐵7cc 腸間膜淋巴腺ノ淋巴輸入管ニ注入シ、注入後淋巴輸出管ヨリ乳糜採集ス。乳糜中ノ鐵定性反應ヲ行ヒタルニ注入後既ニ10分ニ可成ノ陽性率ヲ示シ、20分最高90分ニシテ陰性ヲ示ス。

第 2 7 表

採 集 時 間	10 分	20	30	45	60	90	120
鐵 反 應	++	+++	++	+	+	—	—

腸間膜淋巴腺ノ組織學的所見 淋巴竇及ビ臍胞間ノ網狀織内被細胞殊ニ組織球性細胞ハ著明ニ鐵攝取ヲナセリ。

III) 實驗總括

腸間膜淋巴腺ガ果シテ鐵代謝ニ如何ナル態度ヲ取ルカヲ探求セシ本實驗ニ於テ、淋巴輸入管ヨリ含糖酸化鐵ヲ注入セシニ淋巴輸出管ヨリ乳糜ト共ニ鐵排出サレ、注入後20分最多量ニシテ、60分迄ハ「ベルリン」青鐵定性反應ニ陽性ヲ示スモ、最早1時間半ニ於テハ陰性ヲ示ス。斯ク腸間膜淋巴腺ハ鐵ヲ乳糜ト共ニ排出スルコトヲ短時間ニ行フモノナルヲ知レリ。他方注入後2時間ノ腸間膜淋巴腺ヲ剔出シ顯微化學的鐵反應ヲ檢索セシニ、淋巴竇及ビ臍胞間網狀織内被細胞殊ニ遊離性組織球性細胞ニ於テ炳カニ鐵攝取ヲナシ、顯微化學的反應著明ニ陽性ヲ示スヲ知ル。以上ノ所見ヨリ推斷スルニ腸間膜淋巴腺ハ顯微化學的ニ鐵反應陽性ヲ示シ Meyer 及ビ Schmidt ノ稱スル Feste Bindung ニ變換スルニアラズシテ鐵攝取ヲナセシ組織球性細胞ハ乳糜ト共ニ速ニ排出サレ鐵代謝ニ對シテ鐵貯藏ヲ營マザルモノノ如シ。此點ニ於テ腸間膜淋巴腺ハ他各部位淋巴腺（腰部、頸部、腋窩及ビ鼠蹊部）ト鐵代謝ニ對スル機能ヲ異ニスルモノナルヲ知リ得タリ。

第 12 章 腸間膜淋巴腺ノ鐵攝取ト乳糜ノ流レトノ關係

前章實驗的檢索ニ據リ腸間膜淋巴腺ハ血管内ニ注入セラレタル鐵劑ヲ Funktionseisen ニ變換スルニアラズシテ、鐵ヲ攝取セル組織球性細胞ハ大部分ハ乳糜ト共ニ淋巴輸出管ヨリ腺外ニ速ニ排出サルモノニテ、殘存セル僅少ノ鐵ガ鐵反應ヲ呈スルモノナル

ヲ知レリ。然ラバ腸間膜淋巴腺ハ乳糜ノ流レ如何ニ據リ攝取セラレタル鐵ヲ抑留スルモノナラント思考サル可キモノナルモ、果シテ乳糜ノ流レガ關係ヲ有スルカ否カラ闡明センタメ次ノ實驗ヲナセリ。

I) 實驗方法

生後6箇月頃ノ健康犬ヲ選ビ、術前5時間前 P. K. 鐵ノ一定量ヲ「ツベルクリン」注射器ニ¼注射針ヲ
 40g 牛肉ヲ投與シ術前30分 P. K. 0.5cc 内外ノ鹽酸 附シテ) 注入シ、24時間後ノ淋巴腺ヲ顯微化學的ニ
 「モルヒネ、スコボラミン」皮下注射麻醉ヲナス。開 檢査シ、鐵反應ヲ檢索セリ。
 腹ナシ、腸間膜淋巴腺ノ淋巴輸入管ニ4% 含糖酸化

II) 實驗成績

第 2 8 表

例	番 號	性	體 重 kg	注入量 cc	經過時間	陽性率	備 考
1	M 2	♂	7.2	5.5	2	卅	一般網狀織内被細胞強ク攝取シ尙 ホ種子中心部ニモ鐵攝取ス
2	M 4	♀	5.8	5.5	24	卅	種子中心部ニハ鐵反應ヲ呈セズ
3	M 1	♂	6.3	1.8	2	卅	一般網狀織内被細胞強ク攝取シ尙 ホ種子中心部ニモ鐵反應ヲ呈ス
4	M 5	♂	7.1	1.8	24	卅	種子中心部ニハ鐵反應ヲ呈セズ
5	M 8	♀	4.9	1.5	24	卅	輕度ナリ
6	M 6	♀	6.9	1.0	24	+	輕度ナリ

本實驗成績ハ前表ノ示スガ如ク、淋巴輸入管ヨリ4%ノ含糖酸化鐵 5.5 cc, 1.8 cc, 1.5 cc, 1.0 cc 注入ナシタルニ、各例ニ於テ24時間後ノ顯微化學的鐵反應ハ2時間後ノソレヨリモ輕度ナル事及ビ注入量ノ僅少ナル程時間ノ經過ニ從ヒ陽性率輕度ナルヲ略ボ察知スルヲ得タリ。然レドモ此實驗ニ於テハ麻醉液注射後嘔吐ニ據リ攝食セル牛肉ヲ吐出スル事アリテ淋巴管ニ流出スル乳糜ノ量一定セザル憾アルヲ以テ、其ノ流出ヲ確實ニナシテ淋巴管内及ビ淋巴腺内ニ理想的ニ乳糜ノ時間的觀察ヲ充分ニ爲サンガタメ次ノ實驗ヲ行ヘリ。

實驗第2 空腹正常犬麻醉後開腹シ、腸間膜ノ淋巴輸入管ヨリ4%ノ含糖酸化鐵 1.8ccヲ注入シ、閉腹シ、2時間後再ビ開腹シ、該注入淋巴腺ノ周圍ノ輸入淋巴管ヨリ生理的食鹽水ヲ種種ナル量ニ「ツベルクリン」2cc注射器ニ據リ徐々ニ注入ス。其ノ間20—30分ヲ要ス。最後ノ注入ヨリ10分ニシテ、該腸間膜淋巴腺ヲ剔出ス。西川氏「ヘモジデリン」反應染色ヲ行フ。

第 2 9 表

例	番 號	性	體 重 kg	注入量 cc	經過時間	注入生理的 食鹽水總量 cc	「ヘモジデ リン」反應	備 考
1	M 7 ¹	♂	6.1	1.8	2	18	+	淋巴腺ノ一角ニ僅少殘存ス
2	M 7 ²	♂	6.5	2.0	2	20	—	

本實驗ニ據リ淋巴腺内ノ鐵ハ生理的食鹽水ノ多量注入ニ據リ腺外ニ排出セラレ顯微化學的鐵反應ヲ認ムル能ハザルニ至ル。茲ニ於テ腸間膜淋巴腺ノ鐵攝取細胞ハ乳糜ノ流レニ據リ淋巴輸出管ヨリ腺外ニ排出サレ、乳糜ノ流レ旺盛ナル程腺内ニ顯微化學的鐵反應減少スルヲ知レリ。尙ホ生理的食鹽水ヲ以テ徐々ニ淋巴輸入管ヨリ稍々大量注入セルモ腺内組織ヲ破壊スルコトナシ。

III) 本實驗總括

腸間膜淋巴腺ニ乳糜ノ流レノ旺盛ナルト否トニ因リ腺内ノ鐵攝取量ノ増減ハ顯微化學的ニ如何ナル相違ヲ呈スルモノナルヲ追及セント犬ニ牛肉ヲ投與シ腸間膜淋巴腺ヘノ乳糜流入ヲ旺盛ナラシメ4% 含糖酸化鐵 5.5 cc, 1.8 cc, 1.5 cc 及ビ 1.0 cc ヲ各例ノ腸間膜淋巴腺淋巴輸入管ヨリ注入シ、注入後2時間例及ビ24時間例ノ該淋巴腺ノ組織學的所見ヲ檢セシニ鐵反應ハ2時間例(5.5 cc, 1.8 cc)ニテハ鐵反應強陽性ヲ示シ、24時間例ノ 5.5 cc, 1.8 cc, 1.5 cc 及ビ 1.0 cc ニ於テハ前者ヨリ鐵反應輕度ナリ。然レドモ此實驗ニ據ル時ハ腸間膜淋巴腺ニ乳糜ノ流入スル程度及ビ其ノ流入繼續時間各犬ニ據リ相違アルベキナリ。據ツテ腸間膜淋巴腺ノ淋巴輸入管ニ乳糜ノ流通シ居ラザル空腹犬ヲ用ヒ其ノ腸間膜淋巴腺ニ4% 含糖酸化鐵 1.8 cc ヲ注入シ、注入後2時間ニシテ生理的食鹽水ヲ鐵注入淋巴腺周圍ノ淋巴輸入管ヨリ種々ナル量ニ徐々注入セシニ、其ノ注入總量 18 cc—20 cc 位ニテ、既ニ該淋巴腺内ニハ顯微化學的ニ殆ド鐵反應ヲ呈セザルヲ知レリ。斯ク腸間膜淋巴腺ニ攝取サレタル鐵ハ局所ニ於ケル乳糜ノ流レニ據リ速ニ腺外ニ排出サル。而シテ淋巴ノ流入旺盛ナル程腺内ニ顯微化學的鐵ノ存在減少スルモノナルヲ知レリ。

第 13 章 腸間膜淋巴腺及ヒ腋窩淋巴腺ノ鐵攝取抑留比較觀察

腸間膜淋巴腺ノ鐵攝取細胞ハ乳糜ノ流レニ據リ腺外ニ排出サレ乳糜ノ流入旺盛ナル程腺内顯微化學的鐵ノ存在減少スルヲ知リタルヲ以テ、同一條件ノ許ニ置カレタル同一生體內ニ於テ、腸間膜淋巴腺ト腋

窩淋巴腺トノ淋巴輸入管ニ一定量ノ含糖酸化鐵ヲ略ボ同時ニ注入シ以テ兩者ノ鐵攝取機能狀態ヲ檢索セントセリ。

I) 實驗方法

生後5箇月位ノ正常健康犬ヲ用ヒ、上肢ヲ上方ニ索引シテ手術臺ニ固定ス。腋窩淋巴腺部ノ露出手術ヲ行フ。此時淋巴腺ノ周圍組織ノ損傷ヲ避ケンガタメ操作ヲ可及的鈍的ニ行ヒ淋巴腺ノ周圍淋巴輸入管及ビ輸出管ノ生理機能ヲ毫モ損傷セザル様ニ念ニ手術ヲナス。然ルトキハ淋巴腺ノ周圍ニ脂肪組織豐富ナルニ拘ラズ輸入管ノ走行ヲ明カニ求メ得ルナリ。而シテ其ノ淋巴管ガ腋窩淋巴腺ニ至ル輸入管ナル事

ヲ確メタル後「ツベルクリン」注射器ニ $\frac{1}{4}$ 注射針ヲ以テ輸入管内ニ含糖酸化鐵溶液ヲ徐々ニ注入ス。他方直チニ開腹シ、腸間膜淋巴腺ノ淋巴輸入管ニ同量ノ含糖酸化鐵溶液ヲ注入シ、閉腹ス。

上敘述ノ方法ニ據リ含糖酸化鐵注入シ、35時間後ノ兩淋巴腺ヲ剔出シ、組織標本作製顯微化學的鐵反應量ヲ比較ス。麻醉犬ハ24時間以内ニ食物ヲ攝取セザルヲ以テ滿1日經過後ニ一定食餌ヲ與ヘ攝食後

7—8 時間ニシテ乳糜ノ流入ヲ旺盛ナラシメタル後
(手術時ヨリ 35 時間後)ニ再手術ヲナシ、淋巴腺ノ
剔出ヲ行ヘリ。食物ハ牛肉ヲ與ヘ、含糖酸化鐵ハ 4%
ノモノ 0.5 cc ヲ注入ス。尙ホ對照例ハ術後牛肉ヲ投
與セズ。

第 30 表

例	體 重 kg	性	腋窩淋巴腺	腸間膜淋巴腺
1	10.5	♂	+++	+
2	8.7	♂	+++	+
對 照	3	♂	+++	++

正常時ニ鐵陽性反應ヲ呈スル腰、腋窩、頸及ビ鼠
蹊淋巴腺ハ果シテ淋巴ノ流レ緩慢ナルカ、換言セバ
淋巴腺ニ淋巴ノ流入流出作用ノ緩徐ナルタメ鐵攝取
細胞ノ腺外ニ流出亦ハ游出スル機轉少ナキ結果、此
鐵保留或ハ貯藏ヲナスニ至ルモノナルカヲ知ラント
セシ本實驗ニ於テ、術後乳糜ノ流レヲ旺盛ニセシ牛
肉投與例ニ於テハ腸間膜淋巴腺ハ腋窩淋巴腺ヨリ鐵
攝取細胞非常ニ僅少ナリ。牛肉投與セザリシ對照例

ハ兩淋巴腺ノ鐵攝取細胞ノ量的關係左程ノ相違ヲ觀
ズ、腸間膜淋巴腺ニ於テ稍々少キ感アルノミ。本實
驗ニ據リ確カニ邊緣型ナル腋窩淋巴腺ハ鐵貯藏作用
ヲナスモ、腸間膜淋巴腺ハ然ラズ。茲ニ於テ各部位
淋巴腺ノ鐵反應ニ對シ、檢鏡的ニ相違ヲ來ス所以ハ
其ノ淋巴腺ニ對スル淋巴亦ハ乳糜ノ流入流出ノ多寡
及ビ其ノ強弱ノ結果ニ據ル事大ナルヲ知レリ。

第 14 章 含糖酸化鐵多量注入ニ據ル各部位淋巴腺ノ鐵反應ニ就テ

多量注入亦ハ長時日注入ニ據リ腸間膜淋巴腺ノ鐵攝取如何ヲ檢索セントシ此實驗ヲ行ヘリ。

I) 實驗方法

各實驗ニ於テ鐵「エレクトロイド」(1% P. K. 8.0 cc
ヲ 4 日)鐵「ソマトーゼ」(4% P. K. 4.0 cc 2.5 cc 5.0 cc
ヲ 3 日)含糖酸化鐵(4% P. K. 4.0 cc ヲ 3 日)ヲ靜脈
内ニ注入セルヲ以テ、本節實驗ニ於テハ生後 5 箇月
位ノ正常健康犬ヲ用ヒ 4% 含糖酸化鐵 P. K. 10 cc 8
日間耳靜脈ヨリ反覆注入ス。最後ノ注射ヨリ 30 分後
ニ各部位淋巴腺ヲ剔出シ西川氏「ヘモジデリン」染色
標本作製ス。

第 31 表

例	體 重 kg	性	肝 臟	脾 臟	淋 巴 腺					
					腸間膜	十二指腸 腸間膜	腰	腋 窩	頸	鼠 蹊
1	7.5	♂	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
2	10.1	♀	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++

組織學の所見 肝臟ノ「ク」氏星芒細胞ハ飽和ノ狀態ニ鐵顆粒ヲ攝取スルモ肝實質細胞ノ鐵反
應ヲ毫モ呈シ居ラズシテ「ク」氏星芒細胞ノ膨大ノタメ壓縮セラレタル像ヲ呈ス。膽管及ビ血管
内ニモ少量ノ鐵反應ヲ呈ス。脾臟一般網狀織内被細胞強度ニ鐵攝取ヲナス。臚泡内ニモ鐵反應

ヲ僅少ニ呈ス。

淋巴腺ハ各部位淋巴腺トモ一般網狀織内被細胞ニ據リ鐵攝取セラレ、第1例ノ如キハ臍胞内網狀織内被細胞ニ攝取セラレタル像ヲ炳カニ示セルアリ。併シ一般ニ淋巴腺胞ニハ鐵攝取細胞僅少ナリ。

II) 本實驗總括

4% 含糖酸化鐵 P. K. 10cc 8 日間耳靜脉内注入シ強度ノ Siderose ヲ惹起サストキハ、肝、脾最モ強く鐵ヲ夫レノ網狀織内被細胞ニ據リ攝取ス。又各部位淋巴腺モ同様強度ニ鐵攝取ヲナス。勿論腸間膜淋巴腺ニモ鐵反應ヲ強く見ルニ至ル。

第 15 章 本實驗總括

脾臓剔出後各部淋巴腺ハ果シテ脾ノ代償機能ヲ營ムモノナルヤ否ヤヲ檢センガタメ脾ノ一機能ナル鐵代謝ニ對シ、剔脾後ノ各部位淋巴腺ハ如何ナル態度ヲトルカラ檢索セリ。尙ホ併セテ正常淋巴腺ノ鐵代謝機能ニ就キ檢索セリ。其ノ項目ハ次ノ如シ。

I. 淋巴腺ノ鐵代謝機能ニ就テ

II. 脾臓剔出後各部位淋巴腺ノ脾代償機能ニ就テ

I) 淋巴腺ノ鐵代謝機能ニ就テ

正常犬ニ於テハ腸間膜淋巴腺ヲ除ク他ノ淋巴腺ニ於テハ組織顯微化學的鐵反應ヲ輕度ニ呈スルモ腸間膜淋巴腺ハ通例ニ於テ鐵反應ヲ呈セズ。剔脾後約2箇月經過セル犬ノ各部位淋巴腺ノ鐵反應ハ正常犬ノ夫レヨリ稍々増量セルモ腸間膜淋巴腺ハ同ジク鐵反應ヲ呈セズ。腸間膜淋巴腺ハ鐵貯藏作用ナキモノノ如キヲ以テ余ハ「リチオン・カルミン」ヲ使ヒ、生體染色ヲ行ヒ、各部位淋巴腺ノ色素攝取機能ノ比較竝ニ剔脾後各部位淋巴腺ノ色素攝取比較ヲ觀察セシニ、各部位淋巴腺網狀織内被細胞ハ稍々強く色素ヲ略ボ同比率ニ攝取シ、剔脾犬ノ腸間膜淋巴腺モ正常犬ヨリ稍々攝取量増加セリ。金屬「コロイド」ナル「コラルゴール」1% 液ヲ反覆注入セバ各部位淋巴腺ノ「コラルゴール」攝取ハ「リチオン・カルミン」ト同様ナルベキカ否カヲ知ラントシテ行ヘル實驗ニ於テハ「コラルゴール」ガ各部位淋巴腺ニ攝取サレル量ハ非常ニ僅少ニシテ、「カルミン」攝取量ニ比シ非常ニ僅微ナリ。然レドモ肝臓及ビ脾臓ノ「コラルゴール」攝取量ハ可成多量ナリ。各部位淋巴腺ノ「コラルゴール」攝取ハ（腸間膜、腰、腋窩、頸部及ビ鼠蹊淋巴腺）同比率ヲ示ス。

上述ノ豫備的實驗ヲ行ヒ茲ニ脾臓剔出後鐵「エロクロイド」ヲ注入セバ各部位淋巴腺ニ於テ果シテ鐵貯藏機能ヲ營ムヤノ過重機能實驗ヲ試ミタリ。剔脾後ノ腰及ビ腋窩淋巴腺ノ鐵攝取量ハ正常犬ヨリ稍々増量ヲ示シ、略ボ2者ハ同比率ニ増量セリ。剔脾犬ニ於テ「カルミン」ヲ腰及ビ腋窩淋巴腺ヨリ稍々多ク攝取セシ腸間膜淋巴腺ハ却テ鐵反應ヲ呈セザルナリ。併シナガラ鐵代謝ニ就キ剔脾犬ノ腸間膜淋巴腺以外ノ各部位淋巴腺ハ一層鐵貯藏機能ヲ代償スルモノナルヲ炳

カニ知見ス。尙ホ淋巴腺網狀織内被細胞ノ鐵攝取量ハ肝臓ノ夫レヨリモ遙ニ多量ナリ。余ノ實驗ニ於テ腸間膜淋巴腺ノミ鐵貯藏作用ヲ認メズ、是レ或ハ鐵種ノ異ナルモノニ對シテハ何カノ機能ヲ有スルニハ非ザルヤヲ疑ヒシヲ以テ、鐵「ソマトーゼ」及ビ含糖酸化鐵ヲ正常犬ニ反覆注入セリ。然レドモ他各部位淋巴腺ハ可成ノ鐵貯藏狀態ヲ認メタルニ反シ、腸間膜淋巴腺ノミハ鐵貯藏作用アルヲ認ムル能ハズ。

若シ鐵劑ヲ經口的ニ投與セバト思ヒ、鐵「ソマトーゼ」P. K. 0.5 g 14 回(1 週間)投與セシニ各部位淋巴腺ハ一般ニ鐵攝取可成アルモ腸間膜淋巴腺ハ鐵反應ヲ呈セザルヲ知レリ。飢餓時腸間膜淋巴腺及ビ後腹膜淋巴腺ハ「ヘモジデリン」反應ノ增量ヲ來スニアラザルカヲ各部位淋巴腺ニ於テ之ガ檢索ヲナセシニ(5 日間ノ飢餓)腰部及ビ腋窩淋巴腺ニ於テ僅微ノ「ヘモジデリン」反應增量セルニ腸間膜淋巴腺ハ「ヘモジデリン」反應陰性ヲ示セリ。尙ホ各部位淋巴腺ノ一般網狀織内被細胞ハ肥大シ、淋巴腺胞種子中心部擴大シ tingiblen Körper ノ出現「ミトーゼ」赤血球貪喰トノ所見アリテ別脾後ノ組織學の所見ニ類似ノ感アリ。茲ニ於テ少クモ別脾後ノ淋巴腺ノ網狀織内被細胞系ヲ論ジ、其ノ機能ヲ檢索スル場合ハ必ズ飢餓ナル影響ヲ顧慮セザルベカラザルヲ知見セリ。

上述各種ノ實驗ニ於テ腸間膜淋巴腺ノミ鐵攝取反應ヲ容易ニ呈セザルハ此腺ガ果シテ鐵代謝ニ何等關與スルモノナキカ否カタ追求セントメ、余ハ腸間膜淋巴輸入管ヨリ含糖酸化鐵ヲ注入シ、他方淋巴輸出管ヨリ乳糜ヲ吸引シ、其ノ液ヲ以テ「ベルリン」青鐵定性反應ヲ檢索セルニ注入後 20 分最モ多量ニ鐵反應陽性ヲ示スモ、60 分後ニハ最早「ベルリン」青鐵反應ニテハ檢索スル能ハザリキ。他方注入後 2 時間ニテ腸間膜淋巴腺ヲ剔出シ組織標本ヲ作製シ、顯微化學的鐵反應檢索ヲ試ミタルニ、淋巴竇及ビ腺胞間網狀織内被細胞殊ニ遊離性組織球性細胞ニ於テ炳カニ鐵攝取ヲナシ、顯微化學的鐵反應著明ニ陽性ヲ示スヲ知リタリ。茲ニ於テ腸間膜淋巴腺ハ Meyer 及ビ Schmidt ノ稱スル Feste Bindung ノ鐵ニ變換スルニアラズシテ鐵攝取ヲナシ組織球性細胞ハ迅速ニ乳糜ト共ニ他臟器ニ排出サレ、鐵代謝ニ對シテ鐵貯藏作用トシテノ生理的機能ヲ營マズ、鐵ヲ攝取セル一般網狀織内被細胞ハ迅速ニ遊離性組織球トナリ、淋巴輸出管ヨリ輸送サルベキモノト信ズ。尙ホ腸間膜淋巴腺ニ於テ注入鐵ノ量的關係、時間的關係及ビ淋巴流ノ關係等ヲ闡明セントメニ犬ニ牛肉ヲ投與シ淋巴腺ヘノ乳糜流入ノ旺盛ヲ計リ、4% 含糖酸化鐵(5.5 cc, 1.8 cc, 1.5 cc 及ビ 1.0 cc)ヲ腸間膜淋巴腺ノ淋巴輸入管ヨリ注入シ、注入後 2 時間ヲ對照例トシテ、注入後 24 時間後ノ顯微化學的鐵檢索ヲ行ヒシ實驗及ビ腸間膜淋巴腺ニ 4% 含糖酸化鐵 1.8 cc ヲ注入シ 2 時間後ニ生理的食鹽水ヲ以テ淋巴腺ニ走入セル周圍ノ淋巴輸入管ヨリ徐々ニ注入セシ灌流實驗等ニ據リ、腸間膜淋巴腺ノ鐵攝取細胞ハ時間ノ經過ト共ニ輕減シ乳糜ノ流入ノ強弱ニ關係スル事多大ニシテ、乳糜ノ流入旺盛ナル程腺内ニ顯微化學的鐵陽性細胞ノ存在減少ス。殊ニ生理的食鹽水ニテ腺内ヲ灌流スル事ニ據リ最モ炳カニ之等ノ關係ヲ闡明スルコトヲ得タリ。即チ鐵注入後 2 時間ニシテ生理的食鹽水ヲ淋巴輸入管ヨリ腺内ニ徐々ニ注入

シ、乳糜ガ腺内ニ流入スルト同一状態ニ置キ灌流セシニ腺内ノ鐵攝取細胞ハ陰性ニナレリ。

由是觀之炳カニ腸間膜淋巴腺ガ他部位淋巴腺ト異リ常態時ニ鐵反應陰性ヲ示スハ乳糜ノ流入他ノ淋巴腺ヨリ強キタメニ應鐵ヲ攝取セル細胞ガ短時間内ニ腺外ニ排出サレル結果ナラント信ズ。他方常態時ニ鐵陽性反應ヲ呈スル脾、腋窩、頸及ビ鼠蹊淋巴腺等ハ果シテ淋巴ノ流レ緩慢ナルカ換言セバ淋巴腺ニ淋巴ノ流入流出作用ノ緩徐ナルタメ鐵攝取細胞ノ腺外ニ流出又ハ遊出スル機轉少キ結果鐵ガ貯藏サルルモノナルカヲ探究セントメ、余ハ同一條件ノ許ニ置カレタル同一犬ノ腸間膜淋巴腺ト腋窩淋巴腺トニ該淋巴腺ノ輸入管ヨリ4% 含糖酸化鐵0.5ccヲ直接注入シ、腹壁及ビ腋窩切創ヲ縫合ス。術後全ク覺醒シタル時牛肉ヲ投與ス、攝取後5乃至10時間ハ小腸及ビ結腸ヨリノ乳糜流入最モ旺盛ナル時期ナルヲ以テ、余ハ此時期ニ及ビ該淋巴腺ヲ剔出シ顯微化學的鐵反應ニ據リ鐵陽性細胞量ヲ比較セシニ、腸間膜巴淋腺ニ於テハ腋窩淋巴腺ノ其ノ反應ヨリ非常ニ僅少ニシテ、邊緣型ナル腋窩淋巴腺ハ鐵攝取細胞淋巴竇及ビ臚胞間ニ殘存シ炳カニ鐵貯藏ヲナスモ、腸間膜淋巴腺ニ於テハ非常ニ僅少ノ殘存ヲ觀ルノミナリ。

本實驗ニ據リ確カニ邊緣型ナル腋窩淋巴腺ハ鐵貯藏作用ヲナスモ、腸間膜淋巴腺ハ然ラザルヲ知レリ。茲ニ於テ同一淋巴腺ナル構造ヲ有シ其ノ機能の差違ハ少クトモ Nordmann 氏(1927)ノ記載セル腸間膜淋巴腺ト邊緣型ナル腋窩淋巴腺等ハ組織學的ニ淋巴竇ノ廣狹又ハ網狀織内被細胞ノ強弱等ノ淋巴腺自體ノ組織學的ノ相違アルモ、外因的ナル淋巴又ハ乳糜流入流出ノ強弱ニ據ル事大ナルヲ知見セリ。

II) 脾臓剔出後ノ各部淋巴腺ノ脾代償機能ニ就テ

脾臓剔出後各部淋巴腺ノ腫大及ビ血液淋巴腺ノ腫大又出現等ハ余ノ例ニ於テ認ムルヲ得ザリキ。然レドモ剔脾犬淋巴腺ノ組織學的所見トシ、一般ニ淋巴竇及ビ臚胞間ノ網狀織内被細胞ノ増殖肥大及ビ種子中心部ノ増大竝ニ tingiblen Körperノ増加等アリ。又臚胞内細胞ニ「ミトーゼ」アリテ、且處々「ヒスチオチーテン」ガ赤血球ヲ貪食セルモノヲ認メ、炳カニ淋巴腺ハ機能亢進ノ像ヲ呈ス。果シテ機能的ニ脾ノ代償機能ヲ營ムモノナルヤ否ヤニ就キ、余ハ鐵代謝ニ關シ檢索セリ。正常犬ト剔脾犬トニ就キ尋常時各淋巴腺ノ鐵攝取狀態ヲ顯微化學的反應ニ據リ比較觀察セシニ、剔脾犬ニ於テ稍々僅微ニ增量セルヲ認メタリ。由テ正常犬及ビ剔脾犬ニ鐵「エロクロイド」注入シ鐵ノ攝取狀態ヲ比較觀察セシニ、剔脾犬ニ於テ顯著ニ增量セリ。尙ホ「カルミン」生體染色ヲ行ヒ正常犬及ビ剔脾ノ淋巴腺ガ之ヲ攝取スル有様ヲ比較ナセシニ、剔脾犬ハ「カルミン」ヲ攝取スル事正常犬ヨリ強キヲ知リタリ。由是觀之剔脾後各部位淋巴腺ハ脾ノ代償機能ヲ行ヒ淋巴腺ノ網狀織内被細胞ノ機能旺盛トナルヲ知レリ。

結 論

1. 淋巴腺ノ鐵代謝機能ニ就テ

上記實驗ニ於テ余ハ鐵代謝ニ對シ淋巴腺ハ各部位ニ據リ鐵攝取態度ニ相違アルヲ知見セリ。

故ニ鐵「エロクロイド」, 鐵「ソマトーゼ」, 含糖酸化鐵等ノ注入或ハ經口的ニ投與シ, 各部位淋巴腺(腸間膜, 腰, 腋窩, 頸及ヒ鼠蹊)ノ顯微化學的「ヘモジデリン」反應ヲ比較檢索セシニ, 正常淋巴腺ハ各部ニヨリ鐵代謝機能ニ相違アリ。即チ腰, 腋窩, 頸及ヒ鼠蹊等ノ邊緣型淋巴腺ハ鐵貯藏作用アルモ, 腸間膜淋巴腺ハ鐵貯藏作用ヲ營マズ, 其ノ兩者相違ノ主因ハ多少存在スル組織學的相違ノ夫レヨリモ外因的ニ淋巴又ハ乳糜ノ流入流出ノ強弱ニ基因スルヲ知見セリ。

2. 1) 剔脾後各部淋巴腺ハ肉眼的ニハ格別ノ腫大及ヒ血液淋巴腺ノ増大或ハ出現等ヲ認メズ。
- 2) 剔脾後各部淋巴腺ノ組織像ニ於テ網狀織内被細胞ハ一般ニ肥大增殖シ, 種子中心部亦増大。
- 3) 剔脾後ノ邊緣型淋巴腺ハ正常ヨリモ益々鐵顆粒ヲ貯藏シ脾ノ一機能タル鐵貯藏作用ヲ代償ス。然レドモ腸間膜淋巴腺ニハ斯ル際ニモ鐵顆粒ヲ容易ニ出現セズ。是レ恐ラク其ノ通過ヲ速ニシ以テ滞在ヲ許サザルニ因ルベシ。

拙筆スルニ臨ミ, 本研究ヲ御下命下サレ, 終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ忝フセシ, 恩師泉教授ニ謹ミテ満腔ノ謝意ヲ捧グ。併セテ御助言ヲ賜ハリシ, 當教室前助教授神原博士ノ御好意ヲ深謝ス。

文 獻

- 1) *Aschoff*, Das reticulo-endotheliale System. *Ergebn. d. inn. Med.* Bd. 26, 1924. 2) *Aschoff-Kamiya*, Über d. lipididulpende Funktion. 3) *Alberchte*, Zit nach Sternberg. *Dents. med. Wochenschr.* Nr. 24, 1922. 4) *Ascher u. Grossenbacher*, *Zentralbl. f. Physiologie.* Bd. 22, 1908. 5) *Abderhalden*, *Lehrbuch der physiolog. Chemie.* 1906. 6) 愛甲文雄, 熊本醫學會雜誌, 第4卷, 5號, 昭和3年. 7) 尼子富士郎, 醫學中央雜誌, 第467—8號, 大正15年. 8) 赤岩亨二, 岡醫雜, 第42年, 7號, 昭和6年. 9) *Clacson*, Zit nach Eppinger. 10) *Downey u. Weidenreich*, *Arch. f. mikrosk. Anat.* 80, 1912. 11) *Eppinger*, Die Hepatoliennalen Erkrankungen. 12) *Eppinger*, *Wien. kl. Wochenschr.* Nr. 15, 1922. 13) *Erdelyi*, *Zeits. f. Biol.* Bd. 46, 1905. 14) *Emschaft*, Zit nach Kiyono. 15) *Fahr u. Stamm*, *Klin. Wochenschr.* 1924. 16) *Firleiwitsch*, *Zeits. f. Biolog.* Bd. 47, 1906. 17) *Freytag*, Zit nach c. Sternberg. 18) *Fallin*, Zit nach Sternberg. 19) *Gossmann*, *Arch. f. path. Anat.* Bd. 272, 1929. 20) *Goldmann*, Zit nach Kiyono. 21) 堀内正重, *Ziegler, Beiträge.* Bd. 54, 1912; 南滿醫學會雜誌, 11卷, 15頁. 22) *Huck*, *Beitr. z. path. Anatomie.* Bd. 66, 1920. 23) 濱崎, 早川, 岡醫雜, 第39年, 9號. 24) 濱崎, 相原, 岡醫雜, 第40年, 8號. 25) *Henke u. Lubarsch*, *Handbuch d. spez. Path. Anat. u. Histol.* Bd. 1. 26) *Haus Oeller*, *Lymphdrüsen u. Lymphatisches System. Handbuch der normalen u. path. Physiolog.* Bd. VI/2. 27) 泉伍朗, 日本外科學會雜誌, 29回, 8號, 昭和3年; 日新醫學, 18年, 12號, 昭和3年. 三宅教授在職二十週年紀念祝賀論文集. 28) 岩男, 藤本, 松本, 日本病理學會雜誌, 第18年, 昭和

大庭論文附圖

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

- 3 年. 29) 岩野俊治, 臺灣醫學會雜誌, 206 號, 大正 9 年. 30) 岩男督, 日本病理學會雜誌, 6 卷, 大正 5 年. 31) *Iwao*, Mitt. d. all. Path. u. path. Anatom. Bd. 11/2. 32) *Iger, Jaquer*, Biochem. Zeits. Bd. 169, 1926. 33) *Jäger*, Beitr. z. path. Anat. Bd. 80, 1928. 34) *Jaest*, Zit nach Kiyono. 35) 清野謙次, 生體染色研究ノ現況及其ノ検査術式. 36) *Kozumi*, Verhandl. Jap. path. Gesellsch. Bd. 14, 1924. 37) 清野謙次, 日本病理學會雜誌, 6 卷, 大正 5 年. 38) 勝沼精藏, 滿洲醫學會雜誌, 7 卷, 2. 3 號. 39) 小島重一, 日本微生物學會雜誌, 第 20 卷, 2 號, 大正 15 年. 40) *Kraw*, Zit nach Sternberg. 41) *Lefehne*, Klin. Wochenschr. 1925. 42) 森戸耕作, 東京醫學會雜誌, 42 卷, 12 號, 昭和 3 年. 43) *Meyer*, Ergebn. d. Physiologie. Bd. 5, 1906. 44) 永野, 東京醫學會雜誌, 34 卷, 15 號, 大正 9 年. 45) *Nordmann*, Virchows Archiv. Bd. 207, 158. 46) 西村安敬, 日本病理學會雜誌, 1 卷, 明治 44 年. 47) 西川及高木, 醫學中央雜誌, 17 卷, 2 號, 大正 8 年. 48) *Okuneff*, Zeitschr. f. d. g. exp. Med. Bd. 36, 1923, Bd. 42, 1924. 49) 太田賢一郎, 臨牀醫學, 1. 2. 3 號, 昭和 3 年. 50) *Pana*, Zit nach Horinchi. 51) *Rotter*, Virchows Archiv. Bd. 265. 52) *Robertson*, Zit nach Eppinger. 53) *Rindfleisch u. Weigert*, Zit nach Eppinger. 54) *Siegmund*, Virchows Archiv. Bd. 224. 55) *Siegmund*, Klin. Wochenschr. 1922. 56) *Stheemann*, Beitr. z. path. Anat. Bd. 48, 1910. 57) *Schmidt, M. B.*, Verhandl. d. deuts. path. Gesellsch. 1914. 58) *Stubenrausch*, Zit nach C. Sternberg. 59) 富永謙, 大阪醫學會雜誌, 26 卷, 6 號, 昭和 3 年. 60) 田中, 大村, 中島, 日本外科學會雜誌, 16 卷, 2 號, 昭和 3 年. 61) *Tedeschi*, Zit nach Nagano. 62) *Tattieb*, Zit nach Nagano. 63) *Vincent u. Harrison*, Zit nach Eppinger. 64) *Wacker u. Hueck*, Arch. f. exp. path. u. Pharm. 71, 74, 77. 65) *Weidewich*, Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 65. 1905. 66) 宇野規矩治, 京都醫學雜誌, 18 卷, 2 號, 大正 10 年. 67) *Warthin*, Zit nach Sternberg. 68) *Winogradow*, Zit nach Eppinger.

附 圖 說 明

Fig. 1. 正常健康犬ノ腸間膜淋巴腺ノ「ヘモジデリン」反應

Fig. 2. 正常健康犬ノ腋窩淋巴腺ノ「ヘモジデリン」正應

Fig. 3. 正常健康犬ノ腰淋巴腺ノ「ヘモジデリン」反應

擴大 Zeiss Okul. 7, Objk. 40, K. 1. 30

染色 西川氏「ヘモジデリン」染色法

「カルミン」核重染色