75.

611.013.6.61.62

腎臓原基ノ發生ニ關スル研究

集合管系統ノ發生ニ就テ
家鶏胎兒ニ於ケル檢索

岡山醫科大學解剖學教室胎生學研究室（主任敷波教授）

高井 禎 道

[昭和8年5月17日受稿]

*Aus dem Embryologischen Laboratorium des Anatomischen Institutes der Okayama Med. Fakultät
(Vorstand: Prof. Dr. J. Shikinami).*

Studien über die Entwicklung der Nierenanlage, besonderes die morphologische
Entwicklung des Sammelrohrsystems.
Untersuchung am Zwerghuhn (*Gallus domesticus* Linné).

Von

Teidô Takai.

Eingegangen am 17. Mai 1933.

Seit alters wurden von verschiedenen Seiten die Untersuchungen über die Entwicklung der Nierenanlage von vielen Autoren eifrig ausgeführt, aber leider noch nicht in vielen Punkten über die morphologische Entwicklung des Sammelrohrsystems. So habe ich unter der Leitung von Prof. Shikinami eine Untersuchung über die morphologische Entwicklung der Nierenanlage angestellt, indem ich die Serienschnitte von 30 Embryonen des Haushuhns, insbesondere des den orientalischen Ländern eigentümlichen Zwerghuhns, als Material benutzte und sie der Bequemlichkeit halber in 14 Stadien einteilte.

Das Material wurde alles in Zenker's Lösung fixiert, Stückfärbung mit Borax-Karmin, in Paraffin eingebettet und zu Serienschnitten von 10 μ dickem Querschnitt angefertigt. Die nötigen Teile dieser Serienschnitte wurden mittels Edinger's Zeichenapparats in 75-100 facher Vergrößerung abgezeichnet, auf einer 0.75-1.0 mm dicken Wachsplatte reproduziert, nach Born-Peter's Methode aufgeschichtet, zu genauen

Rekonstruktionsmodellen hergestellt, dann mit der Beobachtung des Entwicklungszustands dieser Anlage durch das Mikroskop verglichen einer genauen Untersuchung unterworfen, wobei sich folgendes Resultat ergab:

Beim Embryo des Zwerghuhns.

(1) Entsteht die Nierenknospe wie bei Säugetieren und Menschen von der Dorso-medialseite des Caudalteils des Urnierengangs her. Bei einem Embryo von Sch-St-L. 6.0 mm, N-St L. 6.5 mm mit 95 Stunden Bebrütungsdauer 48 Ursegmente kann die Knospung zuerst beobachtet werden.

(2) In ihrem Initialstadium verschiebt sich die Öffnung des Ureters an der Dorso-medialseite des Caudalende des Urnierengangs mit dem Fortschritt der Entwicklungsstadien auf die Dorsalseite und tritt beim Embryo von 11.0 mm ganz aus demselben heraus, und kommt zugleich damit allmählich in die Nähe der Kloake und mündet schliesslich beim Embryo von 12.5 mm vollständig in dieselbe.

(3) Hat die Lageverschiebung der Öffnung des Ureters, der sich vom Urnierengang trennt und sich in die Kloake öffnet, zur Folge, dass sich die Röhrenwand des Caudalends des Urnierengangs zur Kloakenwand mit dem Entwicklungsfortschritt der Kloake vergrössert.

(4) Nimmt der Ureter, der im Frühstadium der Entwicklung platt gestaltet ist und daher morphologisch vom Nierenbeckenteil sich schwer unterscheiden lässt, mit dem Fortschritt der Entwicklungsstadien an Grösse ab. Er kann erst beim Embryo von 8.0 mm resp. 7.0 mm Sch-St-L. vom Nierenbeckenteil unterschieden werden, nimmt allmählich runde Röhrenform an, wird länger, und zuletzt beim Embryo von 17.0 mm beträgt die Gesamtlänge 0.8 mm.

(5) Verschwindet der Teil, der den Säugern des Nierenbeckens und dem Caudalteil desselben entsprechen soll, beim Embryo von 6.5 mm Sch-St-L., 7.0 mm N-St-L. und 50 Ursegmenten.

(6) Gelangt das Nierenbecken von der Dorso-medialseite des Caudalteils des Urnierengangs ventralwärts von der A. iliaca communis zu der Dorsalseite der Urniere und wächst kopfwärts empor. Und beim Embryo von 11.5 mm Sch-St-L. wird der der Ventralseite der A. ilisca communis entsprechende Teil durch diese gehemmt und der Nierenkelch kann nicht entstehen. Daher können morphologisch 3 Teile, d. h. Caudal-, Medial- und Cranialteil, unterschieden werden.

(7) Entwickelt das Nierenbecken allmählich kopfwärts von seiner Schwanzseite aus 3 Nierenkelche, nämlich je eines der Reihe nach an dem Caudalteil, an der Cranialteilschwanzseite und an der Cranialteilkopfseite. Und es zeigt sich beim Embryo von 11.0 mm Sch-St-L. am Caudalteil, beim von 12.0 mm Sch-St-L. an der Cranialteilschwanzseite und beim von 12.5 mm Sch-St-L. an der Cranialteilkopfseite erst ein auffallend entwickelter Nierenkelch.

(8) Kommt das Sammelrohr, wie in der Entwicklungsreihenfolge des Nierenkelches, in der Reihenfolge von Caudalteilkopfende, Cranialteilschwanzende und Cranialteilkopfende hervor. Man sieht beim Embryo von 12.5 mm Sch-St-L. am Caudalteilkopfende des Nierenbeckens und beim Embryo von 13.5 mm am Cranialteilsschwanzende desselben und beim Embryo von 14.0 mm am Cranialteilkopfende desselben erst ein primäres Sammelrohr entstehen.

(9) Verzweigen sich dichotomisch auch die sekundäre, tertiäre und quartäre Sammelrohr gleich der Reihenfolge des primären Sammelrohrs vom primären, sekundären und tertiären Sammelrohr. Beim Embryo von 17.0 mm Sch-St-L., der die quartären Sammelröhren entsendet, die Gesamtgestalt des Sammelrohrsystems ist ähnlich wie die äussere Gestalt der Niere bei den erwachsenen Vögeln.

(10) Beruht die Tatsache, dass die Nierenanlage, die sich in ihrem Frühstadium aussen an der Ventralseite der Aorta abdominalis befindet, ihre Lage beim Embryo von 17.0 mm Sch-St-L. nach der Dorsalseite der Aussenseite der Aorta abdominalis verändert, darauf, dass sie gedrückt wird, da sich im Frühstadium die Urniere und im Spätstadium die Abdominalorgane bedeutend entwickeln. (Kurze Inhaltsangabe.)

内 容 目 次

第1章 緒 論	第4節 集合管ノ發生ニ關スル總括竝ニ考察
第2章 材料及ビ研究方法	第5節 腎臟原基ノ位置移動ニ關スル總括竝ニ考察
第3章 各家鶏胎兒ニ於ケル腎臟原基ノ檢索	察
第4章 總括竝ニ考察	第5章 結 論
第1節 集合管系統發生早期ニ於ケル總括	主要文獻
第2節 輸尿管ノ發生ニ關スル總括竝ニ考察	挿圖説明
第3節 腎盂腎盞ノ發生ニ關スル總括竝ニ考察	

第 1 章 緒 論

鳥類ニ於ケル腎臟原基ノ發生ニ關スル研究ハ 1855 年 Remak 氏ガ創メテ家鶏胎兒(孵卵 6 日目)ノ原尿管ノ内側ニオキテ blind endiges Epithelialrohr ヲ觀テ腎臟原基トナシ, 孵卵 10 日目ニ至ル迄ハ恰モ肺, 其ノ他ノ腺質臟器ノ發生ト同様ニ盛ンニ側枝ヲ分岐シテ遂ニ其ノ先端ニ血管絲襖ノ發生ヲ見ルニ至ルモノニシテ, 細尿管ハ集合管ノ分岐セルモノナリト唱ヘシ以來 Rathke (1861), Kölliker (1861) 諸氏ノ業績相繼ギテ出デ共ニ Remak 氏ト其ノ所說ヲ同ジクセリ.

然ルニ 1866 年 Kupffer 氏ハ家鶏胎兒ニ就キテ腎臟ハ其ノ發生初期ニオキテハ集合管系統ト

細尿管系統トハ全く異ナレル母地ヨリ發生スルモノニシテ集合管系統ハ原腎管ノ尾部背方ヨリ出デ、細尿管ハ別ニ造腎組織ヨリ發生シテ後ニ集合管ト結合スルモノナリト唱ヘタリ。爾來其ノ成立ニ關シテハ所謂 Remak-Kölliker 説及ビ Kupffer 説ノ 2 派ヲ生ズルニ至リ Bornhaupt (1867), Balfour (1876) ノ兩氏ハ共ニ Kupffer 説ヲ唱ヘ。1902 年 Schreiner 氏ハ Ente, Möven, Hühnerembryo ニオキテ詳細ナル研究ヲ遂ゲ腎臟ノ細尿管ハ Kupffer 氏ノ唱フルガ如ク造腎組織ヨリ發生スルモノナレドモ其ノ外層ヨリ發生スルモノニ非ラズシテ造腎組織ノ内層ヨリ發生シテ後ニ集合管ト結合スルモノナリ。而シテ造腎組織ノ外層ハ腎臟ノ間質結締組織及ビ腎臟包皮ノ發生ニ關與スルモノナリト説キテ今日一般學者ノ認ムル處トナリ。既ニ腎臟ノ成立ニ就キテハ全く解決ヲ與ヘタルモノノ如キ感アラシムルニ至レリ。

其他 Rienhoff 氏 (1922) ノ鶏胎ニ於ケル細尿管ノ發生ニ關スル報告及ビ Attebury 氏 (1923) ノ特殊孵卵ニヨル 6 日目ニ於ケル鶏胎後腎發生狀態ノ觀察アリト雖モ、概シテ腎臟原基ノ發生ニ就テハ集合管ト細尿管ノ結合機轉ニ關スル問題ヲ中心トセルガ爲メニ多クハ部分的ニシテ之ガ系統的研究、殊ニ集合管系統ノ形態學の發生ニ至リテハ未ダ遺憾ナル點多シトス。

茲ニ於テ余ハ數波教授指導ノ許ニ家鶏特ニ東洋獨特ノ家鶏、「チャボ」(Zwerghuhn, Gallus domesticus Linné) ノ胎兒ヲ材料トシテ該原基、殊ニ集合管系統ノ形態學の發生ニ就キテ研究ヲ企テ幸ニ所期スル結果ヲ得タレバ茲ニ詳述セントス。

第 2 章 材料及ビ研究方法

本研究ニ用ヒタル家鶏胎兒 30 箇ノ材料ハ、總テ採取直後 Zenker 氏液ニテ固定シ、Borax-Karmin ヲ以テ Stück-färbung ヲ施シ、所定ノ方法ヲ經テ Paraffin 包埋ヲ行ヒ、厚サ 10 μ ノ Querschnitt ノ連續切片ニ作成セルモノナリ。

之等連續切片中ノ必要部分ヲ Edinger 氏ノ Zeichen-Apparat ニヨリテ、75—100 倍ニ擴大複寫シテ、厚サ 0.75—1.0mm ノ蠟板ニ複寫シ、之ヲ Born-Peter 氏法ニヨリ疊積シテ正確ナル複製模型ヲ作成シ其ノ立體像ヲ如實ニ現出シテ顯微鏡ニヨル腎臟原基發生

狀態觀察ノ參考トナシ、彼我相對照シテ研究セルモノナリ。

一臟器ノ發生階梯ハ必ズシモ其ノ孵卵時數、胎兒ノ體長及ビ他臟器ノ發生狀態ト一致スルモノニハ非ザレドモ之等竝ニ Müller 氏管及ビ腎臟原基ト最モ密接ナル關係ヲ有スル原腎ノ發生概況等ヲ考慮シテ便宜上之ヲ 14 發生階梯ニ別チテ該原基ノ發生狀態ヲ檢索シタリ。

今余ガ使用シタル家鶏胎兒ノ後腎發生階梯ヲ順序ニヨリテ表示スレバ次ノ如シ。

階 梯	胎 兒 記 號	胎 長 及 ビ (原 節 數)		切 片 ノ 厚 サ	模 型 ノ 大 サ
		Sch.-St.-L mm	N.-St.-L mm		
1	Nr. 24	6.0	6.0(48)	10 μ	$\frac{100}{1}$
	Nr. 12	6.0	6.5(48)		

階 梯	胎 兒 記 號	胎 長 及 ビ (原 節 數)		切 片 ノ 厚 サ	模 型 ノ 大 サ
		Sch.-St.-L mm	N.-St.-L mm		
2	Nr. 26	6.0	6.0(48)	10 μ	$\frac{100}{1}$
	Nr. 19	6.5	6.5(49)		
	Nr. 5	6.0	6.5(48)		
3	Nr. 31	6.5	7.0(50)	◇	◇
	Nr. 13	7.0	7.0		
4	Nr. 30	6.0	6.5	◇	◇
	Nr. 28	7.0	7.0		
5	Nr. 27	8.0	7.0	◇	◇
6	Nr. 29	9.0	9.0	◇	◇
	Nr. 1	10.0	9.0		
7	Nr. 6	11.0		◇	◇
	Nr. 7	11.0			
8	Nr. 32	11.5		◇	◇
9	Nr. 34	12.0		◇	◇
	Nr. 33	12.0			
10	Nr. 3	13.0		◇	◇
	Nr. 35	12.5			
11	Nr. 2	14.0		◇	◇
	Nr. 8	13.5			
12	Nr. 4	14.0		◇	$\frac{75}{1}$
	Nr. 9	14.0			
	Nr. 36	15.0			
13	Nr. 14	15.0		◇	◇
	Nr. 10	14.0			
	Nr. 11	16.0			
14	Nr. 16	17.0		◇	◇
	Nr. 40	18.0			
	Nr. 42	17.0			

第 3 章 各家鶏胎兒ニ於ケル腎臟原基ノ検索

第 1 階 梯

胎兒記號 Nr. 12. Sch.-St.-L. 6.0 mm. N.-St.-L. 6.5 mm 原節數 48.

胎兒ノ外形及ビ他臟器ノ發生概況

胎兒ハ頂屈曲及ビ背彎曲共ニ著シク、頭部ハ尾端ト相接スルガ如キ形ヲ呈シ、大腦半球特ニ中腦ノ膨隆著シクシテ上肢及ビ下肢ハ共ニ體側ヨリ隆起セリ心肝原基ノ發育著明ニシテ、胃原基ハ僅ニ左側ニ偏シ、背腹兩膝原基ハ共ニ腺囊狀ヲ呈ス。原腎ハ體腔ノ背壁ヨリ腹腔ニ隆起シ、原腎小管ハ僅ニ迂曲シテ原腎管ニ開口セルモ尾端ニオキテハ尙ホ原腎小泡ノ

狀ヲ呈ス。原腎管ハ原腎ノ外側背方ニオキテ原腎中ヲ尾方ニ走リ第 34 原節ノ高サニオキテ Kloake ニ入ル、Müller 氏管ハ原腎ノ頭端、原腎管ノ外側ニオキテ漏斗形成ノ途上ニ在リ、造腎組織ハ第 33 原節ノ高サヨリ原腎管ノ内側ニ竝行シテ頭方ニ向ヒ第 29 原節ノ高サニオキテ原腎ニ入ル。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

第 33 原節ノ高サニ於ケル原腎管尾部ニ於ケル断面ヲ見ルニ (Fig. 1. A.) 原腎管壁ハ單層圓柱上皮ヨリナリテ管壁ノ内側背方部ニ於ケル細胞ハ其ノ腹方部ニアルモノヨリモ肥厚シテ多クノ Mitose ヲ認メ、V. cardinalis post. ノ内側ニ接シテ扁平ナル形ヲ呈

シ僅ニ背方ニ膨出セルヲ見ル。此膨出部ハ 40 μ 頭方ニオキテ最モ著シク膨隆シテ尙ホ頭方ニ至ルニ從ヒ再ビ僅ニ背方ニ膨隆シ、遂ニ 30 μ 頭方ニ至リテハ原腎管壁ハ内側背方ニ於ケル膨隆ヲ認ムル能ハザルニ至ル。此膨隆部ハ所謂腎芽ニシテ將來輸尿管及ビ腎盂タル可キ腎臟集合管系統ノ發芽ナリ。

Fig. 1. A.

ニ之ヲ模型ニ就キテ見ルニ (Fig. 1. B.) 腎芽ハ原腎管ノ尾部、内側背方ニ於ケル管壁ガ扁平ナル形ヲ呈シテ 70μ ノ間僅ニ背方ニ膨隆セルモノナリ。

2. 後造腎組織

mesonephrogenes Gewebe ノ尾端、背方ニオキテ腎芽ノ内側及ビ背側ハ密集セル細胞層ヲ以テ圍繞セ

ラル。此細胞層ハ所謂 metanephrogenes Gewebe ノ初現ニシテ腎芽ノ壁ニ接スル部分ハ細胞ハ著シク密集シテ、其ノ周圍ニ至ルニ從ヒテ鬆粗ノ配列ヲナス。後造腎組織ハ細胞ノ配列状態ニヨリテ緻密ナル内層ト、鬆粗ナル外層トニ區別スルコトヲ得。

Fig. 1. B.

第 2 階 梯

胎兒記號 Nr. 19. Sch.-St.-L. 6.5 mm. N.-St.-L. 6.5 mm 原節數 49.

胎兒ノ外形及ビ他臓器ノ發生概況

胎兒ハ頂屈曲及ビ背彎曲共ニ著シク、外形及ビ頭部ニ於ケル半球及ビ中腦ノ膨隆状態ハ共ニ前階梯ニ於ケルト略ボ同様ノ形ヲ呈ス。

他臓器ノ發生状態モ亦前階梯ニ於ケルト略ボ同様ノ發生階梯ニ在リテ、氣管ハ左右ニ分岐下垂シテ其ノ終端ハ圓ク膨隆ス。原腎ハ體腔ノ背壁ヨリ腹腔ニ隆起シ、原腎小管ハ僅ニ迂曲シテ原腎管ニ開口セル

モ尾端ニオキテ尙ホ原腎小泡ノ狀ヲ呈ス。原腎管ハ第 29 原節ノ高サニオキテ原腎ヨリ出デテ尾方ニ走リ Klonke ニ入ル。Müller 氏管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ僅ニ發育進展セル状態ニ在リト雖モ尙ホ漏斗形成ノ途上ニ在リ。mesonephrogenes Gewebe ハ第 33 原節ノ高サヨリ原腎管ノ内側ニ並行シテ頭方ニ走リ第 29 原節ノ高サニ至リテ原腎ニ入ル。

腎臓原基ノ發生状態

1. 集合管系統

腎芽ハ前階梯ニ於ケルヨリモ一層發育シテ原腎管ノ尾部、第 33 原節ノ高サニオキテ原腎管ノ内側、背

方ヨリ V. cardinalis post. ノ内側ニ接シテ背方ニ膨出ス。其ノ形ハ扁平ニシテ (Fig. 2. A.) 豌豆形ヲ呈シ Fig. 2. B. ニ見ルガ如ク背方ニ膨出セルノミナラ

ズ頭方及ビ尾方ニ向ヒテモ亦僅ニ膨隆ス。頭方ニ於ケル膨隆部ハ哺乳類腎盂ノ頭部ニ相當シ又尾方ニ於ケル膨隆部ハ其ノ尾部ニ相當スル部分ニシテ、腎芽ノ壁ハ單層圓柱上皮ヨリナリ原尿管壁ノ細胞ハ腎芽部ニ移行スルニ從ヒ肥厚増殖シテ其ノ高サヲ増ス。

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ mesonephrogenes Gewebe ノ尾端、

背方ニオキテ腎芽ノ尾端ヲ被ヒ其ノ内側及ビ背側ニ接シテ頭方ニ向ヒ腎芽ノ頭端ヲ被フ。獨リ其ノ外層ノミハ尙ホ頭方ニ向ヒテ第32原節尾端ノ高サニ終ル。而シテ後造腎組織ノ細胞ハ腎芽ノ壁ニ接スル部位ハ最モ密集シテ其ノ周圍ニ至ルニ從ヒテ鬆粗ノ配列ヲナシ、其ノ堺ハ判然タラザレドモ之ヲ内、外ノ2層ニ區別スルコトヲ得。

Fig. 2. A.

Fig. 2. B.

第 3 階 梯

胎兒記號 Nr. 31 Sch.-St.-L. 6.5 mm. N.-St.-L. 7.0 mm 原節數 50.

胎兒ノ外形及ビ他臟器ノ發生概況

胎兒ハ頂屈曲及ビ背彎曲共ニ前階梯ニ於ケルガ如ク、頭部ハ尾端ト相接シテ、腦半球特ニ中腦ノ膨隆著シクシテ、上肢及ビ下肢ハ共ニ體側ヨリ隆起セリ。心、肝、原基ノ發育共ニ著シク Lebertrabekel ノ發育著明ナリ。原腎ノ全形ハ頭方ニオキテハ細長ニシテ尾方ニ向フニ從ヒテ其ノ大サヲ増シ尾端再ビ細小トナル。原腎小管ハ僅ニ迂曲シテ原腎管ニ開口セル

モ尾端ニオキテハ尙ホ原腎小泡ノ狀ヲ呈ス。

Müller氏管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ一層發育セルノ狀態ヲ呈スモ末ダ尙ホ管腔ヲ形成スルニ至ラズ。mesonephrogenes Gewebe ノ細胞配列ノ狀態ハ前階梯ニ於ケルヨリモ一層鬆粗ニシテ、處々ニ退化消失セル部分ヲ認ム。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

第 33 原節ノ高サニオキテ左側原腎管尾部ニ於ケル横斷面ヲ見ルニ原腎管ノ内側、背方部ニ當リテ原腎管ノ壁ハ V. cardinalis post ノ内側ニ接シテ僅ニ背方ニ膨隆ス。此膨隆部ハ腎芽ノ尾端ニシテ頭方ニ進ムニ從ヒテ次第ニ原腎管ヨリ著シク背方ニ向ヒ扁平ナル形ヲ呈シテ膨出シ、尾端ヨリ 9 Schnitt (10 μ) 頭方ニ至リテハ原腎管ヨリ獨立シテ V. cardinalis

post. ノ内側ニ接シ卵圓形ノ管腔狀ヲ呈シテ 30 μ ノ間頭方ニ膨隆シ、其ノ頭端ハ第 32 原節ノ高サニ終ル。模型ニ就キテ其ノ形態ヲ見ルニ (Fig. 3. B.) 腎芽ハ扁平ニシテ、原腎管ノ内側背壁ヨリ背頭方ニ向ヒテ膨出シ、其ノ頭端背側ヨリ卵圓形ノ管腔狀ヲ呈シテ頭方ニ膨隆ス。

腎芽ハ本階梯ニオキテハ前階梯ニ見タルガ如キ尾方ニ於ケル膨隆ヲ缺キテ、背頭方ニノミ發育シ其ノ

Fig. 3. A.

Fig. 3. B.

頭端ハ管腔状ヲ呈シテ頭方ニ膨隆セリ (V. g. 1. Fig. 2 B, Fig. 3. B.)

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎芽ノ尾端ヲ被ヒ其ノ内側ニ接シ

テ頭方ニ走り腎芽ノ頭端ヲ帽状ニ被覆ス。外層ハ尙ホ V. cardinalis post. ノ内側背方ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ A. iliaca communis ノ腹方ヲ走リテ原腎ノ背方ニ至リ、第 30 原節ノ頭端ノ高サニ終ル。

第 4 階 梯

胎兒記號 Nr. 28. Sch.-St.L. 7.0 mm. N.-St.-L. 7.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臟器ノ發生概況

胎兒ハ頂屈曲及ビ背彎曲共ニ著シク尾端ハ内翻シテ頭部ト相接スルガ如キ形ヲ呈ス。頭部ニオキテハ大腦半球殊ニ中腦ノ膨隆著シク、氣管ハ左右ニ分岐シテ其ノ終端ハ圓ク膨隆ス。原腎ハ著シク腹腔ニ隆起シテ、原腎小管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ一層迂曲シテ原腎管ニ開口シ、尾端第 30 原節ノ高サニオキ

テハ尙ホ原腎小泡ノ狀態ヲ呈ス。Müller 氏管ハ頭端ニオキテハ漏斗状ヲ呈シ尾方ニオキテハ既ニ管腔ヲ形成シテ尾端ハ第 19 原節ノ高サニ在リ。

mesonephrogenes Gewebe ノ細胞配列狀態ハ甚ダシク鬆組ニシテ、處々ニ全ク退化消失セル部分ヲ認ム。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

腎芽ハ益々頭方ニ發育延長シテ本階梯ニオキテハ扁平ナル管腔状ヲ呈スル後腎管トナル後腎管ハ第 33 原節尾端ノ高サニオキテ原腎管ノ尾部、内側、前階梯ニ於ケルヨリモ僅ニ背方ニ偏シタル部位ヨリ出デテ V. cardinalis post. ノ内側ニ接シ、扁平ナル管腔状ヲ呈シテ Fig. 4. B. ニ見ルガ如ク原腎管ノ背側ヲ之ニ並行シテ頭方ニ走り、其ノ頭端ハ第 31 原節尾

端ノ高サニ終ル。

今模型ニ就キテ後腎管ガ原腎管ヨリ分岐セル部分ノ形態ヲ前階梯ノソレト比較スルニ、本階梯ニオキテハ其ノ大サ著シク減小セリト雖モ、未ダ次ノ階梯ニ於ケルガ如ク後腎管ハ其ノ尾方ニオキテ背方ニ發育膨出セザルガ爲メニ、形態ニヨリテ輸尿管ト、腎盂部トヲ區別スルコトヲ得ルニ至ラズ (V. g. 1. Fig. 3. B., Fig. 4. B., Fig. 5. B.)

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ後腎管ノ尾端ヲ被ヒ其ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ後腎管ノ頭端ヲ被フ、外層ハ尙ホ V.

cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ原腎ノ背方ヲ頭方ニ進ミ、第 28 原節ノ高サニ終ル。

Fig. 4. A.

Fig. 4. B.

第 5 階 梯

胎兒記號 Nr. 27. Sch.-St.-L. 8.0 mm. N.-St.-L. 7.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臟器ノ發生概況

胎兒ハ前階梯ニ於ケルヨリ發育進展シテ伸長スト雖モ、頂屈曲及ビ背彎曲尙ホ著シク、頭部ハ右側ニ偏シテ腹部ニ接スルガ如キ形ヲ呈ス。頭部ニオキテ

ハ大腦半球及ビ中腦ノ膨隆著シク。上肢及ビ下肢ハ共ニ體側ヨリ隆起ス。

氣管ハ左右ニ分岐シテ尾方ニオキテハ既ニ第 2 分

岐ヲナシ。胃原基ハ前胃及ビ筋胃ノ區別明カニシテ筋胃ノ發育著明ナリ。原腎ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク腹腔ニ隆起シテ原腎小管ノ迂曲モ亦甚ダシキヲ見ルモ尾端ニオキテハ尙ホ原腎小管初期ノ状態ヲ呈ス。Müller 氏管ハ益々尾方ニ發育延長シテ尾端ハ

第 20 原節ノ高サニ至ル。mesonephrogenes Gewebe ハ既ニ退化消失シテ之ヲ認メズ。Aorta abdominalis ハ Chorda ノ腹方ヲ之ニ並行シテ走り第 30—第 31 原節ノ間ニオキテ A. iliaca communis ヲ分岐シ。急ニ其ノ大サヲ減ジテ尾方ニ走ル。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

後腎管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ頭方ニ發育延長シテ、其ノ頭端ハ第 30 原節頭端ノ高サニオキテハ僅ニ背方ニ發育膨出シテ其ノ尾方原腎管ニ至ル部分ヨリモ形ノ大ナルガ爲メニ、尾部ニ於ケル形ノ小ナル部分ヲ輸尿管トシ、頭方ニ於ケル形ノ稍々大ナル部分ヲ腎盂部トシテ、形態上輸尿管及ビ腎盂部ノ區別ヲナスコトヲ得ルニ至レリ。

A. 輸尿管。輸尿管ハ第 33 原節尾端ノ高サニオキテ原腎管ノ尾部、背側、内方ヨリ背頭方ニ出デ第 33 原節頭端ノ高サニオキテ腎盂ニ移行ス (Fig. 5. B.)

B. 腎盂。第 33 原節頭端ノ高サニ於ケル左側腎盂尾端ノ横斷面ヲ見ルニ、腎盂ノ壁ハ單層圓柱上皮

ヨリナリテ扁平ナル管腔狀ヲ呈シ、其ノ背側ヲ僅ニ外側ニ向ケテ、V. cardinalis post. ノ内側ニ接ス。(Fig. 5. A.) 腎盂ハ V. cardinalis post. ノ内側ニ並行シテ A. iliaca communis ノ腹方ヲ頭方ニ向ヒ、原腎ノ尾端背側ニオキテハ V. cardinalis post. ノ内側ニ接シテ卵圓形ノ管腔狀ヲ呈シ、第 30 原節頭端ノ高サニ終ル、

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂ノ尾端ヲ被ヒ、腎盂ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ走り腎盂ノ頭端ヲ被フ。外層ハ尙ホ原腎ノ背方ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ、第 27 原節ノ高サニ終ル。

Fig. 5. A.

Fig. 5. B.

第 6 階 梯

胎兒記號 Nr. 1. Sch.-St.-L. 10.0 mm. N.-St.-L. 9.0 mm.

胎兒ノ外形及ヒ他臓器ノ發生概況

胎兒ハ益々發育シテ其ノ外形ハ増大スト雖モ、尙ホ背彎曲殊ニ頂屈曲著シキガ爲メニ頭部ハ軀幹ニ接スルガ如キ形ヲ呈ス。頭部ニオキテハ半球殊ニ中腦ノ膨隆甚ダシクシテ、上肢及ビ下肢ハ共ニ體側ヨリ著シク隆起ス。

氣管枝ハ尾方ニオキテ前階梯ニ見タルヨリモ著シク分岐シテ、肝原基ノ發育著シク Lebortrabekel ノ發育著明ナリ。原腎ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク

腹腔ニ隆起シテ原腎小管ノ迂曲甚ダシク、血管絲毯ノ發育著明ナリト雖モ尙ホ尾端第 30 原節ノ高サニオキテハ初期ノ狀態ニ在リ。Müller 氏管ハ益々尾方ニ延長シテ第 22 原節ノ高サニ終ル。Aorta abdominalis ハ脊索ノ腹方ヲ之ニ並行シテ走り、第 30—第 31 原節ノ高サニオキテ A. iliaca communis ヲ分岐シ、急ニ其ノ大サヲ減少シテ尾方ニ走ル。

腎臓原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ第 34 原節頭端ノ高サニオキテ原腎管ノ尾端、前階梯ニ於ケルヨリモ一層 Kloake ニ近キ部位ニオキテ、其ノ背側内方ヨリ出デ背頭方ニ向ヒ、第 33 原節ノ高サニ至リテ腎盂ノ尾端ニ移行ス。其ノ形ハ圓形ノ管腔狀ヲ呈シ前階梯ニ於ケルヨリモ僅ニ長サヲ増シテ全長 0.12mm ヲ算ス。

B. 腎盂。第 33 原節ノ高サニ於ケル腎盂尾端ノ横斷面ヲ見ルニ、腎盂ハ扁平ナル管腔狀ヲ呈シ、其

ノ背側ヲ僅ニ外方ニ向ケテ V. cardinalis post. ノ内側ニ接ス。腎盂ハ次第ニ頭方ニ進ミテ A. iliaca communis ノ腹方ヲ (Fig. 6. A.) 原腎ノ背側ニ至リ Aorta abdominalis ノ腹側外方ヲ V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ向ヒ、頭端ハ第 29 原節ノ高サニ終ル。

腎盂ハ益々頭方ニ發育延長スルノミナラズ尾方ニオキテハ前階梯ニ於ケルヨリモ一層背方ニ膨出シテ其ノ大サヲ増シ、形態上輸尿管トノ區別次第ニ明カトナル。

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ前階梯ニ見タルガ如ク腎盂ノ尾端ヨリ其ノ内側背方ニ接シテ1ツノ索状ヲ呈シテ頭方ニ

向ヒ其ノ頭端ヲ被フ。後造腎組織ノ外層ハ尙ホ原腎ノ背側ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ走り第25原節ノ高サニ終ル。

Fig. 6. A.

Fig. 6. B.

第 7 階 梯

胎兒記號 Nr. 6. Sch.-St.-L. 11.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臓器ノ發生概況

胎兒ハ頂屈曲及ビ背彎曲尙ホ著シキト雖モ頸部ハ頭部及ビ軀幹ヨリ稍々獨立シテ前階梯ニ於ケルヨリモ發育伸長セル形ヲ呈ス。頭部ニオキテハ大腦半球ノ膨隆ハ尙ホ中腦ノ膨隆ニ及バズ。上肢及ビ下肢ハ共ニ著明ニ發育シテ體側ヨリ隆起ス。氣管枝ハ益々分岐セル狀ヲ呈シテ、心肝原基ノ發育亦著明ナリ。原腎ハ著シク腹腔ニ隆起シテ原腎小管ノ迂曲甚ダシ

ク血管絲毯ノ發育亦著明ナリ。Müller氏管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ尙ホ尾方ニ發育延長シテ尾端ハ第24原節ノ高サニ終ル。Aorta abdominalis 及ビ A. iliaca communis ノ經過ハ略ボ前階梯ニ於ケルト同様ニシテ第30、第31原節ノ間ニオキテ A. iliaca communis ヲ分岐ス。

腎臓原基ノ發生狀態

1. 集合管系統 D.W.

A. 輸尿管. 輸尿管ハ第33原節ノ高サニオキテ原腎管ノ尾端、背方ヨリ出デテ背頭方ニ向ヒ、第32原節ノ高サニ至リテ腎盂ノ尾端ニ移行ス。

今模型ニ就キテ見ルニ、輸尿管ハ原腎管ノ全ク背方ヨリ出デテ其ノ開口部ハ前階梯ニ於ケルヨリモ尾方 Kloake ニ近キ位置ニ在リ。

B. 腎盂. 第32原節ノ高サニ於ケル左側腎盂ノ横断面ヲ見ルニ、(Fig. 7. A.) 腎盂ハ原腎管ノ背側ニオキテ V. cardinalis ノ内側背方ニ接シ、其ノ背側ヲ僅ニ外方ニ向ケ、扁平ナル内腔ヲ有スル管腔狀ヲ呈シ、管壁ハ單層圓柱上皮ヨリナル。更ニ頭方ニ進ミテ第31原節ノ高サ A. iliaca communis ノ腹方ニ一致スル部分ニ至レバ腎盂ハ Fig. 7. B. ニ見ル如ク A. iliaca communis ノ腹方ニオキテ V. cardinalis post. ノ背側ニ接シ、其ノ内側ヲ殆ド背側ニ向ケテ頭方ニ向ヒ、第30原節ノ高サ A. iliaca communis ノ頭方ニ至リテハ (Fig. 7. C.) 原腎ノ背方、Aorta abdominalis ノ腹側外方ヲ V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接シテ第32原節ノ高サニオキテ見タルガ如ク、腎盂ハ其ノ背側ヲ僅ニ外方ニ向ケ Fig. 7. D. ニ示スガ如ク頭方ニ至ルニ從ヒテ其ノ大サヲ減少シ、頭端ハ第28原節ノ高サニ終リテ前階梯ニ於ケルヨ

リモ頭方ニ發育延長スルノミナラズ、尾方ニオキテハ背方ニ膨出シテ僅ニ腎盂ヲ發生ス。

前階梯ニ於ケル A. iliaca communis ノ腹方ニ一致セル部分ノ腎盂ハ、其ノ内側面ヲ僅ニ背方ニ向ケテ其ノ尾方及ビ頭方ノ部分ニ於ケルト同様ノ狀態ヲ呈シタレドモ (Fig. 6. A.) 本階梯ニオキテハ未ダ次ノ階梯ニ於ケルガ如ク腎盂ノ大サニヨリテ、之ヲ尾部、中間部及ビ頭部ノ3部分ニ區別スルコトヲ得ルニハ至ラザレドモ、腎盂ハ A. iliaca communis ノ腹方ニ一致セル部分ニオキテハ其ノ内側面ヲ殆ド背側ニ向ケテ、尾方及ビ頭方ニ於ケルヨリモ趣ヲ異ニセリ (V. g. l. Fig. 7. A., B., C. 及ビ Fig. 6. A.).

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂ノ尾端ヲ覆ヒテ、其ノ内側背方ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ、A. iliaca communis ノ腹方ニ至リテハ腎盂ノ背側ニ接シテ A. iliaca communis ノ爲メニ其ノ發生ヲ障礙セラレ (Fig. 7. B.) 更ニ頭方ニ進ミテ第30原節ヨリ頭方ニオキテハ原腎ノ背側ヲ腎盂ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ向ヒテ腎盂ノ頭端ヲ被フ。外層ハ原腎ノ背方ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ尙ホモ頭方ニ走リ第25原節ノ高サニ終ル。

Fig. 7. A.

D.

Fig. 7. B.

Fig. 7. C.

Fig. 7. D.

第 8 階 梯

胎兒記號 Nr. 32. Sch.-St.-L. 11.5 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臓器ノ發生概況

胎兒ノ外形ハ前階梯ニ於ケルト略ボ同様ノ形ヲ呈ス。上肢及ビ下肢骨ハ既ニ軟骨化セルヲ認メ、胃原基ハ前胃及ビ筋胃ノ區別明カニシテ筋胃ノ發育著明ナリ。氣管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ尙ホ分岐セル狀ヲ呈シ、原腎ノ隆起著シクシテ原腎小管ノ迂曲モ亦

著明ナリ。Müller 氏管ハ益々發育延長シテ其ノ尾端ハ第 25 原節ノ高サニ至ル。胚腺ハ原腎ノ内側ニオキテ左右殆ト同大ナリ。Aorta abdominalis ハ Chorda ノ腹方ヲ之ニ並行シテ走り第 31 節ノ高サニオキテ A. iliaca communis ヲ分岐ス。

腎臓原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ原腎管ノ尾部前階梯ニ於ケルヨリモ尙ホ Kloake ニ接近セル部位ニオキテ原腎管ノ背側ヨリ出デ背頭方ニ向ヒ第 32 原節ノ高サニオキテ腎盂ノ尾端腹側ニ移行ス。模型ニ就キテ見ルニ輸尿管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ其ノ大サヲ減少シテ長サヲ増シ全長 0.25mm ヲ算ス。

B. 腎盂。腎盂ハ扁平ナル管腔狀ヲ呈シ、第 32 原節ノ高サニオキテ輸尿管ト連リ、原腎管ノ背方ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ A. iliaca communis ノ腹方ヲ頭方ニ向ヒ、原腎ノ背方ヲ頭方ニ走り其ノ頭端ハ第 27 原節ノ高サニ終ル。

腎盂ハ前階梯ニ於ケルヨリモ益々頭方ニ發育延長セルノミナラズ、A. iliaca communis ノ腹方ニ一致セル部分ハ A. iliaca communis ノ發育甚ダシキガ爲メニ腎盂ノ發生ヲ障碍セラレテ、其ノ尾方及ビ頭方ニ於ケルヨリモ形ノ小ナルガ爲メニ形態ニヨリテ、腎盂ヲ A. iliaca communis ノ腹方ニ一致セル部分ヲ中間部トナシ、其ノ尾方及ビ頭方ヲ腎盂ノ尾部及ビ頭部トシテ 3 部分ニ區別スルコトヲ得ルニ至レリ。

以下記載ノ便宜上腎盂ノ尾部、中間部、頭部ノ 3 部分ニ分チテ各部ノ所見ヲ記述セン。

腎盂尾部。第 32 原節ノ高サニ於ケル腎盂尾部ノ横斷面ヲ見ルニ (Fig. 8. A.) 腎盂ハ原腎管ノ背方ニオキテ扁平ナル管腔狀ヲ呈シ、其ノ壁ハ單層圆柱上

皮ヨリナリテ僅ニ彎曲シテ其ノ凹面即チ内側ヲ背外方ニ向ケ、V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ向ヒ、第 31 原節頭端ノ高サニオキテ中間部ニ移行ス。

中間部。第 30 原節尾端ノ高サニ於ケル中間部ノ横斷面ヲ見ルニ (Fig. 8. B.) 腎盂ハ尾部及ビ頭部ニ於ケルヨリモ其ノ大サ遙ニ小ニシテ (V. g. l. Fig. 8, A, B, C.) A. iliaca communis ノ腹方ヲ V. cardinalis post. ノ背側ニ接シテ扁平ナル内腔ヲ有スル小管腔狀ヲ呈シ、其ノ内側ヲ全ク背方ニ向ケテ頭方ニ走り、第 30 原節ノ頭方ヨリ次第ニ其ノ大サヲ増シテ頭部尾端ノ腹側ニ移行ス。

頭部。第 30 原節ノ高サニ於ケル腎盂頭部ノ横斷面ヲ見ルニ (Fig. 8. C.) 腎盂ハ Aorta abdominalis ノ外側腹方ニオキテ、扁平ナル管腔狀ヲ呈シ其ノ大サハ尾部ニ於ケルヨリモ小ナリト雖モ、中間部ニ於ケルヨリハ大ニシテ V. g. l. Fig. 8. A, B, C. 内側ヲ背外方ニ向ケ、V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接シテ原腎ノ背方ヲ頭方ニ向ヒ、次第ニ其ノ大サヲ減ジテ Aorta abdominalis ノ外側ニ至リ、其ノ頭端ハ第 27 原節ノ尾端ニ終ル。

模型ニ就キテ見ルニ (Fig. 8. D.) 腎盂ノ尾部ハ前階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ背方ニ發育膨出シテ腎盂ノ大サヲ増シ、頭部亦頭方ニ發育延長スルト共ニ頭部尾方ハ初メテ背方ニ發育膨出シテ腎盂ヲ發生スルニ

至レリ (V. g. l. Fig. 7. D., Fig. 8. D.)

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂ノ尾端ヲ被ヒ、腎盞ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ、中間部ニオキテハ A. iliaca communis ト腎盂トノ間ニオキテ其ノ發生ヲ著シク障碍

セラレテ頭方ニ向ヒ、腎盂ノ頭部ニ至リテハ再ビ腎盂ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ走リ、腎盂ノ頭端ヲ頭巾狀ニ被覆ス。後造腎組織ノ外層ハ尙ホ原腎ノ背方ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ、第 25 原節ノ高サニ終ル。

Fig. 8. A.

Fig. 8. B.

Fig. 8. C.

Fig. 8. D.

第 9 階 梯

胎兒記號 Nr. 33. Sch.-St.-L. 12.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臟器ノ發生概況

胎兒ハ頂屈曲ノ爲メニ頭部ハ胸部ニ接シ背部ハ僅ニ彎曲シテ其ノ外形ハ一般ニ發育伸展シテ増大スト雖モ、頭部ニオキテハ尙ホ半球ノ膨隆ハ中腦ノ膨隆ニ及バズ。

四肢骨及ビ椎骨ハ共ニ軟骨化シテ、氣管ノ分岐ハ前階梯ニ於ケルヨリモ一層複雑ナル狀態ヲ呈ス。胃

原基ノ發育著明ナレドモ未ダ前胃ニハ胃腺ノ發生ヲ認メズ。原腎ハ基ダシク腹腔ニ隆起シテ血管ハ著明ニ發達ス。Müller 氏管ハ前階梯ニ於ケルヨリモ尾方ニ發育延長シテ尾端ハ第 26 原節頭端ノ高サニ至ル。Aorta abdominalis 及ビ A. iliaca communis ノ經過ハ前階梯ニ於ケルト略ボ同様ノ狀態ニ在リ。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ第 34 原節ノ高サニテ原腎管ノ尾端 Kloake トノ堺ニオキテ原腎管ノ背側ヨリ背外方ニ出デテ頭方ニ向ヒ第 32 原節尾端ノ高サニオキテ腎盂ニ移行ス。其ノ形ハ圓形ニシテ管腔狀ヲ呈シ、模型ニ就キテ見ルニ大サハ却ツテ前階梯ニ於ケルヨリモ減少シテ長サ 0.35mm ヲ算ス。

B. 腎盂。

尾部。第 32 原節ノ高サニ於ケル腎盂尾部ノ横斷面ヲ見ルニ (Fig. 9. A.) 腎盂ハ原腎管ノ背方ニオキテ扁平ニシテ彎曲セル管腔狀ヲ呈シ、前階梯ノ尾部ヨリモ遙ニ大ニシテ (V. g. l. Fig. 8. A., Fig. 9. A.) 其ノ背側ヲ僅ニ外方ニ向ケ V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ向ヒ、第 31 原節頭端ノ高サニオキテ中間部ニ移行ス。

中間部。腎盂ハ A. iliaca communis ト V. cardinalis post. ノ間ニ在リテ、其ノ形扁平ニシテ尾部及ビ頭部ニ於ケルヨリモ遙ニ小サキ管腔狀ヲ呈シ、内側ヲ全ク背方ニ向ケテ頭方ニ向ヒ、第 30 原節ノ高サニテ急ニ其ノ大サヲ増シテ腎盂ノ頭部ニ移行ス。

頭部。第 30 原節ニ於ケル腎盂ノ頭部尾方ニ於ケル横斷面ヲ見ルニ (Fig. 9. B.) 腎盂ハ Aorta abdominalis ノ腹側外方ニオキテ彎曲セル扁平ノ管腔狀

ヲ呈シ、前階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ背方ニ膨出シテ (V. g. l. Fig. 8. C., Fig. 9. B.) 其ノ内側ノ凹面ヲ背外方ニ向ケ、V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接シテ原腎ノ背方ヲ頭方ニ走ル。頭部頭方ニオキテハ腎盂ハ未ダ次ノ階梯ニ於ケルガ如ク著シク大ナラザレドモ (V. g. l. Fig. 9. C., Fig. 10. C.) 前階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ背方ニ膨出シテ其ノ頭端ハ第 26 原節ノ高サニ終ル。

模型ニ就キテ腎盂腎盞ノ發生狀態ヲ見ルニ (Fig. 9. D.) 腎盂ノ尾部ニオキテハ腎盞ハ前階梯ニ於ケルモ著シク背方ニ膨出シ、中間部ニオキテハ A. iliaca communis ノ爲メニ障礙セラレテ腎盞ノ發生ヲ見ザルノミナラズ却ツテ前階梯ニ於ケルヨリモ其ノ大サヲ減少ス。之ニ反シテ腎盂頭部尾方ニ於ケル腎盞ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク發育増大セルガ爲メニ腎盂ハ形態ノ大小ニヨル尾部、中間部、頭部ノ區別益々明瞭トナレリ。

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂ノ尾端ヲ被ヒ腎盞ノ内側ニ接シテ索狀ヲ呈シテ頭方ニ向ヒ、中間部ニオキテハ A. iliaca communis ノ發育著シキガ爲メニ僅ニ腎盂ノ背方ニ接シテ頭方ニ向ヒ、腎盂ノ頭部ニオキテハ再び腎盞ノ内側ニ接シテ頭方ニ向ヒ、腎盂ノ頭部頭方

ニ至リテハ腎盂ノ内側ニ沿ヒテ (Fig. 9. C.) 其ノ頭 | *cardinalis post.* ノ内側背方ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ, 第
端ヲ被フ. 造腎組織ノ外層ハ尙ホ原腎ノ背方ヲ V. | 25 原節ノ高サニ終ル.

Fig. 9. A.

Fig. 9. B.

Fig. 9. C.

Fig. 9. D.

第 10 階 梯

胎兒記號 Nr. 35. Sch.-St.-L. 12.5 mm.

胎兒ノ外形及 他臟器ノ發生概況

胎兒ハ前階梯ニ比シ頂部及ビ背部ノ彎曲減却シテ頭部ハ尾部ト相隔タルコト甚ダシク、頸部ハ頭部及ビ軀幹ヨリ稍々獨立セル形ヲ呈ス。大腦半球ハ發育増大シテ其ノ間ニ於ケル境界著明トナリ、眼盃ハ胎兒ノ全形ニ比較シテ甚ダシク大ナリ。四肢ハ其ノ位置ニヨルノミナラズ形ニヨリテモ亦翼ト脚トヲ區別スルコトヲ得ルニ至レリ。椎骨及ビ肢骨ハ共ニ軟骨

化シテ、胃原基ハ益々發育進展シテ左側ニ偏在シ前胃ニオキテハ僅ニ胃腺ノ發生ヲ認ム。原腎ハ益々發育シテ今ヤ發育ノ頂點ニ達スルヤノ觀ヲ呈シテ腹腔ヲ充滿シ、血管及ビ血管絲毯ノ發育盛ナリ。Müller氏管ハ益々尾方ニ發育延長シテ尾端ハ第27原節ノ高サニ至ル。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ本階梯ニオキテハ原腎管ヨリ分離シテ、完全ニKlonkeヨリ出デテ背頭方ニ進ミ第32原節ノ高サニオキテ腎盂ノ尾端ニ移行ス。其ノ形ハ圓形ノ管腔狀ヲ呈シ、全長0.35mmヲ算ス。

B. 腎盂。

尾部。第32原節ノ高サニ於ケル左側腎盂尾部ノ横斷面ヲ見ルニ(Fig. 10. A.)腎盂ハAortaノ腹側外方ニオキテ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク背方ニ膨出シテ大サヲ増シ(V. g. 1. Fig. 9. A., Fig. 10. A.)彎曲セル管腔狀ヲ呈シ其ノ凹面ヲV. cardinalis post.ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ向ヒ第31原節ノ高サ、腎盂ノ尾部頭端ニオキテハ、腎盂ハ背方ニ膨隆シテ僅ニprimäre Sammelrohrヲ發生シ、急ニ其ノ大サヲ減少シテ中間部ニ移行ス。

中間部。腎盂ノ中間部ハA. iliaca communisノ腹方ニ於テ、扁平ナル小管腔狀ヲ呈シ、内側ヲ全ク背方ニ向ケテ頭方ニ進ミ第30原節ノ頭端ノ高サニオキテ腎盂ノ頭部尾端腹側ニ移行ス。

頭部。腎盂ノ頭部尾端ニオキテハFig. 10. D.ニ見ルガ如ク、腎盂ハA. iliaca communisノ背方ヲ僅ニ尾方ニ膨出シテ、A. iliaca communisヲ圍繞セントスルガ如キ形ヲ呈ス。

腎盂ハ第30原節ノ高サニオキテハ(Fig. 10. B.)Aorta abdominalisノ外側腹方ニオキテ扁平ナル管腔狀ヲ呈シ、前階梯ニ於ケルヨリモ著シク背外方ニ膨出シテ(V. g. 1. Fig. 9. B., Fig. 10. B.)V. cardinalis

post.ノ内側背方ニ接シ原腎ノ背側外方ヲ頭方ニ至ルニ從ヒテ其ノ大サヲ減少シ、第26原節ノ高サニ至リテ再ビ背方竝ニ腹方ニ膨出シテ前階梯ニ於ケル腎盂ノ頭部頭方ヨリモ著シク腎盂ノ大サヲ増ス(V. g. 1. Fig. 9. C., Fig. 10. C.)腎盂ハ第26原節ノ高サニオキテハ(Fig. 10. C.)原腎ノ背方、Aorta abdominalisノ外側ニオキテ、V. cardinalis post.ノ内側ニ接シ、僅ニ彎曲セル扁平ノ管腔狀ヲ呈シ、其ノ凹面ヲ内側ニ向ケ、Fig. 10. D.ニ見ルガ如ク頭端ニ向ヒテ再ビ其ノ大サヲ減ジ、頭端ハ第25原節ノ高サニ終ル。

模型ニ就キテ之ヲ見ルニ、腎盂ノ尾部ニオキテハ腎盂ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク背方ニ膨出シテ其ノ大サヲ増シ(V. g. 1. Fig. 9. D., Fig. 10. D.)背側頭端ニオキテハ初メテ僅ニprimäre Sammelrohrヲ發生シ、急ニ大サヲ減少シテ中間部ニ移行ス。

又腎盂ノ頭部ハ前階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ頭方ニ發育延長セルノミナラズ、頭部尾方ニオキテハ腎盂ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク背方ニ膨出シテ其ノ尾端背側ハ僅ニ尾方ニ膨出ス。而シテ頭部頭方ハ背方竝ニ腹方ニ膨出シテ、前階梯ニ於ケル腎盂ノ頭部頭方ヨリモ著シク増大セルヲ見ル(V. g. 1. Fig. 9. D., Fig. 10. D.)

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂ノ尾端ヲ被ヒ腎盂ノ背内側ニ沿ヒテ頭方ニ向ヒ、腎盂ノ尾部頭端ニ至リテハprimäre Sammelrohrノ周圍ヲ圍繞ス。中間部ニオキテハA. iliaca communisノ發育著シキガ爲メニ後造腎組織

ハ僅ニ之ヲ認ムルノミニシテ、頭部ニオキテ再ビ腎 | 被フ。後造腎組織ノ外層ハ尙ホ原腎ノ背方ヲ頭方ニ
蓋ノ内側背方ニ沿ヒテ頭方ニ走リ腎盂ノ頭部頭端ヲ | 走リテ第 25 原節頭端ノ高サノ終ル。

Fig. 10. A.

Fig. 10. B.

Fig. 10. C.

Fig. 10. D.

第 11 階 梯

胎兒記號 Nr. 8. Sch.-St.-L. 13.5 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臟器ノ發生概況

胎兒ハ益々發育伸長シテ頸部ハ頭部及ビ軀幹ヨリ獨立シテ判然タレドモ、尙ホ頭部ハ頂屈曲ノ爲メニ胸部ニ接セントスルガ如キ形ヲ呈ス。大胸半球ノ膨隆ハ著シク増大セルモ尙ホ中腦ノ膨隆ニ及バズ。上肢ハ僅ニ屈曲シテ翼狀ヲ呈シ下肢又其ノ長サヲ増シテ脚狀ヲ呈ス。

胃原基ノ發育著シク前胃ニオキテハ僅ニ胃腺ノ發生セルヲ認ム。原腎ハ甚ダシク發育シテ腹腔ヲ充滿シ血管及ビ絲毯ノ發育著明ナリ。原腎小管ハ甚ダシク迂曲シテ原腎管ニ開口シ原腎ハ正ニ發育ノ絶頂ニ在ルガ如シ。Müller氏管ハ益々尾方ニ發育延長シテ第28原節ノ高サニ至ル。

腎臟原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ原腎管ノ背方ニオキテ Klooke ヨリ背外方ニ出デテ背頭方ニ走リ第32原節ノ高サニオキテ腎盂ノ尾部尾端。腹側ニ移行ス。其ノ横斷面ハ圓形ノ管腔狀ヲ呈シ、管壁ハ單層圓柱上皮ヨリナリ、前階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ長クシテ全長0.3mmヲ算ス。

B. 腎盂。

尾部。腎盂ノ尾部ハ第32及ビ第31原節ノ間ニ在リテ Fig. 11. D. ニ見ルガ如ク V. cardinalis post. ノ背側ニ向ヒ3箇ノ primäre Sammelröhre ヲ出ス。尾端ニ於ケル primäre Sammelrohr ハ V. cardinalis post. ノ背側ヲ外方ニ出デ、其ノ終端ハ僅ニ膨隆ス。又頭端ニ於ケル primäre Sammelrohr ハ V. cardinalis ノ内側ニ出デテ其ノ背側ニ至リ、先端ハ外頭方ニ膨隆シテ今ヤ sekundäre Sammelrohr ヲ分岐セントスルガ如キ形ヲ呈ス。

中間部。腎盂ノ中間部ハ A. iliaca communis ノ腹方ヲ頭ニ向ヒ第30原節ノ高サニオキテ腎盂ノ頭部尾端腹側ニ移行ス。腎盂ハ A. iliaca communis ノ發育著シキガ爲メニ其ノ發育ヲ障碍セラレテ圓形ノ小管腔狀ヲ呈シ前階梯ニ於ケルヨリモ長クシテ全長0.33mmヲ算ス。

頭部。腎盂ノ頭部尾端ニオキテハ、腎盂ハ Fig.

11. D. ニ見ルガ如ク A. iliaca communis ノ背側ヲ尾方ニ膨出シテ primäre Sammelrohr ヲ發生シ、腎盂ノ尾部頭端ニ於ケル Sammelrohr ト共ニ A. iliaca communis ヲ圍繞セントスルガ如キ形ヲ呈シテ之ト相對ス。

第30原節ノ高サニ於ケル腎盂ノ横斷面ヲ見ルニ (Fig. 11. B.) 腎盂ハ Aorta abdominalis ノ外側腹方、原腎ノ背側外方ニオキテ扁平ナル管腔狀ヲ呈シ、其ノ内側ヲ背外方ニ向ケテ、V. cardinalis post. ノ内側背方ニ接ス。腎盂ハ原腎ノ背側外方ヲ V. cardinalis post. ニ接シテ頭方ニ向フニ從ヒ其ノ大サヲ減少シ、第26原節ノ高サヨリ頭方ニ至リテハ腎盂ハ再び其ノ大サヲ増大シテ彎曲セル扁平ノ管腔狀ヲ呈シ、凹面ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ接シテ原腎ノ背側外方、Aorta abdominalis ノ外方ヲ頭方ニ進ミ、頭端ハ第25原節ノ高サニ終ル而シテ腎盂ノ頭部腹側及ビ頭端ノ背腹兩側ハ Fig. 11. D. ニ見ルガ如ク僅ニ膨隆シテ正ニ primäre Sammelrohr ヲ發芽セントスルガ如キ形ヲ呈ス。

模型ニ就キテ本階梯ニ於ケル集合管系統ノ發生狀態ヲ觀ルニ (Fig. 11. D.) 腎盂尾部ニオキテハ Sammelrohr ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク發育進展シテ3箇ノ primäre Sammelröhre ノ發生ヲ見ルニ至リ、殊ニ頭端ニ於ケル Sammelrohr ハ A. iliaca com-

munis ノ背側ヲ頭方ニ向ヒテ之ヲ圍繞セントスルガ如キ形ヲ呈ス。

腎盂ノ頭部ハ前階梯ニ於ケルヨリモ頭方ニ發育延長シ、頭部尾端ニ於ケル primäre Sammelrohr ハ A. iliaca communis ノ背側ヲ尾方ニ發育シテ尾部頭端ニ於ケル Sammelrohr 及ビ中間部ト共ニ A. iliaca communis ヲ圍繞セントスルガ如キ形ヲ呈シ、頭部頭方ニオキテモ亦腎盂ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク發育増大シテ正ニ 3 箇ノ primäre Sammelröhre ヲ發生セントスルガ如キ形ヲ呈スルニ至レリ。

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂ノ尾部ニオキテハ Sammelrohr

ノ周圍ヲ圍繞シテ其ノ先端ヲ覆ヒ、中間部ニオキテハ A. iliaca communis ノ發育著シキガ爲メニ其ノ發生ヲ障礙セラレ後造腎組織内層ハ之ヲ認メズ僅ニ外層ノミ腎盂ノ周圍ヲ圍繞セルヲ見ルノミナリ。頭部ニオキテハ尾部ノ Sammelrohr ヲ圍繞シテ腎盂ノ内側背方ヲ頭方ニ向ヒ、頭部頭方ニ至リテハ造腎組織ハ腎盂ノ内側ヲ走りテ其ノ内層ハ腎盂ノ腹側及ビ頭端ニ於ケル腎盂ノ膨隆部ニ密集シテ腎盂ノ頭端ヲ被ヒ、外層ハ尙ホ原腎ノ背側ヲ頭方ニ向ヒテ第 25 原節頭端ノ高サニ終ル。

Fig. 11. A.

Fig. 11. B.

Fig. 11. C.

第 12 階 梯

胎兒記號 Nr. 9. Sch.-St.-L. 14.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臓器ノ發生概況

胎兒ハ前階梯ニ於ケルト略ボ同様ノ外形ヲ呈スレドモ、頸部ハ判然タル形ヲナスニ至レリ。椎骨及ビ四肢骨ノ軟骨化セルヲ見ルノミナラズ、胸骨及ビ肋骨モ亦軟骨化シテ、氣管枝ハ益々分岐シテ複雑ナル狀ヲ呈ス。胃原基ニオキテハ胃腺ノ發育前階梯ニ於

ケルヨリモ一層發達セルヲ認メ、原腎ハ腹腔ヲ充滿シテ血管ノ分布著シク、原腎小管ハ一部退化ヲ開始セントスル形ヲ呈シ、Müller 氏管ハ益々尾方ニ發育シテ尾端ハ第 29 原節ノ高サニ至ル。

腎臓原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ原腎管ノ背方ニオキテ

Kloake ヨリ背外方ニ出デテ頭方ニ走り第 32 原節ノ高サニ至リ腎盂ニ移行ス。其ノ形ハ圓形ノ管腔狀ヲ

呈シ全長 0.5mm ヲ算ス。

B. 腎盂。

尾部。腎盂ノ尾部ハ第 32 原節及ビ第 31 原節ノ間ニ在リテ尿管ノ背側ニオキテ尾動脈ノ外側腹方ヲ *V. cardinalis post.* ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ走り中間部ニ移行ス。

腎盂尾部ニオキテハ Fig. 12. D. ニ見ル如ク背外方ニ向ヒテ 3 箇ノ *Sammelröhre* ヲ出シ、尾端ニ於ケル *Sammelrohr* ハ腎盂ヨリ管腔狀ヲ呈シテ背外方ニ出デ *V. cardinalis post.* ノ背側ニ至リ其ノ先端ハ分岐シテ 60 μ 尾方ニ、又 50 μ 頭方ニ膨出シテ *sekundäre Sammelröhre* ヲ發生ス。中間ニ在ル *Sammelrohr* ハ第 32 原節ノ中央部ノ高サニオキテ、腎盂ヨリ *V. cardinalis post.* ノ内側ニ向テ出デ其ノ腹側ニ至リテ僅ニ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐ス。又腎盂ノ頭端ニ於ケル *primäre Sammelrohr* ハ腎盂ヨリ圓形ノ管腔狀ヲ呈シテ外方ニ出デ *V. cardinalis* ノ腹方ニ至リ、其ノ先端ハ僅ニ分岐シテ *sekundäre Sammelröhre* ヲ形成ス。

中間部。中間部ハ *A. iliaca communis* ノ腹方ヲ頭方ニ進ミ第 30 原節ノ高サニオキテ腎盂ノ頭部尾端腹側ニ移行ス。其ノ横断面ハ小卵圓形ヲ呈シテ全長 0.55mm ヲ算ス。

頭部。腎盂ノ頭部ハ扁平ナル管腔狀ヲ呈シテ尿管ノ背側外方、*Aorta abdominalis* ノ外方ヲ *V. cardinalis* ノ内側ニ接シテ頭方ニ走り其ノ頭端ハ第 25 原節ノ高サニ終ル。

頭部尾端ニオキテハ Fig. 12. D. ニ見ルガ如ク、腎盂ハ背側尾端ニオキテ *A. iliaca communis* ノ背方ヲ尾方ニ膨出シテ扁平ナル小管腔狀ヲ呈シテ *primäre Sammelrohr* ヲ發生シ其ノ尾端ハ膨隆シテ正ニ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐セントスルガ如キ形ヲ呈ス。又第 30 原節頭方ノ高サニオキテハ、腎盂ハ

V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ Fig. 12. D. ニ見ル如ク 2 箇所ニオキテ著シク背方ニ膨隆シ、僅ニ *primäre Sammelröhre* ヲ發生ス。尙ホ頭方第 29 原節頭端及ビ第 28 原節中央ノ高サニオキテモ亦腎盂ハ背方ニ膨隆シテ *primäre Sammelröhre* ヲ發生セントスルガ如キ形ヲ呈ス。尙ホ第 26 原節ノ高サニ至リテハ腎盂ノ腹側ニオキテモ亦僅ニ *primäre Sammelrohr* ヲ發生シ、頭端ニオキテハ背腹兩端ニオキテ頭方ニ *primäre Sammelröhre* ヲ膨出セルヲ見ル。

今本階梯ニ於ケル *Sammelrohrsystem* ノ發生狀態ヲ前階梯ノソレト比較スルニ腎盂ノ尾部ハ本階梯ニオキテハ著シク狭小トナリ前階梯ニオキテ僅ニ其ノ發生ヲタル *primäre Sammelröhre* ハ本階梯ニ至リテハ著シク發育シテ其ノ先端ハ *sekundäre Sammelröhre* ヲ發生スルニ至レリ。中間部ハ前階梯ニ比シテ著シク長クシテ、腎盂ノ頭部尾端ニ於ケル *Sammelrohr* ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク發育シテ尾端ハ膨隆シテ正ニ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐セントスルガ如キ形ヲ呈シ、頭端ニ於ケル *primäre Sammelröhre* モ明カニ其ノ發生ヲ認ムルノミナラズ他ニ 5 箇ノ *primäre Sammelröhre* ヲ發生シ、腎盂ノ頭部ニオキテハ 8 箇ノ *Sammelröhre* ヲ發生スルニ至レリ (*V. g. l. Fig. 11. D., Fig. 12. D.*)

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂尾部ニオキテハ *Sammelröhre* ノ周圍ヲ圍繞シテ其ノ先端ヲ頭巾狀ニ被ヒ、中間部ニオキテハ僅ニ外層ノ細胞ガ腎盂ノ周圍ヲ圍繞スルノミニシテ内層ノ細胞ヲ認メズ。頭部ニオキテハ腎盂ノ内側ヲ頭方ニ向ヒ *Sammelröhre* ノ發生部ニオキテハ内層ノ細胞ハ其ノ周圍ニ密集シテ之ヲ圍繞シ *Sammelrohr* ノ頭端ヲ被フ。造腎組織ノ外層ハ尙ホ頭方ニ進ミテ第 24 原節尾端ノ高サニ終ル。

Fig. 12. A.

Fig. 12. B.

Fig. 12. C.

Fig. 12. D.

第 13 階 梯

胎兒記號. Nr. 14. Sch.-St.-L. 15.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臓器ノ發生概況

胎兒ハ軀幹ノ發育著シキガ爲メニ背彎曲ハ減却シテ、頭部ハ軀幹ヨリ隔リ、頭部ハ判然タル形ヲ呈ス。頭部ニオキテハ大腦半球ノ發育増大セルガ爲メニ中腦ノ膨隆トノ均衡ヲ得ルニ至ル。上肢ハ屈曲シテ翼狀ヲ呈シ、下肢又著シク其ノ長サヲ増シテ脚狀ヲ呈ス。

四肢、椎骨、胸骨及ビ頭蓋ノ諸骨ハ共ニ軟骨化シテ、胃原基ニオキテハ胃腺ハ前階梯ニ於ケルヨリモ發育進展セルノ狀ヲ呈ス。原腎ハ腸管ト共ニ腹腔ヲ充滿シテ血管ノ分布著シキヲ見ル。Müller氏管ハ益々尾方ニ發育シテ尾端ハ第30原節ノ高サニ至ル。

腎臓原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ原腎管ノ背方ニオキテ Kloake ヨリ外方ニ出デテ背頭方ニ走り、第32原節ノ高サニ至リテ腎盂ノ尾部ニ移行ス。其ノ横斷面ハ圓形ノ管腔狀ヲ呈シ全長0.54mmヲ算ス。

B. 腎盂。

腎盂ハ Fig. 13. D. ニ見ル如ク14箇ノ Sammelröhre ヲ出シテ Sammelrohr ハ稍々複雑ナル分岐ヲナセルガ爲メニ、各 Sammelrohr ニ尾方ヨリ次第ニ頭方ニ 1. S. r. 2. S. r. ノ序數ヲ附シテ記載ノ便宜ヲ計リタリ。

尾部。尾部ハ第32原節ヨリ第31原節ノ間ニ在リテ、原腎管ノ背側ヲ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ走り、第31原節ノ中央ノ高サニオキテ中間部ニ移行ス。

腎盂ノ尾部ニオキテハ Fig. 13. D. ニ見ルガ如ク3箇ノ Sammelröhre ヲ出シ、Sammelrohr 1. S. r. ハ第32原節ノ高サニオキテ腎盂ヨリ圓形ノ管腔狀ヲ呈シテ背外方ニ向ヒ、V. cardinalis post. ノ背方ニ出デテ sekundäre Sammelrohr ヲ分岐ス。而シテ sekundäre Sammelröhre ノ1ツハ V. cardinalis post. ノ背方ニ、他ハ外頭方ニ向フ。2. S. r. ハ第32第31原節ノ間ニオキテ、腎盂ヨリ外方ニ出デテ V. cardinalis ノ内側ニ沿ヒテ僅ニ頭方ニ向フ。3. S. r. ハ第31原節ノ高サニオキテ、腎盂ヨリ外方ニ出デテ V. cardi-

nalis post. ノ内側腹方ニ至リテ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐シ1ツハ V. cardinalis post. ノ内側ヲ頭方ニ向ヒ、他ハ其ノ腹側ヲ頭方ニ向ヒテ tertiäre Sammelröhre ヲ分岐シテ共ニ A. iliaca communis ノ背側ニ出デテ、之ヲ圍繞シ、腎盂ノ頭部尾端ニ於ケル Sammelrohr ト相對ス。

中間部。中間部ハ第31原節ノ高サニオキテ腎盂ノ尾部ト連リ、原腎管ノ背方 A. iliaca communis ノ腹方ヲ頭方ニ走り、其ノ横斷面ハ扁平ナル小管腔狀ヲ呈シテ第30原節ノ高サニオキテ腎盂ノ頭部尾端ニ移行ス。

頭部。腎盂ノ頭部ハ原腎ノ背側外方、Aorta abdominalis ノ外側ニオキテ、V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ走り、其ノ頭端ハ第25原節ノ高サニ終ル。

頭部尾端ニ於ケル Sammelrohr 4. S. r. ハ腎盂ヨリ背外方ニ出デ V. cardinalis post. ノ内側ニ至リテ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐シ、sekundäre Sammelröhre ハ共ニ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ A. iliaca communis ノ背側ヲ尾方ニ向ヒ、腎盂ノ中間部及ビ尾部頭端ノ Sammelrohr ト共ニ A. iliaca communis ヲ圍繞シテ相對ス。5. S. r. ハ第29原節ノ尾端ノ高サ、6. S. r. ハ第29原節頭端ノ高サニ於テ共ニ腎盂ヨリ背方ニ出デ V. cardinalis post. ノ内側ニオキテ尾方及ビ頭方ニ向ヒ sekundäre Sammelröhre

ヲ分岐ス。7. S. r. ハ第 28 原節中央部ニオキテ腎盂ヨリ背方ニ向ヒテ primäre Sammelrohr ヲ出シ Fig. 13. D. ニ見ル如ク其ノ終端ハ未ダ sekundäre Sammelrohr ヲ分岐スルニ至ラズ。8. S. r. 及ビ 9. S. r. ハ第 27 原節尾端及ビ頭端ノ高サニオキテ腎盂ヨリ背方ニ primäre Sammelröhre ヲ出シ、共ニ V. cardinalis post. ノ内側ニオキテ頭方及ビ尾方ニ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐ス。10. S. r. ハ第 26 原節ノ高サニオキテ腎盂ノ背側ヨリ圓形ノ管腔狀ヲ呈シテ V. cardinalis post. ノ内側背方ニ至リテ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐ス。而シテ sekundäre Sammelrohr ノ 1 ツハ尾方ニ、他ハ頭方ニ向ヒ、共ニ其ノ終端ハ僅ニ膨隆ス。11. S. r. ハ第 26 原節ノ高サニオキテ腎盂ノ腹側ヨリ出デテ尾方及ビ頭方ニ向ヒテ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐シ sekundäre Sammelrohr ノ上行枝ハ第 25 原節ノ高サニ至リテ頭端ニ於ケル Sammelrohr ノ腹方ニ終ル。12. S. r. 13. S. r. 14. S. r. ハ共ニ腎盂ノ頭端ヨリ頭方ニ primäre Sammelrohr ヲ出シ、13. S. r. ハ短キ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐シテ共ニ頭方ニ向フ。

今前階梯ニ於ケル集合管系統ノ發生狀態ト比較スルニ、本階梯ニオキテハ腎盂ハ著シク狹小トナリ、腎盂尾部ニオキテハ Sammelrohr ハ益々發育分岐シテ一部既ニ tertiäre Sammelröhre ヲ分岐スルニ至レリ。中間部ハ前階梯ニ於ルヨリモ著シク其ノ長サヲ増シテ全長 0.8 mm ヲ算スルニ至リ、頭部ニオキテハ 11 箇ノ Sammelröhre ヲ發生シテ 3 箇ノ primäre Sammelröhre ノ外ハ總テ sekundäre Sammelröhre ヲ分岐スルニ至レリ。

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ尾部ニオキテハ腎盂及ビ Sammelröhre ノ周圍ヲ圍繞シ、造腎組織ノ内層ノ細胞ハ終末集合管ノ周圍ニ集リテ之ヲ圍繞シテ Sammelrohr ノ先端ヲ頭巾狀ニ被フ、中間部ニオキテハ腎盂ノ周圍ニオキテ僅ニ外層ノ細胞ヲ認ムルノミニシテ内層ノ細胞ハ全ク之ヲ認ムルコトヲ得ズ。腎盂ノ頭部ニオキテハ metanephrogenes Gewebe ハ腎盂及ビ Sammelröhre ノ周圍ヲ圍繞シ metanephrogenes Gewebe ノ内層ノ細胞ハ各終末集合管ノ周圍ニ密集シテ之ヲ圍繞シテ其ノ終端ヲ帽狀ニ被フ。

Fig. 12. A.

Fig. 13. B.

Fig. 13. C.

Fig. 13. D.

第 14 階 梯

胎兒記號 Nr. 16. Sch.-St.-L. 17.0 mm.

胎兒ノ外形及ビ他臓器ノ發生概況

胎兒ハ軀幹ノ發育甚ダシクシテ頭部トノ均衡ヲ得
頸部ハ頭部及ビ軀幹ヨリ全ク獨立シテ判然タル形ヲ
呈ス。上肢ハ既ニ翼狀ヲ呈シ下肢又脚狀ヲ呈シテ既
ニ鳥類ノ諸標徴ヲ具備スルニ至レリ。椎骨、頭蓋、
胸、肋骨ノ諸骨ハ著シク軟骨化セルヲ認メ、呼吸器
ニオキテハ氣囊ノ發達著シク、胃原基ニ於ケル胃腺

ハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク發達セルヲ見ル。原
腎ヲ見ルニ血管ノ分布著シクシテ原腎小管ハ一部既
ニ退化ヲ開始セントスルノ狀ヲ呈ス。Müller氏管ノ
尾端ハ第32原節ノ高サニ達シ今ヤ Kloakenwandニ
達セントス。

腎臓原基ノ發生狀態

1. 集合管系統

A. 輸尿管。輸尿管ハ原腎管ノ背尾方ニオキテ
Kloakeヨリ外頭方ニ出デ、原腎管ノ背側ヲ之ニ並行
シテ背頭方ニ走り、第32原節ノ高サニ至リテ腎盂ノ

尾端ニ移行ス。其ノ形ハ圓形ニシテ全長0.8 mmヲ
算ス。

B. 腎盂。

尾部。腎盂尾部ハ原腎管ノ背側内方尾動脈ノ腹

側外方, V. cardinalis post. ノ内側腹方ヲ頭方ニ走リ (Fig. 14. A.) 第31原節ノ高サニオキテ中間部ニ移行ス。

腎盂尾部ニオキテハ背外方ニ2箇ノSammelröhreヲ出シ尾端ニ於ケルSammelrohr 1. S. r. ハ腎盂ヨリ背外方ニ出デテ V. cardinalis post. ノ腹方ニ至リ, V. cardinalis post. ノ内側背方及ビ腹側外方ニ向ヒテsekundäre Sammelröhreヲ分岐ス。V. cardinalis post. ノ内側背方ニ向フsekundäre Sammelrohrハtertiäre Sammelröhreヲ分岐シテ其ノ1ツハ内方ニ, 他ハ外頭方ニ向フ (Fig. 14. A.) 而シテtertiäre Sammelrohrハ共ニQuartäre Sammelröhreヲ分岐ス。

又 V. cardinalis post. ノ腹側外方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ V. cardinalis post. ノ腹側外方ニ至リテ腹方及ビ背方ニtertiäre Sammelröhreヲ分岐シtertiäre Sammelröhreハ共ニQuartäre Sammelröhreヲ分岐ス。

尾部頭端ニ於ケルSammelrohr 2. S. r. ハ腎盂ヨリ外尾方ニprimäre Sammelrohrヲ出シ, 1. S. r. ノ腹方ヲ尾方ニ走リ, V. cardinalis post. ノ腹方ニ至リテ内方及ビ外方ニsekundäre Sammelröhreヲ分岐シ各sekundäre Sammelrohrハtertiäre Sammelröhreヲ分岐ス。

中間部. 腎盂ノ中間部ハ本階梯ニオキテハ A. iliaca communis ノ發育著シキガ爲メニ Fig. 14. D. ニ見ルガ如ク其ノ腹方ニ彎曲シテ頭方ニ走リ, 第30原節頭端ノ高サニ至リテノ腎盂ノ頭部ニ移行ス。

頭部. 腎盂頭部ハ尾方ニオキテハ原腎ノ背外方, Aorta abdominalis ノ外側, V. cardinalis post. ノ内側腹方ヲ頭方ニ向ヒ第26原節ヨリ頭方ニオキテハAorta abdominalis ノ外側背方ヲ頭方ニ進ミテ頭端ハ第25原節ノ高サニ終ル。頭部ニオキテハ Fig. 14. D. ニ見ル如ク12箇ノSammelröhrenヲ出シ頭部尾端ニ於ケルSammelrohr 3. S. r. ハ, 腎盂ヨリ背外方ニ出デテ A. iliaca communis ノ背側ニ至リ, 尾方及ビ

背外方ニ向ヒテsekundäre Sammelröhreヲ分岐ス。尾方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ背尾方及ビ腹尾方ニtertiäre Sammelröhreヲ出シ, 背尾方ニ向フtertiäre Sammelrohrハ尾方ニQuartäre Sammelröhreヲ分岐ス。

又背外方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ V. cardinalis post. ノ腹側ニ至リテ頭方及ビ外方ニtertiäre Sammelröhreヲ分岐シ,tertiäre Sammelröhreハ共ニQuartäre Sammelröhreヲ分岐ス。斯クノ如ク3. S. r. ハ A. iliaca communis ノ背側ヲ尾方ニ至リテQuartäre Sammelröhreヲ分岐シ腎盂ノ中間部及ビ尾部ニ於ケルSammelröhreト共ニ A. iliaca communis ノ圍繞スルノ形ヲ呈ス。

4. S. r. ハ第29原節中央ノ高サ, 5. S. r. ハ第28原節尾端, 6. S. r. ハ第27原節中央, 7. S. r. ハ第26原節頭端ノ高サニオキテ共ニ腎盂ヨリ背外方ニ向ヒテprimäre Sammelröhreヲ出シ, 各primäre SammelrohrハAorta abdominalis ノ外側, V. cardinalis ノ内側ニオキテ共ニ頭方及ビ尾方ニSekundäre Sammelröhreヲ分岐ス。而シテ4. S. r. ノ尾方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ尾方及ビ外方ニtertiäre Sammelröhreヲ分岐シ外方ニ向フtertiäre Sammelrohrハ尾方及ビ頭方ニQuartäre Sammelröhreヲ分岐ス。又頭方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ頭方ニtertiäre Sammelröhreヲ分岐ス。

5. S. r. ノ頭方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ頭方及ビ背方ニtertiäre Sammelröhreヲ分岐シ各tertiäre Sammelrohrハ共ニQuartäre Sammelröhreヲ分岐ス。

6. S. r. ノ尾方ニ向フsekundäre Sammelrohrハ尾方ニtertiäre Sammelröhreヲ分岐ス。

次ニ8. S. r. ハ第26原節尾端, 9. S. r. ハ第26原節中央, 12. S. r. ハ第25原節尾端ノ高サニオキテ腎盂ヨリ腹側外方ニ向ヒテprimäre Sammelrohrヲ出シ各Sammelrohrハ尾方及ビ頭方ニsekundäre Sam-

melröhreヲ分岐ス。8.S.r.及ビ9.S.r.ノ尾方ニ向フ sekundäre Sammelrohr ハ共ニ尾方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐シ、12.S.r.ノ頭方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ頭方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐ス。

又10.S.r.ハ第26原節ノ中央、11.S.r.ハ第26原節頭端ノ高サニオキテ腎盂ヨリ背側内方ニ向ヒテ primäre Sammelrohrヲ出シ共ニ尾方及ビ頭方ニ sekundäre Sammelröhreヲ分岐ス。而シテ10.S.r.ノ頭方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ頭方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐シ11.S.r.ノ尾方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ尾方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐ス。13.S.r.ハ第25原節ノ高サニオキテ腎盂ノ頭端ヨリ頭方ニ primäre Sammelrohrヲ出シ腹外方及ビ頭方ニ sekundäre Sammelröhreヲ分岐シ腹外方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ頭方及ビ尾方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐ス。又頭方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ頭方及ビ腹側外方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐ス。頭方ニ向フ tertiary Sammelrohrハ頭方ニ、又腹側外方ニ向フ tertiary Sammelrohrハ頭方及ビ尾方ニ、各々 Quartäre Sammelröhreヲ分岐ス。

14.S.r.ハ第25原節ノ高サニオキテ腎盂ノ頭端ヨリ頭方ニ primäre Sammelrohrヲ出シ、primäre Sammelrohrハ背側内方及ビ頭方ニ sekundäre Sammelröhreヲ出シ、背側内方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ尾方及ビ頭方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐シ、頭方ニ向フ tertiary Sammelrohrハ Quartäre Sammelröhreヲ分岐ス。而シテ頭方ニ向フ sekundäre Sammelrohrハ頭方ニ tertiary Sammelröhreヲ分岐ス。

以上ノ如ク本階梯ニオキテハ Sammelrohrハ前階梯ニ於ケルヨリモ著シク複雑ナル分岐ヲナシテ quartäre Sammelröhreヲ分岐スルニ至リ Sammelrohrハ腎盂尾部ニオキテ最も著シク發達シテ Fig. 14.D.ニ示スガ如ク腎盂ノ頭部尾方、頭部頭方、頭部中央部ノ順序ニ發達シテ集合管系統ノ全形ハ恰モ成鳥ニ於ケル腎臟ノ外形ニ髣髴タル形ヲ呈スルニ至レリ。

2. 後造腎組織

後造腎組織ハ腎盂及ビ集合管ノ周圍ヲ圍繞シテ、内層ノ細胞ハ各終末集合管ノ周圍ニ集リテ之ヲ圍繞シ其ノ頭端ヲ帽狀ニ被覆ス。

Fig. 14. A.

Fig. 14. B.

Fig. 14. C.

Fig. 14. D.

第4章 總括竝ニ考察

前章ニオキテ、各家鶏胎兒ニ於ケル腎臟原基ノ發生狀態ヲ檢索シタレバ、本章ニオキテハ之ヲ次ノ5節ニ分チテ、總括竝ニ考察ヲ試ミントス。

第1節 集合管系統發生早期ニ於ケル總括

第1階梯(孵卵時數95時間. Sch.-St.-L. 6.0 mm. N. St.-L. 6.5 mm. 原節數48. 胎兒)ニオキテ、原腎管ノ尾部内側背方ニ於ケル原腎管壁ガ扁平ナル形ヲ呈シテ70 μ ノ間僅ニ背方ニ膨出セルヲ見タリ。此膨出部ハ所謂腎芽ノ初現ニシテ、第2階梯(胎兒. Sch.-St.-L. 6.5 mm. N.-St.-L. 6.5 mm. 原節數49)ニオキテハ、腎芽ハ益々背方ニ膨出スルト共ニ頭方及ビ尾方ニ向テモ亦僅ニ膨隆シテ扁平ナル豌豆形ヲ呈ス。腎芽ハ將來輸尿管及ビ腎盂タル可キ部分ノ發芽ニシテ恰モ Schreiner 氏ガ家鴨胎兒、原節數45—48, Waldeyer 氏ガ家雞胎兒、孵卵時數88—120

時間, Keibel 氏ガ家鷄胎兒, 原節數 49—50, Schreiner 氏ガ Möven ノ胎兒, 原節數 40, 又 Wellensittichs ノ胎兒ニオキテハ Abraham 氏ガ, 原節數 48, Keibel 氏ガ, 孵卵日數 5—6 日目ニ見タル時期ト略ボ一致シテ, 模型ニ就キテ腎芽ノ發生部位ヲ觀察シタルニ, 鳥類特ニ「チャボ」ノ胎兒ニオキテハ全ク哺乳類ノソレト同ジク, 原腎管ノ尾部, 而モ内側背方ヨリ發生スルモノナルコトヲ明カニ認メタリ。

次ニ第 3 階梯 (原節數 50. Sch.-St.-L. 6.5 mm. N.-St.-L. 7.0 mm. ノ胎兒) ニオキテハ第 33 原節ノ高サニオキテ, 腎芽ハ原腎管ノ尾部内側ヨリ扁平ナル形ヲナシテ背頭方ニ膨出シ, 其ノ背側頭端ヨリ 30 μ ノ間卵圓形ノ管腔トナリ頭方ニ膨隆シテ尾方ニ向フ膨隆ヲ缺ク, 恰モ Schreiner 氏ガ家鴨胎兒 (原節數 51) ニ見タル所見ト一致シテ, 余ガ同時期ニ於ケル家鳩胎兒 Sch.-St.-L. 5.5 mm ニ見タル腎芽ノ尾方ニオキテモ亦僅ニ膨出シタル所見トハ其ノ趣ヲ異ニセリ。

第 4 階梯ニオキテハ腎芽ハ原腎管ノ尾部第 3 階梯ニ於ケルヨリモ僅ニ尾方 Kloakl ニ近キ部位ニオキテ, 其ノ内側背方ヨリ背頭方ニ出デテ扁平ナル管腔狀ヲ呈スル後腎管トナリテ V. cardinalis post. ノ内側ニ接シテ, 第 3 階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ頭方ニ發育延長シ, 其ノ頭端ハ第 31 原節ノ高サニ至ル。第 5 階梯ニオキテハ後腎管ハ原腎管ノ尾部, 第 4 階梯ニ於ケルヨリモ尙ホ Kloake ニ近キ部位ニオキテ, 原腎管ノ背側内方ヨリ出デ, V. cardinalis ノ内側ニ接シテ第 4 階梯ニ於ケルヨリモ一層頭方ニ延長シテ頭端ハ第 30 原節ノ高サニ至ルノミナラズ, 第 33 原節頭端ノ高サニオキテハ僅ニ背方ニ膨出シテ其ノ尾方ヨリ原腎ニ至ル部分ヨリモ發育増大セルガ爲メニ形態ノ大サニヨリテ僅ニ輸尿管ト腎盂部トヲ區別スルコトヲ得ルニ至レリ。

第 2 節 輸尿管ノ發生ニ關スル總括竝ニ考察

第 1 節, 集合管系統發生早期ニ於ケル總括的所見ニヨリテ, 輸尿管ガ原腎管ヨリ分岐セル位置の關係ヲ考察スルニ腎芽ハ發生初期, 第 1 階梯ニオキテハ原腎管ノ尾部, 内側背方ヨリ出デテ發生階梯ノ進展スルト共ニ原腎管ノ背方ニ移動シテ, 第 6 階梯ニ至リテハ原腎管ノ背側内方ヨリ出デ, 第 7 階梯 (Sch.-St.-L. 11.0 mm ノ胎兒) ニオキテハ原腎管ノ全ク背方ヨリ出ヅルニ至レリ。同時ニ發生初期ニオキテ原腎管ノ尾方 Kloake ヨリ稍々隔タリタル位置ヨリ出デタル輸尿管ハ發生機轉ノ進ムニ從ヒテ次第ニ Kloake ニ接近シテ遂ニ第 9 階梯 (Sch.-St.-L. 12.0 mm 胎兒) ニ至リテハ恰モ余ガ家鳩胎兒全長 (85 mm) ニ見タルト同一所見ヲ呈シテ原腎管ト Kloake トノ堺ニ開口スルニ至リ, 更ニ第 10 階梯 (Sch.-St.-L. 12.5 mm 胎兒) ニオキテハ初メテ原腎管ヨリ分離シテ完全ニ Kloakenwand ニ開口スルニ至レリ。

輸尿管ガ原腎管ヨリ分離シテ Kloake ニ開口スル時期ニ就キテハ, 余ハ鳩胎 Sch.-St.-L. 11.0 mm, Abraham, Keibel 兩氏ハ鷄胎全長 14.6 mm, 孵卵時間 135 時, Furbringer 氏ハ鷄胎孵卵 6 日目, Schreiner 氏ハ家鴨胎兒 N.-St.-L. 10.0 mm ニオキテ之ヲ認メ, Kupffer 氏ハ腎芽ノ發生スル時期ヨリ 20—23 時間後トナシテ, 各人各様ノ時期ヲ得テ鳥類ニオキテハ其ノ種類ノ

異ナレルニヨリテ其ノ時期ハ一致スルモノニ非ラザルナリ。

斯クノ如ク輸尿管開口部ガ位置ノ移動ヲナス事實ハ Kloake ノ發生機轉ノ進ムニ從ヒ原腎管尾端ノ管壁ガ擴大セラレテ一部 Kloake ノ壁トナル結果ニ起因スルモノニ外ナラザルモノナリ。

今輸尿管ノ發生狀態ヲ模型ニ就キテ觀察スルニ、初期（第1—2—3階梯）ニオキテ扁平ナル形ヲ呈シタル輸尿管ハ發生階梯ノ進ムニ從ヒテ次第ニ卵圓形トナリテ（第4—5階梯）大サヲ減少シ、第6階梯（Sch.-St.-L. 10.mm, N. St.-L. 9.0 mm 胎兒）ニ至リテハ圓形ノ管腔狀ヲ呈シ發生機轉ノ進展スルト共ニ其ノ長サヲ増シテ第14階梯（Sch.-St.-L. 17.0 mm 胎兒）ニオキテハ全長0.8 mm ヲ算スルニ至レリ。

尙ホ參考ノ爲ニ模型ニ就キテ輸尿管ノ長サヲ實測シタルニ第1表ニ示スガ如キ成績ヲ得テ、余ガ用ヒタル材料ニオキテハ胎兒ノ發生階梯ノ進ムニ從ヒテ輸尿管ハ其ノ長サヲ増加セルヲ見タリ（第1表）。

第 1 表

階 梯	輸 尿 管 全 長	腎 盂 尾 部 ノ 長 サ	腎 盂 中 間 部 ノ 長 サ	腎 盂 頭 部 ノ 長 サ	腎 盂 ノ 全 長	輸尿管及ビ腎盂 全 長
1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1.5
3	—	—	—	—	—	2.0
4	—	—	—	—	—	3.0
5	1.0	—	—	—	5.0	6.0
6	1.2	—	—	—	7.3	8.5
7	1.5	3.5	2.0	8.0	13.5	15.0
8	2.5	3.5	2.0	10.0	15.5	18.0
9	3.0	3.5	2.5	11.0	17.0	20.0
10	3.5	3.3	3.0	12.5	18.8	22.3
11	3.7	3.0	3.3	13.0	19.3	23.0
12	5.0	3.0	5.5	15.0	28.5	28.5
13	5.5	2.5	8.0	17.0	27.5	33.0
14	8.0	2.3	9.0	20.0	31.3	39.3

$\frac{100}{1}$ 大模型ニ就テ實測 單位 cm $\frac{75}{1}$ 大模型ハ $\frac{100}{1}$ 大ニ換算

第 3 節 腎盂腎蓋ノ發生ニ關スル總括竝ニ考察

腎盂ハ第1階梯 (Sch.-St.-L. 6.0 mm. N. St.-L. 6.5 mm. 原節數 48 胎兒) ニオキテ原腎管ノ尾部内側背方ニ於ケル管壁ガ僅ニ背方ニ膨出シテ初メテ腎芽ノ發生ヲ認メタリ。第2階梯 (Sch.-St.-L. 6.5 mm. N. St.-L. 6.5 mm. 原節數 49 胎兒) ニ至リテハ腎芽ハ益々背方ニ發育シテ扁平ナル豌豆形ヲ呈シ尾方及ビ頭方ニ向ヒテモ亦僅ニ膨隆ス。而シテ其ノ尾方及ビ頭方ニ於ケル膨隆部ハ哺乳類腎盂ノ尾部及ビ頭部ニモ相當ス可キ部分ニシテ、第3階梯 (Sch.-St.-L. 6.5 mm. N. St.-L. 7.0 mm. 原節數 50) ニオキテハ腎芽ハ背頭方ニノミ發育シテ、尾方ニ於ケル哺乳類腎盂ノ尾部ニ相當ス可キ部分ハ既ニ退化消失スルニ至レリ。此第2及ビ第3階梯ノ間ニ於ケル腎盂ヲ形態的變化ハ恰モ Schreiner 氏ノ家鴨胎兒原節數 50 及ビ原節數 51 ニ於ケル Profilkonstruktion ニ就キテ Felix 氏ガ與ヘタル所見ニ一致シテ、余ガ鳩胎兒ニ於ケル腎盂ノ哺乳類腎盂尾部ニ相當ス可キ部分ガ發生後期ニ至ルモ尙ホ之ヲ認メタル事實トハ大ニ其ノ所見ヲ異ニシテ、鳥類ニオキテハ種類ノ異ナレルニヨリテ腎盂ノ形態モ亦異ナレルモノナリ。

第4階梯 (Sch.-St.-L. 7.0 mm. N. St.-L. 7.0 mm) ニオキテハ腎芽ハ原腎管ヨリ出デテ扁平ナル管腔様ノ後腎管トナリテ頭方ニ發育シテ頭端ハ第31原節ノ高サニ至リ、第5階梯 (Sch.-St.-L. 8.0 mm. N. St.-L. 7.0 mm) ニ至リテハ後腎管ハ第33原節尾端ノ高サニオキテ原腎管ノ尾部内側背方ヨリ出デテ V. cardinalis post. ノ内側ニ沿ヒテ頭方ニ發育延長シテ第30原節ノ高サニ及ブノミナラズ、第33原節ノ高サニオキテハ背方ニ發育膨出シテ夫レヨリ尾方原腎管ニ至ル部分ヨリモ大ナルガ爲メニ初メテ形態ニヨリテ僅ニ輸尿管ト腎盂部トヲ區別スルコトヲ得更ニ第6階梯 (Sch.-St.-L. 10.0 mm. N. St.-L. 9.0 mm 胎兒) ニオキテハ腎盂ハ益々頭方ニ發育シテ第29原節ノ高サニ達スルト共ニ尾端ニオキテモ亦一層背方ニ發育膨出シテ輸尿管トノ區別次第ニ明瞭トナルニ至ル。

第7階梯 (Sch.-St.-L. 11.0 mm 胎兒) ニオキテハ、腎盂ハ第32原節ノ高サニテ輸尿管ト連リ V. cardinalis post. ノ内側背方ニ沿ヒテ背側ヲ僅ニ外方ニ向ケテ頭方ニ走り、A. iliaca communis ノ腹方ヲ原腎ノ背方ニ至リ、頭端ハ第28原節ノ高サニ終ル。腎盂ハ此時期ニ至リテハ頭方ニ發育延長スルト共ニ背外方ニ向ヒテ發育膨出シテ尾方第32原節ノ高サニ於テハ僅ニ腎蓋ヲ發生スルノミナラズ A. iliaca communis ノ腹方ニ一致スル部分ニオキテハ、A. iliaca communis ノ發育著シキガ爲メニ其ノ障礙ヲ受ケテ A. iliaca communis ノ尾方及ビ頭方ニ於ケルガ如ク、腎盂ハ背側ヲ僅ニ外方ニ向ケテ發育スルコトヲ得ズシテ其ノ内側ヲ全ク背方ニ向クルニ至レリ。

第8階梯 (Sch.-St.-L. 11.5 mm 胎兒) ニ至リテハ腎盂ハ益々頭方ニ發育延長シテ頭端ハ第27原節ノ高サニ達シ、尾方第32原節ノ高サニオキテハ腎蓋ハ益々背方ニ發育スルノミナラズ第30原節ノ高サニオキテモ亦背方ニ發育膨出シテ僅ニ腎蓋ヲ發生スルニ至レリ。然ルニ A. iliaca

communis ノ腹方ニ一致スル部分ハ *A. iliaca communis* ノ障碍ヲ受ケテ腎盂ハ發生スルコトヲ得ザルガ爲メニ、本階梯ニオキテハ腎盂ノ發生狀態ニヨリテ、腎盂ノ全形ニ大小ノ部分ヲ生ジ、腎盂ヲ *A. iliaca communis* ノ腹方ニ一致セル腎盂ノ發生ヲ見ザル部分ヲ中間部トナシ、其ノ尾方及ビ頭方ヲ尾部及ビ頭部トシテ形態上腎盂ヲ尾部、中間部、頭部ノ3部分ニ區別スルコトヲ得ルニ至ル。次ニ第9階梯 (Sch.-St.-L. 12.0 mm 胎兒) ニオキテハ腎盂ノ頭端ハ第26原節ノ高サニ達シ、腎盂ハ第8階梯ニ於ケルヨリモ一般ニ背方ニ發育膨出シテ、頭部頭方ニオキテハ未ダ第10階梯ニ於ケル腎盂ノ頭部頭方ニ於ケル腎盂ノ大サニハ遙ニ及バズト雖モ、第8階梯ノソレヨリハ著シク大ナリ。

第10階梯 (Sch.-St.-L. 12.5 mm 胎兒) ニ至リテハ腎盂ハ第32原節ノ高サヨリ *V. cardinalis post.* ノ内側背方ニ接シテ頭方ニ向ヒ、*A. iliaca communis* ノ腹方ヲ原腎ノ背方、*Aorta abdominalis* ノ外側腹方ニ至リテ頭端ハ第25原節ノ高サニ終ル。而シテ腎盂ハ一般ニ第9階梯ニ於ケルヨリモ遙ニ發育シテ尾部ハ扁平ニシテ僅ニ彎曲シ、尾部頭端ニハ *primäre Sammelrohr* ヲ發芽スルニ至ル。又腎盂ノ頭部尾端ニオキテハ腎盂ハ *A. iliaca communis* ノ背側ヲ僅ニ尾方ニ發育シテ *A. iliaca communis* ヲ圍繞セントスルガ如キ形ヲ呈シ、頭方ニ進ムニ從ヒテ其ノ大サヲ漸減シ、第26原節ノ高サニ至リテハ再ビ背方及ビ腹方ニ向テ著シク腎盂ノ發生セルヲ見ル。更ニ進デ第11階梯ニオキテハ腎盂ノ尾端ハ第32原節ノ高サヨリ頭端ハ第25原節ノ高サニ至リテ、尾部ニハ3箇ノ *primäre Sammelröhre* ヲ發生シ、頭部尾端ノ腎盂ハ第10階梯ニ於ケルヨリモ著シク背方ニ發育シテ *A. iliaca communis* ノ背側ヲ尾方ニ膨出シ尾端ニハ *primäre Sammelrohr* ヲ發生シテ尾部頭端ノ *Sammelrohr* 及ビ中間部ト共ニ *A. iliaca communis* ヲ圍繞スルガ如キ形ヲ呈ス。而シテ腎盂ハ頭方ニ進ムニ從ヒテ其ノ大サヲ漸減シ、第26原節ノ高サニ至リテハ再ビ頭端ニ向ヒテ第10階梯ニ於ケルヨリモ一層著シク背方及ビ腹方ニ發育シテ頭端ニ於テハ今ヤ *primäre Sammelrohr* ヲ發生セントスルガ如キ狀態ヲ呈スルニ至レリ。又腎盂ノ發生狀態ヲ原節ノ高サニヨリテ圖示スレバ第2表ノ如クニシテ以上腎盂腎盂ノ發生ニ關スル總括的所見及ビ第1表並ニ第2表ニヨリテ腎盂腎盂ノ發生狀態ヲ考案スルニ、腎盂ハ他ノ鳥類ニ於ケルト同ジク原腎管ノ尾部内側背方ヨリ出デテ (第1—2階梯) 扁平ナル後腎管トナリ *V. cardinalis post.* ノ内側ニ沿ヒテ背頭方ニ向ヒ *A. iliaca communis* ノ腹方ヲ原腎ノ背側ニ至リ頭方ニ發育延長スルモノニシテ Sch.-St.-L. 13.5 mm ノ胎兒ニテハ其ノ頭端ハ第25原節ノ高サニオキテ原腎ノ背側外方、*Aorta abdominalis* ノ外方ニ終ル。而シテ哺乳類腎盂ノ尾部ニ相當ス可キ腎盂ノ尾部ハ比較的早期 (第3階梯) ニ退化消失シテ腎盂ノ頭端ガ第30原節ノ高サニ達スル時期ニ至リテハ (第4—5階梯) 形態上輸尿管ト腎盂部トヲ區別スルコトヲ得ルニ至ル。腎盂ノ頭端ガ第29—28原節ノ高サニ達スル時期ニ至レバ (第6—7階梯) 腎盂ノ尾方ハ背方ニ發育シテ腎盂ヲ發生シ腎盂ノ發生狀態ニヨリテ腎盂ヲ形態上尾部、中間部及ビ頭部ノ3部分ニ區別スルコトヲ得ルニ至ル。又腎盂ノ頭端ガ第27—26原節ノ高サニ達スル時期ニオキテハ (第

8—9 階梯) 腎盂ハ頭部尾方ニオキテモ著シク腎盞ヲ發生シテ更ニ頭端ガ第 25 原節ノ高サニ至ル時期ニオキテハ(第 10—11 階梯) 腎盂ノ頭部頭方ニオキテモ亦腎盞ノ著シキ發生ヲ見ルニ至ルモノナリ。即チ腎盞ハ余ガ囊ニ家鳩胎兒ニ就キテ見タル所見ト同ジク腎盂ノ尾部, 頭部尾方, 頭部頭方ノ順序ニ尾方ヨリ次第ニ頭方ニ 3 箇ノ腎盞ヲ發生スルモノニシテ, 腎盂ノ中間部ニオキテ腎盞ノ發生ヲ見ザルハ全ク *A. iliaca communis* ノ爲メニ其ノ發生ヲ障礙セラルルニ起因スルモノナリ。

第 2 表

第 4 節 集合管ノ發生ニ關スル總括竝ニ考察

集合管ノ發生ニ關シテハ Abraham, Keibel 兩氏ハ, 鶏胎全長 12.0 mm, 又 Keibel 氏ハ Wellensittichs 孵卵 7 日目ノ胎兒ニオキテ初メテ集合管ノ發生ヲ認メタリト雖モ, 共ニ其ノ發生狀態ノ記述ナク管ニ其ノ時期ヲ示セルノミナリ。其ノ他 Schreiner 氏ハ鶏胎(孵卵時數 6 日 8 時間 Sch.-St.-L. 13.5 mm N. St.-L. 12.75 mm)ニ於ケル集合管系統ノ Profilkonstruktionニ

就キテ、余ガ第13階梯 (Sch.-St.-L. 15.0 mm) ノ胎兒ニ於ケル所見ト略ボ相似タル所見ヲ簡單ニ記述セルノミニシテ其ノ早期ニ於ケル發生階梯ニ就キテハ何等報ズル處ナシ。

余ハ第10階梯 (Sch.-St.-L. 12.5 mm 胎兒) ニオキテ腎盂ノ尾部頭端、第31原節ノ高サニ於ケル腎盂ノ背側ニオキテ初メテ1箇ノ *Sammelrohr* ノ發芽ヲ見タリ。第11階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 13.5 mm) ニオキテハ腎盂ノ尾部ニ3箇ノ *primäre Sammelröhre* ヲ發生シ、尾部頭端ニ於ケル *Sammelrohr* ノ如キハ終端膨隆シテ正ニ *sekundäre Sammelrohr* ヲ分岐セントスルガ如キ形ヲ呈ス。

又腎盂ノ頭部尾端ニオキテハ腎盂ハ *A. iliaca communis* ノ背側ヲ尾方ニ膨出シテ *primäre Sammelrohr* ヲ發生シ、頭部頭端ニオキテモ亦腎盂ノ背側及ビ腹側ハ僅ニ膨隆シテ *primäre Sammelrohr* ヲ發芽セントスルガ如キ狀ヲ呈ス。

第12階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 14.0 mm) ニ至リテハ *Sammelröhren* ハ益々發育進展シテ腎盂尾部ニ於ケル *primäre Sammelrohr* ハ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐シ、又腎盂頭部尾端ニ於ケル *primäre Sammelrohr* ノ終端ハ膨隆シテ正ニ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐セントスルガ如キ形ヲ呈ス。尙ホ腎盂ノ頭部頭方第26原節ノ高サニオキテハ腎盂ハ其ノ腹側ニオキテモ亦1箇ノ *primäre Sammelrohr* ヲ發生シ、頭端ニ於ケル *primäre Sammelrohr* ハ第11階梯ニ於ケルヨリモ著シク發育進展セルノミナラズ、頭部ノ第30原節乃至第28原節ノ間ニオキテハ尙ホ5箇ノ *primäre Sammelröhre* ヲ發生シテ、本階梯ニオキテハ頭部ニ於テハ9箇ノ *Sammelröhre* ヲ發生スルニ至レリ。

次ニ第13階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 15.0 mm) ニ於ケル腎盂尾部ノ *Sammelröhren* ハ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐セルノミナラズ、尾部頭端ニ於ケル *Sammelrohr* ノ如キハ *tertiäre Sammelröhre* ヲ分岐シテ頭部尾端ニ於ケル *Sammelröhre* ト共ニ *A. iliaca communis* ヲ圍繞スルガ如キ形ヲ呈ス。腎盂頭部ニオキテモ亦第12階梯ニ於ケルヨリモ著シク發育シテ11箇ノ *Sammelröhre* ヲ發生スルニ至リ。第28原節ノ中央部及ビ頭端ノ一部ニ於ケル *Sammelröhre* ノ外ハ總テ *sekundäre Sammelröhre* ヲ分岐スルニ至レリ。

更ニ進ンデ第14階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 17.0 mm) ニ至リテハ *Sammelrohr* ハ著シク分岐シテ尾部及ビ頭部尾方ニ於ケル *Sammelröhre* ハ腎盂ヨリ背外方ニ、頭部頭方ニ於ケル *Sammelröhre* ハ腹側外方及ビ背側内方ニ向テ出デ、腎盂ノ尾部、頭部尾方、頭部頭方ニオキテハ *quartäre Sammelröhre* ヲ分岐スルニ至ル。而シテ *Sammelrohr* ハ腎盂ノ尾部、頭部尾方、頭部頭方ノ順序ニ著シク分岐ヲナシテ *Sammelrohrsystem* ノ全體ノ形ハ成鳥ニ於ケル腎臟ノ外形ニ髣髴タル形ヲ呈スルニ至レリ。

以上ノ總括的所見ヨリシテ *Sammelrohr* ノ發生狀態ヲ考察スルニ、*primäre Sammelrohr* ハ腎盂ノ發生順序ト同様ニ腎盂ノ尾部、頭部尾方、頭部頭方ノ順序ニ發生シ最後ニ頭部中央部ニ發生スルモノニシテ、*sekundäre*、*tertiäre*、*quartäre Sammelrohr* モ亦 *primäre Sammelrohr*

ノ發生順序ニ primäre, sekundäre, tertäre Sammelrohr ヨリ分岐シテ, quartäre Sammelrohre ナ分岐スル時期 Sch.-St.-L. 17.0 mm ノ胎兒ニ於ケル Sammelrohrsystem ノ全形ハ成鳥ニ於ケル腎臓ノ外形ト略ボ同様ノ形ヲ呈スルニ至ルモノナリ。

第 5 節 腎臓原基ノ位置移動ニ關スル總括竝ニ考察

第 6 階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 10.0 mm N. St.-L. 9.0 mm) ニオキテ原腎ノ背側, Aorta abdominalis ノ腹側, 僅ニ外方ニ在リタル腎臓原基ハ發生階梯ノ進ムニ從ヒテ外方ニ移動シテ, 第 8 階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 11.5 mm) ニ至リテハ原腎ノ背側外方, Aorta abdominalis ノ外側腹方ニ至リ, 第 10 階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 12.5 mm) ニ至リテハ第 8 階梯ニ於ケルヨリモ益々外側背方ニ移リテ, 第 12 階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 14.0 mm) ニオキテハ原腎ノ背側外方, Aorta abdominalis ノ外方ニ至リ, 更ニ第 14 階梯 (胎兒 Sch.-St.-L. 17.0 mm) ニテハ原腎ノ背側外方ニオキテ腎臓原基ハ Aorta abdominalis ノ外側背方ニ達スルニ至レリ。

斯クノ如ク腎原基ガ發生階梯ノ進ムニ從ヒテ位置ノ移動ヲナス所以ハ, 早期ニオキテハ發育著シキ原腎ノ爲メニ壓迫セラレ, 後期ニ在リテハ腹部臓器ノ著シキ發育ノ爲メニ背外方ニ壓迫セラルルニ由ルモノナリ。

第 5 章 結 論

前章ノ總括竝ニ考察ヨリ次ノ結論ニ達ス。

家鷄胎兒ニオキテハ,

1. 腎芽ハ哺乳類及ビ人類ニ於ケルト同ジク原腎管ノ尾部, 内側背方ヨリ發生シテ, 孵卵時數 95 時間, 原節數 48, Sch.-St.-L. 6.0 mm N. St.-L. 6.0 mm ノ胎兒ニオキテ初メテ其ノ發芽ヲ見タリ。

2. 其ノ初期ニオキテ原腎管ノ尾部, 内側背方ニ於ケル輸尿管ノ開口部ハ, 發生階梯ノ進ムニ從ヒテ原腎管ノ背方ニ移動シ, Sch.-St.-L. 11.0 mm ノ胎兒ニオキテハ全ク原腎管ノ背側ヨリ出ヅルニ至ルト同時ニ, 輸尿管開口部ハ次第ニ Kloake ニ接近シテ遂ニ Sch.-St.-L. 12.5 mm ノ胎兒ニオキテハ完全ニ Kloake ニ開口スルニ至ル。

3. 輸尿管ガ原腎管ヨリ分離シテ Kloake ニ開口スルニ至ル輸尿管開口部ノ位置移動ハ, Kloake ノ發育進展ニトモナヒ原腎管尾端ノ管壁ガ擴大セラレテ Kloakenwand ノ一部トナル結果ニ起因スルモノナリ。

4. 發生早期ニオキテ扁平ナル形ヲ呈シテ腎盂部ト區別シ難キ輸尿管ハ, 發生階梯ノ進ムニ從ヒテ其ノ大サヲ減少シテ, Sch.-St.-L. 8.0 mm N. St.-L. 7.0 mm ノ胎兒ニオキテハ初メテ形態上腎盂部ト區別スルコトヲ得ルニ至リ, 次第ニ圓形ノ管腔狀ヲ呈シテ長サヲ増シ, Sch.-St.-L. 17.0 mm ノ胎兒ニオキテハ輸尿管ノ全長ハ 0.8 mm ヲ算ス。

5. 發生初期ニ於ケル哺乳類腎盂ノ尾部ニ相當ス可キ腎盂ノ部分ハ、比較的早期ニ退化スルモノニシテ Sch.-St.-L. 6.5 mm N. St.-L. 7.0 mm 原節數 50 ノ胎兒ニオキテ既ニ退化消失セルヲ見タリ。

6. 腎盂ハ原腎管ノ尾部、内側背方ヨリ A. iliaca communis ノ腹方ヲ原腎ノ背側ニ至リテ頭方ニ發育延長シ、Sch.-St.-L. 11.5 mm ノ胎兒ニオキテハ腎盂ノ A. iliaca communis ノ腹方ニ一致スル部分ハ A. iliaca communis ニ障碍セラレテ腎盂ヲ發生セザルガ爲メニ形態上腎盂ヲ尾部、中間部、頭部ノ3部分ニ區別スルコトヲ得ルニ至ル。

7. 腎盂ハ尾部、頭部尾方、頭部頭方ノ順序ニ尾方ヨリ次第ニ頭方ニ3箇ノ腎盂ヲ發生スルモノニシテ Sch.-St.-L. 11.0 mm ノ胎兒ニオキテハ尾部ニ、Sch.-St.-L. 12.0 mm ノ胎兒ニオキテハ頭部尾方ニ、Sch.-St.-L. 12.5 mm ノ胎兒ニオキテハ頭部頭方ニオキテ初メテ腎盂ノ發育著明ナルヲ認メタリ。

8. 集合管ハ腎盂ノ發生順序ト同様ニ腎盂ノ尾部頭端、頭部尾端、頭部頭端ノ順序ニ發生スルモノニシテ Sch.-St.-L. 12.5 mm ノ胎兒ニオキテ腎盂ノ尾部頭端ニ、Sch.-St.-L. 13.5 mm ノ胎兒ニオキテ頭部尾端ニ、Sch.-St.-L. 14.0 mm ノ胎兒ニオキテ頭部頭端ニ、初メテ primäre Sammelrohr ノ發生ヲ見タリ。

9. sekundäre, tertiäre, quartäre Sammelrohr モ亦 primäre Sammelrohr ト同ジ發生順序ニ primäre, sekundäre, tertiäre Sammelrohr ヨリ分岐スルモノニシテ、quartäre Sammelrohre ヲ分岐スル時期 Sch.-St.-L. 17.0 mm ノ胎兒ニ於ケル Sammelrohrsystem ノ全形ハ成鳥ニ於ケル腎臟ノ外形ニ髣髴タル形ヲ呈ス。

10. 其ノ早期ニオキテ Aorta abdominalis ノ腹側外方ニ在リタル腎臟原基ガ、Sch.-St.-L. 17.0 mm ノ胎兒ニ至リテハ Aorta abdominalis ノ外側背方ニ移ル。腎臟原基ノ位置ガ移動ヲナス所以ハ早期ニオキテハ原腎ノ爲メニ壓迫セラレ、後期ニ至リテハ腹部臟器ノ著シキ發育ノ爲メニ壓迫セラルルニ由ルモノナリ。

拙筆スルニ當リ終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリタル恩師數波教授ニ對シ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

(本論文ノ要旨ハ第 41 回日本解剖學會ニ於テ發表シタリ。)

文 獻

- 1) Abraham, Anat. Hefte, Bd. 56—57, 1901.
- 2) Arataki, Amer. Jour. Anat. Vol. 36, 1026.
- 3) Atterbury, Amer. Jour. Anat. Vol. 31, 1923.
- 4) Balfour, Journ. Anat. u. Physiol. Vol. X, 1876.
- 5) Bremer, Amer. Jour. Anat. Vol. 19, 1916.
- 6) Chievitz, Arch. f. Anat. Phys. Bd. 1, 1897.
- 7) Ernst, Zeits. Anat. Ent. Bd. 79, 1926.
- 8) Felix, Hertwig. Handbuch der exp. Ent. Wirb. Bd. 3, 1, Teil, 1906.
- 9) Fürbringer, Morphol. Jahrb. Bd. IV, 1878.
- 10) Gerhardt, Arch. f. mikr.

- Anat. Bd. 57, 1901. 11) *Groschuff*, Anat. Anz. Td. 21, 1902. 12) *Hamburger*, Arch. f. Anat. Phys. Bd. 1890, 13) *Hauch*, Anat. Hefte. Bd. 22, 1903. 14) *Hill*, Johns Hop. Hosp. Bull. Vol. 16, 1905. 15) *Hoffman*, Zeits. f. wisch. Zool. Bd. 48. 16) *Huber*, Anat. Record, Vol. 13, 1913. 17) *Janosik*, Arch. f. mikr. Anat. Ent., Bd. 70, 1907. 18) *Kampmeier*, Arch. f. Anat. Phys., 1919. 19) *Derselbe*, Zeit. Anat. Ent., Bd. 70, 1924. 20) *Keibel*, Arch. f. Anat. Ent., 1896. 21) *Kubokawa*, The Seikai medical journal, Bd. 5. 22) *Külz*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 36, 1899. 23) *Kupffer*, Arch. f. mikr. Anat. Bd. 1, 1865. 24) *Lillie*, Development of the chick, 1908. 25) *Löwe*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 16, 1879. 26) *Maresch*, Anat. Anzeiger, Bd. 12, 1896. 27) *Müller*, Arch. f. Anat. u. Ent., Bd. 1883. 28) *Nagel*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 34, 1889. 29) *Nussbaum*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 57, 1901. 30) *Reinhoff*, Johns Hop. Hosp. Bul., Vol. 33, 1922. 31) *Ribbert*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 17, 1880. 32) *Schreiner*, Zeit. f. Wiss. Zoolog., Bd. 71, 1902. 33) *Solger*, Anat. Anzeiger, Bd. 12, 1896. 34) *Störk*, Anat. Hefte, Bd. 72, 1904. 35) *Tadokoro*, Knibogaku Zasshi, Bd. 4, Nr. 6, 1931. 36) *Warner*, Anat. Record, Vol. 36, 1927. 37) *Wiedersheim*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 36 1890.
- 38) 高井 岡 醫 雜. 第 514 號, 昭和七年.

挿 圖 説 明

Fig. 1. A. 鶏胎 Nr. 12 (第 1 階梯) 腎芽横断面.
45 倍大.

B. 腎芽模型左側面觀及内側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$
大 $\frac{1}{2}$ 縮少寫載.

Fig. 2. A. 鶏胎 Nr. 19 (第 2 階梯) 腎芽横断面.
45 倍大.

B. 腎芽模型左側面觀及内側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$
大 $\frac{1}{2}$ 縮少寫載.

Fig. 3. A. 鶏胎 Nr. 31 (第 3 階梯) 腎芽横断面.
45 倍大.

B. 腎芽模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{2}$ 縮少
寫載.

Fig. 4. A. 鶏胎 Nr. 28 (第 4 階梯) 後腎横断面.
45 倍大.

B. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{2}$ 縮少
寫載.

Fig. 5. A. 鶏胎 Nr. 27 (第 5 階梯) 腎盂横断面.
45 倍大.

B. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{2}$ 縮少
寫載.

Fig. 6. A. 鶏胎 Nr. 1 (第 1 階梯) 腎盂横断面.
45 倍大.

B. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{2}$ 縮少
寫載.

Fig. 7. A. 鶏胎 Nr. 6 (第 7 階梯) 腎盂尾部横断面.
45 倍大.

B. 腎盂中間部横断面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部尾端横断面. 45 倍大.

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少
寫載.

Fig. 8. A. 鶏胎 Nr. 32 (第 8 階梯) 腎盂尾部横断面.
45 倍大.

B. 腎盂中間部横断面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部尾方横断面. 45 倍大.

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少
寫載.

Fig. 9. A. 鶏胎 Nr. 33 (第 9 階梯) 腎盂尾部横斷面. 45 倍大.

B. 腎盂頭部尾方横斷面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部頭方横斷面. ♀

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少寫載.

Fig. 10. A. 鶏胎 Nr. 35 (第 10 階梯) 腎盂尾部横斷面. 45 倍大.

B. 腎盂頭部尾方横斷面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部頭方横斷面. ♀

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少寫載.

Fig. 11. A. 鶏胎 Nr. 8 (第 11 階梯) 腎盂尾部頭端横斷面. 45 倍大.

B. 腎盂頭部尾端横斷面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部頭端横斷面. 45 倍大.

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{100}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少寫載.

Fig. 12. A. 鶏胎 Nr. 9 (第 12 階梯) 腎盂尾部集合管横斷面. 45 倍大.

B. 腎盂頭部尾端集合管横斷面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部頭端ノ集合管横斷面. 45 倍大.

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{75}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少寫載.

Fig. 13. A. 鶏胎 Nr. 14 (第 13 階梯) 腎盂尾部集合管横斷面. 45 倍大.

B. 腎盂頭部尾端ノ集合管横斷面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部頭端ノ集合管横斷面. ♀

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{75}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少寫載.

Fig. 14. A. 鶏胎 Nr. 16 (第 14 階梯) 腎盂尾部集合管横斷面. 45 倍大.

B. 腎盂頭部尾端ノ集合管横斷面. 45 倍大.

C. 腎盂頭部頭方ノ集合管横斷面. ♀

D. 後腎模型左側面觀 $\left(\frac{75}{1}\right)$ 大 $\frac{1}{4}$ 縮少寫載.

Verzeichnis der Abkürzungen.

A. = Aorta. Al. = Allantois. A. i. c. = Arteria iliaca communis. C. h. = Chorda dorsalis.
D. = Darm. K. a. t. = Kaudaler Teil d. Nierenbecken. K. d. = Keimdrüse.
K. r. t. = Kranialer Teil d. Nierenbecken. K. l. = Kloake. M. g. = Müllerscher Gang.
M. n. g. = metanephrogenes Gewebe. M. s. g. = mesonephrogenes Gewebe. M. t. = Medialteil d. Nierenbecken.
N. b. = Nierenbecken. N. k. = Nierenknospe. p. S. r. = Primäre sammelrohr.
Q. s. r. = Quartäre sammelrohr. R. m. = Rückenmark. S. r. = Sammelrohr.
s. S. r. = Sekundäre sammelrohr. t. S. r. = tertiäre sammelrohr. U. = Ureter. U. n. = Urniere.
V. c. p. = Vena cardinalis posterior. W. G. = Wolffscher Gang.