120.

611.37.

脾臓體部結紮後ノ同器臟變化ノ組織學的研究

岡山醫科大學解剖學教室 (主任八木田教授)

友澤辰治郎

[昭和8年1月13日受稿]

*Aus dem Anatomischen Institut der Okayama Medizinischen Fakultät
(Vorstand: Prof. Dr. K. Yagita).*

Histologische Untersuchungen über die Veränderung des Pankreas nach Unterbindung seines Körpers.

Von

Tatsujirô Tomozawa.

Eingegangen am 13. Januar 1933.

Der Verfasser führte seine Experimente hauptsächlich bei kleinen Hunden aus, ohne jedoch auch Kaninchen und Hühner aus der Acht zu lassen. Nach Unterbindung des Pankreaskörpers liess er die Tiere 3 Stunden – 28 Tage lang leben, um dann sie zu töten. Aus dem Pankreas wurden der Kopf- und Caudalteil genommen und mit Hilfe der folgenden Methoden untersucht.

1. Eosinhämatoxylinfärbung.
2. Mallorysche Bindegewebsfärbung (für Untersuchung des Bindegewebs und der Zymogenkörnchen).
3. Eisenhämatoxylinfärbung nach Fixierung in der Kopschen Flüssigkeit (für Untersuchung der Mitochondrien).
4. Färbung mit Sudan III und Hämatoxylin.
5. Osmiumfixierung nach Flemming und Safraninfärbung (4 u. 5 für Fettuntersuchung).
6. Cajalsche Uransilbermethode (für Untersuchung des Golgischen Apparates).

Die Ergebnisse sind wie folgt:

1. Nach Unterbindung des Pankreaskörpers zeigt der Kopfteil desselben Organs einstweilen eine kompensatorische Funktionssteigerung, indem die Zymogenkörnchen und der Golgische Apparat der Drüsenzellen an Menge zunehmen und die Langerhans'schen Inseln sich an Zahl und Grösse vermehren. Im Caudalteil dagegen

schwellen die Drüsenzellen und die anderen Epithelzellen infolge der Sekretstagnation an, wobei sie sich trüben, um allmählich der Fettdegeneration anheimzufallen. Endlich gehen sie zu Grunde und an dessen Stelle tritt das wuchernde Bindegewebe auf, wobei das ganze Volum des Caudalteils sich stark vermindert.

2. Das Verderben der Pankreaselemente geschieht auf folgende Ordnung: Drüsenzellen → Zentroazinäre Zellen → Zellen der Schaltstücke → Inselzellen → Zellen der kleinen und mittleren Ausführungsgänge → Epithelzellen des Ductus pancreaticus.

3. Gegen Pankreassaft hat die Lumenseite der Drüsenzellen einen starken Widerstand, während die Zellenbasis am schwachsten ist. Daher zerfallen die Drüsenzellen bei Sekretstagnation immer an der Basalseite.

4. Nach Unterbindung des Pankreaskörpers waren die Tiere nicht stark niedergeschlagen und zeigten erst nach 25 Tagen einen Appetitmangel.

5. In den Inseln können Körnchen auftreten, die an die Zymogenkörnchen erinnern, und nach Unterbindung des Pankreaskörpers sieht man, dass die Inseln sich im allgemeinen in dem Kopfteil vermehren, während sie im Caudalteil meistens eine Verminderung aufweisen. Auf Grund dieser Tatsachen hält der Verfasser für wahrscheinlich, dass die Drüsen- und Inselzellen zueinander übergehen können.

6. Zymogenkörnchen, Golgischer Apparat und Mitochondrien scheinen miteinander in Beziehung zu stehen. Wenn die Mitochondrien deutlich zum Vorschein kommen, treten die Zymogenkörnchen und der Golgische Apparat in den Hintergrund, und umgekehrt. Was ihre Veränderungsordnung anbetrifft, so verändern sich die Mitochondrien zuerst, während die Veränderung der Zymogenkörnchen zuletzt auftritt. Wahrscheinlich stellen sich die Mitochondrien als Vorstufe des Golgischen Apparat dar, während der letztere zu den Zymogenkörnchen übergeht.

7. Die fettige Degeneration des caudalen Pankreasteils nach Unterbindung des Körpers tritt erst am 10. Tage des Versuches in die Erscheinung, um dann allmählich deutlich zu werden.

8. Die Veränderung des Caudalteils nach Unterbindung des Pankreaskörpers geschieht auf folgende Weise. Bald nach Operation stagniert das Sekret und an der 6. Stunde des Versuches weisen die Drüsenzellen Anschwellung und Trübung auf, wobei ihre Kerne gegen die Zellbasis gedrückt werden. 12 Stunden nach Operation treten grosse oder kleine Vakuolen im Zelleib auf und von der 24. Stunde des Versuches an zerfallen die Zellen auf der Basalseite und ihr Inhalt fliesst nach aussen aus. Endlich verschwinden alle Epithelzellen im Caudalteil und machen dem Bindegewebe Platz, wobei das ganze Gewebe der fettigen Degeneration anheimfällt.

9. Die meisten Forscher geben an, dass die Veränderung der Insel viel später als die der Drüsenzellen zum Vorschein kommt. Meiner Erfahrung nach ist die Zeitverschiedenheit viel geringer, indem die Veränderung der Inselzellen nur einen Tag später auf die der Drüsenzellen folgt. (*Kurze Inhaltsangabe*).

目 次

第1章 緒 言	第3節 鐵「ヘマトキシリン」染色ニヨル所見
第2章 文 獻	第4節 「ズメン」Ⅲ染色ニヨル所見
第3章 實驗材料及ビ實驗方法	第5節 Gelgi 氏裝置ノ所見
第4章 實驗成績	第5章 總括並ニ考按
第1節 「ヘマトキシリンエオジン」染色ニヨル所見	第6章 結 論
第2節 「マロリー」氏染色ニヨル所見	主要文獻
	附圖説明

第 1 章 緒 言

腺細胞ノ組織學的研究ハ、アラユル方面ヨリ攻究セラレ愈々闡明セラルルト雖モ、微ニ入り細ニ亘ルニ從ヒ益々錯雜幅廣シテ、尙ホ幾多ノ實驗ヲ要ス可キモノアルヲ見ル。

脾臟ニ於テモ、其ノ外分泌、內分泌、及ビ之等機轉ニ於ケル組織的關係、及ビ他臟器トノ相互的關係ニ就テハ、從來幾多ノ研究業績ノ報告アリ、殊ニ「ラ」氏島ト實質トノ關係ニ就テハ、多數學者ニヨリ論議セラレ、從來「ラ」氏島ハ獨立セル器官ニシテ、之ヲ包圍スル結締組織アリトセラレシモ、(Mac, Callum, Opie, Morchal, Gente, Weichselbaum, Heiberg, Löwenfeld und Yaffe) 近時ハ包囊否定說ニ左祖スルモノ續出シ (Hertel, Kibbes, Diamare, v. Hanse-mann, Grinev, Koch, Herksheimer, Karl Seyfarth, 宮入, 緒方, 徳光, 大森, 明比), 一般ニ後說ノ承認ヲ得タルモノノ如シ。

而シテ「ラ」氏島細胞ト實質細胞トノ移行ニ關シテハ、既ニ 1886 年 Lewa, Tschaff ハ之ヲ主張シ、多數ノ學者 (Lagnesse, Glee, Contiel, Dora, Rosch, Herksheimer, K. Koch, Karakascheff, Marchand, Guttmann, Hertel, 宮入, 徳光, Schmitt, v. Hanse-mann, Benda, Baem, Mardius) ハ之ニ賛シ、殊ニ緒方氏 (大正 9 年) ハ白米病研究上ノ所見ヨリ、腺房中心細胞ト「ラ」氏島細胞トハ兩方向ニ互ニ移行シ得ル事ヲ述ベタレドモ、他方ニ於テハ之ヲ認メザル學者 (Ssobolew, Sanerbeck, Diamara, Heiberg, W. Löwenfeld, R. Hermann-Yaffe, Weichselbaum, Schüler, Lagnesse, 泉) モ多數ニシテ、從ツテ今日尙ホ定說ヲ缺ケルモノノ如シ。

又「ラ」氏島細胞ヲ α, β ノ 2 種ニ區別シ (Lave, 木村, 鷗飼, 宮入, Matin), Matin ハ糖尿病ニ最モ深キ關係アルハ β 細胞ナリトシ、宮入氏ハ β 細胞ハ腺房中心細胞ト、又 α 細胞ハ腺細胞ト密接ナル關係ヲ有ストナセリ。

更ニ Bowie 及ビ大森氏等ハ本細胞ヲ 3 種ニ區別シ何レモ同一細胞ノ變化セルモノナリト言ヘリ。

斯ル狀況ノ下ニ余ハ脾細胞ノ種々ノ關係ヲ闡明セント欲シ先ヅ先人ノ例ニナラヒ、犬ノ脾臟體部ノ中央ヲ結紮シタル後、其ノ左右兩部ヲ比較シテ精檢セシニ、其ノ腺細胞ノ崩壞機轉ニ於

テ殊ニ甚ダ其味アル所見ヲ得タルニ依リ之等ヲ總括シ報告セントス。

第 2 章 文 獻

臨牀上稍々多數ニアル脾臓壞疽ニ就キ L. Jores ハ脾排泄管結紮ヲ特ニ消化ノ最モ盛ナル時ニ行ヒテ之ヲ來シタリト記載シ、同時ニ Langerhans ノ説ヲ引用シ脾液ノ酵素作用、殊ニ「ステアブシン」ニ重キヲオキ、脾臓ノ壞疽ニハ必ズ脂肪變性ヲ同伴スルモノトセリ。

此脾壞疽ニ伴ヘル脂肪變性ニ就テハ、Balser, W. (1882)ハ之ヲ脂肪細胞ノ過剰増殖ニヨルモノナリトシ、Chiari (1900)ハ逆行變性ナリトセリ。更ニ Kutz A, u. Winhler F. (1898), Hirdebrand u. Dettmer (1895), Körte (1911), Fitz, Flexner, Trubart, ハ脾臓疾患ノ結果ト見做セリ。

Hess (1903, 1905) ハ犬ノ脾管ニ「カニウレー」ヲ挿入シ石鹼、膽汁、オリーブ油或ハ無刺激性ノモノヲ注入シテ脾臓壞疽及ビ脂肪變性ヲ起サントセシモ、多クノ實驗ハ陰性ニ終リ只少數例ニ於テ之ヲ認メ、Guleke (1912) モ之ヲ實驗的ニ證明シタリ、

壞疽脾組織ノ毒作用ニ就テハ、V. Bergmann, G. u. Guleke (1910) ガ脾組織ヲ腹腔内ニ移植スル事ニヨリテ同様ノ症狀ヲ起シタルモ、Lattes, L. (1913) ハ之ヲ過敏症性衝動ナリトセリ。

脾臓壞疽ノ臨牀報告及ビ其ノ統計等ニ關スル文獻ハ實ニ枚舉ニ遑アラザルモ、Ruppanner, E. (1927), Schweizer R., (1927), Martens H., (1928), Dietrich (1914), Zoepffel (1921), Clairmontund Sching (1920), Opie and Menkins, (1909), Marchand (1921), Simmonds (1915), Biedl (1923), 室谷 (1912), 泉 (大正 2 年), 石川 (大正 9 年), 野口, 高岸 (大正 5 年), 菅原 (1927), 泉山 (1928), F. Kerschoner, (1929) 等ノ説ヲ總括スルニ、「フアーテル」氏竇ニ嵌入セル膽石、或ハ脾排泄管内蛔蟲ヲ迷入等ノ爲膽汁ノ脾臓内ニ逆流シ脾液ノ消化力ヲ助ルニヨ

ルモノトセリ。

臨牀上確ニ急性脾臓壞疽ニヨル死ト認メラル場合ニモ、病理解剖ヲ行ヒ得ザル事多キハ遺憾ナリ。誠ッテ脾臓組織ノ實驗的研究ニ關スル文獻ヲ抄獵スルニ、既ニ 1882 年 Podwyssotski u. Renaut ハ脾臓「ラ」氏島内ニアル多數ノ毛細管ノ他ニ島ヲ圍繞セル毛細管ヲ認メ、1900 年ニ Walter Schulze ハ脾臓ヲ結紮シテ 3 時間後ニ肉眼的ニハ何等ノ變化ヲモ認メズ、顯微鏡的ニモ「ラ」氏島ノ血管ガ鬱血ノ爲メ擴張セルノミニシテ、他ニ異狀ナキモ、時間ヲ經ルニ從ヒ細胞ハ破壞シ結締組織ノ増殖スル事ヲ報告セリ。但核ノ分裂ハ再生現象ニ外ナラズトセリ。

1902 年 Mankowski ハ Podwyssotski ノ教室ニ於テ脾臓ヲ結紮シテ、其ノ組織學的研究ヲナシ、「ラ」氏島ト腺細胞トノ移行ヲ認メ、當時 Warschaw, Tschassonikow モ同様ノ意見ヲ發表セシモ、Ssobolew 及ビ Schulze ハ全ク他ノ見解ヲ有セリ、即チ Mankowski 等ハ「ラ」氏島ト Gangsystem トハ互ニ移行スルモノナリトセルニ反シ、Schulze ハ同様ナル實驗ノ結果、腺管ハ萎縮シ、「ラ」氏島ハ變化ナク殘ルヲ見テ「ラ」氏島ハ獨立ノ Organ ニシテ脾ノ Gangsystem ニ關係ナク、特別ノ Blutgefäss drüsen トシテ、血液ノ糖含有ノ調節ニ參與スルモノナリトシ、Ssobolew モ同様ノ結論ヲ下セリ。

然レドモ Mankowski ニ據レバ是等ハ觀察ノ相違ニ歸スルモノニシテ、脾臓ヲ 2 箇所ニ於テ結紮スレバ、其ノ初期ニハ結紮前部、結紮間部、結紮後部共ニ充血、分泌物ノ鬱滯、浮腫ヲ起スモ、此變化ハ結紮間部ニ於テ最モ強ク、結紮後部、尾部ニ於テ最モ弱ク起リ、後ニハ主トシテ結紮間部、部結紮後部ニ變化ヲ見、結紮前部、(頭部)ハ結紮ニ接近セル部ヲ除キテハ殆ド變化ナク、結紮後部、(尾部)及ビ結紮間

部ニハ上皮、殊ニ腺細胞ノ消滅、白血球ノ浸潤、結締組織ノ増殖ヲ起シ、少シク遅レテ「ラ」氏島モ消失スルニ反シ前部ニ於テハ「ラ」氏島ハ反ツテ増加スト。

D. Hanseemann (1901) ハ犬ノ膵臓ヲ結紮セシニ、實質全部ノ萎縮、結締組織ノ豊富ナル發育、「ラ」氏島ノ長キ殘存ヲ見タリ。Sauerbeck (1904) ハ膵結紮後「ラ」氏島ハ腺細胞ヨリ多少遅レテ消失シ、同時ニ糖尿病ヲ起ス事ヲ確メタリ。

S. Tschassownikow (1906) モ家兎ニ就テ膵臓ヲ結紮シ結紮間部ヲ切斷シ、後2日乃至75日間ニ起ル膵臓ノ變化ヲ觀察シ、腺細胞ハ或ハ Chromatolyseニ陥リ、或ハ單純萎縮、或ハ Pyknoseノ型ニ於テ、退行變性シ、間接分裂ノ現象ヲ示スモノアリ、且胞體中ニ脂肪滴及ビ空胞ノ發現ヲ認メタルモ、糖尿病ニ關シテハ negativノ報告ヲナセリ。

泉氏(大正6年)ハ犬ノ膵管ニ墨汁ヲ、膵動脈ニ朱ヲ注入シ、或ハ膵靜脈ノ結紮ヲ行ヒ檢査セシガ、「ラ」氏島ト膵排泄管トハ何等關係ナキモノナリトセリ。

明比氏(昭和4年)ハ犬ノ膵管結紮後4日ニシテ腺房ハ境界不明トナリ、腺細胞ハ腫脹渾濁シ、「チモールゲン」顆粒ハ増量渾濁シ細胞體內ニ空胞現出シ、間管ハ一般ニ分泌物ニヨリテ擴張シ、結締組織ハ増殖スルヲ見タルモ「ラ」氏島ハ該變化ニ隨伴セズ、其ノ毛細管ハ Peneaノ說ノ如クナルモ、膵臓各細胞ノ移行及ビ新生現象ヲ確實ニ證明スル能ハズトヘリ。

徳光氏(大正6年)ニ據レバ、膵管結紮後膵實質ハ萎縮消耗シ、「ラ」氏島モ亦犯サルルモ、膵實質ノ變化著明トナレバ、「ラ」氏島ハ自己及ビ實質細胞ヨリ盛ニ新生スト。

Mankowski ハ腺ノ各葉細胞ハ、其ノ分泌能力消失スレバ、「ラ」氏島細胞ニ變ズト。

Tschassownikow ハ腺細胞ハ「ラ」氏島細胞ニ變化スルモ、「ラ」氏島細胞ハ腺細胞ニ復歸スル事ハ不可

能ナリトセリ。

上述ノ泉氏、徳光氏ハ膵ト副腎トノ關係ニ就テモ記載セリ。Lane (1905) ハ海猿ニ於テ研究シ、「ラ」氏島ニ α 及ビ β 細胞ヲ區別シ、木村、鶴飼、南氏(1921)モ鶏膵ニ於テ兩細胞ヲ區別シ、殊ニ Martin (1922) ハ糖尿ニ關係アルハ β 細胞ナリトセリ。

宮入氏(昭和2年)ニ據レバ α 細胞ハ腺細胞ト、 β 細胞ハ腺房中心細胞ト密接ナル關係ヲ有スト、Bowie (1924) ハ魚類ノ「ラ」氏島ニ於テ α 、 β 、 γ ノ3種細胞ヲ區別セシモ、皆同一細胞ヨリノ變化ニ過ギザルヲ説キ、當教室ニ於テモ大森氏(昭和5年)ハ家兎膵「ラ」氏島ノ Golgi 氏裝置ヲ檢索シ同様ニ A, B, C. 3種ノ細胞ヲ區別シ、之等ハ分泌時期ノ差ニヨリテ生ズル同一種細胞ニ外ナラズトセリ。

緒方氏(大正9年)ハ「ラ」氏島細胞ト腺房中心細胞トノ極メテ密接ナル關係ヲ述ベタリ。

膵臓組織ノ Golgi 氏裝置ニ就テハ、當教室ニ於テ上述ノ大森氏ノ外ニ建氏(昭和7年)モ研究シ、鹽化「カルチウム」液ヲ反覆注射スル時ハ實質細胞ノ Golgi 氏裝置ハ最初増量シ、後減量シ、「ラ」氏島ノモノハ漸次増量スルニ反シ鹽化「カリウム」液ヲ反覆注射スル時ハ實質細胞ノモノハ先ヅ幽微トナリ、後ニハ粗大ノ粒子著明ニ現ハレ、ラ氏島ノモノハ漸次減少スト言ヘリ。

宇野氏(昭和7年)ハ家兎ニ Lanolin 及ビ Lezithinヲ經口的ニ與ヘテ「ラ」氏島ノ Golgi 氏裝置ヲ檢シ、Lanolin 試食ニテハ初メ漸次増量シ、後幽微トナリ、次イデ再ビ著明トナリ、Lezithin 試食ニテハ初メ幽微トナリ後増大スト言ヘリ。

Mitochondrien ト Golgi 氏裝置トノ關係ニ關シテハ池田(昭和4年)、小林(昭和6年)等ハ同様ニ Golgi 氏裝置ノ著明ナル時ハ Mitochondrien ハ幽微トナリ、裝置ノ幽微ナル時ハ Mitochondrien ハ増量スト言ヘリ。

第 3 章 實驗材料及ビ實驗方法

實驗動物トシテハ、主トシテ小犬ヲ用ヒ、家兎竝ニ家鶏ハ參考的ニ使用セリ、鶏臍ハ體部ニ於テ血管ト共ニ結紮シ、家兎ノモノハ脾ニ近キ部ニ於テ結紮セリ。

犬ノ臍ハ水平枝ノ中央ヲ結紮セリ。之下行枝ハ鉤ノ延長ナルヲ以テナリ、即チ犬ノ腹壁ヲ「クロロホルム、エーテル」麻醉ノ下ニ正中線ニテ切開シ、大網膜ヲ翻轉舉上シ、胃ノ後側ニ現ハル臍ノ水平枝ヲ約中央ニ於テ、可及の血管ヲ避ケ全ク結紮セリ、同部ヨリ左方ノ尾部ニハ腸ニ開口スル副排泄管ナシ、然レドモ念ノ爲メ之ナキヤヲ確メ手術ヲ終リタリ。

Tschassownikow ハ 2 箇所ニ於テ臍ヲ結紮シ、其ノ間ニテ之ヲ切斷スル事ヲ推奨セルモ、余ハ其ノ必要ヲ認メザリキ、何トナレバ剖檢ノ際常ニ排泄管ヲ完全ニ遮斷シ得タリト認メタレバナリ、且切斷スル時ハ、結紮間部ノ分泌物ガ腹腔ニ流出シ、爲ニ壞疽等ヲ惹起スル恐レアレバナリ。

術後 3 時間、6 時間、12 時間、24 時間(1 日)、36 時間(1.5 日間)、48 時間(2 日)、60 時間(2 日半)、72 時間(3 日)、4 日、5 日、7 日(1 週間)、10 日、14 日、21 日、28 日、ノ間隔ヲ以テ「エーテル、クロロホルム」ニテ動物ヲ致死セシメ、結紮部ノ兩側ヨリ臍ノ小片ヲ採リ之ヲ次ノ如ク處置セリ。

I. Orth 氏液固定(24 時間)→ Müller 氏液(1—2 日)→水洗(1 日)→Paraffin 包埋→5 μ 切片→Hae-

matoxylin nach Hansen (Stöhrs Histologie Technik 8, 35)→1% 鹽酸アルコホル→Eosin 染色ヲナシ一般細胞狀態ヲ檢シ、

II. Orth 氏液(24 時間)→Müller 氏液(1—2 日)→水洗(1 日)→Paraffin 包埋→5 μ 切片→Mallory 氏ノ染色(B. Romeis 1198 頁)ヲ行ヒ、特ニ結締組織ニ「チモーゲン」顆粒ノ狀ヲ檢シ、

III. Mitochondrien 其ノ他細胞ノ微細構造ヲ檢スル爲メニ、コブシュ氏液(24 時間)→水洗セズ直チニ 3% 重クロム酸カリ水(7 日間)(此間毎 2 日ニ液ヲ更換ス)→水洗→脱水→2 μ ノ Paraffin 切片→2.5% 硫酸鐵明礬液(3—12 時間)→瞬間水洗→0.5% 水製「ヘマトキシリン」(5 日間)→水洗→2.5% 硫酸鐵明礬液→水洗→脱水→透明藥→「パルサム」包漬。

IV. 10% 中性「フォルマリン」液ニテ固定後、4% 「フォルマリン」液ニ移シ水洗後凍結切片トシ、Sudan III ニテ染色、次デ Haematoxylin ニテ核染色ヲ行ヒ主トシテ Fettige Degeneration ヲ檢スルニ供シタリ、同様ノ目的ニ Flemming 氏法ニヨリ Osmiumsäure ニテ固定、Paraffin 切片トナシ Safranin ニテ染色セリ、

V. Cajal ノ法ニヨリ Golgischer Apparat ヲ檢ス。凡テ條件ヲ一定スルタメ小犬竝ニ家兎ハ皆空腹時ニ致死セシメタリ。

第 4 章 實驗成績

先ヅ對照トシテ健康ナル小犬ヲ單ニ「クロロホルム、エーテル」ニヨリ致死セシメ、家兎竝ニ家鶏ノ健康ナルモノヲモ空氣栓塞ニヨリ致死セシメ、直チニ其ノ臍ノ小片ヲ切取シ、上記ノ諸法ニテ處置シ檢セシニ、腺管ノ構造明ニシテ、腺細胞ノ核ハ概ネ細胞體ノ外ヲ部ニアリテ、管腔ニ近キ胞體部中ニ Zymogenkörnchen ヲ見ル、然ドモ顆粒ノ大サ必ズシモ一定セズ、細胞基底部分ノ原形質ハ Haematoxylin ニテ淡染シ(Fig. 1)、鐵「ヘマトキシリン」染色ニテハ網狀構造ヲ現セリ、同細胞 Golgi 氏裝置ハ核ノ上方ニアリ、網工トナツテ現ハル、「ラ」氏島ハ其

ノ境界明瞭ナルモ、固有ノ被膜ヲ有セズ、時ニ島内ニ腺房ヲ認ムル事アルモ、連續切片ヲ詳檢スレバ周圍ノ實質ト莖ヲ以テ連レルヲ知リ得ル。

「ラ」氏島ハ血管ニ富ミ其ノ細胞ハ血管ノ周圍ニ排列シ、核ハ腺細胞ノモノヨリ稍々大ナル事アリ、同島ノ Golgi 氏裝置ハ大森氏ノ報告ノ如ク核ニ接在シ、或ハ籠狀ニ核ヲ纏絡シ、或ハ核ノ周圍ニ散在セル微細顆粒トナツテ現ハル。

第 1 節 「ヘマトキシリン、エオジン」染色ニヨル所見

Nr. 1. 結紮後 3 時間ノ所見 (昭和 6 年 6 月 9 日手術)

健常犬 (以下皆同ジ) ノ膵體ヲ結紮 (中央ヨリ稍々左方ニ偏シ) シ、3 時間後ニ動物ヲ殺シ、結紮部ノ兩側ヨリ膵ノ小片ヲ取り、之ヲ檢セシニ肉眼のニモ、顯微鏡的ニモ、互ニ殆ド差異ナク、「ラ」氏島ハ全ク無變ニシテ血管ノ擴張ヲ認メズ。

腺細胞ニハ「チモーゲン」顆粒増加シ、核ハ基底部ニ壓セラレ、管腔ハ殊ニ尾方ノモノニ於テ稍々膨大セリ、核ノ溶解及ビ分裂ヲ認メズ (Fig. 2)。

Nr. 2. 結紮後 6 時間ノ所見 (昭和 6 年 6 月 9 日手術)

稍々尾方ニ偏シ膵體ヲ結紮セリ。

肉眼的ニ結紮部ニ脂肪ノ沈着ヲ認ム。

顯微鏡的ニハ結紮部ヨリ右側部、即チ健康側部 (以下之ヲ單ニ頭部ト稱ス) ニ於テ腺細胞ノ核ハ細胞基底部ニ壓セラレ、管腔ハ擴大セリ、即チ分泌物ノ鬱滯ノ狀ヲ認ムルモ核ニ分裂溶解等ノ現象ナク、「ラ」氏島モ無變ナリ。結紮部ヨリ左側部 (以下之ヲ單ニ尾部ト稱ス) ニ於テハ、腺細胞ノ核ハ殊ニ著シク細胞基底部ニ壓セラレ、管腔ハ擴大シ Zymogenkörnchen 増加シ、細胞體ハ稍々溷濁腫脹セリ、然ドモ細胞ノ排列ハ正然トシテ、核ニ分裂、溶解等ノ現象ナク「ラ」氏島モ無變ナリ (Fig. 3)。

Nr. 3. 結紮後 12 時間ノ所見 (昭和 6 年 6 月 15 日手術)

前例ト同ジク稍々尾方ニ偏シ膵體ヲ結紮セリ。

結紮部ハ結締織ニテ硬化シ、其ノ周圍ニ多ノ脂肪沈着セリ。

顯微鏡的所見

頭部ニ於テハ腺細胞ノ「チモーゲン」顆粒ハ稍々減少シ核ハ元位ニ復シ正常ノモノト大差ヲ認メズ、唯僅カニ腫脹セルカノ感アリ、「ラ」氏島ハ數及ビ大サニ於テ共ニ増加セルヲ認ム (Fig. 4)。

尾部ニ於テハ分泌物ハ、其ノ管腔ヲ充シ、腺細胞ノ核ハ細胞基底部ニ壓セラレ細胞内、殊ニ其ノ内部ニ空胞ヲ見ル、細胞ノ構造ハ稍々亂レ原形質及ビ「チモーゲン」顆粒溷濁シ、染色汚穢ナリ、核ハ分裂像ヲ示セリ (Fig. 5)。

Nr. 4. 結紮後 24 時間ノ所見 (昭和 6 年 6 月 9 日手術)

結紮部ニハ前例ヨリ一層脂肪組織沈着シ且尾部ハ多少縮小セリ。

顯微鏡の所見

頭部ニ於テハ管腔著シク擴張セルモ、腺細胞ノ排列ハ異常ヲ認メズ、多數ノ血管及ビ「ラ」氏島ヲ認ム。

尾部ニ於テハ腺細胞ノ排列亂レ「チモーゲン」顆粒ハ著シク増量シ、核ハ細胞基底部ニ壓セラレ、細胞内ニ多數ノ空胞アリ、殊ニ小葉邊緣部ニ於テハ細胞ニ網狀ノ構造ヲ呈セルモノアリ (Fig. 6).

Nr. 5. 結紮後36時間ノ所見 (昭和6年8月3日手術)

脾體中央ヨリ稍々右方ニ偏シ結紮セリ。

結紮部及ビ其ノ左側ニ脂肪組織ノ増殖ヲ認メ尾部ハ稍々縮小セリ。頭部ハ正常ノモノト大差ナシ。

尾部ノ變化ハ Nr. 3 ト Nr. 4 トノ中間ニ位ス (Fig. 7).

Nr. 6. 結紮後48時間ノ所見 (昭和6年6月9日手術)

結紮部ハ脾臓水平枝ノ左 $\frac{1}{3}$ 部ノ右界ニシテ同部及ビ其ノ左側ニ於テ脂肪組織ノ増加ヲ認ム。

尾部ハ縮小シ其ノ硬度ヲ増シ稍々灰白色ヲ呈セリ。

頭部ニハ著變ナク單ニ分泌物ノ鬱滯セルヲ認ムルノミ、細胞ノ排列モ正シク、染色ノ狀ニモ異狀ナシ、標本ハ美麗鮮明ナリ。

尾部ニ於テハ腺細胞ハ腫脹濁シ排列全ク亂レ胞體中ニ大小多數ノ空胞ヲ有セリ、而シテ基底部ヨリ崩潰ヲ始メ、核ハ腫大シ類圓形ヲ呈シ、或ハ細胞體ヨリ脱出セントスルモノアリ。其ノ大サ亦種々ニシテ内ニハ小ニシテ不正長形ノモノアリ、且核ノ一部ハ溶解或ハ分裂ノ現像ヲ示セリ (Fig. 8). 閏管ハ一般ニ著シク擴張シ、其ノ細胞ハ頗ル扁平トナレリ腺房中心細胞ハ腫脹濁シ境界不明ナルモノ多シ、但シ「ラ」氏島ハ異狀ナシ。

Nr. 7. 結紮後48時間ノ所見 (昭和6年7月14日手術)

結紮部ハ脾臓水平枝ノ右 $\frac{1}{3}$ 部ノ左境。

同部ハ硬固ニシテ其ノ左方ニアル部ハ色調稍々灰白色ヲ呈シ光澤ナク硬固ナリ。

顯微鏡の所見

頭部ニハ分泌物ノ増加ヲ認ムル外異狀ナシ、即チ細胞ノ排列整然トシテ核ハ基底部ニ壓セララルモ形狀大サ等ニ變化ナシ、閏管ハ一般ニ擴張シ其ノ細胞ハ扁平ナリ。腺房中心細胞モ亦境界明ニシテ稍々腺房ノ形狀ヲ有セル閏管ニ接續シ小ナル「ラ」氏島ヲ認ム、加之緒方氏ノ説ノ如ク中心細胞ニ移行セル「ラ」氏島ニ相當ス可キモノヲモ認ム。

尾部ニ於テハ腺細胞ハ一様ニ腫脹濁シ染色汚穢ニシテ、且一部ハ其ノ排列亂レ胞體中ニ大小多數ノ空胞ヲ有セリ。Zymogenkörnchen ハ彌散減少シ核ハ大小不同ニシテ、多クハ細胞ノ基底ニ壓セラレ構造不明トナレリ、閏管ハ微細ノモノヲ除キ一般ニ擴張シ其ノ細胞ハ極扁平トナリ核ハ類圓形ヲ呈セリ、但「ラ」氏島ハ健常ナリ。

Nr. 8. 結紮後 60 時間ノ所見 (昭和 6 年 8 月 3 日手術)

結紮部ハ Nr. 5. ト同ジ. 肉眼的變化ハ大略 Nr. 7. ト同一ナリ.

顯微鏡の所見

頭部ハ一般ニ變化ナク美麗ニ染色シ構造鮮明ナル事 Nr. 7. ト同ジ.

尾部ニ於テハ腺細胞ノ排列全ク亂レ腺房ハ其ノ構造ヲ失ヒ, 核ハ變形シ胞體ヨリ逸出セルモノアリ, 結締織ハ著シク増殖シ, 血管竝ニ閏管ヲ圍繞セリ (Fig. 9).

「ラ」氏島ハ縮小シ, 増殖セル結締織ニヨリ包マレ, 核ハ分裂溶解等ノ像ヲ呈セリ.

Nr. 9. 結紮後 3 日目 (昭和 6 年 6 月 9 日結紮)

結紮部ハ臍水平枝ノ略ボ中央.

同部ハ脂肪組織中ニ埋没シ之ヲ求ムル事難キモ該部硬固トナレルヲ以テ之ヲ知ルヲ得タリ.

頭部ハ肉眼的ニ其ノ色調硬度等ニ於テモ變化ヲ認メザルモ, 尾部ハ頗ル硬固トナリ灰白色其ノ度ヲ増シ, 容積縮小セリ.

顯微鏡の所見

頭部ハ多少其ノ機能ノ亢進セルカノ狀ヲ呈スルノミニシテ, 殆ド變化ヲ認メズ, 「ラ」氏島ハ大サ及ビ數ニ於テ増大セルモ, 其ノ核及ビ細胞ノ排列ニ異狀ナク, 閏管細胞, 中心細胞モ著シク扁平トナレルモノ多キモ核ノ構造明瞭ナリ, 腺細胞ハ美麗ノ網狀ノ構造ヲ示セリ (Basal lamellen).

尾部ノ腺細胞ハ排列全ク亂レ腺房ノ境界不明トナレリ, 胞體內ニハ大小多數ノ空胞アリ, 細胞ノ一部ハ全ク崩潰シ, 一部ハ外側基底ニ於テ破裂シ核其ノ部ヨリ脱出セルヲ見ル, 而シテ染色汚穢ニシテ閏管細胞, 中心細胞ハ萎縮又ハ消失シ, 結締織ハ之ニ反シ旺ニ増殖シ血管, 或ハ「ラ」氏島ヲ圍繞セリ.

「ラ」氏島細胞内ニモ大小多數ノ空胞現出シ, 核ハ大小不同ニシテ類圓形, 骰子形, 三角形等ヲ呈シ, 「クロマチン」ハ凝縮セリ (Fig. 11).

Nr. 10. 結紮後 3 日ノ所見 (昭和 6 年 7 月 14 日結紮)

結紮部ハ Nr. 7. ト同様ニ臍體ノ中央ヨリ稍々右側ナリ.

結紮絲ハ増殖セル脂肪組織中ニ埋没シ, 夫ヨリ左方ニアル部ハ縮小シ硬固トナリ固有ノ赤色ヲ失ヒ稍々灰白色ヲ呈スル事前例ニ均シ.

頭部ニ於テハ前例同様閏管著シク擴張シ, 分泌物ヲ充タセルモ, 腺細胞ノ排列正然トシテ腺房ノ構造變化ナシ, 標本美麗ニシテ鮮明ナリ, 「ラ」氏島ハ小ナルモノ増數シ且著シク發育シ大トナレルモノアルヲ見ル (Fig. 10).

尾部ニ於ケル變化ノ度ハ結紮期間ノ同一ナル Nr. 9. ニ比シ遙ニ輕ク, 腺房ハ尙ホ其ノ形態ヲ保持スレドモ頭部ニ比シ Homogen ニシテ分泌物鬱滯ノ狀ヲ示シ細胞内ニ大小多數ノ空胞ヲ有シ, 細胞基底部ノ將ニ破裂セントシ, 或ハ全ク崩潰セルモノアルヲ見ル, 細胞ノ一部ハ著明

ナル網狀構造ヲ呈シ、核ハ大小形狀種々ニシテ胞體內ノ位置モ一定セズ、破裂セル細胞ノ核ハ或ハ脱出シ、或ハ胞體內ニテ溶解シ、若シクバ分裂ノ現象ヲ示セリ。閏管細胞ハ著シク扁平トナリ腺細胞ト同様ノ變化ヲ呈シ、或ハ神經細胞ノ如キ形態ヲ有セルモノアリ。

腺房中心細胞ハ腺細胞ヨリ、其ノ變化稍々遅レテ現ハル、其ノ核ハ一般ニ大ナリ。

「ラ」氏島細胞モ大小多數ノ空胞ヲ有シ、核ハ分裂溶解等ノ現象ヲ示セリ。

Nr. 11. 結紮後4日ノ所見(昭和6年7月14日手術)

前例ト均シク結紮部ニ於テ脂肪組織増加セリ、夫ヨリ左方ニアル部ハ肉眼的ニ Nr. 10. ト殆ド同様ナルモ、變化ノ度ハ稍々強シ、但癒着ヲ見ズ。

頭部ハ前例ト同様ニシテ「ラ」氏島大トナリ且増數セリ。

尾部ノ腺細胞ハ半バ其ノ排列ヲ亂シ汚染シ、核ハ大小不同ナリ、形狀ハ尙ホ圓形ナルモノ多キモ半月狀、骰子形、或ハ長三角形トナレルモノアリ、之ニ反シ「ラ」氏島ノ細胞ハ正然排列シ、透明性ヲ保チ、核ノ分裂融解等ノ現象ヲ示サズ。

閏管細胞及ビ中心細胞ハ腺細胞ヨリ少シク遅レ變化シ、小ナル「ラ」氏島ト中心細胞トノ區別困難ナル事アリ。

Nr. 12. 結紮後4日ノ所見(昭和6年5月12日結紮)

結紮部ハ Nr. 1. 及ビ Nr. 3. ト同狀ヲ呈ス。

術後日數ノ増加ト共ニ尾部ノ硬化、縮少、周圍脂肪組織ノ増加著明トナレリ、而シテ術後ノ經過日數相等シキ前例ヨリモ肉眼的變化強キヲ見ル。

頭部ハ健常ノモノト差異ヲ呈セザル事、前例ト同様ナリ (Fig. 12)。

尾部ニ於ケル細胞ハ排列全ク亂レ、「チモーゲン」顆粒ニ乏シク、一部ハ崩潰シ核ハ大小形狀種々ニシテ「チモーゲン」顆粒ト共ニ細胞體ヨリ脱出崩潰シ、或ハ正ニ脱出セントスルモノアリ、斯ル細胞ノ基底部ハ崩潰シ内容其部ヨリ流出スルモノ多シ、未ダ崩潰セザル細胞中ニハ大小多數ノ空胞アリ、細胞ノ境界判然セズ、閏管細胞ト増殖セル結締組織トノ間ニ介在セリ、閏管細胞及ビ中心細胞モ亦其ノ境界不明トナレリ。

「ラ」氏島ハ尙ホ其ノ透明性ヲ保有スルモ減數シ、且核ノ分裂溶解等ノ現象ヲ示セリ。

結締組織ハ著シク増殖シ線房間ヲ充填セリ (Fig. 13)。

Nr. 13. 結紮後5日ノ所見(昭和6年8月18日手術)

結紮部ハ Nr. 9. ト同ジ、結紮絲ハ之ヲ見出シ難カリシモ、殊ニ硬固トナレル部ハ結紮部タル事疑ナキガ如シ。脂肪組織ノ増加、睪組織ノ硬化萎縮ハ術後ノ日數ト共ニ著明トナリ、結紮部ヨリ左方ニアル部ハ灰白色ヲ帶ビ硬固トナリ、其ノ容積ハ約 $\frac{1}{2}$ ニ縮小セリ。

顯微鏡の所見

頭部ハ變化ナク「ラ」氏島細胞ハ毛細血管ヲ圍繞シ、放線狀排列セリ、之ニ反シ尾部ノ腺房ハ排列亂レ荒廢ニ傾キ、葉間結締組織ハ増殖シ葉内ニ進入シ、腺細胞ノ多數ハ破壊シ、殘部ハ周圍

ニ放散セントスルガ如キ狀ヲ呈シ、核ハ細胞ヨリ流出セルガ如ク脱出シ、或ハ溶解若シクハ分裂ノ現象ヲ呈セリ。僅ニ殘レル腺房モ其ノ周邊ニ於テ溶解ノ狀ヲ示シ、「チモーゲン」顆粒ハ著シク減少セリ、細胞内ニハ大小種々ノ空胞ヲ多數ニ見ル事前例ト同ジ、核ハ空胞ニテ包圍セララルモノアリ、且其ノ「クロマチン」減少シ、透明トナレルモノ多シ。

「ラ」氏島ハ荒廢セル腺細胞間ニ島嶼狀ニ散在セリ、其ノ細胞ノ排列ハ不正ニシテ、核ハ不正ノ形狀ヲ有セリ (Fig. 14).

Nr. 14. 結紮後7日目ノ所見 (昭和6年7月21日手術)

脾臓ヲ稍々脾頭ニ近ク結紮セリ。

術後小犬ハ活潑ニ運動シ、食慾ニ變化ナカリシ。「クロロホルム」ニテ致死セシム。

結紮部ハ殊ニ硬固ニシテ、尾部ノ縮小硬化著シ。

頭部ハ健常ノモノト差異ナシ。

尾部ニ於テハ腺房ノ一部ヲ殘留セルモ、一部ハ全ク細胞ノ崩潰ヲ示セリ、崩潰セザル腺房ノ内腔ハ擴張シ細胞内ニハ大小多數ノ空胞ヲ見ル。細胞ノ崩潰ハ其ノ基底ニ於テ初マル、核ハ屢屢細胞基底部ニ壓セラレ、或ハ崩潰部ヨリ脱出セルヲ見ル、「チモーゲン」顆粒ハ減少シ、細胞破潰部ヨリ流出セントスルノ狀ヲ示セリ。

核ノ形狀、大小ハ種々ナリ、結締織ハ著シク増殖セリ、腺細胞ノ崩潰セル爲メカ中心細胞、閏管細胞ハ増數セルカノ如キ狀ヲ呈セリ、崩潰ニ傾ケル腺細胞、増殖セル結締織、變化少キ閏管細胞及ビ中心細胞ハ互ニ混在シ、且淋巴球ノ浸潤ヲ見ル、但「ラ」氏島ハ健常ニシテ核ノ分裂溶解等ノ現象ヲ見ズ。

Nr. 15. 結紮後7日目ノ所見 (昭和6年5月12日手術)

脾臓水平枝ヲ稍々尾部ニ偏シ結紮セリ。

結紮絲ハ脂肪組織内ニ埋没シ、尾部ハ縮小シ増殖セル脂肪組織ニヨリテ包マレ肉眼的ニハ殆ド其ノ形態ヲ認ムルヲ得ズ。

顯微鏡的所見

頭部ハ健常ニシテ「ラ」氏島ハ其ノ數及ビ大サヲ増シ、閏管及ビ腺房中心細胞ト接續的關係ヲ示セルモノアリ。島細胞ハ前例同様血管ヲ圍繞シテ排列セリ。

尾部ハ結締織化シテ腺細胞全ク消失シ、唯血管及ビ排泄管ヲ殘スノミ (Fig. 15).

Nr. 16. 結紮後10日目ノ所見 (昭和7年5月15日手術)

Nr. 5. ト同一部ヲ結紮セリ。

脂肪ノ沈着著シカラズ、然レドモ尾部ハ正常ノ帶赤色ヲ失ヒ白色ニ變セリ、結紮絲ハ周圍組織ニ癒着シテ之ヲ見出し難シ、然ドモ脾ノ兩側部ハ硬度及ビ色調ニヨリ明瞭ニ區別シ得、本例ハ變化著シク遲延シテ顯ハレタルモノノ如シ。

頭部ハ健常ナルモ其ノ「ラ」氏島ハ減數シ小トナレルヲ見ル、

尾部ノ腺細胞ハ排列未ダ整然タルモノナキニアラザレドモ、管腔擴大シ、細胞膨大、腫脹シ胞體中ニ大小多數ノ空胞ヲ含メリ、核ハ細胞基部ニ壓迫サレ、「チモーゲン」顆粒ハ一般ニ増加シ、分泌物鬱滯ノ狀ヲ示セリ、小葉間結締組織ハ増加シ、殊ニ排泄管ノ周圍ニ著シク發育セリ。「ラ」氏島ハ著シク其ノ數及ビ大サヲ増シ腺細胞ノ如キ排列セルモノアリ (Fig. 16).

核ハ分裂溶解ノ現象ヲ示サズ。

Nr. 17. 術後14日目ノ所見 (昭和6年7月21日手術)

結紮部前例ニ同ジ。

動物ハ術後健康ニシテ食慾、運動共ニ異狀ナシ。

結紮部ノ左方ニアル部ハ硬固、縮小日數ト共ニ増加シ、固有ノ赤色ヲ失ヒ灰白色ヲ帶ビ周圍脂肪織ハ著シク増加セリ。

顯微鏡の所見

頭部ハ正常ト差異ナシ。

尾部ノ變化ハ Nr. 15. ヨリ輕ク Nr. 12. ヨリ強シ、腺細胞ノ排列全ク亂レ、比較的著シク増殖シタル結締組織ニ由テ圍繞セラル、變化ノ尤モ僅ナル部ニテハ核ハ細胞基部ニ壓セラレ腺管內腔擴大シ、胞體腫脹シ空胞ヲ有シ中心細胞ノ増加ヲ示セリ。

「ラ」氏島ハ尙ホ其ノ透明性ヲ有シ、其ノ細胞ハ正常ノ排列ヲナシ核ニ分裂溶解ノ現象ヲ見ズ。變化ノ尤モ強キ部ニテハ腺組織ハ消失シ全ク結締組織ニ變シ、「ラ」氏島モ亦認知スル能ハズ。變化ノ中等度ナル部ニテハ細胞ハ基底ニ於テ破裂シ内容流出シ、核ハ脫出シ中心細胞増加シ、「ラ」氏島ノ細胞ハ排列ヲ亂シ、其ノ核ハ分裂溶解等ノ現象ヲ示セリ。(Fig. 17).

Nr. 18. 結紮後28日ノ所見 (昭和6年8月22日手術)

結紮部ハ略ボ臍體ノ中央。

動物ハ術後食慾、運動等凡テノ點ニ於テ異狀ナカリシモ、術後25日頃ヨリ食慾稍々衰ヘタリ。

結紮部ヨリ左方ノ部ハ脂肪組織ニヨリテ包マレ、臍臟組織ハ殆ド消失シ、僅ニ硬固ナル一小部分殘存セルノミ。

頭部ハ健常ナルモ大小ノ「ラ」氏島増數セリ。

尾部ハ本例ニ於テモ變化ノ強キ部ト微ナル部トニ區別スル事ヲ得、甲部ハ全ク結締織化シ (Fig. 18) 乙部ニ於テモ結締織ノ増殖著シク、腺細胞ハ大部崩潰シ、殘部ハ擴張セル腺管ヲ圍ムモノアルモ、其ノ基底ノ境界判然セズ、増殖セル結締織中ニ中心細胞、「ラ」氏島細胞及ビ變化セル腺細胞ガ不規則ニ混在セルヲ見ル、但變化ノ度ハ Nr. 15. ヨリ少シク弱シ。

第2節 「マロリー」氏染色ニヨル所見

(第2節以下ノ各番號動物ハ凡テ第1節ノ同番號ノモノト同一ナリトス)。

Nr. 5. 頭部ハ正常ノモノト大差ナク、腺細胞ノ「チモーゲン」顆粒ハ核ヨリ内方ニ集在シ、

其ノ量亦正常ニシテ染色美麗ナリ。

尾部ハ頭部ニ比シ腺細胞ノ「チモーゲン」顆粒稍々多ク、且結締織ノ増殖ヲ示セリ。

Nr. 7. 頭部ニハ正常ニ比シ「チモーゲン」顆粒稍々少ナキモ顆粒ハ比較的粗大ナリ。

尾部ニ於ケル該顆粒ハ弱變化部ニテハ多ク、強變化部ニテハ少ク、且染色不良ナリ。

[]而シテ顆粒少ニシテ彌散セル狀ヲ呈シ、加之「ラ」氏島細胞内ニモ「チモーゲン」顆粒ニ類似ノモノヲ見ル事アリ、結締織ハ著シク増殖シ淋巴球浸潤セリ。

Nr. 8. 「チモーゲン」顆粒ハ頭部ニテハ増加セルモ、尾部ニテハ却テ減少シ、且微細ニシテ外方ニ向ケ彌散セリ、且同部ニハ結締織ノ著シキ増殖ヲ見ル。

Nr. 10. 頭部ハ變化ヲ呈セズ。

尾部ノ「チモーゲン」顆粒ハ著シク減少シ汚染セリ、尾部ノ結締織ハ Nr. 8. ト同ジク増殖セリ。

Nr. 11. 結紮ノ兩側共一般ニ「チモーゲン」顆粒ノ増加ヲ認ム、殊ニ頭部ニ於テ著シ、尾部ニ於テハ未ダ正常ノ觀ヲ呈セル腺細胞中ニハ其ノ増加ヲ示セルモ、崩潰セントセル腺細胞中ノモノハ減少シ散亂セルヲ見ル。

「ラ」氏島内ニモ Zymogenkörnchen ニ類似ノ顆粒ヲ有スル大ナル細胞アリ、之 α 細胞ニ一致スルモノニシテ宮入氏ノ說ノ如ク腺細胞ト同一物ナルガ如シ、然モ「ラ」氏島ノ多數ノ細胞ハソレヨリ小ニシテ恐ラク β 細胞ニ當ルモノナラン。

結締織ノ増殖ハ術後ノ日數ト共ニ著シ。

Nr. 13. 頭部ニ於テハ唯「チモーゲン」顆粒ノ増加ヲ認ムルノミ。

尾部ニ於テハ腺細胞ノ排列亂レ腺房間ニハ結締織増殖セリ (Fig. 19) 「チモーゲン」顆粒ハ増加セル細胞ナキニアラザレドモ、一般ニ減少シ「ラ」氏島細胞ト腺細胞トノ區別困難ナル事アリ。

「ラ」氏島ニハ前例ノ如ク「チモーゲン」顆粒ニ類似ノ顆粒ヲ有スル細胞散在セリ。

Nr. 14. 頭部ニハ「チモーゲン」顆粒稍々増加シ、且結締織多少増殖セリ。

尾部ニハ「チモーゲン」顆粒著シク減少シ「ラ」氏島モ正常ノ狀態ヲ失ヒ崩潰セル細胞ヲモ之ヲ見ル、而シテ結締織ノ増殖著シク、殊ニ葉間結締織著シク肥厚シ、腺細胞「ラ」氏島及ビ閘管ノ細胞、中心細胞ハ不規則ニ結締織内ニ混在セリ。

Nr. 16. 頭部ハ「チモーゲン」顆粒ノ増加ト、結締織ノ増殖トヲ顯ハシ、尾部ハ「チモーゲン」顆粒ノ増加、結締織ノ増殖及ビ「ラ」氏島ノ増數増大ヲ示セリ。

「ラ」氏島内ニ迷入セル腺細胞アルモ、連續切片ニテ仔細ニ檢スル時ハ周圍ノ腺房ト莖狀ニ連絡セリ。

「ラ」氏島内ニ「プロチモーゲン」顆粒ノ増量ヲ見ルモ、後述ノ Golgi 氏網トハ關係ナキガ如シ。

Nr. 17. 頭部ハ正常ノモノニ比シ、「チモーゲン」顆粒ノ減少ヲ示ス外變化ナシ。

尾部ハ前節ニ記載セル如ク三段ノ變化ヲ示ス、尤強變化部ニテハ、腺細胞ハ狹長トナリ、結締織著シク増殖シ、極少量ノ「チモーゲン」顆粒ハ細胞ヨリ脱出セルヲ見ル。

「ラ」氏島ハ結締織及ビ崩潰セントセル、腺細胞ヨリ圍繞セラレ、其ノ細胞ハ「チモーゲン」顆粒ニ酷似セル顆粒ヲ含メリ。

弱變化部ニテハ腺細胞ノ「チモーゲン」顆粒ハ核ノ内方ニ於テ腺管内腔ノ周圍ニ集在シ、細胞體ノ周邊部ニ至ルニ從ヒ疎トナレリ。

小葉間結締織ハ著シク増殖シ、血管及ビ閤管ヲ圍繞セリ。

Nr. 18. 頭部ニハ結締織稍々増殖セルモノノ如ク、「チモーゲン」顆粒ハ或ハ變化ナク、腺細胞ノ内部ニ集在シ、或ハ減少シテ胞體ノ全部ニ彌散セルモノアリ。尾部ニテハ、結締織ハ著シク増殖シ、崩潰セントセル腺細胞ハ結締織中ニ不規則ニ混在シ、「チモーゲン」顆粒ヲ認メズ。

「ラ」氏島モ荒廢ニ傾ケルモ其ノ變化ハ腺細胞ヨリ少シク遅レテ起レルノ狀アリ。

第 3 節 鐵ヘマトキシリン染色ニヨル所見

健常ナル犬ノ睪臟ヲ檢スルニ美麗ナル「チモーゲン」顆粒ハ腺房ノ中央部ニ多ク密集シ、細胞基底部ニハ極ク少量ノ線狀ノ「ミトヒヨンドリエン」ヲ認ム。此「ミトヒヨンドリエン」ハ主トシテ細胞ノ基底部ヨリ縦ニ腺房ノ内腔ニ向エルモ、一部ハ斜位ヲトルヲ見ル。

Nr. 5. 頭部ニ於テハ腺細胞ノ「チモーゲン」顆粒多量ニシテ「ミトヒヨンドリエン」ヲ認メ難シ。

尾部ニ於テモ同様ニ「チモーゲン」顆粒多量ナルモ細胞ノ基底部ニ極ク少數ノ「ミトヒヨンドリエン」ヲ認ム。

「チモーゲン」顆粒ハ小ニシテ小細胞ニテハ「チモーゲン」顆粒ト「ミトヒヨンドリエン」トヲ區別シ難シ。

「ラ」氏島ハ透明性ヲ有シ「ミトヒヨンドリエン」ヲ示サズ。

Nr. 7. 頭部ニ於テハ腺細胞ノ「ミトヒヨンドリエン」著明ニシテ、細胞基底ヨリ内腔側ニ向テ直線ニ排列シ、或ハ渦狀ヲ呈セルモノアリ。

「ラ」氏島細胞ノ「ミトヒヨンドリエン」ハ小ニシテ腺細胞ノモノノ如ク著明ナラズ、然レドモ不完全ナガラ一定ノ排列ヲナセリ (Fig. 20).

尾部ニ於テハ「ミトヒヨンドリエン」ハ頭部ニ比シ著シク少量ニシテ、且小ナレドモ一定ノ排列ヲ示セリ (Fig. 21).

但細胞ノ排列ノ亂レタル部ニ於テハ「ミトヒヨンドリエン」ノ排列モ不規則ナリ。

Nr. 8. 頭部ニ於テハ Nr. 7. ト同様、「ミトヒヨンドリエン」著明ニシテ、細胞基底ヨリ内腔ニ向ヒ縦ニ排列セリ。「ラ」氏島ニ於テモ「ミトヒヨンドリエン」ハ Nr. 7. 同様ニ細胞ノ縦軸ニ從ヒ排列セリ、但腺細胞ノモノヨリ幽微ナリ。

尾部ニ於テハ Nr. 7. ト同様ニ Mitochondrien ハ頭部ヨリモ幽微トナレリ。

「ラ」氏島ハ數量共著シク減少セリ。

Nr. 10. 頭部ニ於テモ尾部ニ於テモ Mitochondrien ハ著シク減少、シ且小ニシテ球形ヲ呈シ、Zymogenkörnchen トノ區別困難ナリ、殊ニ尾部ニ於テハ極メテ著シク減少セルヲ見ル。

「ラ」氏島ハ數量共ニ正常ノ狀ヲ呈セリ。

Nr. 11. 結紮部ノ兩側共「ミトヒヨンドリエン」ヲ認メ難ク、殊ニ尾部ニ於テハ全ク之ヲ認ムルヲ得ズ。頭部ニ於テハ極ク微細ノモノヲ見ル。

「ラ」氏島ハ殊ニ頭部ニ於テ數量共ニ減少セリ。

Nr. 13. 頭部ニ於テハ腺細胞ノ排列正シク、「ミトヒヨンドリエン」モ細胞基底部ヨリ内腔ニ向ヒ縱ニ排列セリ、「ラ」氏島ニテモ細胞長軸ノ方向ヲ取レル「ミトヒヨンドリエン」ヲ見ル。

尾部ニ於テハ「ラ」氏島ニ明ニ「ミトヒヨンドリエン」ヲ證明シ得ルモ腺細胞ハ基底部ニ於テ網狀構造部中ニ幽ニ之ヲ示ス。

Nr. 14. 頭部ニ於テハ腺房稍々縮小セルモ、細胞ノ排列整然タリ、多數ノ小ナル「ミトヒヨンドリエン」モ細胞基底部ヨリ内腔ニ向テ縱ニ排列セリ。

尾部ニ於テハ「ミトヒヨンドリエン」ハ一般ニ僅ナリ、但崩潰ノ度輕キ腺細胞ニ於テハ、網狀ノ構造部中ニ稍々多クノ「ミトヒヨンドリエン」アリテ、頭部ニ於ケルト同一ノ排列ヲ顯ハセリ。

「ラ」氏島ハ頭部ニテハ明瞭ニ之ヲ認ムルモ、尾部ニテハ腺房ト區別シ難ク、其ノ核ハ圓形、長三角形等、種々ノ形狀ヲ呈シ、大小モ不同ナリ、然ドモ細胞ノ排列尚ホ整然タリ。

「ミトヒヨンドリエン」ハ極テ微細ナルモ、稍々多數ニ存在シ細胞ノ長軸ニ從テ排列セリ。

Nr. 16. 頭部ニ於テハ腺細胞ノ「ミトヒヨンドリエン」ハ前例ヨリモ著明ニシテ核ノ周圍ニ於テ縱ニ排列セリ、「ラ」氏島ノ「ミトヒヨンドリエン」ハ稍々減少セルヲ見ル。

尾部ノ「ラ」氏島ハ細胞長軸ノ方向ヲ取レル著明ナル「ミトヒヨンドリエン」ヲ有ス、腺細胞ノモノハ顆粒狀ニシテ細胞基底部ニ多ク、縱ニ排列セリ。

Nr. 17. 頭部ニハ「ラ」氏島ノ増大増數ヲ見ルモ、其ノ「ミトヒヨンドリエン」ハ認メ難シ。腺細胞ニモ「ミトヒヨンドリエン」識別シ難キモ細胞内部ニ「チモーゲン」顆粒ヲ認メ、基底部ニハ Basallamellen ヲ見ル。尾部ニ於テハ腺房荒廢シ、結締織増殖シ、胞體ヨリ脱出セル核ハ結締織中ニ、尚ホ胞體內ニ殘レル核ハ、「チモーゲン」顆粒ニテ圍繞セラル「ミトヒヨンドリエン」ハ認メ難シ。「ラ」氏島ハ尚ホ其ノ透明性ヲ有スルモ、細胞核ハ正常ノモノナク、多クハ變形シ、溶解セントスルノ狀ヲ示シ、大小種々ニシテ「ミトヒヨンドリエン」ト共ニ不規則ニ存在セリ。

Nr. 18. 頭部ノ腺細胞ハ全ク正常ナリ、「ミトヒヨンドリエン」ハ多カラズシテ縱ニ排列セリ。核ハ Basallamellen ト Mitochondrien トノ間乃至ハ Basallamellen 内ニアリ。

「ラ」氏島ノ Mitochondrien モ、微細ニシテ、細胞長軸ノ方向ニ正シク排列セリ。

尾部ニ於テハ結締織ノ増殖著シク、崩潰セントスル腺細胞ハ之ニ由テ圍繞サルルモノ多シ、

又細胞ヨリ脱出セル「チモーゲン」顆粒、核及ビ Basallamellen ガ互ニ不規則ニ混在セル事アリ、「ミトヒヨンドリエン」ハ認メ難ク「ラ」氏島ハ増殖セル結締織ニ包マレ、大ナル島中ニハ結締織進入セリ、而シテ細胞ノ排列不規則ニシテ、「ミトヒヨンドリエン」ノ狀又種々ナリ。

第 4 節 ズダン III 染色ニヨル所見

睪臓ノ疾患ニハ、殊ニ脂肪變性ヲ起スモノ多キヲ以テ、本實驗ニ於テモ、其ノ脂肪變性ノ狀ヲ檢シタリ、然レドモ頭部ハ脂肪變性ヲ起サズ、尾部ニ於テモ結紮後 5 日以内 (Nr. 13.迄) ニハ細胞ニ脂肪變性ノ狀ヲ認メズ。

結紮後 7 日目ノ Nr. 14. ノ尾部ニハニ Endstücke ニ極テ輕度ノ脂肪變性ヲ認メ、結紮後 14 日目ノ Nr. 17. ノ尾部ニハ變化著シキ部ニ於テ脂肪變性ヲ認メ、(Fig. 22) 結締織内ノ細胞ニモ脂肪滴ヲ含メルモノアリ。

Nr. 18. 尾部ハ腺細胞ノ崩潰ト共ニ著明ナル脂肪變性 (Fig. 23) ヲ起セリ。

第 5 節 Golgi 氏裝置ノ所見

睪細胞ノ Golgi 氏裝置ニ就テハ、已ニ當教室ヨリモ大森氏、建氏、宇野氏等多數ノ業績發表サレ、正常ノモノヲ説明スルノ要ナキガ如シ。

以下睪體部結紮後ニ於ケル左右兩部ノ Golgi 氏裝置ヲ比較陳述セント欲ス。

Nr. 1. 結紮後 3 時間以内ニ、其ノ兩側ニ於テ著シキ差異ヲ認メズ、只尾部ニ於テ僅ニ Golgi 氏裝置ノ増加セルヤノ感アリ。

頭部ノ腺細胞ニ於テハ裝置ハ正常ノ如ク、核ノ内側ニ接在シ、美麗ノ斑文狀ヲ呈シ、「ラ」氏島細胞ニテハ核ノ周圍ニ存在シ、屢々核ヲ籠狀ニ圍繞セリ (Fig. 24)。

尾部ノ腺細胞ニ於テハ裝置ハ少シク發育セルモ、其ノ内外兩端顆粒狀ヲ呈セリ。(Fig. 26)。

「ラ」氏島細胞モ同様ニ顆粒狀ノ裝置ヲ有セリ (Fig. 25)。

Nr. 2. 頭部ハ Nr. 1. ト同様。

尾部ニ於テハ腺細胞竝ニ「ラ」氏島細胞ノ裝置ハ Nr. 1. ヨリ稍々増量セルヤノ感アルノミニシテ、他ハ Nr. 1. ト同狀ヲ呈セリ。

Nr. 3. 頭部ニテハ細胞ノ Golgi 氏裝置ハ一般ニ増量セルモ、他ニ變化ヲ認メズ。

尾部ニテハ、腺細胞ノ裝置ハ増量シ、其ノ内外端部ニハ微細ノ裝置顆粒トナツテ、散亂セル事、前例ヨリモ著明ナリ、加之「ラ」氏島細胞ノ裝置モ全ク顆粒狀ヲ呈シ散亂セリ (Fig. 27)。

Nr. 4. 頭部ニ於ケル裝置ハ變狀ヲ呈セザルモ、尾部ノモノハ擴張セル内腔ヲ圍繞シテ著シク増量セリ、但其ノ絲狀網工ハ細胞ノ端部ニ於テ崩潰シ、顆粒トナツテ散亂セリ。「ラ」氏島ニ於テモ Golgi 氏裝置ハ絲毬狀ノ網工ヲ呈セズ。(Fig. 28)。

Nr. 5. 頭部ニ於テハ Golgi 氏裝置ハ著シク減少セルモ、尾部ニ於テハ腺細胞ノ裝置ハ著シ

ク著明トナリ、顆粒狀ヲ呈シ、正常ノ位置ニ集セルノ他ニ胞體ノ全部ニ微粒子瀰蔓性ニ散亂セリ。

「ラ」氏島ノ裝置ハ其ノ量極テ少ク、微粒子ヨリナルヲ見ル (Fig. 29)。

Nr. 6. 頭部ノ腺細胞裝置ハ一部顆粒狀トナツテ胞體基底部ニ向テ飛散セリ、之正常ノ所見ト異ナル所トス (Fig. 30)。

尾部ニ於テハ其ノ裝置ハ更ニ著シク顆粒狀ニ飛散シ、Mitochondrienノ瀰散セル方向ト逆ニ細胞基底ニ向ヒ飛散シ、放線狀ニ排列セリ (Fig. 31)。

Nr. 7. 頭部ニ於テハ腺細胞ノ裝置ハ著シク增量シ、其ノ一部ハ顆粒狀ニ飛散シ、放線狀ニ排列セリ。「ラ」氏島ノ裝置ハ専ラ顆粒ヨリナル (Fig. 32)。

尾部ニ於テハ裝置ノ變化ハ前例ヨリモ僅ナルモ、裝置網狀構造部ハ減少シ、粒子ハ周圍ニ向ヒ飛散シ、胞體內ニ多數ノ空胞ヲ有セリ (Fig. 33)。

「ラ」氏島細胞ニテハ、Golgi氏裝置ノ顆粒狀トナリ、且減少セル事前例ト同様ナリ。

Nr. 8. 頭部ラ氏島細胞ハ境界判然セズ、其ノ裝置ハ全ク粒子ニ分解シ、腺細胞ニ於テハ裝置正常ノ狀ヲ示セルモ、其ノ量少シ。

尾部「ラ」氏島ニ於テハ、裝置ハ著シク增量シ、網狀ノモノ無キニアラザレドモ、概シテ顆粒狀ヲ呈シ、核ノ1側又ハ周圍ニ多ク存在セリ (Fig. 34)。

腺細胞ニテハ、空胞ノ増加ト共ニ網狀ノ裝置ハ減少シ、且微細粒子モ亦僅トナレリ。

Nr. 9. 頭部ノ裝置ハ著明ニシテ、且稠密ノ構造ヲ有セリ、即チ腺細胞ニ於テハ、其ノ核ヲ圍繞シ、內腔迄蔓延シ。加之內腔ヲモ充鎮セルモノモアリ、且屢々間管ニ沿ヒテ存在セル事アリ。細胞基底部ニアル微細粒子ハ恰モ Mitochondrienノ如キ狀ヲ呈シ、兩者ヲ區別シ難シ。「ラ」氏島細胞ノ裝置モ亦增量シ、核ヲ圍繞シ、其ノ微細粒子ハ稠密ニ全細胞體內ニ瀰蔓セリ (Fig. 35)。

尾部ニ於テハ腺細胞ノ荒廢スルニ從ヒ、Golgi氏裝置モ亦崩潰シ其ノ顆粒ハ胞體ノ基底ニ向テ散亂セルヲ見ル。該細胞體內ニアル多數ノ空胞トGolgi氏裝置トノ間ニハ、一定ノ關係ナキモノノ如シ、即チ裝置ハ核ヲ圍繞セルモ、空胞ハ或ハ之ヲ圍繞シ、或ハ其ノ內方ニ散在シ、或ハ全ク核ト離レテ存在セルモノアルヲ見ル (Fig. 36)。

「ラ」氏島ニ於テハ尾部ノ裝置ハ頭部ノモノヨリ稍々顆粒ノ減少ヲ示スノミニシテ、其ノ排列ハ正常ト異ナラズ。

Nr. 10. 頭部ノ細胞ハ整然ト排列シ、其ノ裝置ハ著明ニシテ美麗ナル斑文狀ヲ呈シ、核ノ內側ニアリテ正常ト異ルコトナシ、頭部「ラ」氏島ニ於テハ裝置顆粒ハ核ヲ圍繞シテ排列セルコトアレドモ、概ネ核ノ1側ニ集セルヲ見ル。

尾部ノ細胞内ニハ空胞アリ、裝置ハ斑文狀ヲ呈セルモ減量シ、一部ハ顆粒トナリテ胞體基底ニ向テ飛散セントセリ。

「ラ」氏島ニ於テモ装置顆粒ハ其ノ量少ク、且微細ナリ (Fig. 37).

Nr. 11. 頭部ノ腺細胞ハ前例ト均シク、核ノ内側ニ於テ、装置ノ絲狀網工ヲ有セリ、此者變化ナク胞體基底部ニ飛散スル顆粒モ之ヲ認メズ.

「ラ」氏島細胞ハ稠密ニ存在シ、其ノ Golgi 氏装置ハ主トシテ核ノ 1 側ニ存在セル主部ノ他ニ胞體全部ニ彌散セル顆粒ヨリナル.

尾部腺細胞ノ Golgi 氏装置ハ細胞ト共ニ荒廢シ、其ノ微細ナル顆粒胞體基底ニ向テ飛散シ、且減量セリ、「ラ」氏島ノ數量ハ減少セルモ島細胞ノ装置顆粒ハ却テ増量セリ (Fig. 38).

Nr. 12. 頭部ハ正常ナルモ、尾部ノ腺細胞ハ著シク荒廢シ、其ノ Golgi 氏装置ノ顆粒ハ著シク減少シ、排列全ク不正トナレリ、但中心細胞、閏管細胞ノ装置顆粒ハ腺細胞ノモノニ比シ其ノ量稍々多シ、

「ラ」氏島ニテハ細胞ノ装置顆粒ハ中心細胞、閏管細胞ノモノヨリモ、其ノ量稍々多キモ正常ニ比シ著シク減少シ、主トシテ核ニ接在セリ、而シテ「ラ」氏島自身モ荒廢セルヲ認ム.

Nr. 13. 頭部ハ正常ナリ.

尾部ニ於テハ、細胞ノ排列著シク亂レ、胞體中ニ多數ノ空胞ヲ有セリ、Golgi 氏装置粒子ノ排列モ全ク亂レ、散亂シ、減量セリ (Fig. 39), 但中心細胞及ビ閏管細胞ト思ハルルモノニハ、装置顆粒稍々其ノ量多シ、「ラ」氏島ノ細胞ハ尙ホ正常ニ近キモノアルモ、屢々核ハ變小シ装置顆粒ハ前例ヨリモ少ク、加之或ル「ラ」氏島ハ著シク荒廢シテ變化セル腺房トノ區別困難ナルモノアリ.

Nr. 14. 頭部ハ正常ニシテ腺細胞ノ Golgi 氏装置ハ美シキ斑文狀ヲ呈シ、「ラ」氏島ノ装置粒子モ微細ナガラ著明ニ存在シ、主トシテ核ニ接在セリ.

尾部ニテハ組織ノ癡類ト共ニ Golgi 氏装置ノ顆粒ハ一般ニ微細トナリ散亂シ、且減量セリ、増殖セル結締織中ニ散亂セル「ラ」氏島ト腺房トハ屢々區別シ難シ (Fig. 40). 腺細胞ニ於テハ「チモーゲン」顆粒ノアル可キ部ニ幽微ノ Golgi 氏装置粒子ヲ見ル.

Nr. 15. 頭部ハ前例ト同様ニ正常ニシテ Golgi 氏装置モ變化ナシ、即チ腺細胞ノ装置ハ絲狀物ヨリナリ、斑文狀ヲ呈シ、中心細胞及ビ「ラ」氏島細胞ノモノハ互ニ酷似シ、其ノ邊緣ニ幽微ナル顆粒ヲ示セリ.

尾部ノ組織ハ全ク荒廢シ、「ラ」氏島ト實質トハ互ニ區別シ難シ、各上皮細胞共大ニ變化シ、Golgi 氏装置ハ其ノ核ト思ハルル部ニ接シ、極テ少量ノ微細顆粒トシテ殘留セリ、但「ラ」氏島ト思ハル部ニ最も多ク之ヲ認ム.

Nr. 16. 頭部ニ於テハ Golgi 氏装置ハ一般ニ減量セルモ正常ノ狀ヲ保テリ.

尾部ニ於テモ組織ハ前例ノ如ク荒廢セザル爲メニ稍々正常ニ近キ Golgi 氏装置ヲ見ルモ、頭部ノモノト同ジク減量セリ、而シテ腺細胞ノ装置顆粒ハ正ニ崩潰セントスルモノノ如ク、核ノ内側ニ集在シ、胞體基底ニ向ヒ飛散セントスルノ狀ヲ呈セリ、内腔側ニ於テハ閏管ノモノト殆

ト連續セルヲ見ル,「ラ」氏島ノ Golgi 氏裝置粒子ハ核ヨリ小ナル集團ヲ形成シ,主トシテ核ニ接シテ毛細管側ニ存在セルモ時ニ他部ニ存スル事アリ,加之時トシテ微細顆粒ノ點線狀ニ排列セルヲ見ル事アリ (Fig. 41).

Nr. 17. 頭部ニテハ Golgi 氏裝置著明ニ現ハル,即チ腺細胞ノモノハ核ノ内側ニ於テ絲狀物ヨリナレル網工ヲ形成シ,「ラ」氏島ノモノハ一般ニ微細粒子ヨリナリ,主トシテ核ニ接シテ集在セリ.

尾部ハ Nr. 15. ト殆ト同狀ヲ呈ス,即チ組織ノ荒廢著シクシテ,脾固有ノ細胞ヲ認メ難ク, Golgi 氏裝置モ又著シク減量シ,其ノ少量ノ微細顆粒ハ極メテ不規則ニ散在セリ,但散亂セル核ノ周圍及ビ結締織ニテ圓形ニ圍繞サル「ラ」氏島部ハ裝置粒子ニ富ム (Fig. 42).

Nr. 18. 頭部ハ正常ナルモ,尾部ハ結締織ノ増殖著シクシテ,全ク腺組織ヲ認メ得ズ.其ノ Golgi 氏裝置モ亦殆ト消失シ,唯極ク少數ノ微細黑色顆粒ノ散在セルヲ見ルノミ (Fig. 43).

附. 家兎ニ於テハ,其ノ脾臓ノ解剖的關係上,犬ニ於ケルガ如ク著明ニ結紮部ノ兩側所見ノ差異ヲ認メ難キモ,大略上記犬ノ所見ト一致スルヲ知ルヲ得タリ.概シテ家兎ニ於テハ脾臓結紮後周圍脂肪組織ノ増加著シキト,尾部ノ變化犬ヨリモ稍々早く起ルヲ以テ特徴トス.家鷄ニテハ脾動脈ト排泄管トハ互ニ並行シ,且接在セル爲メ脾臓中央部ニ於テ尿管ノミヲ結紮スルヲ得ズ,全體ヲ結紮セシニ左半部ノ脾靜脈ハ直チニ著シキ鬱血ヲ起シ,十二指腸蹄係ト共ニ壞死ニ陥リタル故ニ其ノ所見ト犬ニ於ケルモノト直ニ比較シ得ザルモ,頭部(健康側)ト尾部(壞死側)トノ差ハ上陳ノ犬ニ於ケル所見ト略ボ相類セル點アルヲ認メタリ,而シテ尾部ノ變化ハ著クシ早く起リ,十二指腸蹄係ノ壞死ノ爲メ動物ハ營養次第ニ衰ヘルモ結紮後 30 日間ハ生息シタリ,其ノ脾尾部ハ全ク索狀物トナリ,顯微鏡ノニハ結締織ヨリナリ,内ニ淋巴球ノ浸潤アルノミ.犬ニ於テモ術後 15 日目ニ急速ニ衰弱シ死セシモノアリ.

第 5 章 總括並ニ考按

以上實驗例ノ所見ヲ總括センニ,犬ノ脾臓體部ヲ結紮スル時ハ,頭部ハ結紮後 6 時間ニシテ分泌ノ増加ヲ起シ,管腔ハ擴張シ細胞内ニモ分泌物充滿シ,核ハ胞體基底部ニ壓セラレ Zymogen-körnchen ハ増加シ, Golgischer Apparat モ著明ニ増量シ,結紮後 4 日ニハ,其ノ頂點ニ達スルヲ見タリ.爾後 Golgischer Apparat ハ漸次正常ノ狀ニ復歸スルモ,「チモーゲン」顆粒ハ尙ホ多量ニ存在セリ.

Mitochondrien ハ術後先ヅ減量スルモ,次デ増量シ,結紮後 3 日位ニシテ再ビ減量ス,5 日目後ニハ再ビ増量シ,10 日目ニハ,其ノ頂點ニ達シ,後次第ニ減少シ,2 週間ニシテ正常ノ狀ニ復ス.

頭部ニ於テハ結締織ノ増殖及ビ脂肪變性ハ之ヲ認メズ.

「ラ」氏島ハ,其ノ細胞ニ變性ナキモ,數量ノ増減アルヲ見ル,結紮後 12 時間ニシテ,島ノ數

量共ニ増加シ、〔ラ〕氏島ト臍臓トノ容積ノ比率ハ Panchow ニヨレバ、犬ニ於テハ $1/8-1/10$ ナリ、臍組織 50 平方耗内ノ〔ラ〕氏島數ハ倉上氏ニヨレバ、93.0 明比氏ニヨレバ 105.4 ニシテ、明比氏ハ臍管結紮後ニハ 92.8 臍靜脉結紮後ニハ 82.1 ヲ算シタリト言ヘリ）24 時間後ニテモ増加シ、1 日半乃至 2 日半ノ間ニハ増加ヲ認メズ。結紮後 3 日、及ビ 4 日ニ於テモ増加ヲ見タリ、其ノ數量ノ減少セルハ結紮後 10 日ノモノノミナリキ。

尾部ハ已ニ結紮後 3 時間ニシテ分泌物鬱滯ノ狀ヲ示シ、更ニ次第ニ増強スルヲ見タリ、即チ 6 時間後ニハ細胞ハ濁濁シ、核ハ細胞ノ基底部ニ壓セラレ、12 時間後ニハ細胞内ニ大小ノ空胞現出セリ、爾後細胞ノ排列亂レ、24 時間後ニハ分泌物鬱滯ノ狀極度ニ達セリ、此變化ハ殊ニ小葉ノ邊緣ニ著シ、〔ラ〕氏島ノ變化ハ最モ遅ク現ハルルモノニシテ、48 時間後ニハ尙ホ健全ノ狀ヲ呈セリ、2 日半後ニ始メテ變化シ、次第ニ核ノ分裂溶解等ノ現象ヲ示スヲ見ル。

結紮後 3 日ニシテ、腺細胞ノ核ハ胞體ノ基底部ヨリ脱出シ、胞體内容モ亦流出スルヲ見ル、即チ細胞ハ先ヅ腫脹濁濁シ、細胞内ニ空胞ヲ生ジ、次デ基底ヨリ崩潰スルモノトス。此變化ト共ニ結締織ハ増殖スルモノニシテ、最初ハ小葉間ニ著シク、後ニハ小葉内ニモ進入シ崩潰セル細胞、或ハ細胞ヨリ脱出セル核ノ集團ヲ圓形又ハ橢圓形ニ包圍スルノミナラズ、各核間ニモ進入シ〔ラ〕氏島モ増殖セル結締織ニヨリテ圍繞セララルヲ見ル、之ト同時ニ小葉間ヨリ淋巴球現出シ、其ノ浸潤ヲ起シ、之結締織ノ増殖ニ伴ヒ進行シ、殊ニ小葉邊緣部、就中脂肪ノ沈着セル部ニ著シキ浸潤ヲ認ムルニ至ル。

Zymogenkörnchen ハ結紮後 24 時間ニシテ増加シ、2 日目ヨリ次第ニ減少シ、漸次微細トナリ、飛散シ、7 日目ニ殊ニ胞體基底ノ破潰セル部ヨリ核ト共ニ流出シ、遂ニ全ク消失スルニ至ル、但結紮後 14 日目ニハ、其ノ一小部細胞内ニ殘留スル事アレドモ、28 日目ニハ全ク之ヲ認メザルニ至ル。

Zymogenkörnchen ノ減少スルト同時ニ、結締織ハ増殖シ始メ、小葉間ヨリ、小葉内ニ入り、淋巴球浸潤シ、結紮後 4 週目ニハ、全組織ハ殆ド結締織化スルヲ見ル、

尾部ニ於ケルハ Mitochondrien ハ Zymogenkörnchen ノ最モ著シク出現時期、即チ結紮後 24 時間迄ハ、其ノ出現ヲ見ザルモ、36 時間後ニハ出現スルヲ認ム。然レドモ爾後増量セズシテ却テ細胞ノ崩潰ト共ニ漸次減少シ、結紮後 28 日目ニハ全ク之ヲ認メザルニ至ル。頭部ニ於テモ Mitochondrien ハ結紮後 1 日半ニテハ認メ難キモ、2 日後ニハ著明ニ現出シ、次デ 3 日後ニハ減少シ爾後著シキ増減ヲ示サズ。

尾部ニ於ケル脂肪變性ハ腺細胞崩潰後ニ起ルモノニシテ、結締織ノ増殖ヨリモ稍々遅レテ結紮後 7 日乃至 10 日頃ヨリ始リ、漸次進行シ、結紮後 28 日目ニハ臍組織ハ著シク脂肪變性ニ陥ル。尾部ニ於ケル Golgi 氏裝置ハ結紮直後ヨリ増進シ、殊ニ核ニ接シテ最モ著明ニ現出ス、然レドモ裝置絲條ハ漸次崩潰シ顆粒トナリ、周圍殊ニ胞體基底部ニ向ツテ飛散シ、〔チモーゲン〕顆粒ヨリモ稍々早く減少スルモノトス、然ドモ腺房内腔ニ出デシ裝置小顆粒ハ列ヲナシ、稍々

久シク残留セルヲ見ル、詳言スレバ結紮後1日半迄ハ該裝置ハ増量シ、主トシテ核ニ接在セルモ、同時ニ漸次崩潰シ其ノ一部ハ微細顆粒トナリ、絲狀構造部ノ内外兩側ニ向テ飛散シ消失ス、但内腔中ニ出デシモノハ、久シク残留シ、結紮後10日目ニ於テモ尙ホ列ヲナシ、閘管ニ迄達セルヲ見ル、之ニ反シ Golgi 氏裝置ノ主部ハ、結紮後2日目ヨリ漸次崩潰減少シ、其ノ顆粒ハ核ノ脫出ト共ニ細胞基底ノ破裂部ヨリ流出シ、結紮後5日目ニハ胞體中ノモノ著シク減量シ、結紮後4週目ニハ細胞内ノ裝置ハ全ク之ヲ認メザルニ至ル。

「ラ」氏島細胞ノ Golgi 氏裝置ノ變化ハ腺細胞ノモノヨリモ約1日間遅レテ現ハル、即チ腺細胞ニ於テハ裝置ハ結紮後1日半ニ尤モ増量セルモ島細胞ノモノハ、結紮後2日半ニシテ最モ増量セルヲ見タリ、而シテ3日後ヨリ次第ニ減少ス、其ノ狀腺細胞ノモノノ變化ト同様ナリ。

以上ノ所見ニ基キ考按センニ、頭部ハ結紮後モ、分泌物ハ正常ナル排泄路ヨリ出ヅルヲ以テ殆ド影響ヲ蒙ル事ナク、其ノ一時的ニ機能亢進スルハ、尾部ノ機能ヲ代償スルニ基カガ如シ。然レドモ機械的刺戟モ其ノ一原因ナルカモ知ル可カラズ、然レドモ此頭部ハ常ニ脂肪變性及ビ結締織ノ増殖ヲ示サズ、「チモーゲン」顆粒 Golgi 氏裝置及ビ「ミトヒヨンドリエン」ノ増減ハ専ラ腺細胞ノ作用上ノ時期ニ關係アルモノト思考ス。

總ジテ「チモーゲン」顆粒ノ多量ナル時ハ Golgi 氏裝置モ増量シ、「ミトヒヨンドリエン」ハ却テ減少セリ、而シテ時間的ニハ「ミトヒヨンドリエン」ノ變化最モ早く現ハル、Golgi 氏裝置ノモノ之ニ次ギ、「チモーゲン」ハ最モ遅ク變化スルガ如シ。

尾部ハ結紮後已ニ3時間ニシテ分泌物鬱滯ノ狀ヲ示シ、Golgi 氏裝置及ビ「チモーゲン」顆粒ハ増量シ、24時間目ニハ其ノ頂點ニ達シ、細胞ハ腫脹濁シ、胞體中ニ空胞現出シ、結締織増殖ヲ始ム。

結紮後36時間ニテハ腺細胞ノ一部ハ其ノ基底部分ニ於テ破潰シ、核ハ脫出シ、Golgi 氏裝置モ崩潰シ顆粒狀トナリ、「チモーゲン」顆粒、及ビ核ト共ニ破潰セル胞體基底部分ヨリ流出スルヲ見ル。此細胞ノ破潰ニ先チ「チモーゲン」顆粒及ビ Golgi 氏裝置ハ最著明ニ増量スルモ、Mitochondrien ハ認メ難シ、即チ Mitochondrien ハ Golgi 氏裝置及ビ「チモーゲン」顆粒ト反スル消長ヲ現ハスガ如シ、然レドモ變化ノ時間的關係ハ頭部ニ於ケルト同ジク、Mitochondrien ニ最モ早く現ハレ、Golgi 氏裝置之ニ次ギ、「チモーゲン」顆粒ノ變化ハ最モ遅キヲ見ル、而シテ腺細胞ノ殆ド崩潰スル結紮後7日乃至2週ノ頃ニハ上記ノ三者トモ減少シ脂肪變性及ビ結締織ノ増殖現出スルモノトス、結紮後4週ヲ經ルトキ、前三者ハ凡テ全ク消失シ、脂肪變性及ビ結締織ノ増殖顯著トナル。

上記ノ所見ニヨレバ、「ミトヒヨンドリエン」、Golgi 氏裝置、「チモーゲン」顆粒ハ皆分泌ト密接ナル關係ノアルモノノ如クニシテ、恐クハ「ミトヒヨンドリエン」ハ「チモーゲン」顆粒ノ前階梯物ナラント思考ス。

「ラ」氏島細胞ノ變化ハ腺細胞ノモノヨリ約1日間遅レテ顯ハルルヲ見ル、而シテ遂ニ全腺組

織ハ結締織化シ、且脂肪變性ニ陥ル。

此脂肪變性ハ先入ノ證明セン如ク Steapsin ノ作用ニヨルモノノ如シ、「ラ」氏島細胞内ニモ「チモーゲン」顆粒ニ類似ノ顆粒現出スルハ注意ニ價ス可キモノト思考ス

「ラ」氏島ノ數量ハ時ニ減少スル事アルモ、概シテ頭部ニ於テハ著シク増加シ、之ニ反シ尾部ニ於テハ減少スルヲ見ル、此事實ハ腺細胞ト「ラ」氏島細胞トノ相互ニ移行シ得ルヲ物語ルモノノ如クト思考ス。

膵組織ノ成分ノ變性スル順序ハ、先ノ腺細胞ニ初リ、腺房中心細胞之ニ次キ、「ラ」氏島及ビ細間管ハ稍々遅レテ變化ス、大キ排泄管殊ニ膵管ハ血管ト共ニ最後迄結締織中ニ残留セルヲ見ル。

第 6 章 結 論

1 膵臓ヲ其ノ體部ニ於テ結紮スル時ハ、頭部ハ一時代的ニ機能亢進ノ狀ヲ示スモノニシテ、腺細胞ノ「チモーゲン」顆粒及ビ Golgi 氏裝置トハ増量シ、「ラ」氏島ハ其ノ數量ヲ増ス。

尾部ハ分泌物ノ鬱滯ニヨリ、腺細胞及ビ他ノ上皮細胞ハ腫脹凋落シ、漸次脂肪變性ニ陥リ遂ニ荒廢消失シ、腺組織ニ代リ結締織増殖スルヲ見ル、而シテ尾部ハ大ニ容積ヲ減ズ。

2. 膵臓諸成分ノ荒廢ハ腺細胞、中心細胞、間管、「ラ」氏島、小及ビ中等大ノ排泄管及ビ膵管ノ順序ニ起ルモノトス。

3. 膵腺細胞表層ノ分泌液ニ對スル抵抗力ノ管腔ニ向ヘル内側最モ強ク、基底ノ外側最モ弱シ、即チ分泌液鬱滯スル時ハ、細胞ハ基底部ニ於テ崩潰スルモノトス

4 膵臓體部ヲ結紮スルモ動物ハ著シク衰弱セズ。結紮後 25 日頃ヨリ始テ食欲不振ヲ來ス。

5. 「ラ」氏島内ニ「チモーゲン」顆粒ニ類似ノ顆粒ヲ見ル、而シテ結紮後「ラ」氏島ハ概シテ、頭部ニ於テ増加シ、尾部ニ於テ減少スルヲ見レバ、腺細胞ト島細胞トハ互ニ移行シ得ルモノノ如シ

6 「チモーゲン」顆粒、Golgi 氏裝置及ビ「ミトヒヨンドリエン」ハ互ニ一定ノ關係アルモノノ如ク、「チモーゲン」顆粒及ビ Golgi 氏裝置ノ著明ナル時ハ「ミトヒヨンドリエン」ハ幽微トナリ、「ミトヒヨンドリエン」著明トナレバ、前兩者ハ幽微トナル、而シテ其ノ變化ノ順序ハ概シテ「ミトヒヨンドリエン」ニ最モ早く起リ Golgi 氏裝置之ニ次ギ、「チモーゲン」顆粒最モ遅レテ變化スルヲ見ル、故ニ恐クハ「ミトヒヨンドリエン」ハ Golgi 氏裝置ノ前階級物ニシテ裝置ハ「チモーゲン」ノ前階級ナルモノノ如シ。

7 本實驗ニ於テハ、脂肪變性ハ結紮後 10 日目位ニ始リ、漸次増強スルヲ見タリ

8 本實驗ニ於テ、尾部細胞崩潰ニ至ル過程ハ、結紮直後ヨリ分泌物鬱滯シ、6 時間後ニハ細胞腫脹凋落シ、核ハ其ノ基底部ニ壓セラレ、12 時間後ニハ胞體內ニ大小ノ空胞現レ、腺細胞ハ 24 時間以後ニ基底部ヨリ崩潰シ、其ノ内容流出スルヲ見ル、而シテ尾部ニ於ケル諸上皮細胞

ハ遂ニ消失シ、脾組織ハ全ク結締織化シ、脂肪變性ニ陥ルヲ見ル。

9. 島細胞ノ變化ハ腺細胞ノモノヨリ非常ニ遅レテ現ハルルト言ヘル報告多キモ、余ノ實驗ニ於テハ僅ニ1日間遅レテ現ハルルヲ見タリ。

稿ヲ終ルニ臨ミ始終御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリシ恩師上坂博士ニ對シ謹而謝意ヲ捧グ。

主 要 文 獻

- 1) *Alpern u. Leites*, Klin. Ws., Nr. 4, 1925.
- 2) *Biedl*, Deutsch. Med. Ws., Nr. 29, 1923.
- 3) *Fischer, B.*, Frankf. Z. f. Pathol., Bd. 17, 1915.
- 4) *Bergen*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 64, 1914.
- 5) *Biondi*, Arch. f. Zellforsch., Bd. 6, 1911.
- 6) *Falta*, Wien. Klin. Ws., Nr. 3, 1909.
- 7) *Hess, O.*, Münch. med. Ws., 1903, u. 1905.
- 8) *Hildebrand*, Zentralbl. f. Chir., Bd. 22, 1895.
- 9) *V. Hansemann*, Berl. Klin. Ws., Nr. 20, 1912.
- 10) *Herxheimer u. Carpentier*, Ziegler's Beitrage., Bd. 76, 1927.
- 11) *Koch, K.*, Virchows Arch., Bd. 211, 1913, u. Bd. 214, 1913.
- 12) *Knape*, Deutsch. Z. f. Chir., Bd. 121, 1913.
- 13) *Katz, A., u. Winkler, F.*, Arch. f. Verdauungs-krankh., Bd. 4, 1898.
- 14) *Kyrle*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 72, 1908.
- 15) *Kerschner, F.*, Bruns Beiträge zur Klin. Chir., Bd. 147, 1927.
- 16) *Kopsch*, Z. f. Anat. u. Entw., Bd. 67, 1925.
- 17) *Lattes, L.*, Virchows Arch., Bd. 211, 1913.
- 18) *Langerhans*, Virchows Arch. f. pathol. Anat. u. Physiol., Bd. 122, 1890.
- 19) *Löwenfeld*, Virchows Arch., Bd. 216, 1914.
- 20) *Mankowski*, Arch. f. mikro. Anat., Bd. 59, 1902.
- 21) *Martius, K.*, Frankf. Z. f. Pathol., Bd. 17, 1915.
- 22) *Nassonow*, Arch. f. mikr. Anat. u. Entw., Bd. 100, 1924.
- 23) *Negri*, Verhandl. d. anat. Ges., Pavia 1900.
- 24) *Oka*, Virchows Arch., Bd. 228, 1920.
- 25) *Podwysotszki u. Renaud*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 21, 1882.
- 26) *Ruppanner, E.*, Schw. med. Ws., Nr. 22, 1927.
- 27) *Schulze, W.*, Arch. f. mikro. Anat., Bd. 56, 1900.
- 28) *Ssobolew, L.*, Virchows Arch., Bd. 158, 1902.
- 29) *Sauerbeck, E.*, Virchows Arch., Bd. 177, 1904.
- 30) *Sauerbeck*, Arch. f. mikro. Anat., Bd. 59, 1902.
- 31) *Tschassownikow, S.*, Arch. f. mikro. Anat. u. Entw., Bd. 67, 1906.
- 32) *Jores, L.*, Anatomische Grundlagen Wichtigerkrankh., 1926.
- 33) *Tschassownikow*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 56, 1900.
- 34) *Visentini*, Virchows Arch., Bd. 195, 1905.
- 35) *Zimmermann, K. W.*, In Möllendorffs Handb. d. mikr. Anat. d. Menschen. Bd. 5, 1. 1927.
- 36) 明比, 近畿婦人科學會雜誌, 第12卷, 第2號, 昭和4年.
- 37) 泉, 日新醫學, 第7卷, 第6號.
- 38) 倉上, 長崎醫學會雜誌, 第3卷, 第2號.
- 39) 小林, 岡醫雜, 第503號, 第501號, 昭和6年.
- 40) 宮入, 東京醫學會雜誌, Bd. 41, 昭和2年.
- 41) 岡田, 診斷ト治療, 第17卷, 第10號, 昭和5年.
- 42) 岡田, 日本內科全書, 第3卷, 第6冊, 昭和6年.
- 43) 大森, 岡醫雜, 第483號, 昭和5年.
- 44) 緒方, 日本病理學會會誌, 第10年, 大正9年.
- 45) 白坂, 岡醫雜, 第487號, 第480號, 昭和5年.
- 46) 進藤, 岡醫雜, 第477號, 第478號, 第479號, 昭和4年.
- 47) 村山, 岡醫雜, 第490號, 昭和5年, 第494號, 昭和6年.
- 48) 陶守, 岡醫雜, 第505號, 昭和7年.
- 49) 建, 岡醫雜, 第507號, 昭和7年.
- 50) 徳光, 日新醫學, 第7卷, 第7號.
- 51) 田中, 軍醫團雜誌, 第169號, 昭和2年.
- 52) 高橋, 日本病理學會會誌, 第16年, 大正15年, 第17年, 昭和2年.
- 53) 友澤, 岡醫雜, 第458號, 昭和3年.
- 54) 宇野, 岡醫雜, 第508號, 昭和7年.
- 55) 山田, 熊本醫學會雜誌, 第3卷, 昭和2年.
- 59) 吉田, 岡醫離, 第416號, 大正13年.

附 圖 說 明

- Fig. 1. 犬正常睪
- Fig. 2. (Nr. 1) 犬ノ睪體部結紮3時間後ノ同器
尾部
- Fig. 3. (Nr. 2) 犬ノ睪體部結紮6時間後ノ同器
尾部
- Fig. 4. (Nr. 3) 同 12 時間後ノ頭部
- Fig. 5. (Nr. 3) 同 12 時間後ノ尾部
- Fig. 6. (Nr. 4) 同 24 時間後ノ尾部
- Fig. 7. (Nr. 5) 同 36 時間後ノ尾部
- Fig. 8. (Nr. 6) 同 48 時間後ノ尾部
- Fig. 9. (Nr. 8) 同 60 時間後ノ尾部
- Fig. 10. X (Nr. 10) 同 3 日目ノ頭部
- Fig. 11. (Nr. 9) 同 3 日目ノ尾部
- Fig. 12. XX (Nr. 12) 同 4 日目ノ頭部
- Fig. 13. (Nr. 12) 同 4 日目ノ尾部
- Fig. 14. (Nr. 13) 同 5 日目ノ尾部
- Fig. 15. XX (Nr. 15) 同 7 日目ノ尾部
- Fig. 16. (Nr. 16) 同 10 日目ノ尾部
- Fig. 17. (Nr. 17) 同 14 日目ノ尾部
- Fig. 18. (Nr. 18) 同 28 日目ノ尾部
- 以上「ヘマトキシリン、エオジン」染色（第4章第一節）Zeiss 7×40, X印 7×10, XX印 7×20, KL 32 cm, 「」内ノ Nr. ハ動物番號ナリ。
- Fig. 20. (Nr. 7) 犬ノ睪體部結紮後 48 時間目ノ同器頭部
- Fig. 21. (Nr. 7) 同尾部
- 以上鐵「ヘマトキシリン」染色
- Fig. 24. (Nr. 1) 犬ノ睪體部結紮後3時間目ノ頭部
- Fig. 25. (Nr. 1) 同 3 時間目ノ尾部(「ラ」氏島)
- Fig. 26. (Nr. 1) 同 3 時間目ノ尾部
- Fig. 27. (Nr. 3) 同 12 時間目ノ尾部
- Fig. 28. (Nr. 4) 同 24 時間目ノ尾部
- Fig. 29. (Nr. 5) 同 36 時間目ノ尾部
- Fig. 30. (Nr. 6) 同 48 時間目ノ頭部
- Fig. 31. (Nr. 6) 同 48 時間目ノ尾部
- Fig. 32. (Nr. 7) 同 48 時間目ノ頭部
- Fig. 33. (Nr. 7) 同 48 時間目ノ尾部
- Fig. 34. (Nr. 8) 同 60 時間目ノ尾部
- Fig. 35. (Nr. 9) 同 3 日目ノ頭部
- Fig. 36. (Nr. 9) 同 3 日目ノ尾部
- Fig. 37. (Nr. 10) 同 3 日目ノ尾部(「ラ」氏島)
- Fig. 38. (Nr. 11) 同 4 日目ノ尾部
- Fig. 39. (Nr. 13) 同 5 日目ノ尾部
- Fig. 40. (Nr. 14) 同 7 日目ノ尾部
- Fig. 41. (Nr. 16) 同 10 日目ノ尾部
- Fig. 42. (Nr. 17) 同 14 日目ノ尾部
- Fig. 43. (Nr. 18) 同 28 日目ノ尾部
- 以上 Cajal 氏法ニヨル（第4章第5節）Golgi 氏裝置 Zeiss 7×40, KL 32 cm.
- Fig. 19. (Nr. 13) 同 5 日目ノ尾部「マロリー」氏染色（第4章第2節）
- Fig. 22. (Nr. 17) 犬睪體部結紮後 14 日目ノ尾部「ズダン」染色（第4章第4節）
- Fig. 23. (Nr. 18) 犬睪體部結紮後 28 日目ノ尾部「ズダン」染色（第4章第4節）

友澤論文附圖

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

友澤論文附圖

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

友澤論文附圖

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.

友澤論文附圖

Fig. 38.

Fig. 39.

Fig. 40.

Fig. 20.

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 19.

Fig. 23.