7.

611.37:611.83

迷走神経切断後ノ膵臓諸細胞ノ變化ニ就テ

岡山醫科大學解剖學教室（主任八木田教授）

友澤辰治郎

[昭和8年12月6日受稿]

*Aus dem anatomischen Institute der Okayama medicinischen Fakultät
(Vorstand: Prof. Dr. K. Yagita).*Über die Veränderung des Pankreas nach Durchschneidung
der beiderseitigen Nn. vagi.

Von

Tatsujiro Tomozawa.

Eingegangen am 6. Dezember 1933.

Bei Kaninchen durchschnitt der Verfasser die beiderseitigen Nn. vagi einerseits im Halse, anderseits unterhalb des Zwerchfells, und tötete die Tiere nach der ersten Operation sofort oder nach 10, 30 u. 60 Minuten sowie nach 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 24, 30 und 36 Stunden, während er nach der zweiten Operation die Tiere 2, 3, 5, 7, 10, 15, 28 und 42 Tage weiter leben liess. Dann nahm er ihre Pankreas heraus und untersuchte diese mit der Malloryschen, Eisenhämatozylin- und Sudan III- Färbung sowie mit der Cajal-schen Methode. Ausserdem legte er bei Kaninchen die Nn. vagi unterhalb des Zwerchfells bloss, ohne sie zu durchschneiden und tötete die Tiere nach 30 und 60 Minuten sowie nach 3 Stunden, um ihre Pankreas als Kontrollmaterial zu untersuchen. Daraus ergibt sich das Folgende:

1. Wenn man bei Kaninchen die beiderseitigen Nn. vagi im Hals oder unterhalb des Zwerchfells durchschneidet, so fällt das Pankreas derselben Veränderung anheim, aber diese tritt nach der Operation im Halse etwas früher auf.

2. Was die Veränderung der einzelnen Pankreasteile anbetrifft, so kommt die der Langerhansschen Insel zuerst zum Vorschein, dann die der Acinuszellen, während die der Zentral- und Schaltstückzellen dazwischen in die Erscheinung tritt. Doch ist der Veränderungsgrad in den Inselzellen am schwächsten im Gegensatz zu den Acinus-

zellen, die der stärksten Beschädigung anheimfallen.

3. Nach Durchschneidung des Halsvagi entwickelt sich der Golgische Apparat in den Pankreaszellen zuerst und zeigt nach einer Stunde die maximale Entwicklung, um dann allmählich in den Hintergrund zu treten und nach 18 Stunden nur als zerstreute Granula zu bleiben, obwohl er sich im weiteren Verlauf der Zeit etwas wiederherstellt.

4. Auch nach Durchschneidung der beiderseitigen Vagi unterhalb des Zwerchfells zeigt der Golgische Apparat in den Pankreaszellen zuerst eine Entwicklung, die nach 3 Stunden ihre Maximum erreicht. Dann reduziert sich der Apparat allmählich und wird nach 3 Tagen am undeutlichsten, um dann sich wieder etwas zu entwickeln.

5. Die Zymogenkörnchen nehmen an der 5.-12. Stunde nach Durchschneidung der beiderseitigen Vagi zu, aber dann allmählich ab, indem sie sich trüben und zerstreuen. Am 15. Tage nach Operation werden sie am spärlichsten, um dann wieder etwas zahlreicher zu werden.

6. Die Mitochondrien nehmen bald nach der Operation ab und verschwinden nach Verlauf von 2-3 Stunden gänzlich, aber nach 2 Tagen treten sie wieder allmählich zutage und werden nach 15 Tagen am zahlreichsten im Gegensatz zu den Zymogenkörnchen, die zu dieser Zeit am spärlichsten werden.

7. Die Basallamellen treten nach Verschwinden der Mitochondrien in den Hintergrund, aber kommen wieder zum Vorschein, ehe dieselben sich entwickeln.

8. Der Kern zeigt von der 8. Stunde nach der Operation an abnorme Erscheinungen wie Teilung, Auflösung, Schrumpfung etc. Fast gleichzeitig treten Vakuolen im Zellleib auf, während das interazinäre Bindegewebe eine Wucherung erfährt. Diese Erscheinung wird allmählich deutlicher, aber tritt wieder in den Hintergrund, wenn der Kern sich wiederherstellt.

9. Im Präparat der Malloryschen Färbung färben sich die Zymogenkörnchen durch Säurefuchsin am intensivsten, darauf folgen die Basallamellen, aber die Körnchen färben sich mit dem Zellkörper vielmehr mit Orange, wenn sie sich trüben. Der Kern wird im allgemeinen durch Orange oder Anilinblau gefärbt, doch färbt sich der der Inselzelle blauer als der der Azinuszelle. Nach Durchschneidung der Nn. vagi wird das Pankreas beim Kaninchen anämisch und verkleinert sich allmählich, wobei auch der Acinus dasselbe Schicksal erfährt, wenn auch er enfangs eine Zeit lang etwas anschwillt.

Aus den genannten Tatsachen kommt der Verfasser zum folgenden Schluss :

a. Nach Durchschneidung der Vagi hat die Sympathicuswirkung die Oberhand, aber die spärlichen sekretionsbefördernden Fasern im Sympathicus wirken später auf das Pankreas den zahlreichen Sekretionshemmenden Sympathicusfasern entgegen, was die Funktion des Pankreas etwas zur Wiederherstellung bringt, obwohl diese nicht die Vollständigkeit erreicht.

b. Der Verfasser ist der Meinung, dass die Basallamellen die Quelle der Mitochondrien darstellen, die ihrerseits die Anlage der Sekretgranula sind.

c. Die Mitochondrien gehen auf dem Wege des Golgischen Apparates zu den Zymogenkörnern über.

d. Die Langerhanssche Insel steht mit dem Pankreasazinus in inniger Beziehung, sodass sie kein selbständiges Organ darstellt. (Kwze Inhaltsangabe).

目 次

第1章 緒 言	第3節 横隔膜下ニ於テ迷走神経ノ全部ヲ切断 セシ後ノ脾所見 (乙)
第2章 文 獻	
第3章 實驗材料並ニ實驗方法	第5章 總括並ニ考按
第4章 實驗成績	第6章 結 論
第1節 横隔膜下ニテ單ニ食道周圍ノ迷走神経 ヲ現シ之ヲ切断セザリシモノノ脾所見	主要文獻
第2節 頸部ニ於テ兩側迷走神経ヲ切断セシ後 ノ脾所見 (甲)	附圖説明

第 1 章 緒 言

自律神経ノ緊張状態ハ内分泌腺ノ機能ヲ左右シ、反對ニ内分泌腺「ホルモン」ハ自律神経系ニ影響ヲ及ボス。脾臓ノ副交感神経ナル迷走神経(N.V.)ヲ刺激スレバ、Insulinノ分泌ヲ盛ナラシメ、血糖ノ著シキ減少ヲ來ス。又Insulinノ分泌強盛ナル時ハ迷走神経過敏トナリ、顯著ノアツシュネル氏現象、呼吸性不整脈ノ出現、血壓下降及ビ呼吸緩徐ヲ來ス。又自律神経ハ反射的ニ諸臓器ノ作用ヲ促進ス此反射ハ必ず遠心性ニ自律神経ニヨリテ傳達セララルモノニシテ、例之口腔ノ味覺刺激ハ舌咽神経及ビ舌神経ヲ經テ、延髓ノ唾液腺ニ、更ニ顔面神経、鼓索神経ヲ介シテ唾液ニ達シ、茲ニ唾液ノ分泌ヲ來スモノトス。其ノ他自律神経ハ大脳ヨリノ影響、又ハ知覺刺激

ニヨリテ興奮スルコト多シ。一般ニ自律神経ノ分佈ヲ受ケ居ル臓器及ビ組織ハ、殆ド常ニ交感神経ト副交感神経トノ支配ヲ受ルモノニシテ此兩神経ノ作用ハ殆ド常ニ頷頷のナリ、然レドモ兩者ガ時トシテ臓器ノ官能ニ對シテ共同的ニ作用スル事アリ。

脾臓ハ迷走神経及ビ上内臓神経ノ支配ヲ受クルモノニシテ、迷走神経中ニハ知覺纖維ノ外ニ副交感神経纖維ヲ含ミ、其ノ刺激ハ旺盛ナル分泌ヲ來ス、然レドモ迷走神経中ニモ分泌抑制纖維ガ混在スルモノトス。交感神経モ亦多少分泌ニ作用ヲ及ボス。

Scaffidiニヨレバ迷走神経ハ脾酵素ノ發生ヲ調節シ、其ノ分泌ヲ抑制シ、交感神経ハ其ノ分泌ヲ促進スト。即チ犬ニ於テ迷走神経ヲ

刺戟スレバ、始メ膵細胞内分泌顆粒ノ減少ヲ來シ、後ニハ其ノ増加ヲ見ルニ反シ交感神経ノ刺戟ハ先ヅ分泌顆粒ヲ増加セシムルモ、其ノ後ニ減少ヲ來スト。

膵臓ノ神経ハ動脈管ニ沿ヒテ進入シ、無數ノ小神経叢ヲ構成シ、且其ノ經過中多數ノ小神経節ヲ介在セシムルモノニシテ、大部分ハ無髓ノ神経纖維ヨリナル。

延髓ノ刺戟ニヨリテ、膵分泌ガ亢進スルハ既ニ Heidenhain 氏ガ證明セシコロニシテ、Pawlow 及ビ其ノ門下 Sawitsch, Babkin 氏等ハ、迷走神経ガ膵分泌神経ナル事ヲ確メ、更ニ Pawlow, Sawitsch, Modraskowski 等ハ此迷走神経ノ膵分泌作用ハ Atropin ニヨリテ全然停止セラルルコトヲ證明セリ。然レドモ Bayliss und Starling 兩氏ハ酸性ノ胃内容ガ十二指腸ニ入ル時ハ、膵分泌ヲ亢進セシムルコトヲ認メ、迷走神経ノ膵分泌作用ハ胃運動亢進ニ續發スルガ故ニ同神経ヲ膵分泌神経ナリト速斷シ難シト云ヘリ。然レドモ十二指腸ヲ幽門ヨリ切斷スルモ尚ホ迷走神経刺戟ニヨル膵分泌作用ガ消失セザルガ故ニ迷走神経ガ膵分泌神経ナルハ疑ナキ所トス、加之、中川、垣田、松本氏等ハ全小腸ヲ剔出シタル後ニモ、迷走神経ノ膵分泌作用ヲ證明シ、同神経ノ直接分泌作用アル事ヲ確メタリ。

Popielski 氏ハ 1 側迷走神経ヲ刺戟シテ、膵分泌亢進ヲ起セシ時ニ、他側迷走神経ヲ刺戟スレバ、其ノ分泌ハ抑制セラレ、又 1 側迷走神経ヲ反覆刺戟スル場合ニモ、前刺戟ニヨリテ亢進セシ分泌ハ次ノ刺戟ニヨリテ抑制セラレ、時トシテハ全然阻止スル事ヲ見タリ、此分泌停止時間ハ 2 分以上ニ出ズルコトナク

又此抑制作用ハ神経刺戟開始後 5—7 秒ニテ現ルト。

Epinger, Falta, Rudinger ノ 3 氏ハ Adrenalin ニヨル過血糖ガ, Pilocarpin ニヨリテ阻止セルル事實ニ基キ迷走神経ハ、膵内分泌ヲ亢進セシムル作用アリトセリ。之ニ反シテ、Frank und Issak 氏ハ Adrenalin 過血糖ハ、「ヒヨリン」又ハ Pilocarpin ニヨリテ阻止セラレズトシ、迷走神経ノ膵内分泌作用ヲ否定セシモ、de Corral ハ迷走神経ノ膵臓枝ヲ破壊シタル後、迷走神経ヲ刺戟スレバ血糖下降ヲ來スト報告シ、星氏ハ犬、家兎ニ於テ迷走神経ノ刺戟ハ血糖ヲ下降セシムル事實ヲ確メ、更ニ吳氏ハ迷走神経ヲ興奮セシムル「ピロカルピン」及ビ「ヒヨリン」ノ投與ガ必ズシモ血糖ノ下降ヲ來サザル事アルハ之等薬剤ガ、Adrenalin 分泌ヲモ亢進セシムルガ故ニシテ。即チ同時ニ副腎及ビ膵ノ内分泌ガ盛ントナルニ基クナル可シト。加之 Adrenalin ヲ血中ニ輸入スル時膵内分泌ノ亢進ヲ來スハ Loewi, Geiger, 及ビ星氏ノ證明セシ處ニシテ、此内分泌亢進ハ Atropin 投與又ハ迷走神経胸腔内切斷ニヨリテ阻止セラルト、更ニ氏等ハ Insulin ノ注射ガ Adrenalin ノ分泌ヲ亢進セシムル事ヲモ見タリ。

最近建氏ハ家兎ニ Kcl 或ハ CaCl ヲ注射シ又ハ迷走神経興奮劑ナル Pilocarpin 竝ニ Insulin, 及ビ交感神経興奮劑ナル Adrenalin ヲ各別ニ注射シ、膵細胞内 Golgi 氏装置ノ變化ヲ探究シ、或ハ、胆汁鬱滯ニ依ル膵臓細胞ノ組織學的變化ヲ報告セリ。

然ルニ迷走神経切斷後ノ膵諸細胞ノ變化ヲ檢セシハ Scaffidi ノミニシテ、而モ氏ノ研究

ハ主トシテ生理學的方面ニ屬スルガ故ニ、余ハ此變化ヲ精確ニ知ラント欲シ、上坂博士指

導ノ下ニ、組織學的方面ヨリ此問題ヲ攻究シ、茲ニ其ノ成績ヲ報告セント欲ス。

第 2 章 文 獻

腺ノ神経分布ニ關スル生理學的研究ハ Heidenhain 及ビ其門下ニヨリテ着手セラレ、次デ Pawlow (1888) 及ビ Mett (1894) ハ腺ニ分布スル迷走神経中ニハ、分泌促進纖維ト分泌抑制纖維トノ 2 種アル事ヲ證明セリ。

Kudreweski ハ交感神経ニモ血管運動纖維ト、分泌纖維アル事ヲ發見セリ。Pawlow ニ據レバ腺交感神経ヲ刺激スル時ハ血管運動纖維ノ作用偏勝シ、分泌抑制サルモ、交感神経ヲ切断シ、該纖維ヲ變性セシメ次デ末梢斷端ヲ刺激スル時ハ分泌纖維ノ作用ガ現ルルト。

Scaffidi (1907) ハ犬ニ就テ、迷走神経ヲ刺激スル時ハ、初メニハ腺分泌顆粒ノ減少、後ニハ其ノ増加ヲ來シ、交感神経ヲ刺激スル時ハ初メ同顆粒ハ増加シ、後ニハ減少スル事ヲ認メタリ、

Glaser (1926) ハ白鼠ニ Thyroxin ヲ注射シ、Heidenhain (1878) 及ビ他ノ研究者ガ飢餓動物ノ腺ニ於テ見タル同様ニ内分泌及ビ外分泌ガ數量的ニモ、亦性質的ニモ變化スルヲ見テ、Thyroxin ガ腺ニ及ボス作用ハ營養缺乏ニヨル第二次的變化ナリトセリ。

最近藤井氏 (1933) ハ腺ノ神経支配ニ關シ詳細ナル研究ヲ遂ゲ、曰ク、大内臓神経中ニアル交感神経纖維ハ腺血管ヲ收縮セシメ、腺液分泌ヲ抑制スルモ、同神経中ニ混在セル脊髄副交感神経纖維ハ腺血管ヲ擴張セシメ、其ノ分泌ヲ促進ス、且此纖維ノ刺激ハ素來ニ富メル分泌ヲ出サシムト。他方迷走神経内ニハ腺液ノ分泌ヲ抑制スル纖維モ混在セリ、是レ交感神経纖維ナリ。

腺管ハ大内臓神経中ノ交感神経纖維ニヨリテ收

縮シ、脊髄副交感神経纖維ニヨリテ輕度ニ擴張ス。而シテ迷走神経ノ刺激ニヨリテ初期ニハ腺管ハ收縮スルガ是レ同神経中ニ含マルル交感神経纖維ノ作用ナリト云ヘリ。又谷島氏 (1933) モ脊髄副交感神経刺激ハ腺管内分泌機能ヲ充進セシムルコトヲ證明シ、Scaffidi ノ組織學的檢査ト一致セル成績ヲ得タリ。

建氏 (1932) ニ據レバ家兎ニ Cu ヲ反覆注射スル時ハ、腺臓實質細胞ノ Golgi 氏裝置ハ注射 25 日目頃迄ハ漸次増量シ、其ノ以後ハ漸次減少ス、之ニ反シ K ヲ反覆注射スル時ハ腺臓實質細胞ノ Golgi 氏裝置ハ、最初漸次縮小シ、注射 25 日目頃ニ最モ幽微トナリ、其ノ以後ハ再び漸次著明トナル。「ラ」氏島細胞ノ Golgi 氏裝置ハ注射日數ニ比例シテ Cu ノ場合ハ増量シ、K ノ場合ハ漸次減少ス、其ノ理由ハ恐クハ Cu 注射ノ場合ニハ細胞中ノ Cholesterol 増量シ、K 注射ノ場合ハ細胞中ノ Lecithin 量増量スルニ由ルナランモ、K 注射久シキニ亙ル時ハ Lecithin ノ増量ニ伴ヒ之ニ對抗セン爲 Cholesterol モ多量ニ製造サルルニ至ルガ故ニ腺臓實質細胞ノ Golgi 氏裝置ガ却テ發育スルモノナラント、岡本同氏ハ家兎ニ於テ輸膽管ヲ結紮スル時ハ、腺臓「ラ」氏島ノ Golgi 氏裝置ハ一時稍々著明トナルモ、其ノ後ハ經過日數ニ比例シテ漸次崩潰シ、細顆粒狀トナリ遂ニ消失ス、而シテ實質及ビ島ノ細胞ハ術後ノ經過日數ニ比例シテ核ト共ニ益々膨大シ、島細胞ノ核ハ一般ニ染色不良トナリ、球形ヲ帶ビ實質細胞ハ溶解、或ハ崩潰セントスルガ如キ狀ヲ呈スルヲ見タリ。

第 3 章 實驗材料並ニ實驗方法

實驗動物トシテ 1500 g 乃至 2000 g ノ健康ナル家兎ヲ用ヒ、迷走神經ノ切斷ハ一部ハ頸部ニ於テ（以下之ヲ單ニ甲トス）、一部ハ横隔膜下ニ於テ（以下之ヲ單ニ乙ト呼ブ）之ヲ行ヘリ。即チ甲ニ於テハ頸部正中線ニ於テ皮膚ヲ切開シ、氣管ノ側方ニ於テ頸動靜脈ノ間ニ迷走神經ヲ露出セシメ、兩側共約 1 cm 長之ヲ切除セリ、次デ型ノ如ク皮膚縫合ス。本手術ハ約 5 分乃至 10 分間ニテ之ヲ行ヒ得ルモ、呼吸及ビ循環ニ障礙ヲ起シ、術後 36 時間以上動物ヲ生活セシムル事困難ナルガ故ニ術後長時間經過セシモノノ狀ハ乙ニ於テ檢セリ。乙ニ於テハ横隔膜下ニテ食道周圍ノ迷走神經ヲ全部切斷セリ。猶ホ對照トシテ開腹シ、食道ノ周圍ニ於テ單ニ迷走神經ヲ露出セシメ之ヲ

切斷セザリシモノノ所見ヲモ檢シタリ。頸部ニテ迷走神經ヲ切斷セシモノハ、術後直ニ、或ハ 10 分、30 分、1 時間、2 時間、3 時間、5 時間、8 時間、10 時間、15 時間、20 時間、24 時間、30 時間及ビ 36 時間ヲ經テ動物ヲ殺シ、横隔膜下ニテ迷走神經ヲ切斷セシモノハ、2 日、3 日、5 日、7 日、10 日、15 日、28 日及ビ 42 日ノ後動物ヲ殺シタリ。

動物ノ死後直チニ其ノ臍臟ヲ摘出シ、1) Hämatoxylin-Eosin 染色、2) Mallory 氏 Säurefuchsin-Phosphormoribdensäure-Anilinblau-Orange 染色、3) 鐵「ヘマトキシリン」染色、4) Cajal 氏法、5) Sudan III 染色ヲ施シ之ヲ檢セリ（岡醫雜 524 號、2178 頁參照）。

第 4 章 實 驗 成 績

第 1 節 横隔膜下ニテ單ニ食道周圍ノ迷走神經ヲ現シ之ヲ切斷セザリシモノノ臍所見

Nr. 1. 術後 30 分ニテ殺セシモノ、各細胞ハ整然排列シ染色美麗ナリ、腺房細胞ノ Zymogenkörnchen ハ其ノ量少ク内方ニ集リ、腺房内腔ニハ「チモーゲン」顆粒ト同色ニ染色セル濃厚ノ分泌物多量存在セリ、「ラ」氏島ニ於テモ「チモーゲン」顆粒ヨリ小ナレドモ之ト類似ノ多數ノ顆粒ヲ認ム。

Mitochondrien (M.) ハ何レノ細胞ニモ多ク、殊ニ腺房細胞ニハ著シク多數ニ存在シ、核ノ周圍ニ於テ細胞體全部ニ蔓延セリ (Fig. 17)。

Golgischer Apparat ハ腺房細胞ニテハ、微小ノ細絲毯狀ヲ呈シ、「ラ」氏島細胞ニテハ微細顆粒ノ

撒布セル狀ヲ呈シ幽微ナリ。

Nr. 2. 術後 1 時間ニテ殺セシモノノ所見、「チモーゲン」顆粒ハ頗ル僅少ニシテ、腺房内腔ニモ分泌物ヲ認メズ。Mitochondrien ハ多數ナレドモ Nr. 1. ヨリハ少シ。Golgischer Apparat ハ腺房細胞ニ於テハ Nr. 1. ヨリ稍々著明ナレドモ、「ラ」氏島細胞ニテハ同様幽微ナリ。

Nr. 3. 術後 3 時間ニテ殺セシモノノ所見。Golgischer Apparat 及ビ Zymogenkörnchen ノ狀態ハ normal ノモノニ近似セルモ稍々幽微ナリ、然レドモ Nr. 1. 及ビ 2. ニ比スレバ著明ナリ、之ニ反シ Mitochondrien ハ normal ノモノヨリモ多量ニシテ著シク發育セリ。

Sudan 染色ニテハ、何レノ實驗ニ於テモ脂肪變性ノ狀ヲ認メズ。

頸部ニテ兩側迷走神経ヲ切断セシ動物ハ、術後直ニ心搏數ノ増加ヲ示シ、且呼吸困難ノ狀ヲ呈シ、食慾全クナク、多クハ30時間乃至36時間ニシテ死亡シ、早キモノハ術後13時間ニシテ死亡シタリ。

腹部ニテ迷走神経ヲ全ク切断シタル動物ハ術後數時間ニシテ元氣ヲ回復シ、爾後活潑ニ運動シ、42日後ニ於テモ外見異狀ヲ認メザリキ、開腹ニ際シ膵ハ術後ノ日數ニ應ジテ白色ヲ帶ビ、且縮小セリ。

第二節 頸部ニ於テ兩側迷走神経ヲ切断セシモノノ膵所見 (以下之ヲ「甲」ト稱ス)

Nr. 4. 切断直後ノ所見。膵房細胞ノ Zymogenkörnchen ハ稍々増加シ、Basallamellen ノ發育佳良ナリ。Mitochondrien ハ之ニ反シ極メテ尠ク、Zymogen 顆粒ニ富マザル膵房細胞ニ於テハ、核ノ外側、即チ胞體底部ニ僅ニ之ヲ見ルノミ (Fig. 1)。「ラ」氏島細胞ニ於テモ Mitochondrien ハ極メテ幽微ナリ。Golgischer Apparat ハ何レノ細胞ニ於テモ著明ニ現出シ、膵房細胞ニ於テハ其ノ内半部ニ籠狀網工ヲ形成シ、「ラ」氏島細胞ニ於テハ核ニ接在シ、或ハ之ヲ圍繞シ、或ハ其ノ1側ニ於テ顆粒狀又ハ絲狀網工トナツテ現ルヲ見ル。(術後5分及ビ10分ニテ殺セシモノノ所見ハ、術後直後ノモノト大差ナキヲ以テ省略ス)。

Nr. 5. 術後30分ニテ殺セシモノノ所見。膵房細胞ノ Zymogen 顆粒ハ稍々増加シ、膵房腔ハ稍々擴張シ、内ニ分泌物ヲ充タセリ。Basallamellen ノ發育殊ニ著明ニシテ、Zymogenkörnchen ト同様ニ染色セリ。Mitochondrien ハ Nr. 4. ヨリモ更ニ尠シ。核ハ Mallory 氏法ニテハ Fuchsin ニテ赤染シ、或ハ Orange ニテ黃色ニ染色シ、或ハ Blau ニ染色シ、或ハ中間ノ狀ニ染色セルモノアリテ、其ノ所

見一定セズ。「ラ」氏島ノ核モ或ハ黃染シ、或ハ青染セリ、同島細胞中ニアル微細ノ纖維及ビ顆粒ハ「チモーゲン」顆粒ヨリモ Blau ニ染色シ著明ナリ。Golgi 氏裝置ハ「ラ」氏島細胞ニ殊ニ著明ニ現ル、核ヲ $\frac{2}{3}$ 包圍セルモノ多シ、之ニ反シ「ラ」氏島ノ Mitochondrien ハ之ヲ認ムル能ハズ。

Nr. 6. 術後1時間ニテ殺セシモノノ所見。膵房細胞ノ Zymogenkörnchen ハ Nr. 5. 同様稍々多クシテ細胞ノ内 $\frac{2}{3}$ 帶ヲ占メ、(Fig. 31) 膵房内腔ハ稍々擴大セリ、Basallamellen ハ著シク發育シ、核ヲモ圍繞セル事多シ、M. ハ Nr. 4. ヨリモ稍々多クレドモ頗ル幽微ナリ (Fig. 15)。核中稍々萎縮濃染セルモノアリ。「ラ」氏島細胞ノ核ハ淡染シ、膵房細胞ノモノヨリモ稍々大ナリ。膵房中心細胞ノ核ハ其ノ中間ニ位ス。Golgi 氏裝置ハ極メテ著明ニ發育シ、膵房細胞ニテハ核ノ内方ニ於テ籠狀網工ヲ形成シ、「ラ」氏島ニテハ核ノ周圍ニ甚ダ著明ナル網工ヲ形成セリ (Fig. 2)。Mallory 氏染色ニテハ「ラ」氏島細胞ノ顆粒及ビ纖維ハ甚ダ微細ナルモ、膵房細胞ノ Zymogenkörnchen 及ビ Basallamellen ニ酷似セリ。

Nr. 7. 術後3時間ニテ殺セシモノノ所見。膵房内腔ハ擴大シ、個々ノ細胞ハ分離シ、細胞間間隙ヲ生ジ、(Fig. 23) 中心細胞ハ、其ノ數ヲ増シ、其ノ核ハ Basallamellen ニテ圍繞サルヲ見ル。「チモーゲン」顆粒ハ胞體ノ全部ニ蔓延セル事アルモ密ナラズ、斯ル細胞ニテハ Basallamellen 狹シ、之ニ反シ「チモーゲン」顆粒ノ少キ細胞ニテハ Basallamellen ノ發育著明ナリ。M. ハ殆ド之ヲ認ムル能ハズ、只「チモーゲン」顆粒ノ稍々少キ細胞ニ於テ極ク少數ノ點狀 M. ヲ見ルノミ。核ハ膵房細胞ニ於テモ、「ラ」氏島細胞ニ於テモ黃或ハ青色ニ着色セルモ、膵房細胞ニハ黃染セルモノ多ク、「ラ」氏島細胞ニテハ青染セルモノ多シ、「ラ」氏島細胞中ニ微細ノ顆粒及ビ纖維ヲ著明ニ認ム。Golgi 氏

装置ハ一般ニ幽微トナレルモ、「ラ」氏島ニテハ尙ホ稍々著明ナル網工、或ハ顆粒トナツテ存在セルヲ見ル。

Nr. 8. 術後5時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ノ核ハ増量セル「チモーゲン」顆粒ノ爲メ胞體基底部分ニ壓迫サレ、汚穢ニ染色セリ。細胞間々隙現出シ、個々ノ細胞ヲ能ク區別シ得ベシ。中心細胞ハ其ノ數ヲ増シ「ラ」氏島ノ小ナルモノ群在セリ、腺房細胞ノ Basallamellen ハ其ノ幅ヲ増セルモ、細胞ノ中心部迄ニ達セズ。「ラ」氏島細胞中ニ多クノ微細纖維著シク現出シ、核ヲ圍繞シ胞體全部ニ平等ニ蔓延セリ。M. ハ何レノ細胞ニモ殆ド之ヲ認ムル能ハズ。腺房間結締組織ハ著明ニ増殖セルモ、「ラ」氏島周圍ノ結締組織ハ之ヲ見ザル事多シ。Golgi 氏装置ハ、何レノ細胞ニ於テモ Nr. 7. ヨリ著明ニ現在セルモ顆粒狀ノモノ多シ。

Nr. 9. 術後8時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ノ「チモーゲン」顆粒ハ増加シ、胞體全部ニ擴散シ、核ヲ基底部分ニ壓セリ、然レドモ溷濁シ胞底ニハ空泡ヲ生ゼリ。Basallamellen ハ細胞基底部分ニ存在スルモ、發育不良ニシテ極ク少數ノ M. 其ノ間ニ介在セリ。「ラ」氏島細胞ノ核ハ大小種々ニシテ分裂ノ狀ヲ呈セルモノアリ、同細胞ノ微細顆粒ハ腺房細胞ノ「チモーゲン」顆粒同様ニ溷濁セリ。Golgi 氏装置ハ何レノ細胞ニ於テモ幽微トナレリ。

Nr. 10. 術後12時間ニテ殺セシモノノ所見。肉眼的ニ脾臟ハ稍々縮小シ、帶白色ヲ呈セリ。腺房細胞ハ縮小シ其ノ排列稍々亂レ胞體內ニ多數ノ空泡ヲ有セリ、殊ニ胞體基底部分ニハ多クノ空泡アリ、爲ニ同部ハ網狀トナリ、破壊セルガ如ク見ユ (Fig. 24)。腺房細胞ノ「チモーゲン」顆粒ハ増加シ、胞體全部ニ擴散セルモ染色汚穢ニシテ trüben シ Basallamellen ヲ見ル能ハズ (Fig. 32)。M. モ認め難シ、核ハ尙ホ正常ノ形狀ヲ保テルモノアレド

モ多クハ、骰子形、不正形、或ハ半月形ニシテ分裂又ハ融解ノ狀ヲ呈セルモノアリ。「ラ」氏島細胞中ノ微細ノ顆粒及ビ纖維ハ増加スレドモ trüben セリ、同細胞ノ核ハ aufquellen シ大トナレルモ、其ノ形狀ハ種々ナリ。其ノ Golgi 氏装置ハ普通ノ位置ヲ保テルモ、腺房細胞ニテハ亂レ且減少セリ (Fig. 3)。 (術後15時間ニ於テ殺セシモノノ所見ハ Nr. 10. ト Nr. 11. トノ中間像ナルガ故ニ之ヲ省略ス)。

Nr. 11. 術後18時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ハ其ノ排列亂レ胞體內ニ大小多數ノ空泡ヲ有セリ (Fig. 25)。殊ニ胞體ノ Basalteil ハ殆ド空泡ヲ以テ充タサレ網狀トナリ、Basallamellen 及ビ M. ヲ見ル能ハズ。Zymogenkörnchen ハ増加セルモ trüben シ染色汚穢ニシテ胞體全般ニ溷濁セリ、核ハ三角形、骰子形、三日月形、又ハ不正形ニシテ分裂又ハ融解ノ像ヲ呈ス。之ニ反シ中心細胞ノ核ハ一般ニ橢圓形ニシテ大ナリ。「ラ」氏島細胞中ニハ微細ナル顆粒及ビ纖維多量ニ存スルモ不規則ニ排列シ、溷濁セル狀ヲ呈セリ、且細胞ノ排列モ不規則ニシテ、胞體內ニハ空泡ヲ有セリ、但シ此空泡ハ八木氏ノ所謂空泡ト異ニシテ細胞ノ退行變性ニ由テ生ジタル事明カナリ。

核ハ分裂、融解、萎縮ノ狀ヲ呈スルモノアルモ、Sudan 染色上細胞ハ脂肪變性ヲ示サズ。Golgi 氏装置ハ著シク亂レ網工ノ狀ヲ失ヒ、顆粒トナツテ飛散シ減少セリ。但シ「ラ」氏島細胞中ニアルモノハ尙ホ固有ノ形狀ヲ保有セル事アリ (Fig. 4)。

Nr. 12. 術後24時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ハ其ノ排列亂レ、胞體內ニ多數ノ空泡ヲ有セリ (Fig. 26)。「チモーゲン」顆粒ハ増加シ、胞體全部ニ擴散セル事多キモ、不規則ニ排列シ、且 trüben セリ。Basallamellen ハ増幅シ、細纖維狀ノ空泡間細壁ト共ニ核ヲ圍ミ Zymogenkörnchen ト接スルニ至レリ。腺房間結締組織ハ著シク増殖セ

リ (Fig. 33). 「ラ」氏島細胞ニハ核ヲ圍繞スル微細纖維ノ網狀構造ヲ見ル事アレドモ、多クハ多量ノ微細顆粒ト空泡トヲ含メリ、「ラ」氏島周圍ニハ著明ナル結締織ヲ認メズ。M. ハ何レノ細胞ニモ認メ難シ (Fig. 16). 核ハ腺房細胞ニ於テモ「ラ」氏島細胞ニ於テモ概ネ變形シ、或ハ萎縮シ、或ハ分裂シ、或ハ融解セリ。但シ脂肪變性ハ認メズ。Golgi 氏裝置ハ極メテ幽微ニシテ、主トシテ核ト腺房內腔トノ間ニ存シ、其ノ顆粒ハ一部ハ胞底及ビ內腔ニ飛散セリ。但シ「ラ」氏島細胞ノ裝置形素ハ規則正シク排列シ、尙ホ核ノ全圍又ハ半周ヲ圍繞セルモノアリ (Fig. 5).

Nr. 13. 術後 30 時間ニテ殺セシモノノ所見.

Nr. 12. ト同様、腺房細胞内ニハ大小多數ノ空泡アリテ細胞ノ排列亂レ、核ノ位置不定ナリ.

核ハ分裂、融解、萎縮ノ狀ヲ示シ、「チモーゲン」顆粒ハ瀾濁シテ胞體ノ全部ニ漏散シ、染色汚穢ニシテ各細胞ノ境界判然セズ (Fig. 27). M. ハ認メ難ク、細胞底部ニアル多量ノ微細纖維狀物ハ Basallamellen ト異ナリテ Protoplasma ノ遺殘物ナルガ如シ。中心細胞ノ核ハ融解セントセルモノ多ク、潤管ハ著シク擴大シ、腺房間結締織ハ殊ニ著シク増殖セリ。「ラ」氏島細胞内ノ微細顆粒ハ纖維狀ニ排列シ、核ヲ圍繞スレドモ著シク瀾濁セリ。同細胞ノ核ハ著シク萎縮セルモノ多シ。Golgi 氏裝置ハ概ネ著シク減量シ、空泡間ニ不規則ニ放散セル顆粒狀物トシテ殘留スル事多キモ、「ラ」氏島細胞ニハ尙ホ稍々著明ナル裝置ヲ見ル事アリ.

Nr. 14. 術後 36 時間ニテ殺セシモノノ所見.

肉眼的ニハ膵臟ハ縮小シ、著シク白色ヲ帶ビ貧血狀態ヲ呈セルモ、血管ノ經過分明セリ。腺房細胞中ニハ大小多數ノ空泡、前例ヨリモ更ニ増加シ、細胞排列ハ益々混亂シ、不規則ノ狀ヲ呈シ、腺房間結締織ハ増殖セリ。細胞底部ニアル多數ノ微細纖維狀物ハ結締纖維ナルカ、將又 Basallamellen

ナルカ、Protoplasma ノ遺殘ナルカ判然セズ、胞體ノ上部ニアル Zymogenkörnchen ハ疎在シ、瀾濁シ、染色不良ナリ (Fig. 34). 核ハ分裂、融解、或ハ萎縮ノ狀ヲ示シ、其ノ内容ノ一部ガ脫出セルガ如キモノアリ、M. ハ認ムル能ハズ。中心細胞ノ核ハ腺房細胞ノ核ヨリモ著シク變形セル事多シ。腺房內腔ニハ多量ノ分泌物ヲ見ル事アリ。「ラ」氏島細胞ノ細纖維網工ハ多量ナルモ瀾濁セリ。一般ニ「ラ」氏島ノ細胞ハ腺房ノモノヨリモ Mallorysches Gemisch ニ染色シ易キモ Fuchsin ニ對シテハ Zymogenkörnchen 最モヨク染色シ、Basallamellen 之ニ次グ。Golgi 氏裝置ハ細胞内ニ現出セル多數ノ空泡ニヨリテ壓セラレ、減少シ顆粒狀物トナリテ殘留セルノミ、「ラ」氏島細胞ニ於テモ、裝置ハ多クハ顆粒狀物ヨリナリ不規則ニ散亂セルモ、時トシテ核ノ周圍ニ稍々著明ノ裝置ヲ見ル事アリ (Fig. 6).

第 3 節 横隔膜下ニ於テ迷走神経ノ全部ヲ切斷セシモノノ膵所見

(以下之ヲ「乙」ト稱ス)

Nr. 15. 切斷直後ノ所見。各細胞ノ排列整然トシ、正常ノ位置ヲ保チ、腺房細胞ノ Basalteil ニアル Basallamellen 著明ニ現出シ、核ヲモ圍繞シ、細胞上部ニアル Zymogenkörnchen ト觸接シ、共ニ Fuchsin ニテ良染セリ、但シ M. ハ認ムルヲ得ザリキ。潤管細胞及ビ腺房中心細胞ノ Basallamellen モヨク發育セリ。「ラ」氏島細胞ノ核ハ腺細胞ノモノヨリモ大ニシテ、胞體中ニ小數ノ細纖維ヲ有スルモノアリ、此細胞ハハ木氏ノ所謂明細胞ニシテ稠密ナル微細顆粒ヲ含メル細胞ハ、所謂暗細胞ニ外ナラザルガ如シ。「ラ」氏島ト周圍腺房トノ間ニハ、或ハ結締織、或ハ小間隙ヲ有スルモノト、兩者ガ直接相接セルモノトアリ一定セズ。此關係ハ

各腺房間ニ於テモ見ル所ナリ。「ラ」氏島細胞中ノ微細ノ顆粒及ビ纖維ハ Mallory 氏法ニテハ紫色乃至青色ニ染レルヲ見ル。Golgi 氏裝置ハ略ボ Nr. 4. ト同狀ヲ呈スルモ、腺房細胞ニテハ Nr. 4. ヨリモ稍々幽微ナルガ如シ (Fig. 7).

Nr. 16. 術後 30 分ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ニハ Zymogenkörnchen 多量ニ存在シ、Basallamellen 著明ニ現ル、「ラ」氏島細胞ハ微細ノ顆粒及ビ纖維ニ富ミ、Golgi 氏裝置ハ Nr. 5. ト同狀ヲ呈セリ。M. ハ Nr. 5. ヨリモ著シク多量ニ出現セリ。

Nr. 17. 術後 1 時間ニテ殺セシモノノ所見。fuchsinophile Zymogenkörnchen ハ減少シ、Basallamellen ハ fuchsinophil 部分ヨリモ却テ Orange ニ染色サルル部多ク、長橢圓形ノ核ヲ有スル腺房中心細胞ハ Nr. 16. ヨリモ其ノ數ヲ増シ、潤管竝ニ排泄管ハ擴大シ、Fuchsin ニ染色セル多量ノ分泌物ヲ含有セリ。「ラ」氏島ハ種々ノ形狀ノ細胞ヨリナリ、著明ノ細纖維網工ヲ有セルモ locker ニシテ内ニ空泡ヲ有セリ。M. ハ殊ニ腺房細胞ニハ多數ニシテ、多クハ杆狀ヲ帶セリ (Fig. 18). Golgi 氏裝置ハ腺房細胞ニテハ幽微ニシテ只顆粒ヨリナルモ「ラ」氏島ニ於テハ其ノ網工稍々著明ナリ。

Nr. 18. 術後 3 時間ニシテ殺セシモノノ所見。頸部迷走神經切斷後ノ同時間ノモノ、即チ Nr. 7. ト大同小異ニシテ Zymogenkörnchen ハ減少シ、apicaler Teil ニ集合セル事アルモ、概ネ集團セズ、胞體全般ニ locker ニ擴散シ trüben セリ。Basallamellen ハヨク發育シ、核ハ分裂、融解等ノ狀ヲ示サズ、腺房中心細胞ノ Basallamellen 殊ニヨク發育シ、核ヨリ上方ニ細纖維狀物ヲ放出セルコトアリ。「ラ」氏島細胞ノ微細纖維ハ密網ヲ造レルモ trüben セリ。M. ハ Nr. 17. ヨリモ其ノ量ヲ減ゼリ。Golgi 氏裝置ハ前例ヨリモ著明ニシテ Nr. 7. ト同狀ヲ呈セリ、而シテ腺房細胞ニテハ主トシテ核ト

内腔トノ間ニ於テ核ニ接シ、或ハ房腔ニ達シ、或ハ之ニ達セザルモノアリ、又時トシテハ核ヲ内方ヨリ包メル事アリ (Fig. 9). 「ラ」氏島ノ裝置ハ或ハ核ノ周圍、或ハ其ノ内方、或ハ其ノ外方、或ハ其ノ 1 側ニ存スル事、大森氏ノ説ケルガ如シ (Fig. 8).

Nr. 19. 術後 5 時間ニシテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ハ甚ダ Zymogenkörnchen ニ富ミ、Basalteil ニハ大小多數ノ Vakuolen ヲ有シ、爲メニ Basallamellen 鮮明ナラズ、「ラ」氏島細胞ハ微細ノ纖維ト顆粒ヲ含メリ。細纖維ハ能ク發育セル網工ヲ作り細顆粒ハ主トシテ Apicalzone ニ存在セリ、兩者ハ恰モ腺房細胞ニ於ケル「チモージェン」顆粒ト Basallamellen トノ如キ關係ヲ示セリ。M. ハ認メ難シ。Golgi 氏裝置ハ前例ヨリモ稍々幽微ナリ。

Nr. 20. 術後 8 時間ニシテ殺セシモノノ所見。Zymogenkörnchen ハ増加シ胞體全般ニ擴散セルモ染色不良ナリ、腺房細胞底部ニハ空泡ヲ生ジ、Basallamellen ノ發育不良ナリ。核ハ其ノ大サ形狀種々ナルモ中心細胞ノ核ハ長大ナリ。「ラ」氏島細胞ノ核モ亦分裂、融解、或ハ萎縮ノ狀ヲ示セルモ Sudan 染色ニテハ細胞ニ脂肪變性ノ狀ヲ認メズ。M. ハ消失セリ。Golgi 氏裝置ハ前例ヨリモ稍々發育シ、殊ニ「ラ」氏島ノモノハ著明ナレドモ、其ノ絲狀網工ハ減少シ不規則ニ排列セル顆粒トナツテ現ル。

Nr. 21. 術後 12 時間ニテ殺セシモノノ所見。Zymogenkörnchen ハ前例ヨリ更ニ増加シ、胞體全部ヲ充滿セリ、細胞基底部ニハ大小空泡多ク Basallamellen ハ發育不良ナリ、潤管竝ニ小排泄管ニハ分泌物充滿ス。核ハ腺房細胞ニ於テモ「ラ」氏島細胞ニ於テモ一般ニ不正形ナリ。「ラ」氏島細胞中ニハ微細ノ纖維竝ニ顆粒著シク存在セルヲ見ル。M. ハ何レノ細胞ニ於テモ認メ難シ、Mallory

氏染色標本ニ於テハ一般ニ腺房細胞、殊ニ「チモーゲン」顆粒、Basallamellen 並ニ核ハ著シク Fuchsin ニテ染色シ、「ラ」氏島細胞モ Mallory'sches Gemisch ニ良染セリ。Golgi 氏裝置ハ頸部ニテ迷走神経ヲ切斷セシ同時間ノモノ、即チ Nr. 10 ヨリモ著明ニシテ腺房細胞ニテハ裝置顆粒、樹枝狀ニ排列シ「ラ」氏島細胞ニテハ、裝置ハ多クハ核ヲ約 $\frac{1}{4}$ 圍繞セリ。

Nr. 22. 術後 18 時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ニハ大小ノ空泡前例ヨリモ更ニ増加シ、Zymogenzone 内ニ迄進入セリ、腺房間結締織ハ増殖シ爲メニ Basallamellen ヲ充分ニ認識シ難シ、「チモーゲン」顆粒モ増加シテ胞體全般ニ擴散セリト雖モ、其ノ染色ハ不良ナリ。核モ亦分裂、融解或ハ萎縮ノ狀ヲ示シ、M. ハ認ムル能ハズ。Golgi 氏裝置ハ頸部ニ於テ迷走神経ヲ切斷セシ同時間ノモノニ比シ一般ニ著明ニシテ、殊ニ「ラ」氏島細胞ニ於テ然リト雖モ、時間ノ經過ト共ニ漸次幽微トナルノ傾アリ。

Nr. 23. 術後 24 時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ハ、其ノ排列、稍々亂レ「チモーゲン」顆粒ハ胞體全般ニ擴散セルモ染色極メテ不良ナリ。大小多數ノ空泡ハ更ニ増加シ、核ノ位置形狀ハ不定ナリ。細胞ノ境界判然セズ。時トシテ不規則ニ分離セル事アリ。M. ハ之ヲ認ムル事能ハズ。「ラ」氏島細胞中ノ微細顆粒ハ存在セルモ「チモーゲン」顆粒ニ類似セル狀ヲ呈セリ。M. ハ認ムル事能ハズ。Golgi 氏裝置ハ何レノ細胞ニモ發育セルモ、其ノ狀不規則ニシテ瀾瀾セリ (Fig. 10)。

Nr. 24. 術後 30 時間ニテ殺セシモノノ所見。前例ニ比スレバ腺房細胞ハ一層排列ヲ亂シ、空泡ハ更ニ増加セリ、Zymogenkörnerchen ハ之ニ反シ減少シ apicale Zone ニ集合シ瀾瀾セリ。胞體內ニハ多數ノ細纖維基底部ヨリ細胞長軸ニ沿ヒ走行スレドモ、Basallamellen ナルヤ、或ハ Protoplasma

ノ遺殘ナルヤ判別シ難シ、「ラ」氏島細胞モ空泡ヲ有シ細纖維ニ富ム、之ニ反シ微細顆粒ハ少ナシ、然レドモ時トシテ微細顆粒ノ連珠狀ニ連レルヲ見ル。Golgi 氏裝置ハ前例ヨリモ増量セルモ主トシテ顆粒ヨリナル (Fig. 11)。M. ハ何レノ細胞ニモ之ヲ認ムル能ハズ。

Nr. 25. 術後 36 時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ノ空泡ハ前例ヨリモ減少セルモ、尙ホ多數ニ存在セリ。「チモーゲン」顆粒ハ減少セルモ normal ノ時ヨリモ多ク且瀾瀾セリ、腺房腔ニハ分泌物ヲ見ル。腺房及ビ「ラ」氏島中ノ毛細管及ビ小血管ハ良ク發育シ、結締織モ前例ヨリ一層増殖セルモ「ラ」氏島ヲ完全ニ包圍セルモノハ之ヲ見ズ。「ラ」氏島細胞ハ三角形、散子形、多角形、類圓形、三日月形等種々ノ形狀ヲ呈シ、微細顆粒ヲ含メリ、此者線狀ニ排列シ、或ハ胞體內ニ平等ニ存在シ、或ハ殊ニ apicale Zone ニ密在セリ。而シテ濃染シ或ハ明暗種々ノ狀ヲ呈セルモノアリ。M. ハ何レノ細胞ニモ之ヲ認ムル能ハズ (Fig. 19)。Golgi 氏裝置ハ時間ト共ニ幽微トナルモ頸部ニテ迷走神経ヲ切斷シタル同時間ノモノ、即チ Nr. 14. ヨリハ著明ナリ、但シ前例ニ比スレバ一層顆粒狀ナリ。

Nr. 26. 術後 48 時間ニテ殺セシモノノ所見。結締織ハ増殖シ、腺房細胞體內ノ空泡及ビ「チモーゲン」顆粒ハ減少セリ、且同顆粒ハ瀾瀾セル狀ヲ呈ス。「ラ」氏島細胞内ノ微細纖維モ瀾瀾シ、核ハ何レノ細胞ニ於テモ大小形狀不定ナリ。M. ハ極ク少數ニ之ヲ認ム。Golgi 氏裝置ハ著シク幽微トナレリ。

Nr. 27. 術後 72 時間ニテ殺セシモノノ所見。腺房細胞ハ空泡ノ減少ト共ニ其ノ排列亂レ細胞間裂隙ヲ生ジ、胞體ハ縮小セリ (Fig. 28)。「チモーゲン」顆粒ハ著シク減少シ、只內腔ニ近キ apicale Zone ニ殘留シ瀾瀾セリ。細胞中ノ微細纖維ハ著シク多クシテ胞底部ヨリ腺房腔ニ達セルモノアリ、

其ノ他胞底部ニハ稍々著明ノ M.ヲ認ム (Fig. 20). 核ハ分裂、融解、或ハ萎縮ノ狀ヲ示セルモノアリ、是レ殊ニ腺房中心細胞ニ見ル所トス。「ラ」氏島細胞ハ細纖維ノ網狀物ニ富ミ潤濁セリ、核ノ周圍ニ少數ノ M.ヲ認ム。核ハ分裂、融解、萎縮等ノ狀ヲ示シ、Golgi 氏裝置ハ前例ヨリモ一層幽微トナレリ (Fig. 12).

Nr. 28. 術後 5 日ニテ殺セシモノノ所見.

細胞ノ排列稍々整復セルモ「チモーゲン」顆粒ハ少シ、主トシテ apicale Zone ニ集在セルモ時ニハ廣ク胞體內ニ擴散セル事アリ。空泡ハ減少シ Basallamellen 時ニ著明ニ現ル、而シテ「チモーゲン」顆粒ト同ジク Fuohsin ニ染色セリ、其ノ他細胞基底部ニハ少數ノ M.ヲ見ル。「ラ」氏島細胞ニハ前例ト同ジク M.ヲ認ム、細胞ハ明細胞ニ屬スルモノ多シ、且空泡ヲ有セルモノアリ。Golgi 氏裝置ハ何レノ細胞ニ於テモ前例ヨリモ一層幽微トナレリ。

Nr. 29. 術後 7 日ニテ殺セシモノノ所見.

腺房細胞ハ多數ノ空泡ヲ含ミ著シク不規則ニ排列セリ、Basallamellen ハ全ク見ル事ヲ得ズ「チモーゲン」顆粒モ減少シ、且潤濁シ、胞體ハ homogen ノ狀ヲ呈セリ、核中ノ仁及ビ「クロマチン」ハ大部消失シ、只核膜ニテ homogen ノ内容ヲ包メルモノアリ。M.モ亦認ムルヲ得ズ。「ラ」氏島細胞モ崩壊セルモノ多ク境界甚ダ不明トナレルモ其ノ Golgi 氏裝置ハ尙ホ顆粒狀トナツテ残留セリ (Fig. 13). Sudan 染色標本ニテハ脂肪變性ノ狀ヲ認メズ。

Nr. 30. 術後 10 日ニテ殺セシモノノ所見.

細胞ノ排列亂ルルモ其ノ度ハ前例ヨリモ輕微ニシテ稍々整復セル狀ヲ示セリ、胞體ハ著シク縮小シ幽微ナガラ Basallamellen 及ビ M.ヲ認ム。Zymogenkörnchen モ少量ナレドモ前例ノ如ク著シキ潤濁ヲ示サズ、然レドモ核ハ尙ホ著シク變形シ、非常ニ小ナルモノアリ。「ラ」氏島細胞モ亦前例ノ如

ク homogen ナラズシテ微細ノ網狀纖維竝ニ顆粒ヲ有シ、且細胞ノ境界モ明瞭ナリ。Golgi 氏裝置モ幽微ナガラ現出セリ、殊ニ「ラ」氏島ノモノハ稍々著明ナリ。脂肪變性ハ之ヲ見ズ。

Nr. 31. 術後 15 日ニテ殺セシモノノ所見.

腺房細胞ハ縮小シ、其ノ排列整復シ Basallamellen ハ著明ニ現出シ Zymogenzone ニモ進入セリ「チモーゲン」顆粒ハ少量ニシテ、且潤濁シ apicale Zone ニ集在セリ、M.ハ細胞ノ基底部ヨリ內腔ニ至ル胞體ノ全部ニ之ヲ見ル、核ハ正常ナルモノ多ク、類圓形ニシテ略ボ中央ニ 1 箇ノ仁ト、其ノ周圍ニアル「クロマチン」トヲ含ミ、胞體ノ外 $\frac{1}{2}$ 部中ニ存在セリ、潤管ハ多量ノ分泌物ヲ有シ、中心細胞ハ異狀ヲ示サズ。「ラ」氏島細胞ハ萎縮シ、2 等邊長三角形ノモノ多シ、核ハ其ノ底邊ニ接シ大小種々ナルモ、一般ニ腺房細胞ノ核ト同大ナリ、長三角形ノ島細胞ノ尖端ハ毛細管ニ向ヒ胞體內ニ少量ノ M. (Fig. 21) ト密在セル微細ノ纖維及ビ顆粒トヲ有セリ、此纖維及ビ顆粒ハ核ノ周圍ニハ少ク、殊ニ細胞ノ周邊部ニ多シ、島細胞ト腺房細胞トノ境界著シク不明トナレル事アリ。Golgi 氏裝置ハ稍々著明トナレルモ尙ホ顆粒狀ノモノ多シ。

Nr. 32. 術後 28 日ニテ殺セシモノノ所見.

腺房細胞ハ排列整然トシ、少量ノ Zymogenkörnchen ヲ含ム、顆粒ノ大サハ種々ニシテ腺房內腔ニ近ク位セリ、多數ノ M.ハ顆粒狀又ハ、(コンマ) 狀ヲ呈シ細胞基底部ヨリ Basallamellen ト共ニ核ヲ圍繞シテ內方ニ蔓延セリ (Fig. 22)。「ラ」氏島細胞モ正常ノ如ク緻密、微細ノ纖維網及ビ顆粒ヲ含ミ、概ネ暗細胞ニ屬セリ、而シテ頗ル大ナル核ヲ有スルモノアリ。Golgi 氏裝置ハ何レノ細胞ニ於テモ頗ル幽微ナリ。

Nr. 33. 術後 42 日ニテ殺セシモノノ所見.

腺房細胞ハ整然排列セルモ、細胞間裂隙ヲ示セリ。Zymogenkörnchen ハ非常ニ多量ニシテ Basal-

lamellen ハ明瞭ナラズ (Fig. 30). M. ハ極メテ少數ニシテ只細胞基部ニ存在セリ. 核中尙ホ萎縮セルモノアリ, 然レドモ中心細胞ノ核ハ大ニシテ長橢圓形ヲ呈ス. 「ラ」氏島細胞ハ長三角形ノモノ多キモ, 三日月形, 或ハ橢圓形ノモノ亦尠シトセズ, 其ノ核ハ概ネ外 1/3 部ニ在リ, M. ハ認ムル能ハズ, 微細顆粒ハ殊ニ細胞ノ毛細管ニ向ヘル尖端部ニアルモ, 其ノ量ハ不定ニシテ同部ヲ充滿セルモノアリ, 或ハ疎在セルモノアリ, 細纖維ノ網工モ或ハ緻密ナルアリ或ハ疎ナルアリ, 細胞ハ明暗

種々ノ像ヲ呈セリ. Golgi 氏裝置ハ何レノ細胞ニ於テモ著明ニ現ル, 殊ニ「ラ」氏島細胞ニ於テハ著シク發育シ, 核ノ全周ヲ圍繞セル事多シ (Fig. 14).

Sudan 染色標本ニ於テハ諸例トモ脂肪變性ヲ認メズ.

肉眼の所見ニ於テ胃壁ハ暗黒色ニ變ジ, 膵臟ハ迷走神経切斷後 3 日迄ハ急速ニ白變シ, 爾後ハ漸次其ノ度ヲ加ヘ萎縮シ小トナリ, 7 日以後ニ於テハ大サ通常ノ略ボ 1/2 ニ減ズ.

第 5 章 總括並ニ考按

以上實驗例ヲ總括スルニ, 「ラ」氏島ノ變化ハ, 腺房ノ變化ヨリ少シク前驅シ顯レ, 中心細胞並ニ潤管ノ變化ハ其ノ中間時ニ起ルヲ見ル. 而モ變化ノ程度ハ腺房最モ強ク, 「ラ」氏島最モ弱シ. 開腹後, 横隔膜下ニ於テ單ニ食道周圍ノ迷走神経ヲ露ハシ, 之ヲ切斷セザリシ對照例ニ於テハ手術直後ニ最モ變化著シク, 腺房, 「ラ」氏島共諸細胞ノ M. ハ著シク多數トナリ (Fig. 17). 桿狀或ハ「コンマ」狀ヲ呈シ, 核ノ周圍ニ於テ細胞ノ長軸ニ沿ヒ排列セルモ, Golgi 氏裝置ハ幽微トナレリ, 分泌顆粒ハ泌別サレ細胞内ニ少量殘留セルノミ, 此狀態ハ術後 3 時間ニシテ消失シ, 略ボ通常ノ狀ニ變ズト雖モ M. ハ尙ホ多數ナリ. 惟フニ迷走神経ヲ露出スレバ, 之ニ由テ神経ハ刺激サレ時的ニ分泌並ニ排泄ヲ促進スルモノナラン. 之 M. ガ増加シ, 分泌物ハ急速ニ排泄サルル所以ナルベシ.

次ニ N. V. ヲ頸部ニ於テ切斷セシ場合(甲)ト, 横隔膜下ニ於テ切斷セシ場合(乙)トヲ比較センニ, 變化ノ出現ニ遲速アルノミニシテ,

其ノ狀ハ大略同様ナリ. 即チ甲ハ乙ヨリモ速ニ變化ヲ現スモノニシテ Golgi 氏裝置ハ甲ニテハ術後直チニ (Fig. 1) 正常ノモノヨリモ著シク増量シテ, 1 時間後 (Fig. 2) ニハ, 其ノ頂點ニ達ス, 但シ裝置ノ狀ハ顆粒狀ニシテ濁濁セリ. 爾後裝置ハ漸次幽微トナリ, 術後 18 時間 (Fig. 4) ニハ非常ニ幽微トナリ, 只飛散セル顆粒ヲ見ルノミ, 爾後再ビ増量スルモ, 崩潰セントスルガ如キ狀ヲ呈シ, 主トシテ不規則ニ散亂セリ, 殊ニ腺房細胞ニテハ其ノ一小部ノミ絲狀網工ノ狀ヲ呈シ, 其ノ周圍ニ顆粒飛散セル事多シ. 「ラ」氏島細胞ニテハ, 之ニ反シ裝置ハ稍々著明ニシテ, 早ク舊狀ニ復スルヲ見ル. 即チ腺房細胞ノ裝置尙ホ顆粒狀幽微ナル際ニ「ラ」氏島細胞ノモノハ稍々著明トナリ, 固有ノ網工狀ヲ呈スルニ至ル事多シ.

乙ノ場合ニ於テハ, 裝置ハ術後 3 時間ニシテ最モ著明ニ現出シ (Fig. 8, 9). 爾後漸次幽微トナリ, 殊ニ腺房細胞ニテハ顆粒狀トナリ, 術後 3 日頃 (Fig. 12) ニハ最モ幽微トナ

ル、其ノ後ハ或ハ崩潰セントスルノ狀ヲ呈シ (Fig. 13). 或ハ增量スルモ顆粒狀ニ飛散シ、潤濁セル事アリ。術後 28 日ニテハ尙ホ各細胞ハ崩潰セントスルガ如キ狀ヲ呈シ、其ノ裝置モ不規則ニ排列セル顆粒ヨリナレルヲ見ル、術後 42 日ヲ經過スレバ、各細胞ハ漸ク常態ニ復スルモ (Fig. 14). 裝置ノ一部ハ尙ホ不規則ニ排列セル顆粒ヨリナリ、潤濁セル狀ヲ呈セリ、之ニ反シ他ノ一部ハ常態ニ近キ狀ヲ呈ス。「ラ」氏島細胞ノ裝置モ腺房細胞ノモノト同様ノ變化ヲ呈スルモ、稍々早く出現シ、其ノ變化ノ程度ハ稍々輕キヲ見ル。「チモーゲン」顆粒ハ術後直チニ増加シ、甲ニテハ術後 5 時間迄、乙ニテハ術後 12 時間迄漸次增量ス、且擴散シ、次第ニ潤濁ス (Fig. 19 u. 23). 爾後ハ益々潤濁シ其ノ量ヲ減ズ (Fig. 27, 28 u. 34). 術後 15 日頃同顆粒ハ最モ減少シ (Fig. 29 u. 21). 後漸次復舊ス (Fig. 30 u. 22). 然レドモ久シク不規則ノ狀ヲ呈シ術後 42 日ニ於テモ全ク常態ニ復スル事ナシ。M. ハ甲ニテハ術後直ニ激減シ、術後 3 時間以後ニハ殆ド之ヲ見ズ、唯 8 時間目ニ於テ極ク少數ノ M. ヲ認メタリ。

乙ニテハ術後 3 時間迄ハ只少數ノ M. ヲ認メ (Fig. 18) 5 時間乃至 36 時間後 (Fig. 19) ニハ全ク之ヲ認メズ、然レドモ術後 2 日ニシテ再ビ現出シ、術後 3 日 (Fig. 20) ニハ稍々著明トナリ、爾後漸次増加シ、術後 15 日ニハ著シク多數トナル (Fig. 21). 其ノ後ハ Zymogenkörnchen ノ増加ト共ニ M. ハ減少ス。「ラ」氏島ノ M. ハ腺房細胞ノモノニ比シ稍々早期ニ變化ヲ起ス、而シテ Golgi 氏裝置ニ反シ「ラ」氏島ノ M. ハ腺房ノモノニ比シ

般ニ幽微ナリ。Basallamellen ハ術後 3 時間迄ハ著明ニ之ヲ認ムルモ「チモーゲン」顆粒ノ擴散ト共ニ漸次纖細トナリ消失シ甲、乙、何レモ同様ノ經過ヲトル、術後 5 日ニシテ細胞ノ排列稍々整復セル時ハ M. ハ最モ著明ニ現出ス、術後 15 日ニハ Basallamellen モ又著シクヨク發育スルヲ見ル。

核ハ「チモーゲン」顆粒ノ増加ト共ニ胞底ニ壓迫セラレ、胞體中ニ空泡現出スルトキハ變形シ、分裂、融解、萎縮等ノ狀ヲ示ス (Fig. 24 33 u. 34).

腺房細胞ノ空泡ハ術後 8 時間ニシテ現出シ其ノ後漸次其ノ大サ及ビ數ヲ増シ (Fig. 25, 24 u. 32) 遂ニ胞體破潰シ、其ノ殘部ハ縮小シ、同時ニ細胞ノ排列亂ルヲ見ル、此狀ハ術後 24 時間頃ニ於テ著シキモノニシテ其ノ際腺房間結締織ハ増殖ヲ始メ、術後 36 時間ニ於テ最モ著シク増加スルモ、術後 3 日以後ニハ再ビ減少シ舊狀ニ復セントセリ。

Scaffidi ハ犬ノ迷走神經切斷後、脾腺房細胞ノ fuchsinophile Granula 及ビ Fädchen ハ減少シ、Plasmosomen ハ増加スト言ヘルモ余ノ實驗ニ於テハ fuchsinophile Granula 即チ Zymogenkörnchen ハ後ニハ減少スルモ初メニハ寧ろ増加シ、Plasmosomen 即チ M. ハ著シク減少スルヲ見タリ。

建氏ハ交感神經ヲ刺激興奮セシムル鹽化「アドレナリン」ノ溶液ヲ家兎ニ注射セシニ脾腺房細胞ノ Golgi 氏裝置ハ、最初ハ極メテ幽微ノ狀ヲ呈スルモ漸次發育シ、既ニ注射後 2 時間乃至 3 時間ニ於テ其ノ極點ニ達シ、注射後 5 時間ニ至レバ再ビ幽微トナルヲ見タリ、之ニ反シ副交感神經ノ末端ヲ刺激興奮セシム

ル鹽酸「ピロカルピン」ノ溶液ヲ注射スルトキハ家兎膵腺房細胞ノ Golgischer Apparat ハ最初ヨリ 5 時間目迄ハ著明ニ出現セルヲ見ルト云ヘリ。余ノ實驗成績ハ「アドレナリン」注射ノ場合ニ比較ス可キモノニシテ術後 1 時間乃至 3 時間ニシテ裝置ハ最も著明トナリ、後漸次幽微トナレリ、是レ迷走神経切断ニヨル頤頤神経、即チ交感神経ノ作用偏勝ニ基クモノナリト信ズ。惟フニ膵ノ分泌神経タル迷走神経ヲ切断スル時ハ膵ハ同神経ノ支配ヲ受ケズ、全然交感神経ノミヨリ支配ヲ受クル事勿論ナリ、而シテ交感神経中ニハ少數ノ分泌神経ナキニアラズト雖モ、其ノ大多數ハ分泌抑制纖維ニ屬セリ。藤井氏ノ研究ニヨレバ交感神経ハ膵臓血管收縮、膵液分泌抑制、膵管ノ收縮等ヲ主宰スト、余ノ實驗例ニ於テモ神経切断後ニハ、Golgi 氏裝置ハ幽微トナリ、「チモーゲン」顆粒ハ減少ヲ來ス可キ理ナルモ、迷走神経ハ露出時、殊ニ其ノ切断ノ際暫時タリトモ刺激サレ興奮ノ狀ヲ呈スルナルベシ、是レ前陳ノ如ク單ニ腹腔中ニ於テ、單ニ同神経ヲ露出セシメシ場合ニ於テ膵諸細胞ノ M. ガ著シキ増加ヲ示セシ所以ニシテ、神経切断後ニハ M. ハ最早ヤ產出セラレズシテ既存ノ M. ハ直チニ Golgi 氏裝置ニ變ジ、同裝置ハ

著明トナリ、次イデ「チモーゲン」顆粒モ増加スルニ至ルモノト信ズ。而シテ迷走神経切断後ニハ交感神経ノ作用偏勝シ、膵管ハ收縮シ、其ノ排泄ハ阻止セラレ分泌顆粒ハ細胞内ニ蓄積サレ滯溜シ、恰モ膵管結紮ノ場合ト同様ノ状態ニ陥ルモノナラン、然レドモ此場合ハ、分泌ハ抑制サルルヲ以テ細胞内空泡ハ生ズルモ分泌ガ持續セザルガ爲メ膵臓ハ脂肪變性ニハ陥ラザルモノナラン。即チ Golgi 氏裝置ヨリ「チモーゲン」顆粒形成サレ、從テ裝置ハ幽微トナリ「チモーゲン」顆粒ハ益々増加スルモ、分泌物ハ膵管ノ收縮ニヨリ排泄サルル事ナク、鬱滯スルガ故ニ顆粒モ細胞基底部ニ迄蔓延シ、此部ニ於テ終ニ崩潰シ空泡ヲ生ズルモノナラン、迷走神経切断後膵臓ハ漸次白色ヲ帶ビ縮小シ、且膵諸細胞ニ至ル迄縮小スルハ交感神経ノ膵臓血管縮小作用ニ基クモノナランモ、總テ上記諸變化ハ交感神経切断後ノ膵臓ノ諸變化ト比較研究ス可キモノタルハ論ヲ俟タズ、之ニ關シテハ項ヲ改メ報告セント欲ス。

膵臓諸細胞ノ變化ガ甲ノ場合ニ於テ、乙ノ場合ヨリモ速ニ進行スルハ甲ノ場合ニ於テハ胸部諸臓器モ影響ヲ受クルニヨルモノナラン。

第 6 章 結 論

1) 家兎ノ迷走神経ヲ頸部又ハ腹腔内ニテ全部切断スル時ハ、其ノ膵臓ハ兩者共ニ同様ノ變化ヲ起スモ、其ノ進行經過ハ前者ニ於テ稍々速ナリ。

2) 各部變化ノ時間的關係ハ「ラ」氏島最も早く、腺房最も遅ク、中心細胞並ニ潤管ハ其

ノ中間ニ在リ。然レドモ變化ノ程度ハ「ラ」氏島最も弱ク、腺房最も強シ。

3) 頸部ニテ迷走神経ヲ全部切断セル家兎ノ膵臓 Golgi 氏裝置ハ初期ニ増強シ、術後 1 時間ニシテ極點ニ達シ、爾後減量シ、術後 18 時間ニハ最も幽微トナリ、只散亂セル顆粒ト

ナツテ残留スルノミ、然レドモ其ノ後ハ再ビ多少回復スルヲ見ル。

4) 家兎迷走神経ヲ全部横隔膜下ニテ切斷スル時モ其ノ脾臓ノ Golgi 氏裝置ハ先ヅ著明トナリ、術後3時間ニシテ其ノ極點ニ達シ、次イデ漸減シ、術後3日頃最幽微トナル、然レドモ其ノ後ハ多少回復スルモノトス。

5) 「チモーゲン」顆粒ハ何ノ部ニテモ迷走神経ヲ全部切斷スルトキハ、5乃至12時間後迄ハ漸次増量シ、爾後漸次擴散、濁濁、減量シ術後15日頃最モ減少シ、其ノ後ハ Golgi 氏裝置ト均シク多少復舊スルヲ見ル。

6) Mitochondrien ハ上記手術後早ク減數シ2時間乃至3時間ニテ消失スルモ、術後2日以後漸次顯出シ。「チモーゲン」顆粒ノ最モ減少セル術後15日頃ニ最モ増量ス。

7) Basallamellen ハ Mitochondrien ノ消失後ニ幽微トナリ、Mitochondrien ノ現出スルニ先ンジテ再ビ發育ス。

8) 核ハ上記手術後8時間頃ヨリ分裂、融解又ハ萎縮ノ狀ヲ示ス、略ボ同時ニ細胞體內ニ空泡現出シ、腺房間結締織ハ増殖ス、此狀ハ其ノ後漸次著明トナルモ、核ノ復舊機轉ト共ニ再ビ幽微トナル。

9) Mallory 氏染色標本ニ於テ Säurefuchsin ニ最モヨク染色セルハ、「チモーゲン」

顆粒ニシテ、次ハ Basallamellen ナリ。然レドモ顆粒ノ濁濁スルニ從ヒ細胞基質ト共ニ兩者ハ Orange ニ染色サルルノ傾向ヲ有シ、核モ Orange 或ハ Anilinblau ニテ染色スルモ、「ラ」氏島ノモノハ腺房ノモノニ比シ blau ニ染色サレ易シ。

10) 迷走神経切斷後ノ家兎ノ脾臓ハ貧血シ、漸次縮小ス、其ノ胞體モ亦初期ニハ稍々膨大スルモ後ニハ縮小ス。

11) 以上各項ヲ綜合シ、次ノ推斷ヲ下ス事ヲ得。

a) 迷走神経切斷後ハ交感神経ノ作用偏勝スルモ、後ニハ交感神経中ニ混ゼル少數ノ睪分泌促進纖維ノ努力ニ由テ交感神経中多數ニ存在セル睪分泌抑制纖維ノ作用ニ對シ多少額頃的作用ヲ現スヲ見ル。然レドモ再ビ完全ノ分泌ヲ營ムノ度ニ至ル事ナシ。

b) Basallamellen ハ Mitochondrien ノ發生地ニシテ從ツテ分泌顆粒ノ原基ナラシ。

c) Mitochondrien ハ Golgi 氏裝置ヲ經テ Zymogenkörnchen ニ移行ス。

d) 家兎脾ノ「ラ」氏島ト、腺房トハ相互ニ密接ナル關係ヲ有シ、同一ノ系統ニ屬ス、換言スレバ、「ラ」氏島ハ獨立ノモノニアラズ。

摘筆スルニ際シ、終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ノ勞ヲ賜リタル恩師上坂博士ニ對シ、衷心ヨリノ謝意ヲ捧グ。

文 獻

- 1) *B. P. Babkin, W. J. Rubaschkin und W. Sawitsch*, *Arch. f. mikr. Anat.*, Bd. 74, 1909. 2) *B. P. Babkin*, *Die äussere Sekretion der Verdauungsdrüsen*, 2. Aufl. Berlin, 1928. 3) *A. S. Dogiel*, *Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abt.* 1893. 4) *Eberth u. Müller*, *Zeitschr. f. wiss. Zool.*, Suppl.-Bd. 53, 1892. 5) *Erik Müller*, *Arch. f. mikr. Anat.*, Bd. 40, 1892. 6) *Galeotti*, *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Phys.*, Bd. 12, 1895. 7) *E. Holmgren*, *Anat. Anz.*, Bd. 23, 1903. 8) *Herxheimer*, *M. Hirschs Handb. d. inneren Sekretion*, Bd. 1, Lief. 1, 1932. 9) *L. Hess und E. Pollak*, *Zeitschr. f. ges. exp. Med.*, Bd. 48, 1926. 10) *R. Heidenhain*, *Pflügers Arch.*, Bd. 10, 1868; Bd. 17, 1878; *Hermanns Handbuch der Physiologie*, 1895. 11) *J. Hett*, *Zeitschr. f. mikroanat. Forsch.*, Bd. 1, 1924. 12) *Kudreweski*, zit. nach Babkin. 13) *W. Krause*, *Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abt.* 1870. 14) *Mett*, *Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abt.* 1894. 15) *G. Maximilian*, *Arch. f. Entwicklungsmech.*, Bd. 107, 1926. 16) *G. Martinotti*, *Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat.*, Bd. 1, 1890. 17) *Ogata*, *Arch. f. Anat. u. Physiol., Phys. Abt.* 1883. 18) *Pawlow*, *Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abt.* 1893. 19) *A. Fischinger*, *Zeitschr. f. mikroanat. Forsch.*, Bd. 1, 1924. 20) *M. Affanassiew u. J. Pawlow*, *Pflügers Arch.*, Bd. 16, 1878. 21) *R. Rössle*, *Zieglers Beitr.*, Bd. 69, 1921. 22) *V. Scaffidi*, *Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abt.* 1907. 23) *Todde*, *Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat.*, 1904. 24) *T. Fukutake*, *Arbeiten aus d. mediz. Universität Okayama*, 1931. 25) *K. W. Zimmermann*, *Handb. d. mikroskop. Anat. von Möllendorff*, Bd. 5, Teil 1, 1927. 26) 藤井, 東京醫學會雜誌, 47卷, 昭和8年. 27) 谷島, 日本消化器病學會雜誌, 昭和8年. 28) 吳, *グレンツゲビート*, 1卷, 昭和2年; 6卷, 昭和7年. 29) 服部, 實驗消化器病學, 7卷, 4號, 昭和7年4月. 30) 於保, 朝鮮醫學會雜誌, 20卷, 11號, 昭和5年. 31) 濱崎, 解剖學雜誌, 6卷, 5號, 昭和8年. 32) 中川, 垣田, 松本, *日新醫學*, 14卷, 大正13年. 33) 建, 岡醫雜, 507號, 昭和7年; 513號, 514號, 昭和7年; 516號, 昭和8年. 34) 八木, *解剖學雜誌*, 6卷, 4號, 5號, 昭和8年. 35) 吉岡, *大阪醫學會雜誌*, 29卷, 昭和5年. 36) 村上, 岡醫雜, 486號, 490號, 491號, 昭和5年. 37) 今橋, 岡醫雜, 465號, 466號, 昭和3年.

附 圖 說 明

- Fig. 1. 頸部迷走神経切断直後ノ腺 (Cajal 氏法染色所見)
 Fig. 2. 同 1 時間後
 Fig. 3. 同 12 時間後
 Fig. 4. 同 18 時間後
 Fig. 5. 同 24 時間後
 Fig. 6. 同 36 時間後
 Fig. 7. 腹腔内迷走神経切断直後ノ腺 (Cajal 氏法染色所見)
 Fig. 8. 同 3 時間後(ノラ氏島) (Cajal 氏法染色所見)
 Fig. 9. 腹腔内迷走神経切断 3 時間後(ノ實質)
 Fig. 10. 同 24 時間後
 Fig. 11. 同 30 時間後
 Fig. 12. 同 3 日後
 Fig. 13. 同 7 日後
 Fig. 14. 同 42 日後
 以上 Zeiss. Okul 7 X, Obj. 40 X, K.L. 35 cm

Fig. 15. 頸部迷走神経切断後 1 時間ノ腓
(鐵「ヘマトキシリン」染色所見)

Fig. 16. 同 24 時間

Fig. 17. 横隔膜下食道周囲迷走神経露呈 (但シ
非切断) 後 30 分ノ腓
(鐵「ヘマトキシリン」染色所見)

Fig. 18. 同 切断後 1 時間

Fig. 19. 同 36 時間

Fig. 20. 同 3 日

Fig. 21. 同 15 日

Fig. 22. 同 28 日

以上 Zeiss. Okul. 7 X, Obj. 90 X, K. L. 32 cm

Fig. 23. 頸部ニ於テ迷走神経切断後 3 時間ノ腓
(「ヘマトキシリン—エオジン」
染色所見)

Fig. 24. 同 12 時間

Fig. 25. 同 18 時間

Fig. 26. 同 24 時間

Fig. 27. 同 30 時間

Fig. 28. 同横膈下ニ於テ切断後 3 日

Fig. 29. 同 7 日

Fig. 30. 同 42 日

以上 Zeiss. Okul. 7 X, Obj. 40 X, K. L. 35 cm

Fig. 31. 頸部ニ於テ迷走神経切断後 1 時間ノ腓
(マロリー氏法染色所見)

Fig. 32. 同 12 時間

Fig. 33. 同 24 時間

Fig. 34. 同 36 時間

(以上擴大 1000 X)

友澤論文附圖

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 6.

友澤論文附圖

Fig. 7.

Fig. 11.

Fig. 8.

Fig. 12.

Fig. 9.

Fig. 13.

Fig. 10.

Fig. 14.

友澤論文附圖

Fig. 15.

Fig. 19.

Fig. 16.

Fig. 20.

Fig. 17.

Fig. 21.

Fig. 18.

Fig. 22.

友澤論文附圖

Fi. 23.

Fig. 27.

Fig. 24.

Fig. 28.

Fig. 25.

Fig. 29.

Fig. 26.

Fig. 30.

友澤論文附圖

Fig. 31.

Fig. 33.

Fig. 32.

Fig. 34.