130.

616.345-002

蟲様突起炎ノ成因ニ關スル實驗的研究

岡山醫科大學津田外科教室（主任津田教授）

三 木 良 定

【昭和 9 年 10 月 5 日受稿】

*Aus der chirurgischen Klinik der Okayama Medizinischen Fakultät
(Vorstand: Prof. Dr. Seiji Tsuda).*

Experimentelle Untersuchungen zur Aetiologie der Appendizitis.

Von .

Yoshisada Miki.

Eingegangen am 5. Oktober 1934.

Wenn man auch den Appendix des Kaninchens mit Seide unvollständig unterbindet oder dabei in den ersteren verschiedene Bakterien eingießt, kann nicht die experimentelle Appendizitis zustande kommen. Stellt man dagegen die sog. Cavité close durch die vollständige Unterbindung des Appendix her, dessen Inhalt, der Kot, dabei unberührt gelassen ist, so stirbt das betreffende Tier durchschnittlich nach drei Tagen an katarrhalischer, eitriger oder gangränöser Appendizitis. Bei der vollständigen Unterbindung, die vorgenommen wird, nachdem man den Appendix leicht mit Finger gedrückt und dessen Inhalt, den Kot, entleert hat, geht es durchschnittlich nach vier Tagen ein. Wenn man den Appendix des Kaninchens vollständig unterbindet, dann in die Höhle des ersteren die von der menschlichen Appendizitis isoliert kultivierten Fränkel-, Kolibazillen, Strepto- und Staphylokokken etc. in einer bestimmten Menge eingießt, so geht das Tier nach zwei Tagen an Appendizitis zugrunde. Wenn man dabei je eine halbe Menge von zwei Arten Bakterien oder je ein drittel Menge von drei Arten Bakterien nimmt und nach Mischung eingießt, so stirbt das Tier meist etwa in 24 Stunden an einer deutlicheren Entzündung. Es ergibt sich hieraus, daß die Virulenz der Bakterien stärker ist, wenn ihre mehr als zwei Arten gemischt eingegossen werden, als wenn es sich um ihre einzige Art handelt. Die oben erwähnten vier Arten Bazillen und Kokken sind jede im normalen Appendix des Kaninchens nachweisbar, aber ihre Virulenz ist kaum vorhanden oder äußerst schwach. Wenn man aber durch Unterbindung eine Cavité close herstellt und die Entzündung hervorruft, so wird die Virulenz

dieser Bakterien erheblich stärker. Der Fremdkörper, den man das Kaninchen per os verschlucken läßt, bleibt ziemlich lange im Magen. Wenn er aber einmal durch den Pylorus hindurchgeht, so wird er schnell im Kot ausgeschieden, ohne sich in Appendix oder Blinddarm einzukeilen. D. h. der Fremdkörper per os ist niemals direkt an Cavité close schuld. Nach der Untersuchung der Chlormenge im Blut bei jedem Experimente zeigt diese keine große Schwankung. Obwohl sie sich 2 und 8 Stunden nach der Unterbindung stärker vermindert, stellt sie sich nach 24 Stunden ein wenig wieder her. Bei den Tieren, die wegen der gleichzeitig entstandenen Perforationsperitonitis frühzeitig zugrunde gegangen sind, sowie bei solchen, die mikroskopisch einen deutlichen Befund zeigen, ist auch die Verminderung der Chlormenge im Blut bezeichnend. Bei solchen, die lange im Leben bleiben oder nur leichte Symptome darbieten, ist die Abnahme von Chlor gering oder sogar kann auch eine kleine Vermehrung eintreten. Kurz, nach den Ergebnissen meines Versuches über die Ursache der Appendizitis braucht man keinen besonderen Erreger der letzteren anzunehmen. Obwohl je nach der Bakterienart, die ständig im normalen Appendix wohnt, Symptom und Verlauf sich leichter oder schwerer ausgestalten, kommt es hier alles auf die Stenose des Lumens an. Nach der Bildung der Cavité close kommt wegen der Steigerung der Bakterienvirulenz die akute Appendizitis zustande. (Autoreferat.)

目 次

<p>第1章 緒 言</p> <p>第2章 文獻概要</p> <p> 第1節 實驗的研究ニ關スル文獻</p> <p> 第2節 細菌學的研究ニ關スル文獻</p> <p> 第3節 病原論ニ關スル文獻</p> <p>第3章 實驗眼目, 材料並ニ方法</p> <p> 第1節 實驗眼目</p> <p> 第2節 實驗材料</p> <p> 第3節 實驗方法</p> <p>第4章 各種對照試驗</p> <p> 第1節 正常家兎蟲樣突起</p> <p> 第1項 肉眼の所見</p> <p> 第2項 顯微鏡の所見</p> <p> 第3項 正常家兎蟲樣突起内細菌</p> <p> 第2節 正常家兎血液内鹽素量</p>	<p>第3節 動物飢餓時ノ血中鹽素量變動</p> <p>第5章 實驗成績</p> <p> 第1節 蟲樣突起不完全結紮試驗</p> <p> 第2節 蟲樣突起完全結紮試驗</p> <p> 第1項 内容タル糞便ヲ其ノ儘ノ場合</p> <p> 第2項 内容ヲ指壓ニヨリ空虚トセル場合</p> <p> 第3節 蟲樣突起結紮後各種細菌ノ單獨注入試驗</p> <p> 第1項 Fränkel 菌ヲ單獨注入セル場合</p> <p> 第2項 大腸菌ヲ單獨注入セル場合</p> <p> 第3項 連鎖狀球菌ヲ單獨注入セル場合</p> <p> 第4項 葡萄狀球菌ヲ單獨注入セル場合</p> <p> 第5項 本節概括</p> <p> 第4節 蟲樣突起結紮後2種類ノ細菌混合注入試驗</p>
--	--

第1項 Fränkel 菌ト大腸菌ヲ混合注入セル場合	第3項 Fränkel 菌ト連鎖狀球菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合
第2項 Fränkel 菌ト連鎖狀球菌ヲ混合注入セル場合	第4項 Fränkel 菌ト連鎖狀球菌ト大腸菌ヲ混合注入セル場合
第3項 大腸菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合	第5項 4種類ノ細菌ヲ混合注入セル場合
第4項 Fränkel 菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合	第6項 本節概括
第5項 連鎖狀球菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合	第6節 蟲様突起結紮後食鹽水注入試驗
第6項 大腸菌ト連鎖狀球菌ヲ混合注入セル場合	第7節 蟲様突起完全結紮ノ際ニ於ケル白血球數ノ變動
第7項 本節概括	第8節 家兎蟲様突起内細菌ノ結紮ニヨル毒力增強試驗
第5節 蟲様突起完全結紮後3種類又ハ4種類ノ細菌混合注入試驗	第9節 異物嚥下試驗
第1項 Fränkel 菌ト大腸菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合	第6章 總括並ニ考案
第2項 大腸菌ト連鎖狀球菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合	第7章 結 論
	主要文獻
	附圖說明
	附 表
	附 圖

第 1 章 緒 言

盲腸ニ關スル疾患ハ既ニ古クヨリ知ラレアルモ、蟲様突起炎ニ關スル歴史ハ比較的近代ノ事ニシテ 1886 年 Reginald Fitz ガ初メテ盲腸周圍炎ノ原因ハ蟲様突起ノ炎症ニ因リ起ル事ヲ提唱シ、之ヲ蟲様突起炎ト命名セリ、尙ホ且同氏ハ手術的ニ蟲様突起ヲ除去スルハ盲腸周圍炎ニ對スル最モ合理的原因療法ナル事ヲ報告シテヨリ、本症ニ對シテ世人ノ注意ヲ喚起シ、爾來蟲様突起炎ニ關スル新生面開拓セラレ、内科醫、外科醫ヲ始メ解剖學、病理細菌學等各方面ヨリ廣ク興味ヲ以テ研究セラレ、之ニ關スル業績ハ洋ノ東西ヲ問ハズ頻出シ近々 50 年ヲ出デズシテ、本症ニ關係ア

ル文獻ハ將ニ汗牛充棟ノ感アリ。

蓋シ本症ハ吾々臨牀家ノ最モ屢々遭遇スル疾患ナレバ診斷、並ニ治療の方面ノ研究ハ顯著ナル進歩ヲ遂ゲ、今日既ニ根本ニ於テハ諸學者ノ意見略ボー致ヲ見タリ。然ルニ其ノ原因論或ハ病理學の方面ニ到リテハ、臨牀的經驗及ビ動物實驗ヨリ種々臆測シ、論議セラレタルモ、今尙ホ完成ノ域ニ到達セズ學者ノ意見區々ニシテ一定ノ解決ヲ下シ得ザルノ狀態ニ在リ、即チ現今ニ於テ我々ハ蟲様突起炎ノ原因ニ細菌ガ關係セル事ハ略ボ疑無ク信ゼラルルモ、如何ナル細菌ニヨルヤ、或ハ正常口腔内又ハ日常腸管内ニ生存セル細菌ガ何等カ

ノ要約ニヨリ其ノ毒力ヲ増強スルニ因ルヤ、或ハ特殊ノ病原菌が存在スルヤ、或ハ又夫等ノ病原トナル細菌ハ如何ナル経路ヲ經テ局所ニ侵入スルヤトイフ侵入門及ビ経路ニ就テモ血行性傳染説 hämatogene Infektionstheorie ガ正シキヤ、或ハ腸内腔ヨリ腸管粘膜ヲ通シテ侵入スルト言フ腸管腔内傳染説 enterogene Infektionstheorie ガ正シキヤ、將又之等細菌ノ侵入ニハ如何ナル要素、條件、並ニ誘因ヲ必要トスルヤ等ノ諸點ハ今尙ホ全ク不明ナリ。

猶ホ其ノ他病理的原因論ニ於テモ血管神經説(Bicker), 血管區劃説(Brünn), 内容滯留

説(Löhr und Rassfeld), (山村), 消化酵素説(Heile)等アリ, 尙ホ之等ノ外ニ往時最モ重要視セラレタル腸内寄生蟲特ニ蟯蟲及ビ蛔蟲, 或ハ異物糞石等ガ蟲様突起炎ノ成因ニ對シテ如何ナル役割ヲ演ズルヤ, 又一般的ニ性別, 年齢, 氣候, 外傷, 月經, 消化障礙, 職業, 文化生活, 民族的, 遺傳的關係等ガ素因又ハ誘因トシテ如何ニ影響スルヤ等々全ク不明ナル點多シ, 余ハ之等ノ不可解ナル蟲様突起炎ノ原因, 病理ニ對シ何等カノ「ヒント」或ハ光明ヲ擲得セントシテ動物實驗ヲ行ヒ, 聊カ得ル所アリタルヲ以テ茲ニ其ノ成績ノ大要ヲ報告シ大方ノ參考ニ供セントス。

第 2 章 文 獻 概 要

第 1 節 實驗的研究ニ關スル文獻

古來蟲様突起炎ノ原因或ハ病理ニ關シ之ヲ實驗的ニ解決セントシテ多クノ學者ニヨリ, 種々ナル方法ニヨリ動物ヲ用ヒ實驗的ニ蟲様突起炎ヲ惹起セシメントシテ研究セラレタリ。

今歴史的ニ其ノ概要ヲ擧グレバ次ノ如シ。

1896 年 Beaussenat ハ動物ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ所謂 Cavité close, 閉塞腔ヲ作レバ必ず壞疽性化膿性炎及ビ腹膜炎ヲ起ス事ヲ證明セリ。更ニ同氏ハ動物ノ蟲様突起ヲ指ニテ壓迫シ外傷ヲ與ヘタル後直チニ大腸菌ノ培養液ヲ蟲様突起腔内ニ注入シ, 或ハ蟲様突起ヲ損傷シタル後, 大腸菌培養液ヲ靜脈内ニ注射シ, 何レモ蟲様突起炎ヲ惹起セシメ得タリ。即チ蟲様突起ノ粘膜或ハ内壁ニ損傷アレバ, 其ノ局所性直接腸内傳染及ビ血行性傳染ニヨリ共ニ炎症ヲ惹起セシメ得ルモノニシテ Cavité close ナラズトモ局所ノ抵抗減弱ノミニヨリテモ傳染ノ素地ヲ作り得ルモノニシテ, 通常大

腸菌ガ原因菌トナリ粘膜ノ正常生活, 又ハ喰菌裝置ニ障礙ヲ與フト結論セリ。

次デ Roger und Josué(1896)兩氏ハ動物ノ蟲様突起ヲ結紮シテ其ノ内腔ニ大腸菌培養液ヲ注入シ壞疽性蟲様突起炎ヲ惹起セシメタリ。

Mühsam(1900)ハ家兎ノ耳殻靜脈ヨリ大腸菌, 綠膿菌ヲ注射シ, 且蟲様突起ニ損傷ヲ與ヘシモ, 其ノ結果ハ一定セズ, 尙ホ蟲様突起ノ小腸間膜血管ヲ結紮スル事ニ因リ蟲様突起ニ壞疽ヲ起スモ, 此壞疽タルヤ其ノ周圍ニ何等炎症機轉ヲ喚起セザル限局性ノモノナリキ。即チ家兎ニ於テハ眞ノ蟲様突起炎ハ起ス能ハズト言ヘリ。

Lipawski(1901)ハ 22 例ノ動物實驗ニ於テ蟲様突起動脈及ビ蟲様突起腔内ニ連鎖狀球菌及ビ大腸菌ヲ注入シ, 其ノ際ニ蟲様突起ヲ結紮シ或ハ壁ニ挫傷ヲ加ヘ, 或ハ化學的刺戟ヲ與ヘシガ, 動脈内注射ニ因リテハ著明ナル變化ヲ起ス事ヲ得ザリキ。

Adrian(1901)ハ動物ノ蟲様突起腔内ニ異物トシ

テ硝子球ヲ入レタルモ效果ヲ認メズシテ、人間ノ蟲様突起炎ハ疑モ無ク扁桃腺炎、及ビ關節使麻質斯等ト密接ナル關係ヲ有スル事ニ注目シ實驗ヲ試ミタリ。即チ家兎ノ耳殻靜脈ヨリ連鎖狀球菌、肺炎雙球菌、大腸菌、腸「チフス」菌、結核菌、脾脫疽菌等ヲ注射シテ蟲様突起ノ淋巴體腔内ニ、炎症ヲ起サシメ得タリ。然レ共該體腔部ノ變化ハ決シテ其ノ體腔部ノミニ限局セズ、他ノ體部淋巴性臟器ニモ同様ノ變化ヲ認ムルモノニシテ、全身感染ノ部分的現象ナリ。但シ蟲様突起ノ體腔部ノ變化ハ時間的ニ他ノ淋巴臟器ノ變化ニ先達チテ始マル事ヲ認メ、蟲様突起ノ體腔ニ好發部位ノ意義ヲ附シテ蟲様突起炎ノ血行説ヲ主張セリ。

Polenow(1902)ハ15匹ノ家兎ヲ用ヒ其ノ蟲様突起ヲ完全閉塞又ハ狹窄ヲ起サシメ、或ハ軸ニ沿ヒ180度屈曲セシメ又ハ捻轉セシメ、又ハ血管ヲ結紮スル等ノ實驗ヲ行ヒテ人間ニ於ケルガ如キ各種ノ蟲様突起炎ヲ起サシメ得タリ。

Nicolaysen(1903)ハ第1ノ實驗ニ於テ大腸菌毒素ヲ皮下ニ注射シ蟲様突起ニ局所因素ヲ呼び起シタルニ蟲様突起粘膜炎ニ腫脹ノ起ル事ヲ證明シ、第2ノ實驗ニテハ動物ニ先ヅ連鎖狀球菌ヲ注射シ、4日ノ後2日間大腸菌 Bouillon 培養液 20ccヲ注入セリ、之ニヨリ蟲様突起ニ特有ノ病的變化ヲ起サシメ得タリ。

Mori(1904)ハ Kocher 教授ノ指導ノ下ニ大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、「プロテウス」菌及ビ新鮮ナル稀釋膿汁ヲ蟲様突起動脈、及ビ一部ハ上腸間膜動脈ニ注射セシニ病變ハ蟲様突起ノミナラズ、全腸管ノ體腔組織内ニ平等ニ炎症ヲ起セルヲ以テ血行傳染ニ因スル蟲様突起炎ハ全身傳染ノ部分的現象ト見ル可キモノニシテ、蟲様突起炎ハ血行ニヨリテモ起リ得ベケレドモ、人間ニ於テハ腸内傳染多シトセリ。

Tedesco(1908)ハ連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、脾

脫疽菌等ヲ家兎ノ耳殻靜脈ニ注射セシニ、前2種類ノ細菌ニ於テハ蟲様突起ノミナラズ、腸管體腔ニモ栓塞性膿瘍ヲ認メ、蟲様突起感染ハ全身感染ノ部分的現象ナリトセリ。唯脾脫疽菌ヲ注射セシ3例ハ内眼的ニハ病竈ヲ認メザルモ、組織學的ニ體腔中ニ壞疽、出血等ヲ見尙ホ「グラム」氏染色標本ニヨリ其ノ體腔中心部ノ血管ニ栓塞狀ニ充填セルヲ見テ蟲様突起炎ハ原發性且限局性ニ發スルモノニ非ズシテ、該菌ニ因ル全身菌血症ノ部分的變化ナリト言ヘリ。

Gohn und Namba(1912)氏ハ正常家兎ノ蟲様突起ノ組織像ヲ綿密ニ検査シタル後、葡萄狀球菌、連鎖狀球菌等ヲ家兎耳殻靜脈内ニ注射シタル後、蟲様突起及ビ盲腸部ノ組織學的検査ヲ行ヒタルニ、血行性轉移性病變ノ發生ヲ認ムルコト能ハズ、又偶々遭遇セル組織學的變化ハ試驗ニ供シタル病原菌ニ因ルモノニ非ズシテ正常動物蟲様突起ニ往々認ムル「コクチゲーム」絲狀菌類ニ依ルモノナリト言ヘリ。

Mordwinkin(1916)ハ家兎ノ蟲様突起ヲ基根部附近ニテ結紮シ、耳殻靜脈ヨリ葡萄狀球菌浮游液ヲ注射セルニ100%ニ化膿性蟲様突起炎ヲ惹起セリ。然モ其ノ際膿中及ビ血中ニハ常ニ注射セル葡萄狀球菌ヲ證明シ、結論トシテ蟲様突起ヨリ腸内腔中ニ血中ノ細菌ヲ排出ス。

青山徹藏(1918)氏ハ家兎蟲様突起ノ基部ニ於テ縱切開ヲ加ヘ人類蟲様突起炎ヨリ手術ニ依リ得タル糞石或ハ傳染セル膽石ヲ上記切開口ニ挿入セシニ、蟲様突起炎ヲ起シ得ズ、且蟲様突起基部ニ近ク結紮ヲ行ヒ、其ノ管腔ヲ閉鎖セシムルニ一定時間後ニハ管腔内ニ再ビ開キアリテ著明ナル炎症ノ起ラザルヲ常トス。但シ管腔ガ閉鎖十分ナルモノハ著明ナル蟲様突起炎ヲ起シ得タリ。更ニ蟲様突起ノ基部ニ於テ靜脈ヲ結紮セル場合ハ蟲様突起炎ヲ起スヲ常トス。要之家兎ニ於テ蟲様突起管腔内ニ

傳染セル異物アリテ管腔閉塞セラレ、更ニ血行障礙コトニ其ノ鬱滯ノアル場合ニ最モ容易ニ炎症ヲ起スヲ見タリ。

加藤竹男(1918)氏ハ鶏ヲ用ヒ其ノ2本アル盲腸ヲ先端ヨリ1—2 糞ノ部ヲ結紮セシニ其ノ末端部ノ壁ノ組織變化ハ通常萎縮セルヲ見ル(67%)、但シ少數例(13%)ハ壁ノ肥厚ヲ見ル。約20%ニ於テハ蟲様突起末端部ニ囊胞狀變化ヲ見タリ。

犬養六郎(1926)氏ハ人體蟲様突起炎ヨリ分離培養セル連鎖球菌、及ビ葡萄球菌ヲ一定量家兎ノ耳殻靜脈ニ注射シ一定時間經過後其ノ動物ノ蟲様突起ヲ細菌學的及ビ組織學的ニ検査シ、且又一方ニ於テハ墨汁ヲ家兎蟲様突起内ニ注入シタル後之ヲ組織學的ニ検査シ、兩者ヲ比較シタル結果血行性感染モ可能ナルモ一部ノ人々ノ主張スルガ如ク重大ナル意義ヲ有セズ、寧ロ細菌傳染ノ大部分ハ腸内性感染ヲ營ムモノナリトセリ。尙ホ同氏ハ更ニ細菌ノ毒力増強ニ關シテ實驗ヲ行ヒ正常家兎蟲様突起内ノ毒力ヲ有スル細菌ハ25.8%ニ過ギザルモ之ニ人工的炎症ヲ起サシムル時ハ蟲様突起内細菌ハ炎症ノ影響ニヨリ其ノ毒力ヲ67.2%ニ増強セル事ヲ證明セリ。

Heile(1930)ハ犬ニ於テ豫メ牛肉ヲ飽食セシメ置キ、後ニ開腹シ犬ノ蟲様突起内ニ多數ノ分解セラレザル蛋白質ト、結合セラレザル消化酵素特ニ「トリプシン」ヲ含有セル事ヲ證明シ且此際蟲様突起内粘膜ニハ人間ノ場合ニ Aschoff ガ認メシ初期感染ト甚ダ類似ノ組織學的變化ヲ認メ、蟲様突起炎ノ原因ヲ飽食後ノ分泌亢進並ニ消化未完了ノ蛋白質毒素、消化酵素及ビ細菌等ガ蟲様突起内ニ鬱滯シ、之ニヨリテ蟲様突起内粘膜ニ損傷及ビ加答兒ヲ招來スルト説明セリ。

Eichhoff und Pfannenstiel(1930)ハ81例ノ蟲様突起炎ノ細菌検査ヲ行ヒ、之ヨリ分離培養セル大腸菌、Enterokokken, Fränkel 氏瓦斯桿菌等

ヲ用ヒテ家兎ノ蟲様突起内ニ注入シタルモ之ニ完全狹窄ヲ伴ハザレバ炎症ヲ起ス事ナシ。之ニ反シ家兎ノ蟲様突起ニ完全ナル結紮ヲ行ヘバ常ニ炎症ヲ起ス事ヲ見タリ。尙ホ此際大腸菌、Enterokokken, 肺炎菌、連鎖球菌等ヲ注入スレバ同様ニ炎症ヲ起セリ。然レ共家兎ニ於テ最モ重篤ナル蟲様突起炎及ビ腹膜炎ヲ惹起セシムルハ Fränkel 氏瓦斯桿菌ノ存在ナリ。結紮セル家兎蟲様突起ニ於テ人工的粘膜損傷ノ有無ハ炎症ノ發生ニ何等意味無キ事ヲ認メタリ。

吳一承(1931)氏ハ家兎ヲ用ヒ蟲様突起ノ内腔ガ一部閉塞セラレ、且末端内腔ニ糞便ガ多量ニ存在スルコトガ蟲様突起炎成因ノ必要條件ノ一ツナリト思惟セリ。從テ手術的ニ蟲様突起ヲ結紮スル事ニヨリ人工的ニ蟲様突起炎ヲ起サシメ得タリ。尙ホ家兎ノ蟲様突起ノ本來長キモノニ於テハ之ヲ起シ易シ、又實驗的ニ惹起セル蟲様突起内容ヨリ殆ド大多數ハ大腸菌類似細菌ヲ認メ尠クモ之ガ病原菌ノ一ツナリト言ヘリ。組織學的所見ヨリ内容ノ刺激ニ因スル粘膜ノ限局性炎症ニ其ノ端ヲ發スル事ハ Aschoff ノ說ニ賛意ヲ表セリ。實驗的蟲様突起炎ヲ惹起スル時ハ血液中ノ鹽素量、血糖、殘餘窒素、白血球數等ニ變動ヲ起ス、カカル變動ハ早期蟲様突起切除術ニヨリ正常値迄復歸ス。

菅野尙夫(1931)ハ Aschoff 學派ト異リタル說ヲ立テ壞疽性蟲様突起炎ハ特別ノ疾患ニシテ嫌氣性菌ニヨリ起ルモノナリトシ、實驗的ニ家兎ヲ用ヒ其ノ蟲様突起内ニ種々ノ要約ニ於テ手術直後ニ得タル壞疽性蟲様突起内容ヲ食鹽水ニ浸出シタルモノヲ注入シ何レモ著明ナル壞疽性蟲様突起炎ヲ惹起セシメタリ。

以上諸氏ノ實驗成績ヲ總括シ見ルニ細菌傳染ノ侵入経路ニ就テハ血行性傳染說可能ヲ唱ヘシハ Kretz, Adrian, Beitzke 等ニシテ、實驗ノ結果血行感染不可能ヲ唱ヘシハ Mühsam, Gohn und

Namba 等ノ諸氏ニシテ、蟲様突起腔内注入法ヲ行ヒ腸管腔内傳染説ヲ主張セシハ Aschoff, Oguro, Mori, 犬養氏等アリ。尙ホ實驗の蟲様突起炎ニハ腔内ノ完全閉塞ガ必要條件ナリト唱ヘシハ Polenow, Mordwinkin, 青山, 吳, Eichhoff und Pfannenstiel 等アリ。之ヲ要スルニ動物ニ於テハ實驗的ニ蟲様突起炎ヲ惹起セシメ得ズトセシ學者アルモ、近年ニ於テハ總テ動物ニ實驗の蟲様突起炎ヲ惹起セシメ得ルノミナラズ、家兎ニ於テハ自然ニ發病シ治癒セル蟲様突起炎ノ存在スルコトヲ認メタル報告少ナカラズ。

第2節 細菌學的研究ニ關スル文獻

近年急性蟲様突起炎ハ一ツノ細菌感染ニヨリテ起ル疾患ナル事ハ全ク確認セラレ、最早議論ノ餘地無キニ到レリ、然レ共此疾患ヲ惹起セシメ得キ細菌ノ種類、並ニ之等ノ細菌ガ如何ニシテ局所的ニ繁殖シ且又如何ニシテ蟲様突起壁ニ炎症ヲ起スニ到ルヤ其ノ經路ニ就テモ未ダ定説ニ到達セズ。

元來正常健康ナル蟲様突起内ニ細菌ノ生存セルヤ否ヤモ一ツノ研究題目ニシテ Tavel und Lanz 氏ハ健康ナル蟲様突起中ニモ必ズ細菌ノ生存スル事ヲ證明セリ。之ニ反シ Winternitz ハ普通健康狀態ニ於ケル蟲様突起ハ常ニ無菌ナリト主張セリ。今日ニ於テハ健康人蟲様突起ノ「レントゲン」學的検査ニヨリテ蟲様突起ノ内容ハ盲腸ノ内容ト常ニ交通アル事ガ確認セラレタルヲ以テ此問題モ自ラ明カトナレリ。即チ正常健康人ノ糞便中ニ見ラルル細菌ハ凡テ蟲様突起中ニモ生存シ居ル可キモノト考フルヲ至當トス。而シテ健康人糞便中ニハ各種ノ細菌ガ生存シ就中太腸菌ハ殆ド必發的ニ發見シ得ルモノニシテ増田中留氏ハ健康兵卒375名ノ糞便ヨリ大腸菌屬81種類ヲ分離培養セリ。伊澤氏モ亦健康人糞便中ノ細菌ヲ詳細研究

報告セリ。

蟲様突起炎發作中其ノ内容ノ細菌検査ニ於テハ何レモ細菌ヲ證明シ單ニ蟲様突起自己内ノミナラズ其ノ附近ノ腹膜腔内ニ於ケル浸出物並ニ膿瘍中ノ細菌ヲモ検索セラレタリ。

抑々蟲様突起炎ノ細菌學的研究ノ端緒ヲ開キシハ今ヨリ約40年前ノ Fränkel (1891) ニシテ以來多數ノ學者ニヨリ報告セラレタル所甚ダ多ク枚舉ニ遑無キモ、比較的最近ノ代表的報告ヲ擧グレバ次ノ如シ。

Veillon und Zuber (1898) 兩氏ハ22例ノ蟲様突起炎ニ於テ19例ハ連鎖狀球菌ト大腸菌トノ混合ノ中ニ嫌氣性菌ヲ證明セリ。

次デ Lanz und Tavel (1904) 氏ハ138例ノ急性蟲様突起炎ノ細菌學的検査ノ結果、大腸菌105回、連鎖狀球菌49回、重球菌62回、類破傷風菌59回、惡性水腫菌49回ヲ分離シ更ニ慢性蟲様突起炎ノ内容ヨリ無菌例10回、蟲様突起周圍膿瘍ヨリ75%、閉鎖性蟲様突起膿腫ヨリ37.5%ノ無菌例ヲ檢出シ正常蟲様突起ト炎症性蟲様突起内細菌トハ大ナル差別ナシト言ヘリ。

Haim (1906) ハ急性蟲様突起炎ニ於テ其ノ催炎菌ノ種類ニヨリテ其ノ病況、病理學的所見、及ビ經過豫後等ヲ異ニスル事ヲ述べ、連鎖狀球菌ト大腸菌トヲ比較シ、重篤ニシテ死亡率多キ病況ニハ連鎖狀球菌ヲ證明セラルル事多ク、比較的輕症ニシテ死亡率少ナキモノハ大腸菌ニ因ル事多シト言ヒ M. Cohn, Franke 等モ亦此説ニ贊セリ。

Kretz (1907) ハ動物實驗ニ因ラズシテ、前後5年間ニ亙ル3579例ノ死體解剖中53例ノ蟲様突起炎ニヨル死亡例ヲ觀察シ、14例ハ蟲様突起ノ外ニ化膿性腹膜炎ト新鮮扁桃腺炎ヲ合併シ、其ノ細菌ハ連鎖狀球菌ニシテ、扁桃腺及ビ腹腔内ニ同様ニ認メタリ。氏ハ此所見ヨリ蟲様突起炎ハ連鎖狀球菌ニヨリ扁桃腺炎ヨリ血行性感染ニヨリ起ル

モノナリトセリ。

之ニ對シ Aschoff ハ反對シ Kretz ノ見タル組織變化ハ死後ノ變化ニシテ炎症ヲ有セル蟲様突起ハ殆ト常ニ同様ノ靜脈内細菌栓塞ヲ見ルモノニシテ之ヲ以テ直ニ血流ヨリノ感染ナリトスルハ早計ニシテ、通常ノ急性蟲様突起炎ハ普通腸内ニ生存スル細菌ガ腸管内感染ヲ起スモノニシテ、敗血症、膿毒症其ノ他ニ續發スル場合ハ例外ナリトセリ。而シテ腸管内細菌ガ一般ノ腸管内ニテ發病セズ蟲様突起ニ於テノミ炎症ヲ惹起スルハ其ノ膿胞構造及ビ生理的内容ノ閉塞其ノ他ノ要素ニ因ルト稱ヘタリ。

Mannel(1907)ハ急性蟲様突起炎37例中20例ハ大腸菌、7例ハ雙球菌ノ單獨感染ヲ見、残りノ10例ハ何レモ大腸菌ト化膿性連鎖狀球菌、ノ混合感染ナリキ。慢性炎症68例ハ何レモ大腸菌ノミノ感染ナリキト言ヒ Haim ノ連鎖狀球菌說ニ反對シ大腸菌ヲ重要視セリ。

Cohn(1908)モ亦 Haim ノ言ヘル如ク病原菌ノ種類ト臨牀症狀トハ必ズシモ特異ノ關係ヲ有スルモノニ非ズ、且純粹ノ連鎖狀球菌ノ感染ハ43例中皆無ニシテ主トシテ大腸菌ノミナルカ、又ハ大腸菌ト連鎖狀球菌又ハ葡萄狀球菌トノ混合感染ナリキト Mannel ノ說ニ同意セリ。

Franke(1908)ハ慢性炎33例、急性炎65例ノ細菌檢索ヲ行ヒタル結果ト臨牀症狀ヲ比較シ Haim, Cohn, Mannel ノ報告ヲ批判シ大腸菌ニヨル腹膜炎ハ豫後比較的良好ニシテ連鎖狀球菌及ビ此混合感染ニヨルモノハ豫後不良ナリト言ヘリ。

Sonnenburg(1908)ハ蟲様突起ノ大多數ニ於テ大腸菌ヲ證明シ、之ニ肺炎菌、嫌氣性菌、葡萄狀球菌、連鎖狀球菌等ノ混合感染ヲ見タリ。

Heile(1909)ハ50例ノ蟲様突起炎ノ細菌學的檢査ヲ行ヒ、大腸菌90%、連鎖狀球菌60%、雙球菌10%、Staphylo, Pseudodiphtherie, Pyocya-

neus ヲ各3%ニ證明シ、尙ホ嫌氣性菌ヲモ證明セリ。

大黒(1907)ハ20例ノ炎症性蟲様突起炎ノ病理組織學的檢索ノ結果、組織内ニ連鎖狀球菌ノ外ニGram陽性ノ桿菌ヲ16例ニ於テ見出セリ。尙ホ此際組織像ニ於テ血行性感染ヲ立證ス可キ所見ハ全ク缺如シ組織内ニ侵入セル細菌ハ總テ蟲様突起内腔ニ存在スル細菌ト全ク同一ノモノニシテ、粘膜表面ニ多少ノ變化ガ常ニ存在シ、内腔ヨリ細菌ノ組織中ヘ侵入感染スル門戸ヲ認ムル等ヲ掲ゲ腸内感染說ヲ主張セリ。

Ungermann(1909)ハ38例ノ蟲様突起炎ノ好氣性培養ヲ行ヒ各種ノ細菌ヲ分離シ且毒力ヲ檢査シタル結果、蟲様突起炎ノ原因菌ハ特殊菌ノ單獨感染ニ非ズシテ多種細菌ノ混合感染ニ因ル、就中肺炎雙球菌及ビ連鎖狀球菌ヲ重要視シ、大腸菌ハ90%ニ證明セルモ最モ重篤性蟲様突起炎ニ大腸菌ノミヲ證明シタル事無シ、大腸菌ハ恐ラク第2次の意義ヲ有スルモノナルベシト言ヘリ。

Noll(1911)ハ急性早期蟲様突起炎ノ際ニハ粘膜窩ニ於ケル炎症ノ原發竈ニ白血球内ニ存在スル「グラム」陽性雙球菌ヲ認メ之ガ蟲様突起ノ病原菌ニシテ Streptococcus faecalis ナリト推測セリ。又稀ニ同時ニ存在スル「グラム」陽性桿菌ハ隨伴作用ヲナスニ過ギズト言ヘリ。

關口蕃樹氏(1913)ハ早期手術12例、間歇時手術32例、限局性又ハ汎發性腹膜炎ヲ起セルモノ19例、對照トシテ正常蟲様突起3例、ニ於ケル細菌檢索ノ結果正常ノ場合ハ塗抹標本ニテ「グラム」陽性菌ノ散在ヲ認メシモ培養ニヨリテハ嫌氣性菌ヲ得ル事能ハズ、早期手術ニヨルモノハ細菌特ニ嫌氣性菌ノ種類多ク、尙ホ稀ニハ全然好氣性菌ヲ缺ク事アリ。但シ嫌氣性菌ノ或ル一種ノミノ純培養ヲ獲ル事ハナカリキ。次ニ蟲様突起ノ纖維素性附着物或ハ漿液性滲出物ヲ檢セシニ往々ニシテ無

菌ノ事アルモ、先ヅ見ラルルハ好氣性菌ニ非ズシテ嫌氣性菌トス。更ニ蟲様突起内容ト腹膜炎ニ於ケル腹腔内膿汁トヲ比較スルニ細菌ノ種別相等シキ事アルモ、屢々後者ニ於テ種類減少シ特ニ好氣性菌ノ消滅セル事アルヲ注意スベシ。之ヲ要スルニ大腸菌ハ最モ屢々發見セラルト雖モ果シテ病原的價值ヲ有スルヤハ疑ハシク、腹腔内ニハ反ツテ嫌氣性菌ガ先ヅ侵入セルヲ見レバ蟲様突起炎ニハ寧ロ嫌氣性菌ニ重キヲ置ク可シト述ベタリ。

赤岩八郎(1913)氏ハ間歇期 87 例ノ細菌検査ヲ行ヒタルニ大腸菌最モ多ク、葡萄狀球菌、連鎖狀球菌之ニ次グ、然モ大腸菌ハ純粹培養 75%ヲ得タリトイフ。急性期 31 例ニ就テ其ノ大多數ハ大腸菌ヲ檢出シ連鎖狀球菌、葡萄狀球菌之ニ次ギ、就中大腸菌ハ 40%ノ純粹培養ヲ得タリ。

有光藤三郎氏(1916)ハ 32 例ノ腹膜炎及ビ蟲様突起周圍膿瘍ニ就テ細菌検査ヲ行ヒタルニ大腸菌最モ多ク 21 例、葡萄狀球菌 13 例、連鎖狀球菌 2 例、雙球菌 2 例、無菌 3 例、嫌氣性菌培養 5 例ナリキ。

仙波嘉清氏(1916)ハ間歇期 188 例ニ就テ好氣性菌檢索ヲ行ヒ陰性ナルモノ 59 例ヲ除キ其ノ檢出細菌ノ大多數ハ大腸菌ニシテ連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、雙球菌等之ニ次グ。急性期 51 例ノ検査ニ於テモ大腸菌ハ大多數ヲ占メ連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、雙球菌之ニ次グト言ヘリ。

Beitzke(1917)氏曰ク Aschoffノ腸内細菌感染説出ルニ及ビテ Kretz氏一派ノ血行性感染説ヲ否定スルモノ多キモ、臨牀上明カニ轉移ト思ハシムルヲ如何ニ説明スルヤ、將又扁桃腺炎ノ病原菌ハ嚥下サレ腸内ニ達スルニハ、酸性ノ胃液ノ作用ヲ受ケ死滅スルカ、或ハ又腸内ニ達シ得ルモ大腸菌其ノ他ノ腸内常住ノ細菌ニヨリ其ノ發育ヲ阻止セラル可キ理ナリ。尙ホ又全然消化管ト關係ナキ癰、丹毒、化膿創ノ場合ニ於テハ如何、尙ホ Beitzke

氏ハ血中ヲ循環スル細菌モ腸管壁ヲ通ジテ排出サル事アリ、然ル時ハ其ノ細菌ガ局所ヲ刺戟シテ障礙ヲ與フル爲、茲ニ原發病竈ヲ生ズ。故ニ血行性傳染ハ否定シ能ハズトセリ。

Runeberg(1918)氏ハ蟲様突起ニ因スル腹膜炎ノ各期ニ其ノ細菌ヲ檢索シ、特有ノ嫌氣性菌ヲ證明シ嫌氣性細菌ハ病理的ノ變化ニ對シ大ナル關係ヲ有セザルモ、反ツテ蛋白質ヲ破壞シ生ズル毒素ニ因ル中毒性ニ作用スルモノニシテ、其ノ患者ノ血清ハ大腸菌及ビ多數ニ有スル連鎖狀球菌ニハ甚ダ弱キ凝集ヲナスニカカハラズ、多數ノ嫌氣性細菌ニハ大ナル凝集ヲ現ハスモノナレバ急性蟲様突起炎ト嫌氣性菌ノ間ニハ大ナル意義ヲ認メ得ベシトセリ。

Selberg(1919)氏ハ血行感染説ト腸内感染説ヲ述べ、何レモ可能ナルモ前者ハ少數ニシテ後者ノ場合ガ多數ナラント言ヘリ。

青木徹藏(1922)氏ハ早期手術ヲ行ヘル急性炎 33 例ニ就テ好氣性培養ヲ行ヒ、其ノ内 28 例ハ大腸菌感染ニシテ其ノ炎症經過ハ多ク亞急性ナルモ局所ノ變化ハ高度ニシテ蟲様突起ノ壞疽ヲ來ス。之ニ反シ連鎖狀球菌ニヨル蟲様突起炎ハ 2 例ニシテ局所ノ變化ハ著シカラザルモ全身症狀著明ニ重症ナルモノ多シ。他ノ 3 例ハ大腸菌及ビ葡萄狀球菌ヲ證明セリ。間歇期手術患者 29 例中 3 例ハ全ク陰性、他ハ普通大腸菌ヲ證明シタルモノ最モ多シトイフ。

Brütt(1923)氏ハ 103 例ノ蟲様突起炎ノ細菌檢索ヲ行ヒ、45 回嫌氣性連鎖狀球菌ト大腸菌、3 回ハ大腸菌純粹培養、8 回ハ大腸菌ト他ノ好氣性菌¹⁾ 3 回ハ好氣性菌、15 回ハ無菌ナルヲ見タリ。ソシテ破壞性蟲様突起炎ニアリテハ嫌氣性連鎖狀球菌 Enterokokken ガ肝要ナ役ヲ演ズルト言ヘリ。

横田浩吉(1923)氏ハ健全ト思ハルル蟲様突起及ビ通常ノ内腔ヲ以テ盲腸ト交通セル間歇期ノ蟲様

突起ヨリ得タル内容、急性穿孔性腹膜炎ノ盲腸周囲膿瘍ノ膿汁並ニ囊水腫ノ渾濁セル内容等ヨリ細菌検索ヲ行ヒタル結果、白色葡萄狀球菌、病原性連鎖狀球菌、大腸菌、馬鈴薯菌、「インフルエンザ」菌等各種ノ嫌氣性、好氣性菌ヲ檢出セリ。

A. Fonio (1923) 氏ハ蟲様突起ノ組織標本及ビ純培養ヲ行ヘル成績ヨリ特異病原菌ハ「グラム」陽性雙球菌及ビ桿菌ナリト Aschoff 説ニ賛意ヲ表セリ。

高木喜寛 (1923) 氏ハ 1235 例ノ蟲様突起炎ヲ基礎トシ研究セルニ、細菌學的檢査ヲ行ヒタルモノハ急性症 116 例ニシテ其ノ内大腸菌ノミヲ證明セルモノ最モ多ク 70.8 % ニシテ大腸菌ト連鎖狀球菌ヲ混合セルモノ之ニ次ギ 19 % ナリキ。

松尾信吉 (1924) 氏ハ早期手術ヲ行ヘル蟲様突起炎 30 例、穿孔性腹膜炎 13 例、膿瘍 41 例ニ就テ檢出セル細菌ノ主ナルモノハ大腸菌ニシテ、其ノ他ハ之ニ比スレバ著シク少數ノ葡萄狀球菌、連鎖狀球菌、雙球菌等ナリト。

阿部 (1925) 氏ハ 382 例ノ蟲様突起炎細菌檢査ノ結果好氣性培養ニヨリ大多數ニ大腸菌ヲ檢出セシモ之ヲ以テ直ニ病原菌ト断定スルハ難シト記載セリ。

犬養六郎 (1926) 氏ハ蟲様突起炎ノ急性期ノモノ 35 例、間歇期 18 例ニ就テ詳細ナル分類法ニ從ツテ細菌培養ヲ行ヒタルニ、桿菌ハ 92.5 % (49 例) ニシテ其ノ大部分ハ大腸菌屬ナリ。葡萄狀球菌ハ 24.4 % (13 例) ニ見ラレ主トシテ白色葡萄狀球菌ナリ。連鎖狀球菌ハ 34.0 % (18 例) ヲ證明セリ。氏ハ之ト同時ニ各細菌ノ毒力ヲ檢シ、毒力ヲ有セル桿菌ハ急性炎初發時ニ 66.6 %, 再發性急性炎ハ 81.9 %, 間歇期ニハ 51.7 % ニシテ急性期ニハ細菌ノ毒力著シク増加スルヲ認メタリ。次ニ氏ハ組織學的研究ヲ行ヒ「グラム」陽性桿菌及ビ球菌ノ蟲様突起炎組織中ニ見出し、尙ホ少數ヲ同様ノ細

菌ヲ炎症無キ蟲様突起組織中ニ存在スル事ヲ證明セリ。且、蟲様突起炎ノ細菌傳染經路ハ腸内感染ガ大部分ヲ占ムルト言ヘリ。

吉田美壽利 (1927) 氏ハ急性炎 18 例、間歇期 42 例ノ培養ヲ行ヒ 81 % ノ大多數ニ大腸菌ヲ證明シ次デ嫌氣性菌、雜種菌、葡萄狀球菌、「ザルチーナ」、分芽菌ノ順序ニ之ヲ見出し毒性ハ大腸菌最モ強ク、大腸菌ヲ主要ナル病原菌ナリトセリ。

Meyer (1928) ハ 60 例ニ於テ「グラム」陽性球菌ヲ檢査セシニ Enterokokken 純培養、47 例、混合培養 11 例ヲ得タリ。Streptococcus viridans ハ 3 例 Streptococcus haemolyticus 1 例ヲ發見シ、此 Enterokokken ガ腸管内感染ニヨリ蟲様突起炎ヲ惹起スト言ヘリ。

Weinberg (1928) 氏ハ 160 例ノ蟲様突起ニ就テ細菌檢査ノ結果、嫌氣性及ビ好氣性細菌ヲ分離シ、壞疽性蟲様突起炎ニハ嫌氣性瓦斯桿菌ノ混合傳染最モ多ク 30 % (51 例) ヲ算シ、次デ大腸菌ト Enterokokken ノ混合傳染ニシテ 25 % (41 例) ニ達セリト。

Hilgermann und Pohl (1930) 氏ハ蟲様突起炎ニハ特殊ノ病原菌ハナク、大腸菌、瓦斯桿菌等ハ意義少ク、寧ロ咽頭ニ見ラルル virulente Bakterien 即チ肺炎雙球菌、連鎖狀球菌等ヲ第一トシ次デ「デフテリー」桿菌及ビ「スピロヘーター」等ハ電擊性蟲様突起炎ノ際ニ見ルト言ヘリ。

Schmitz (1930) 氏ハ急性炎症 87 例、壞疽性炎症 9 例、慢性炎症 4 例、計 100 例ノ蟲様突起炎ヨリ細菌檢査ヲ行ヒ、大腸菌 62 例、紡錘狀菌 25 例、其ノ他葡萄狀球菌、連鎖狀球菌、肺炎雙球菌等ヲ大腸菌ト共ニ檢出セリ。壞疽性炎症ニ於テハ紡錘狀菌ヲ見タルモ瓦斯壞疽ハ殆ド證明セズ。慢性炎症ニ於テハ大腸菌ガ葡萄狀球菌ト共ニ存在シ「デフテリー」桿菌及ビ Enterokokken ハ唯一回證明セリ。而シテ蟲様突起炎ノ原因ハ解剖學的、機械的

動機が補助的要素トナリ、其ノ爲ニ腸内ニ常存スル細菌ノ毒性亢進ガ原因の意義ヲ有スルモノト思惟セリ。

Haslhofer(1930)氏ハ蟲様突起炎ノ病原菌ハ主トシテ肺炎菌、連鎖狀球菌ヲ擧ゲ、之等ガ扁桃腺ヨリ轉移性ニ腸管内ヲ通り蟲様突起内ニ達シ發炎スルモノナリトセリ。

Aschoff(1930)氏ハ Der Appendizitische Anfall ナル單行本ヲ著シ急性蟲様突起炎ノ細菌學的検査成績ヲ報告セリ。即チ發病後少クモ 48 時間ヲ經過セルモノニ於テハ既ニ化膿性滲潤ヲ起スカ、或ハ壞疽ニ陥リ該部ニハ殘存糞便又ハ糞石ヨリノ諸種ノ細菌ヲモ證明スルガ故ニ第 1 次の炎症ヲ與フル催炎菌ノ検査ニハ發病後少クモ 34 時間以内ニ手術セル病例ヲ選バザル可ラズ。此際ハ通常 Gasödembazillen ヲ多量ニ含ムト言ハル。Kotflora ハ 36 例中 2 例ニ見タルニ過ギズ。之ニ反シ Darmstreptokokken (70%) 及ビ肺炎菌 (17%) ノ兩者ハ主要ナル催炎菌ニシテ之ニ次デ大腸菌、「グラム」陽性ノ彎曲セル桿菌、「グラム」陰性ノ「インフルエンザ」菌類似ノ桿菌等ヲ Mitterreger ナリトセリ。

廣瀬速水(1930)氏ハ早期手術例 58 例、穿孔性腹膜炎ヲ併發セルモノ 78 例間歇期手術例 284 例、計 420 例ニ就キ主トシテ好氣性菌培養ヲ行ヒタルニ、251 例ハ純培養ニテ 1 種類菌ヲ證明シ、49 例ニ 2 種類菌、8 例ニ 3 種類菌ヲ見、112 例ハ無菌ナリキ。純培養ニテ 1 種類菌ヲ證明セルハ 251 例中 84.5% ハ大腸菌、8.36% ハ連鎖狀球菌ナリ。カクノ如ク多數例ニ大腸菌ヲ證明シ得タレド之ヲ以テ直ニ病原菌ナリト斷ズルハ早計ナリトセリ。

Eichhoff und Pfannenstiel(1931)氏ハ 39 例ノ急性炎、36 例ノ慢性蟲様突起炎及ビ 6 例ノ正常蟲様突起炎ニ就テ細菌學的検査ヲ行ヒ、大腸菌、Enterokokken 及ビ Welch-Fränkel 菌ヲ以テ主

要ナルモノトシ、而シテ氏等ハ上記ノ細菌ヲ結紮セル家兎ノ蟲様突起内ニ注入シ人工的ニ蟲様突起炎ヲ惹起セシメタリ。

清水勝(1932)氏ハ當教室ニ於テ急性期 28 例、間歇期 30 例、計 58 例ノ細菌學的検査ノ結果、急性期 28 例ニ於テ大腸菌ヲ 96%、雙球(連鎖狀球)菌 96%、Welch-Fränkel 菌 50%、「グラム」陽性ノ纖細ナル彎曲セル桿菌 46%、葡萄狀球菌 11%ニ證明セリ。次ニ間歇期 30 例ニ於テハ大腸菌 76%、雙球菌(連鎖狀球菌) 76%、Welch-Fränkel 菌 46%、「グラム」陽性ノ纖細彎曲桿菌 20%、葡萄狀球菌 6%ナリ、慢性期ニ於テハ無菌ナリシ事 19.5%ニ達シタリ。最モ多キハ大腸菌ト雙球連鎖狀球菌ノ混合ニシテ 34.5%ニ達セリ。氏ハ最近更ニ嫌氣性菌ノ研究ヲ進メ Welch-Fränkel 菌ヲ 86%、Bact. amylobacter 15%、Bac. putrificus tenuis 12%、Bac. histolyticus 9%、Rauschbrandbazillus 6% 其ノ他等ノ嫌氣性菌ガ蟲様突起炎ノ際存在スル事ヲ證明セリ。

之ヲ要スルニ蟲様突起炎ノ催炎菌ニ關シテハ未ダ定説ナク、一部ノ學者ハ炎症ヲ起セル蟲様突起内ヨリ特殊ノ細菌ヲ分離シ之ヲ以テ動物實驗ヲ行ヒ、蟲様突起炎ハ特殊ノ原因菌ヲ有スト主張セルモ、一般ニハ認メラレズ。本名、菅野兩氏ハ Fränkel 氏菌ニヨリ壞疽性蟲様突起炎ヲ起シ、然モ之ハ通常ノ化膿性蟲様突起炎ト根本的ニ異ナレル別種ノモノナリトシ Aschoff 一派ノ學說ニ反對セリ。炎症性蟲様突起内ヨリ多クノ學者ニ依リテ最モ屢々證明セラレタルハ大腸菌ニシテ殆ド總テノ報告ノ一致スル所ナリ。次ニ連鎖狀球菌(雙球菌)、葡萄狀球菌ヲ證明セルモノ多ク最近ニハ嫌氣性菌ノ培養方法ノ發達ニ伴ナヒ Fränkel 氏菌ガ多ク證明セラレタリ。而シテ之等ノ細菌ハ單獨ニ Monoinfektion トシテ證明セラルル場合ハ稀ニシテ多クハ混合感染、Mischinfektion トシテ發見セ

ラルル事多シ。即チ當教室ノ清水氏ノ報告セルガ如ク大腸菌、連鎖狀球菌(雙球菌)、葡萄狀球菌、Fränkel 菌等ヲ以テ蟲様突起炎ノ催炎菌ト思考スルヲ適當トセン。

第3節 病原論ニ關スル文獻

古來蟲様突起炎ノ原因ニ關シテハ幾多ノ假説、臆説ノ發表アリ今其ノ主ナルモノヲ舉グルニ次ノ如シ。

異物説

往時ニ於テハ蟲様突起内ニ迷入セル異物が炎症ヲ惹起セシムルニ重要ナル價值ヲ有スルモノナリト考ヘラレ、今日ニ於テモ可ナリ廣ク一般世人ノ間ニ信セラレタル事ハ内外其ノ軌ヲ同ジクスルモ、事實ニ於テ異物例バ腸内ヨリ來レル膽石或ハ經口のニ果實ノ種子其ノ他ノ異物が手術ニ際シテ蟲様突起内ニ發見セラルル事ハ極メテ稀ナリ。殊ニ健全ナル蟲様突起ハ其ノ盲腸部トノ境界ニ粘膜ノ皺襞ナル Gerlach 氏瓣が存在シ容易ニ蟲様突起内ニ之等異物ノ侵入ヲ許スモノニ非ズ。然リト雖モ之等異物が一度蟲様突起内ニ陷入セバ、其ノ異物ハ此處ニ久シク止マリテ内腔ノ交通杜絶シ内容滯溜シ粘膜ニ刺戟ヲ加ヘ炎症ヲ起シ、更ニ壁ヲ壓迫破壊シ穿孔ノ原因トナル事ハ想像ニ難カラズ。而シテ吾人が最モ屢々手術ニ際シ認ムル異物ハ糞石ニシテ、之ガ成因ハ寧ろ蟲様突起炎ノ結果生成セラルルモノ多ク互ニ原因、結果トナリテ再發性ノ蟲様突起炎ヲ惹起セシムルナリ。即チ異物ノ存在ハ蟲様突起炎ノ眞ノ原因トシテ凡テノ場合ニ適用スル事ハ不可能ナルモ、時ニハ閉塞腔形成ノ一因トシテ蟲様突起炎ノ發生ニ重要ナル役割ヲ演ズル事ハ有り得ベシ。經口の異物例バ果物ノ種子、小石等ハ糞石ニ比シ其ノ價值遙ニ僅少ナリ。

寄生蟲説

腸内寄生蟲就中蛔蟲、蟯蟲、鞭蟲等ガ蟲様突起

内ニ侵入シテ炎症ヲ起ストイフ説モ可ナリ廣ク信セラレタル事アルモ、事實蟲様突起内ニ之等寄生蟲ヲ發見スル事ハ左程屢々ナラズ。尙ホ蟲様突起ニ由來スル限局性膿瘍中ニ蛔蟲ヲ見ル事アリトスルモ其ノ大部分ハ第2次的ニ穿孔部ヲ通ジテ膿瘍内ニ迷入セルモノナリ。蟯蟲又ハ鞭蟲ガ健康ナル蟲様突起内ニ發見サレ且炎症性反應ヲ殆ド認メザル事アリ。然レ共成蟲ノ屍體或ハ卵塊ガ糞石ノ成立ニ核心トナリ惹イテハ蟲様突起炎ノ原因トナル事アリト言フ。サレド我國ノ如キ多數ノ腸内寄生蟲ヲ有スル國ニ於テモ蟲様突起内ニ寄生蟲ヲ發見スルハ稀有ナレバ歐米學者ノ稱ヘシ事實ノ如キハ極メテ少數ナリ。且又蟲様突起炎ハ文明人ニ多ク支那人ノ如キ寄生蟲ノ最モ多キ國民ニ蟲様突起炎ハ却ツテ少ナシ。以上ノ如キ理由ニヨリ Aschoff 一派ハ寄生蟲成因説ヲ一笑ニ附シテヨリ寄生蟲説ハ一時全ク其ノ影ヲ没シタルモ、近年ニ至リ Steilehele (1925) 氏其ノ他ニヨリ再ビ多少學者ノ注意ヲ喚起スルニ到レリ。

傳染病説

蟲様突起炎ガ地方的ニ流行性ニ多發スルトイフ事實ハ古來報告セラレタリ。Ruge ハ細菌學のニ之ヲ研究シ急性扁桃腺炎又ハ流行性感冒ガ本症ノ原因トナリ、然カモ血行性傳染ニヨリ直接細菌ガ轉移シテ起ルト唱ヘ爾來可ナリ多數ノ實驗的研究等モ試ミラレタルモ今日ニ於テハ最早之ヲ信ズルモノナシ。

微毒説

Gaucher (1917) 其ノ他ノ佛國學者ハ遺傳微毒ニヨリ蟲様突起粘膜壁ニ炎症性變化ヲ起スト提唱シタルモ、直ニ之ヲ反駁スル學者 (Boas und Wissing) 續出シテ以來本説ハ全ク顧ミラレザルニ到レリ。

Aschoff 氏初期感染説 (1908)

Aschoff ハ動物試驗ニヨラズ人體ヨリ手術ニヨ

リ得タル新鮮ナル蟲様突起ニ就テ切片標本ヲ作リテ、7年間ニ亙リ詳細ニ研究セル結果蟲様突起炎ノ初發部位ハ蟲様突起ノ内腔粘膜ニ存在スル縦横皺襞ノ陷入部ナル事最モ多ク、蟲様突起ノ收縮運動ニ對シテ内容ノ停滯シ易キ場所ニ一致シ所謂腺窩部ニ相當スルモノニシテ、此初發部位ノ病變ハ粘膜上層ヨリ始マリ次第ニ擴大シ其ノ形狀ハ病原菌ガ腸内腔ヨリ壁中ニ侵入セルヲ示セルモノニシテ、恰モ楔狀ヲ呈シ尖部ヲ粘膜皺襞ノ初發部ニ有シ、基部ヲ漿液膜ニ向ケ病原菌ガ血行ヲ介シテ來リ、血管ヲ充填シ栓塞狀ニ病竈ヲ作リタルモノトハ理解シ難シトセリ。又原發病竈ト淋巴腺トノ關係ハ決シテ腺體ニ原發スルモノニ非ズト言ヘリ。尙ホ Aschoffハ原因タル起因細菌ニ關シ初發部位ニ於ケル粘膜上皮ノ剝脫部ニ形成サレタル白血球苔ニ於テ「グラム」陽性ノ雙球菌又ハ桿菌ヲ發見シ、此細菌ナクテハ蟲様突起炎ハ起リ得ズトセリ。

Moschkowitz (1916) 氏ハ 1500 例ノ炎症性蟲様突起ヲ検査シテ Aschoff ト略ボ相似タル結論ニ到達セリ。宮村秀雄氏 (1933) モ亦 50 例ノ蟲様突起ヲ詳細ニ検索シ Aschoff 氏腸内感染說ニ賛意ヲ表セリ。Van Cott 氏ハ曾テ蟲様突起炎ノ成因ニ就キ榮養神經或ハ血管障礙說ヲ擧ゲ Meissel 氏ハ蟲様突起根部靜脈ノ血栓形成ヲ其ノ原因トナセリ。

血管區劃說(Theorie der Gefäßsegmente)

W. Brunn (1907) 氏ハ蟲様突起ノ血管系統ヲ精細ニ検索シ、蟲様突起ノ大部分ハ迴結腸動脈ノ分枝タル盲腸蟲様突起幹 (Truncus coecoappendicularis) ノ更ニ一分枝タル蟲様突起動脈ニヨリ榮養セララルモ唯其ノ起始部ノミハ前及ビ後迴盲動脈ヨリノ分枝ヲ受クルヲ知り、且之等諸動脈ノ末梢枝ハ互ニ吻合スル事ナク、斯カル終末動脈ニヨリ養ハルル蟲様突起壁ハ各獨立ノ區劃(Segment)ヲナシ其ノ數 7 乃至 15 箇アリ。1 區劃ノ長サハ平

均 8.3mm ニシテ Brunn ニヨレバ急性蟲様突起炎ニ於テ罹患部ノ組織層ト隣接健康部ト夫レトノ限界ガ甚ダ明劃ナルハ血管運動ヲ司ル交感神經系統ノ刺激ニヨリ末梢動脈ニ血行障礙ヲ來スニ際シ之ニ伴フ粘膜層ノ變化ハ實ニ此血管區劃ニ一致シテ表ハルルガ爲ナリト説明セリ。

Paul Klemm (1918) 氏ハ蟲様突起炎ノ血行性感染說ニ反對シテ曰ク、扁桃腺炎後ニ蟲様突起炎ヲ續發シ、且該蟲様突起及ビ扁桃腺ヨリ何レモ連鎖狀球菌ヲ證明シタリトモ、夫レヲ以テ直ニ血行性感染ノ證明トナス事ハ早計ナリ。且又之ヲ以テ連鎖狀球菌ヲ含有スル唾液ノ嚥下ニヨリ同菌ガ蟲様突起内ニ到達セルモノトモ斷ジ難シ。之正常蟲様突起内ニモ常ニ該菌ノ常住スル事アレバナリ。此外正常蟲様突起内ニハ大腸菌最モ多數ニ存在ス、而シテ之等ノ細菌ヲシテ能動的タラシムルモノハ粘膜ニ直接或ハ間接ニ作用スル刺激ニシテ淋巴細胞ノ刺激ニヨリテ増殖ヲ來シ、此淋巴組織ノ増殖ハ蟲様突起粘膜ノ腺窩ヲ速カニ閉塞ス。然ル時ハ蟲様突起内腔ニ流出スベキ分泌ノ停滯ヲ來タスモノニシテ此分泌物停滯ガ細菌繁殖ノ原因ヲナスト言ヘリ。

血管神經說(Gefässnerventheorie)

G. Ricker (1927) ハ氏ノ提唱セル關係病理學 (Relationspathologie) ヨリ、凡テノ病理學的變化ヲ神經殊ニ血管神經ノ異常ナル刺激或ハ反應ニテ説明セントセリ。蟲様突起炎發生ニ關シテモ同様血管神經說ニヨリ説明セントシテ、先ヅ蟲様突起炎ノ際所謂 Vorspiel トシテ心窩部ニ疼痛ヲ惹起スル所ノ初期疼痛ハ從來單純ナル腹膜性刺激症狀ト解セラレタルモ、同氏ニヨレバ此上腹部ノ初期疼痛或ハ嘔吐ハ蟲様突起ノ漿膜面ノ病變ヨリ由來スル刺激症狀トハ推考セラレズ。太陽神經節ノ變化殊ニ急性鬱血 akute Hämatostase ニ由來シ蟲様突起炎ハ全消化器ニ來レル神經性發症 nervöse

Kriseノ部分的現象ニシテ此急性鬱血ニ因ル腸管壁血行障碍ノ爲メ盲管状態ニ在ル蟲様突起ハ最も強度ノ變化ヲ蒙リ易シ。尙ホ氏ハ副交感神経緊張者ニ於テ最も屢々蟲様突起炎ニ罹リ易ク急性蟲様突起炎ノ際ニ屢々蕁麻疹様皮膚變化ヲ見ル事、蟲様突起炎ガ月経困難ト併發スル事、胃、十二指腸潰瘍ヲ併發スル事、食餌過誤ニ因ル「アレルギー」状態ノ時ニ多ク本病ヲ發スル事等ハ何レモ副交感神経緊張症トノ密接ナル關係ヲ思ハスモノナリト主張セリ。尙ホ同氏ニ據レバ蟲様突起炎ハ細菌感染性疾患ニ非ズシテ感染アリトセバ夫ハ概ネ第2次的ニ起セルモノナルハ恰モ水銀中毒時ニ於ケル結腸粘膜面ノ潰瘍ニ於ケルガ如ク、蟲様突起炎ノ本態ハ血管神経ノ刺戟ニヨリ壁層血管腔ノ擴張即チ終末流域 (terminale Strombahngebiete) ノ血行緩慢ヲ來シ、從ツテ血管内ニ赤血球停滯シ所謂 rote Stase ヲ起シ、又臍胞周邊ニハ赤血球滲出 (Erythrodiaapedese) ヲ見ル。之ニ次デ白血球停滯 weisse Stase 及ビ白血球滲出 (Leukodiaapedese) ヲ伴フニ至ル。要スルニ末梢血管梗塞ノ結果ニ基キ該血管流域ノ組織層壁ニ榮養障碍ヲ來シ、以テ腸管壁ノ一部ニ局所的貧血性壊死或ハ楔狀梗塞 (Infarkt) ヲ起シ、此部ニ正常腸内ニ生存セル細菌ノ2次的ニ腸管壁組織中ニ侵入感染シ之ニヨル炎症狀態ヲ伴ヒ進行性壞疽性蟲様突起炎ヲ起ストイフ。又 Ricker ノ説明ニヨレバ此急性變化ニシテ其ノ程度ノ最も輕少ナルモノガ組織のニハ Aschoff ノ所謂初期感染ニ一致セルモノナル可ク、又蟲様突起炎ハ Aschoff ノ言フガ如ク輕症ナル初期感染ヨリ順次重篤ナル變化ヲ伴ナヒテ遂ニ壞疽穿孔等ノ合併症ヲ起スモノニ非ズシテ、初メヨリ重篤ナル變化ニ初マルモノ、又終リ迄輕微ナル變化ニ止マルモノ等々各自ラ定マレルモノニシテ、此 hämorrhagische Nekrose ハ 15 分位ノ短時間ノ循環障碍アレバ起リ得ルモノニシテ Sequester

ニナリシ部ニハ數時間以内ニ細菌侵入シ壞疽性蟲様突起炎ヲ完成スル事疑ナシト言フ。且又蟲様突起ハ明カニ蠕動運動ヲ有シ生體ニ於ケル粘膜ノ皺襞、陷凹部ハ摘出標本ニ見ルガ如ク固定的ノモノニ非ズシテ蠕動運動ト共ニ變轉極マリナク爲メニ細菌ノ感染ハ Aschoff ノ言フガ如ク容易ナラズトセリ。

1929 年「ブレスラウ」大學外科教室ノ Reischauer 氏ハ臨牀的立場ヨリ Ricker 説ニ賛成シ蟲様突起炎最初ノ症狀ハ太陽神經節ノ變化ニテ殊ニ急性鬱血 (akute Stase) ヲ由來シ蟲様突起ト、全消化器系ニ發現セル神経性發症 (Nervöse Krise) ノ只一ツノ部分的現象ナリト主張シ、此急性鬱血ニヨル腸管壁血行障碍中盲管状態ニアル蟲様突起ハ解剖的關係上最も強度ノ變化ヲ蒙リ恰モ胃潰瘍發生ニ關スル Berckmann ノ神経説ト同様ニ解シ得ルニ非ザルヤト思考シ、更ニ又副交感神経緊張者ニ最も屢々蟲様突起炎ニ罹ル事實ヲモ臨牀上證明シ得テ以テ上記ノ神経説ニ一致セル關係アルヲ知レリ。

C. Böhne (1932) 氏モ最近ニ此 Ricker ノ血管神経説ニ賛意ヲ表セリ。

濱田稻積 (1931) 氏ハ多數ノ蟲様突起ノ組織學的檢索ヲ行ヒ早期ニ於ケル組織ノ壊死、上皮剝離、出血又ハ貧血、Erosion 等ヲ證明シ之等ノ變化ニ着目シテ、胃ニ於ケル痙攣ガ諸種ノ病變ヲ惹起セシムルト同様、蟲様突起ニ於テモ亦神經ノ過度ノ亢奮ガ上述ノ如キ變化ノ原因ニ關スル事アルベシト言ヘリ。

「トリブシン」酵素説

Heile (1930) 氏ハ犬ニ於ケル實驗ニ於テ特ニ肉ヲ飽食セシメ、此犬ノ蟲様突起内ニ多數ノ未ダ分解セラレザル蛋白質ト、未ダ結合セザル酵素ガ證明セラレ、尙ホ腸管壁ノ組織的檢査ニヨリ初期感染様ノ變化ヲ起セルヲ認メタリ。又人間ニ於テ

15 例ノ蟲様突起ニ其ノ血行ヲ出來ル限リ障礙セズシテ基礎部ヲ結紮シ先端ヨリ 5 % ノ「トリブシン」液ヲ注射シ暫ク後之ヲ切除シ組織學的ニ其ノ變化ヲ檢シタルニ粘膜一部ニ壞死ヲ認メ、之ハ蟲様突起粘膜ガ消化液ニ觸レル事ニヨリ壞死ニ陥ルモノナリトシ、其ノ炎症發生機轉ニ就キ Aschoff 説ヨリ更ニ竿頭一步ヲ進メタル説明ヲ試ミタリ。即チ今腸内容ガ直接蟲様突起内ニ進入スルカ、或ハ然ラズトモ消化時ニアリテハ交感神經ノ反射的作用ニヨリテ、蟲様突起腔内ニ粘液ノ分泌充進ヲ來シ殊ニ腸トノ交通遮斷サレタル時ハ新カル分泌物ハ強度ノ「トリブシン」酵素ノ作用ヲ發現ス。即チ本症ノ發病ニハ内容ノ停滯ヲ肝要トス、殊ニ未ダ消化シ盡サレザル蛋白質及ビ醱酵素ヲ含メル糞便ノ停滯多キ程炎症ハ進行ス。即チ化學的毒素ニヨリテ Aschoff ノ所謂初期感染ヲ生ジ、此毒素ノ開拓セル道ヨリ腸内ノ Virulente Bakterien ガ侵入シ炎症ヲ惹起スルモノナリト言フ。且此際新カル内容ノ水素「イオン」ハ「アルカリ」性ニ傾ケルモノニシテ、此事實ハ他方動物實驗ニ於テ過剰ノ蛋白質ヲ攝リタル時ノ盲腸部内容ハ強キ「アルカリ」性ヲ呈スル事ト一致セル所見ニシテ、若シ此時蟲様突起内容ガ盲腸ニ流出セザル時ハ粘膜自己ニ對スル刺激トナリテ臨牀上症狀ハ伴ナハザルモ、蟲様突起粘膜ニハ加害兒ヲ招來ストイフ。又若シ斯カル酵素ニ富メル内容液ガ他ノ内容物及ビ細菌ト共ニ長ク滯溜セル時ハ特有ノ毒性ヲ示シ、一方蟲様突起其ノモノノ應着、捻轉或ハ糞石其ノ他ノ原因ニヨリテ内容壓ガ高マリタル時ハ物理的ニ最モ抵抗ノ弱キ粘膜部ニ三角形ヲナセル所謂初期感染竈ヲ形成シ更ニ之ヨリ内壓ノ關係ニヨリテ血管ノ變化ヲ來シ、組織内ニ出血ヲ見、壞疽ヲ起シ、惹イテ蟲様突起壁ノ著シキ破壊的變化ヲ招クモノナリト言ヘリ。此 Heile ノ説明ニハ共鳴スル者少ナカラズ、例バ Leningrad ニ

於ケル第 17 回露國外科學會ノ際ノ Solovjev und Adelson 氏ノ報告ヲ見ルニ氏等ハ Heile ノ考フル如ク蟲様突起炎發病ノ主因ハ糞便ノ存在ニアリ、消化未了ノ蛋白質及ビ有害毒物ニヨリ粘膜ニ傷害ヲ及ボシ非病原菌ニモ影響ヲ來タスト述ベタリ。又米國人 A. A. Salvin (1928) ハ胃腸内ノ異常醱酵ガ屢々急性蟲様突起炎ニ前驅シ又ハ原因トナル、即チ異常ノ内容ガ蟲様突起内ニ入り醱酵ニヨリテ粘膜ヲ傷害シ次デ傳染シテ蟲様突起炎ヲ惹起スト報告セリ。

然ルニ之説ニ反對シテ Böhning (1931) 氏ハ 24 例ノ人體蟲様突起ニ就キ實驗的ニ 5—10 % 「トリブシン」溶液ヲ蟲様突起内ニ注入シ、12 分乃至 1 時間室溫乃至 40 度ノ孵卵器中ニ留置シテ「トリブシン」ヲ粘膜ニ作用セシメタル後之ヲ取出シ組織學的ニ檢索セリ。氏ノ所見ニヨレバ斯カル方法ニヨリテ一見初期感染ニ酷似セル組織像ヲ認メ得ルモ、之ハ單ニ機械的產物ニシテ、第 2 次的ニ此物質缺損部ヨリ「トリブシン」ガ作用シテ、局所ノ壞死ヲ來セリト思ハルル變化ヲ見テ、Heile ノ認メタル所謂初期感染ト稱スルモノモカカル人工的產物ニシテ、Aschoff ノ所謂眞ノ初期感染トハ全ク異リタルモノニシテ、抑々 Aschoff ノ所謂眞ノ初期感染トハ蟲様突起管壁ニ生存セシ雙球菌ガ侵襲性ニ繁殖シ上皮層下ニ進入シ著シキ白血球ノ移動ヲ招來シ爲ニ上皮ニ微細ナル缺損ヲ示スモノナルガ故ニ、局所ノ壞死ヲ以テ蟲様突起炎ノ初期變化ト看做ス理ニシテ、Heile ノ實驗ニ於ケルガ如キ人工的壞死形成ヲ以テ蟲様突起炎ノ成因ヲ解カントスルハ誤リニシテ、然モ氏ノ見タル「トリブシン」壞死竈ハ實ハ「トリブシン」酵素ノ作用ニヨルモノニ非ズシテ、高壓ノ下ニ器械的ニ管腔内ニ壓入サルタル「トリブシン」溶液ガ一定時間ヲ經テ消化性變化ヲ示シタルモノニ過ギズト極言シ Heile 氏説ニ反對セリ。

以上諸氏ノ原因論ノ外ニ近年多數ノ學者ニヨリ内容ノ停溜ガ重要視セラルルニ至レリ。即チBowen (1929) ハ内容ノ停滯ニヨリテ糞便ガ濃縮セラレ糞塊又ハ糞石ヲ生ジ、之等ガ内腔ヲ閉塞シ、又壓迫ニヨリテ潰瘍ヲ生ジ細菌感染ヲ起ストナセリ。Oberndorfer (1929) 氏ハ蟲様突起ノ淋巴性裝置及ビ Lieberkühn 氏腺ヨリ淋巴球ヲ混ジタル粘液ヲ排出シ筋力障礙セラルレバ内容ノ停滯ヲ來シ細菌感染ヲ促スト述ベタリ。又 Westphal (1930) 氏ハ人體ニ於テ「レントゲン」寫眞ヲ利用シテ「ピロカルピン」注射ニヨリ様蟲突起ノ短縮ヲ來シ彎曲ハ消失シ、「アトロピン」注射ニヨリ之ガ延長及ビ弛緩ヲ來ス事ヲ證明セリ。

Rössel (1931) 氏ハ犬ヲ用ヒテ蟲様突起ノ自己淨化作用ニ障礙アレバ炎症ヲ起スト言ヒ、上田寛一 (1932) 氏ハ盲腸部以下ノ大腸ニ内容ノ通過障礙ガ

アリテ其ノ内容ガ盲腸部ニ堆積スレバ、盲腸部ハ之ガ排泄ニ努力シ遂ニ其ノ筋肉裝置ノ疲勞ヲ來シテ盲腸ガ弛緩シ、次デ蟲様突起モ弛緩シ、内容ガ鬱滯シ加ルニ性ヲ異ニセル消化液ノ化學作用ニヨリ粘膜ノ一部ニ損傷ヲ生ジ此部ヨリ細菌感染ヲ起スモノナリトセリ。

山村止雄 (1929) 氏ハ蟲様突起内ニ大腸ノ内容タル糞便ガ逆流シ來リ蟲様突起内ニ停滯シ、或ハ糞石ノ形成等ガ外因トナリテ炎症ヲ起ス外ニ、内因トシテ先天性ニ蟲様突起壁ニ循環障礙ヲ起シ易キ事ヲ擧ゲタリ。而シテ蟲様突起炎ガ糞便ノ侵入及ビ滯留ニヨリ起ル場合ニ糞便ヨリ有毒ノ產物ヲ生ジ其ノ爲ニ蟲様突起壁ヲ傷害シ、或ハ糞便ノ滯留ガ細菌ノ繁殖及ビ毒性増進ヲ促ガシテ炎症ヲ起スト言ヘリ。

第 3 章 實驗眼目、材料並ニ方法

第 1 節 實驗眼目

前記文獻概要ニ於テ既ニ検討シタルガ如ク、蟲様突起炎ノ成因ニ關スル動物實驗ノ報告ハ實ニ多種多様ニシテ、内外國ニ於テ殆ド枚舉ニ遑無キモ、其ノ結論ニ到リテハ未ダ一致スル處ヲ見ズ。而シテ蟲様突起炎ガ細菌ニヨリ起ル事ハ今日ニ於テハ廣ク信ゼラルルニ至リタレドモ其ノ原因菌ニ關シテハ未ダ確定セラレズ。Aschoff 其ノ他ノ學者ノ嘗テ唱ヘシ如ク特有ノ原因菌ニヨリテ起ルトイフ説ト、大腸菌其ノ他一般腸管内ニ生存セル細菌ニ因リテ起ルトイフ説等アリテ未ダ確定セズ。人類蟲様突起炎ノ細菌學的檢索ノ結果ハ殆ド常ニ大腸菌ガ證明セラレ、尙ホ雙球菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌 Enterokokken 等ノ好氣性菌、或ハ「グラム」陽性ノ Welch-Fränkel 菌其ノ他ノ嫌氣性菌等ガ夫々 1 次的、或ハ 2 次的ニ原因トナル等定説ヲ見ズ。當致室清水勝氏ハ綿密ナル細菌檢索

ノ結果大腸菌、雙球菌(連鎖狀球)菌、葡萄狀球菌、Welch-Fränkel 菌等ヲ夫々單獨又ハ混合感染トシテ證明セリ。

余ハ家兎ノ蟲様突起ニ完全結聚、或ハ不完全結聚ヲ起サシメタル後、上述ノ各種細菌ヲ單獨又ハ混合シテ注入スル時ハ實驗的蟲様突起炎ヲ惹起セシメ得ルヤ否ヤヲ、組織學的ニ檢査シ、且其ノ際ニ動物ノ血液中ノ鹽素含有量ハ如何ニ變化スルヤヲ實驗セリ。蓋シ急性腸閉塞症又ハ急性化膿性腹膜炎等ノ如キ中毒性疾患ニ際シテ體內鹽素「イオン」ガ解毒的ニ作用ストイフ説ハ Haden 及ビ Orr 等ノ已ニ唱ヘシ所ニシテ爾來鹽素「イオン」ノ新陳代謝ニ關シテハ多數諸氏ノ報告アリ。

松倉 (1931) 氏ハ腸閉塞時ニ於ケル血液鹽素量ノ減少スル事ヲ證明シ、井乾源 (1930) 氏ハ穿孔性汎發性腹膜炎時ニ於テモ血液鹽素量ノ減少スル事ヲ犬ニヨリテ實驗セリ。余ハ寡聞ニシテ未ダ實驗的

蟲様突起炎ニ際シ之ガ組織學的檢索ト同時ニ血液・内鹽素量ノ變動ヲ時間的ニ測定シタル報告ヲ知ラズ。余ハ此點ヲ一實驗眼目トシ更ニ動物ノ人工的蟲様突起炎ニハ Cavit close ノ必要性ト。其ノ際ニ必要ナル細菌ノ種類竝ニ其ノ配合ニヨリ病理組織學的ニ如何ナル變化ヲ起スヤヲ明カニセントセリ。

第2節 實驗材料

從來此種ノ實驗材料動物トシテハ主トシテ犬及ビ家兎ガ使用サレタルモ、稀ニハ鶏、「モルモツト」豚等ヲ選ベル人アリ。吳氏ハ最初實驗的蟲様突起炎ノ材料動物トシテ犬ヲ選ビタルモ、犬ノ蟲様突起ハ其ノ形態、全長ノ經過ニ於テ人體ニ於ケルモノト大イニ異リ、蜿蜒シ周徑不等ナルノミナラズ、盲腸ヨリ蟲様突起ニ移ル移行部ノ内腔廣ク、且間膜ハ短小厚層ニシテ血管ノ走行ヲ明カニ分別シ得ズ、又蟲様突起ノ壁ハ極メテ菲薄ナルガため、牽引ニヨリ盲腸及ビ腸間膜ノ壞死ヲ起シ斃死シ易シ、猶ホ犬ニ於テハ完全ナル麻醉法ノ不備ナル事アル等種々ナル點ニ不便ヲ認メタルヲ以テ、犬ニ依ル實驗ハ僅ニ 10 例ニテ中止シ其ノ後ハ専ラ家兎ヲ用ヒテ實驗セリ。家兎ノ蟲様突起ハ形態、全長ノ經過等人體ノ夫レニ酷似シ、腸間膜ハ菲薄ニシテ血管ノ走行ヲ明カニ認メ得テ、且蟲様突起ノ大サ人體ノ夫レニ比シ著シク長大ナルハ却ツテ實驗操作ヲ施行スル上ニ種々便利ナル事ヲ認メタリト。余モ亦家兎ヲ以テ實驗動物ニ選ビ、成長セル 2 kg 以上ノ雄性ノモノヲ用ヒ動物購入後數日間ハ教室ニ於テ豆腐粕ヲ以テ飼養シタルモノヲ使用セリ。

實驗ニ使用セル細菌ハ凡テ當教室清水氏ガ人間ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル菌株ヨリ 24 時間純培養ヲ行ヒテ使用セリ。

第3節 實驗方法

人間ニ於ケル蟲様突起炎ノ際ニハ其ノ程度ニ於テ種々ノ差異アリト雖モ、其ノ内腔ニ狹窄ヲ起シ或ハ交通ノ遮斷セラレ所謂閉塞腔 Cavit close ヲ形成スル事ガ蟲様突起炎ノ原因トシテ重要視セラルル事ハ前記多數學者ノ實驗ニヨリ明カトナリ、今日ニテハ一般外科醫ノ認ムル所ニシテ糞石、糞塊、寄生蟲其ノ他ノ異物ニヨル管腔閉塞、或ハ蟲様突起ノ屈折、彎曲、索狀物ニヨル絞扼、周圍トノ癒着、癰痕、粘膜ノ腫脹、Gerlach 氏嚢ノ閉鎖等ニヨリ閉塞腔ガ形成セラレ内容ノ鬱滯ヲ起スモノナリ。此點ニ着眼シテ内腔ノ遮斷試驗ヲ行ヘルハ Heile, Eichhoff und Pfannenstiel, 吳氏等アリ、余モ亦此方法ニヨレリ。即チ家兎ヲ何等麻醉法ヲ用ヒズ動物手術臺上ニ背位ニ固定シ、手術部位ノ毛ヲ充分剪除シタル後 Grossich 氏法ニヨリ皮膚消毒ヲ行ヒ、術者ノ手指、器械及ビ諸材料ノ消毒ハ人體ノ開腹手術ト同様ニ嚴密消毒セリ。斯クノ如ク無菌的ニ準備操作ヲ行ヒタル後、正中線ニ於テ比較的上腹部ニ 6—8 cm 皮膚切開ヲ加ヘ蟲様突起ニ達シ、其ノ起始部ヨリ約 1 cm 距テタル部分ニ於テ腸間膜及ビ之ヨリ分岐走行セル蟲様突起動脈及ビ靜脈ヲ避ケ鈍的ニ可ナリ太キ絹糸ヲ通ジタル後、蟲様突起ノ壁ヲ靜ニ指ニテ輕ク摩擦シ内容タル糞便ヲ盲腸ノ方向ニ移ラシメ内容ヲ空虚トシ、或ハ之ヲ行フ事ナク内容タル糞便ノ存在スル儘、絹糸ニテ結紮シ閉塞腔ヲ形成シタル後、豫メ準備シ置キタル大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、Frnkel 菌等ノ細菌浮游液ヲ單獨ニ或ハ混合シテ、蟲様突起ノ先端ヨリ壁ヲ斜ニ貫キ細小ナル注射針ヲ有スル注射器ニテ注入セリ。注射針ヲ引拔キタル跡ハ清潔ナル綿紗ヲ以テ拭ヒ、尙ホ酒精綿球ニテ清拭セリ。斯クノ如ク手術セル動物ハ安靜ニ保温シ、且術後 2 時間、8 時間、24 時間及ビ以後毎日血中鹽素量ノ測定ヲ行ヒ、一部ノ動物ニ

於テハ白血球數ノ變化ヲ計算セリ。斯クテ動物ノ斃死セル場合ハ直ニ之ヲ解剖シ、長ク生存セルモノハ一定期間後ニ之ヲ撲殺シテ開腹シ、肉眼的ニ十分其ノ腹腔内特ニ蟲様突起ノ状態ヲ觀察シタル後、蟲様突起ヲ切除シ之ガ内容ヲ觀察シ之ヲ細菌學的検査ヲ行ヒタル後、4%「フオルマリン」溶液ニ固定シ「パラフィン」包埋法ニヨリ横斷切片ヲ作リ「ヘマトキシリン—エオジン」重染色法並ニ「グラム」氏染色ヲ行ヒテ檢鏡セリ。尙ホ必要ニ應ジテ Van Gieson, Sudan III. 染色等ヲ施シ且「グラム」陰性菌ヲ検査スル目的ニテ Zieler'sches polychromes Methylenblau 染色、本名、菅野氏ノ推獎セル Levaditi 氏鍍銀法ヲモ併用セリ。

血中鹽素量測定方法ニハ種々アルモ余ハ Bang 氏法藤井氏變法ニヨル微量測定法ヲ用ヒタリ。即

チ家兎耳靜脈ヨリ流出セル血液ヲ精製セル Bang 氏吸取紙ニ吸着セシメ之ヲ成ル可ク速ニ「トルヂオンスワーグ」ニテ秤量シタル後「コルベン」中ニ落シ過剰ノ（通常 1.0 cc）經驗的硝酸銀定規液ヲ加ヘ、銀鹽化物ノ生成ヲ完全ナラシメ、更ニ濃硝酸液 2cc ヲ加ヘ過「マンガン」酸加里溶液ヲ滴加シツツ加熱シ、充分酸化セシメ血液蛋白質ノ消化灰化ヲ完全ナラシメ、同時ニ吸取紙片ヲモ碎破素化シ硝酸性「メデウム」ニ於テ不溶性ナル鹽化物ノミヲ沈澱セシム、カクノ如ク、所謂濕潤性灰化法ヲ行ヒタルモノヲ少量ノ鹽水ニテ「コルベン」壁ヲ洗ヒタル後、鐵明礬飽和溶液ヲ指示薬トシテ一定値ヲ有スル定規「ロダナンモン」液ニテ滴定シ終反應トナス。之ニヨリ藤井氏公式ヲ用ヒ血中鹽化物ノ量ヲ全部食鹽ノ% トシテ算出セリ。

第 4 章 各種對照試驗

第 1 節 正常家兎蟲様突起

第 1 項 肉眼的の所見

總テ動物ノ蟲様突起ハ人間ノ夫レニ比シ著シク大ニシテ、其ノ性能モ亦人間ト大イニ異ル。家兎ノ蟲様突起モ亦此例ニ洩レズシテ巨大ナル盲腸ノ終末端ニ連續シ通常長サ約 10 cm, 直徑約 1.0 cm ニシテ、其ノ壁ハ他ノ小腸、大腸、盲腸部等ノ壁ノ著シク菲薄ナルニ比シテ、可ナリ厚ク壁ノ内部ハ殆ド全ク淋巴臄胞ニテ充滿サレ人間ノ蟲様突起ト類似ノ構造ヲ有シ、色彩モ亦他ノ腸部ト異ナレルヲ以テ一見シテ之ヲ區別スル事ヲ得ベシ。位置ハ通常盲腸ノ後側ヲ廻リテ後上方ニ向ヒ胃ノ下方小腸中ニ終レルヲ以テ、開腹術ノ際ハ人間ノ場合ト異リ正中線ニ於テ比較的上腹部即チ劍狀突起ヨリ臍ニ達スル中間ヲ切開シ胃ノ下方ヲ探レバ容易ニ蟲様突起ヲ求メ得ベシ。小

腸間膜ハ甚ダ菲薄纖細ニシテ血管ノ走行明白ナリ。其ノ血管ハ先ヅ主幹動脈及ビ靜脈ガ小腸間膜ノ蟲様突起ヘノ附着部ニ於テ長軸ニ沿ヒテ走り、蟲様突起ノ終末ニ達シテ終ル。此主幹動脈ヨリ蟲様突起ニ向ツテ等間隔ニ多數ノ側枝ヲ平行ニ分枝シ居レリ。（第 1 圖參照）

猶ホ家兎ニ於テ自發的蟲様突起炎ノ存在セル事ヲ Heile ハ 100 例中 6 例ニ於テ發見セリ。Carrus, Mori モ同様家兎ノ spontane Typhritidis ノ存在ヲ報告シ Eichhoff und Pfannensiel 氏ハ 56 匹中 2 例ニ自然治癒セル自發的蟲様突起炎ヲ實驗中ノ家兎ニ於テ偶然ニ發見セリ。即チ腸管ガ瘢痕性トナリ内腔ガ狹窄ヲ起シ一部分萎縮シ中ニ糞石ヲ證明セリトイフ。余モ亦約 200 匹ノ實驗動物中僅ニ 1 匹ニ於テ先端ノ膨隆シ自發的蟲様突起炎ヲ惹起シ治癒シタリト思ハルル例ヲ見タリ。（第 2 圖參照）

第2項 顯微鏡の所見

正常家兎蟲様突起ノ横斷切片ヲ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色ニヨリ檢鏡スルニ、粘膜層表面ニハ表皮細胞ガ整然ト配列シ其ノ内方腔内ニハ通常少量ノ脱落物質ト共ニ粘液ノ分泌サレタルヲ見ル。粘膜層内ニハ深ク Lieberkühnsche Drüse ガ入り込ミ正常像ニ於テハ毛細血管ノ擴張充血等著シカラザルヲ普通トス。淋巴腫胞ハ甚ダシク良好ニ發育シ全周圍ヲ包圍シ其ノ境界ハ明瞭ナリ、腫胞中隔部ノ結締組織ハ中等度ニ發育シ細胞滲潤無キヲ通例トス。筋膜層ハ内輪層ト外縱層ヨリナリ内輪層ハ厚ク外縱層ハ薄ク何レモ整然タル筋纖維ノ配列ヲ見ル。漿膜ハ菲薄ニシテ纖維素、膿苔等ヲ附着セズ、小腸間膜ノ血管ハ正常ニ於テ輕ク充盈セルモ擴張又ハ血管周圍ノ細胞滲潤等ヲ見ル事ナシ。(第3圖及ビ第4圖參照)「グラム」氏染色ニ於テハ粘膜面ニハ細菌ノ附着セルヲ見ルモ深く組織内ニ侵入セル細菌ヲ見ルハ比較的稀ナリ。細菌ノ種類ハ正常蟲様突起内ニ生存セル各種ノ桿菌及ビ球菌ナリ。

第3項 正常家兎蟲様突起内細菌

人間ノ蟲様突起炎ノ場合之ガ細菌檢索ハ既ニ多數ノ學者ニヨリ種々報告セラレタルモ、其ノ大部分ハ健康人ノ口腔内細菌或ハ腸管内糞便中ニ生存スル細菌ト同種類ナリ。余ノ實驗ニ使用セシ大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、Welch-Fränkel 菌ハ何レモ人間ニ於ケル急性蟲様突起炎ヨリ分離培養セルモノナリ。余ハ正常家兎蟲様突起中ニ之等ノ細菌ノ存在セルヤ否ヤヲ證明セントシテ、普通寒天平板

培養基、Bouillon 及ビ Mark Shoetensack 氏嫌氣性菌分離法等ヲ用ヒテ分離培養ヲ實施セリ。

家兎第170號

塗抹標本ニヨリ 1)「グラム」陽性ノ大桿菌、2)「グラム」陰性ノ小桿菌、3)「グラム」陽性雙球菌、4)連鎖狀球菌ヲ見タリ。

純培養ニヨリテハ 1)大腸菌、2)白色葡萄狀球菌、3)Fränkel 菌ヲ分離セリ。

家兎第171號

塗抹標本ニヨリ 1)「グラム」陽性ノ大桿菌、2)「グラム」陽性葡萄狀球菌、3)「グラム」陽性ノ雙球菌ヲ見タリ。

純培養ニヨリテハ 1)Fränkel 菌、2)大腸菌、3)黃色葡萄狀球菌、4)連鎖狀球菌等ヲ分離セリ。

家兎第172號

塗抹標本ニヨリテ 1)「グラム」陽性ノ桿菌、2)「グラム」陽性ノ雙球菌、3)「グラム」陰性ノ小桿菌、4)「グラム」陽性葡萄狀球菌。

純培養ニヨリテ分離セル菌 1)大腸菌、2)白色葡萄狀球菌、3)黃色葡萄狀球菌、4)連鎖狀球菌、5)Welch-Fränkel 菌。

以上ノ實驗ニ依ルニ大體人間ノ蟲様突起炎ニ見タル菌ト同種類ナリ即チ 1)大腸菌、2)白色及ビ黃色葡萄狀球菌、3)Welch-Fränkel 菌等ハ殆ド毎常之ヲ證明スル事ヲ得タルモ連鎖狀球菌又ハ雙球菌或ハ Enterokokken トイハルル者ハ前者ニ比シ比較的之ヲ證明スル事少ナシ。

第2節 正常家兎血液内鹽素量

富永(1929)氏ハ家兎ノ水分竝ニ鹽素代謝ニ就テ詳細ニ研究シ全血中ノ鹽素濃度ハ最も低ク、同一動物ニテモ血漿ヲ用ヒタル場合ハ之

ヨリモ多ク、血清ニ於ケル鹽素ノ含有量ハ最も高シ。鎌田氏(1927)モ亦家兎血液ノ食鹽量ヲ研究シタルニ動物個々ニヨリテ一定セズ、且同一ノ家兎ニ於テモ日ヲ異ニスレバ含量ニ相當ノ差異ヲ見、又1日中ニ於テモ時間ニヨリテ増減アリ其ノ日差ハ0.018乃至0.088%ニ達ス此外家兎ハ一定時間繩縛スル事ニヨリテ血液中ノ鹽素量ノ増加スル事ヲ證明セリ。

今多クノ學者ノ報告セル正常家兎ノ血液中ノ鹽素濃度ニ就テ之ヲ表示スレバ(第1表)ノ

第1表 正常家兎血中鹽素濃度表

報告者	血液ノ區分	測定法	鹽素濃度食鹽換算量(%)
上原	靜脈血血漿	富永、芦川法	0.555—0.600
多賀谷	靜脈血全血	Rusznayak	0.396—0.480
神林	動脈血全血	Folin-Wu	0.496
◇	動脈血血漿	◇	0.620
杉田	靜脈血全血	Bang	0.450—0.510
鎌田	◇	Rusznayak	0.524—0.588
阿部	◇	Bang	0.440—0.520
藤田	◇	Rusznayak	0.542—0.635
藤井	◇	藤井	0.456—0.513

如クナル。

余ハ實驗ニ先ダチ余ノ選ビタル Bang 氏法ノ藤井氏變法ニヨル微量鹽素測定法ニ熟練シ、且如何ナル程度迄正確ニ測定シ得ルヤ、或ハ技術上ノ誤差ハ如何程ニ來ルヤヲ檢シタリ。即チ0.1%ノ正確ナル食鹽水ニテ本法ヲ以テ檢シ大約小數點以下2位迄ハ正確ニ測定シ得タリ。

第3節 動物飢餓時ノ血中鹽素量變動

動物ニ於テ開腹手術ニヨリ蟲様突起ニ侵襲ヲ加フル事ハ、家兎ヲシテ衰弱ノ状態ニ導クノミナラズ、手術後ニハ屢々食餌ヲ顧ミザル事アリ、從ツテ動物ニ手術ヲ施シ血液中ノ鹽素量ノ變動ヲ檢スルニ際シテハ對照トシテ動物ヲ絶食セシメ、飢餓状態時ニ於ケル血中鹽素量ヲ檢スルハ必要ナリ、余ハ此意味ニ於テ6匹ノ家兎ヲ使用シ10日間絶食セシメテ、之ノ體重及ビ鹽素量ヲ測定セシニ(第2表)ノ如ク絶食第1日ヨリ次第ニ増加シ第5日頃以後ハ概ネ一定ノ價ヲ保ツモノノ如シ。

第2表 家兎飢餓時體重及ビ鹽素量變動表

動物番號	檢査	絶食日										
		食直後	絶食第1日	第2日	第3日	第4日	第5日	第6日	第7日	第8日	第9日	第10日
31	體重	1750	1600	1570	1400	1340	1250	1100	斃死			
	Cl量(%)	0.500	0.541	0.538	0.554	0.567	0.537	0.495				
32	體重	3100	2850	2800	2750	2700	2630	2360	2230	2050	2000	斃死
	Cl量	0.520	0.555	0.542	0.560	0.567	0.579	0.560	0.566	0.590	0.591	
33	體重	1750	1600	1570	1550	1530	1500	1450	1400	1340	1300	1200
	Cl量	0.522	0.510	0.548	0.560	0.584	0.587	0.574	0.547	0.525	0.560	0.550
40	體重	3000	2800	2740	2700	2580	2470	2380	2340	2275	2230	2200
	Cl量	0.484	0.495	0.516	0.512	0.520	0.510	0.530	0.550	0.551	0.547	0.546

動物番號	檢査	絶食日										
		食直後	絶食第1日	第2日	第3日	第4日	第5日	第6日	第7日	第8日	第9日	第10日
41	體重	2100	1850	1830	1780	1700	1620	1570	1470	1390	1340	斃死
	Cl量	0.473	0.506	0.525	0.505	0.510	0.521	0.542	0.544	0.544	0.550	
42	體重	2010	1800	1740	1630	1580	1460	1350	1290	1200	斃死	
	Cl量	0.452	0.502	0.531	0.527	0.540	0.540	0.549	0.545	0.541		
平均	體重	2285	2083	2042	1969	1905	1832	1702	1746	1651		
	Cl量	0.492	0.518	0.534	0.536	0.548	0.546	0.542	0.550	0.552		

第5章 實驗成績

第1節 蟲様突起不完全結紮試驗

家兎ノ蟲様突起ヲ輕ク不完全結紮ヲ施セル場合、及ビ更ニ不完全結紮ヲ行ヘル蟲様突起ノ先端ヨリ細少ナル針ヲ有セル注射器ニテ各種ノ細菌浮游液ヲ注入シ動物ハ如何ナル變化ヲ起スヤヲ肉眼的ニ觀察シ又組織學的標本ヲ作りテ檢鏡セリ。(附表第1参照)

家兎第36號(不完結)2340 gr.

動物ハ手術實施後2,3日間ハ食慾稍々減少シ體重亦減少セシモ4日目ヨリ食慾正常ノ如ク旺盛トナリ、體重亦減少セザルニ至レルヲ以テ、術後7日目之ヲ撲殺シ開腹シ見ルニ腹膜炎症狀ヲ認メズ、蟲様突起ハ正常ニシテ炎症症狀ヲ見ズ。内容ニハ糞汁存在セリ。蟲様突起横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ヲ檢鏡スルニ特別ノ炎症症狀ヲ見ズ。

家兎第22號(不完結+F)0.5cc 2250 gr.

手術實施後モ動物ノ一般狀態ニ特別ノ變化ヲ見ズ。術後5日目ニ之ヲ撲殺シ開腹スルニ腹膜炎症狀ヲ認メズ。蟲様突起モ亦概ネ正常ノ外觀ヲ呈ス。組織標本ニ於テハ淋巴細胞ノ發育大小不同トナリ、外筋層ノ纖維配列粗裂トナレル外ニ著變ナシ。

家兎第54號(不完結+F)0.5cc 2300 gr.

動物ハ手術實施後1晝夜ハ食慾不振ニテ稍々衰弱セルモ、其ノ後ハ元氣回復セリ。術後9日目ニ體重2090 gr.ニテ元氣旺盛ナルニヨリ之ヲ撲殺開腹シ見ルニ何等炎症症狀ヲ認メズ。組織標本ヲ檢鏡スルニ腸腔層毛細血管ノ輕度ノ充盈アリテ細菌ノ侵入セルヲ見ル外著變ナシ。

家兎第66號(不完結+F)0.5cc 2050 gr.

手術實施後モ動物ハ元氣ヨク術後10日目ニ體重2100 gr.ニ増加セルヲ以テ同日之ヲ撲殺シ開腹シ見ルニ腸管ニ輕度ノ應着ヲ見ル外著シキ炎症症狀ヲ認メズ。組織標本ヲ檢鏡スルニ粘膜層ニ輕度物質缺損シ稍々多量ノ細菌附着セルヲ見ル。

家兎第18號(不完結+大)0.5cc 2120 gr.

10日後之ヲ撲殺シ開腹シ見ルニ何等炎症症狀ヲ見ズ。蟲様突起ハ長サ7.0 cm 直径1.4 cmニシテ内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第39號(不完結+大)0.5cc 2480 gr.

9日後撲殺シ開腹スルニ腹腔内ハ清潔ニシテ腸管ニ應着ナシ、蟲様突起ハ長サ6.4 cm 直径1.3 cm 壁ニ炎症症狀ヲ認メズ。内容ハ糞汁ナリ。(第5圖及ビ第17圖参照)

家兎第19號(不完結+連)0.5cc 2220 gr.

手術施行後動物ハ元氣旺盛ナルヲ以テ5日後ニ

之ヲ撲殺シ開腹スルニ腹膜炎症状ヲ全ク見ズ。蟲様突起ハ長サ7.1 cm 直径1.5 cm 突起壁ニ僅少ノ膿苔附着セル外著變ナシ。内容ハ糞汁ナリ。

家兎第57號(不完結+連) 0.5 cc 2500 gr.

術後動物一般症状ニ變化ナキヲ以テ8日目之ヲ撲殺シ開腹スルニ腹腔内ハ全ク清淨ニシテ炎症症状ヲ見ズ。蟲様突起ハ長サ5.5 cm 直径1.0 cm ニシテ壁ハ正常ナリ。内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第63號(不完結+F+大) 0.5 cc 2500 gr.

動物ハ3日目ニ斃死ス之ヲ解剖シ見ルニ腸管ハ腹壁縫合部ニ癒着シ少量ノ膿苔ヲ附着ス。蟲様突起ハ長サ6.5 cm 直径1.8 cm ニテ腸壁ト輕ク癒着シ漿膜面充血シ加答兒ヲ起セルヲ見ル。内容ハ糞便ナリ。

家兎48號(不完結+大+葡) 0.5 cc 2610 gr.

動物ハ手術後モ變化ヲ認メザルヲ以テ7日後ニ之ヲ開腹シ見ルニ蟲様突起ハ長サ6.3 cm 直径1.5 cm ニシテ癒着炎症等ヲ認メズ。内容ハ糞汁ナリ。

以上諸實驗ヲ小括スルニ蟲様突起ヲ不完全ニ輕ク絹絲ヲ以テ結紮シタルノミニテハ動物ハ殆ド影響ヲ被ラズ元氣旺盛ナリ。又不完全ニ弱ク結紮セル後其ノ先端ヨリ注射器ヲ以テ各種ノ細菌浮游液ヲ單獨ニ或ハ混合シテ注入セルニ、此場合ニ於テモ動物ハ通常元氣旺盛

食欲良好ニテ久シク生存ス、之ヲ術後4日乃至10日目ニ撲殺シ解剖ヲ行フニ蟲様突起ハ正常ニシテ癒着、炎症等ヲ認メズ又腹腔内ハ清淨ニシテ化膿性腹膜炎ノ症状ヲ見ザルヲ通例トス。但シ例外トシテ家兎第63號ハ3日間生殘セル後加答兒性蟲様突起ヲ起シテ斃死セリ、此場合ハ解剖ノ結果蟲様突起ノ不完全結紮部ハ殆ド全ク消息子ヲ通ゼザル程度ニ結紮サレ居タルモノナリ。横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ粘膜炎ノ表皮細胞ハ概ネ正常ノ像ヲ呈スルモ一部脱落シ又壞死ニ陥レルモノアリ。(第5圖参照) 粘膜固有層モ概ネ正常ニ近キモ細胞ノ滲潤セルモノアリ。淋巴腺胞ノ發育モ亦正常ニシテ境界明瞭ナリ。細胞中隔ノ結締組織發育中等度ニシテ此部ノ毛細血管充盈セルモノアリ、筋層及ビ漿膜下層ハ正常ナリ。(附表第1參照)

「グラム」氏組織染色法ニヨリ表皮細胞表面乃至内腔中ノ脱落物質内ニハ多數ノ細菌繁殖セルヲ見ル。淋巴腺胞ノ胚中心部ニモ相當量ノ破壊サレタル細菌ノ侵入セルヲ見ル。筋層及ビ漿膜層ニハ通常細菌ノ侵入ヲ見ズ。細菌

第3表 不完結膿素量變動表

時 日	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日
No. 36	0.554	0.548	0.540	0.536	0.531	0.503	0.501	0.515	0.524	0.524		
No. 39	0.455	0.435	0.476	0.480	0.487	0.490	0.501	0.500	0.500	0.528	0.520	0.525
No. 48	0.462	0.448	0.480	0.484	0.496	0.510	0.533	0.522	0.500	0.497		
No. 54	0.560	0.528	0.521	0.523	0.519	0.515	0.525	0.530	0.540	0.538	0.545	0.548
No. 57	0.480	0.492	0.483	0.480	0.470	0.475	0.480	0.483	0.480	0.473	0.470	
No. 66	0.527	0.493	0.502	0.510	0.515	0.530	0.546	0.525	0.540	0.528	0.530	0.533
平 均	0.506	0.496	0.500	0.502	0.503	0.504	0.514	0.513	0.514	0.515	0.516	

ノ種類ハ注入セル菌ヲ主トシ各種ノ菌ヲ見ル。此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ハ(第3表)ニ見ルガ如ク手術後2時間ニハ稍々減少シ8時間後ヨリ既ニ徐々ニ回復シ、3日目頃ニ全ク舊ニ復シ以後漸次増加ノ傾向アリ。

第2節 蟲様突起完全結紮試驗

第1項 内容タル糞便ヲ其ノ儘ノ場合

(糞+完結)

家兎ニ於テ蟲様突起ノ内容タル糞便ノ存在セルママ、絹絲ヲ以テ完全ニ結紮シ所謂閉塞腔ヲ形成シ其ノ動物ノ一般症狀ヲ觀察シ、斃死シタル後ハ直ニ解剖シ蟲様突起ノ狀態ヲ精査シタル後、之ヲ切除シ組織標本ヲ作り檢鏡セリ。(附表第1参照)

家兎第1號(糞+完結) 2150 gr.

3日後斃死シタルヲ以テ開腹シ見ルニ腹腔内ハ所々應着シ腸苔附着シ腹膜炎症狀著明ナリ。蟲様突起ハ長サ7.0 cm 直徑1.6 cm 周圍ノ腸管ト強ク應着セリ之ヲ剝離スルニ周圍ニ膿瘍ヲ形成シアリ且突起壁ハ結紮部ニ近ク一部分壞疽ニ陥レルヲ見ル。突起内容ハ白色ノ膿汁ナリ。

家兎第4號(糞+完結) 2310 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ既ニ少量ノ腹水滯溜シ腸管ニ所々應着ヲ見ル外漿膜下出血ヲ見ル等急性化膿性腹膜炎症狀著明ナリ。蟲様突起ハ長サ6.8 cm 直徑1.7 cm 一部腸管ト應着シ之ヲ剝離スルニ突起壁壞疽ニ陥リ容易ニ穿孔シ内容ヲ漏出セリ。内容ハ血液様膿汁ナリ。

家兎第67號(糞+完結) 2460 gr.

3日後斃死ス。死後之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ一般ニ充血性ニシテ所々小出血アリテ一部分漏出セル糞便ノ附着セルヲ見ル。腹腔内ニハ少量ノ腹水滯溜ス。蟲様突起ハ長サ5.0 cm 直徑1.0 cm ニテ結

紮部ニ近ク小腸間膜ト反對側ニ壞疽ニ陥レル部分アリテ其ノ中央ニ小穿孔アリテ内容ヲ漏出セルヲ見ル。

家兎第110號(糞+完結) 2200 gr.

2日後斃死ス。死後開腹シ見ルニ蟲様突起ハ僅ニ周圍腸管ト應着シ其ノ先端指頭大ニ膨大シ長サ9.0 cm 直徑2.7 cm トナル其ノ先端ノ一部壞疽ニ陥レルモ穿孔ハ認メズ。内容ハ糞汁ナリ。

家兎第112號(糞+完結) 2430 gr.

4日後ニ斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ少量ノ腹水存在シ輕度ノ腸管應着アルモ一般腹膜炎症狀輕少ナリ。蟲様突起ハ長サ5.5 cm 直徑1.8 cm ニシテ壞疽ハ認メズ漿膜面ヲ透シテ小白斑アリ。内容ニハ濃厚ナル膿汁ヲ含ム。

以上ヲ小括スルニ家兎ニ於テ蟲様突起ノ内容タル糞便ノ存在セルママニテ、絹絲ヲ以テ完全ニ結紮シ腹腔ヲ遮斷セルニ動物ハ平均3日間生存シテ斃死セリ。但シ1例ハ翌日既ニ壞疽性炎ヲ起シ穿孔性腹膜炎ヲ併發死亡セリ。而シテ之等斃死セル動物ヲ解剖シ檢スルニ何レモ肉眼のニ既ニ壞疽性又ハ化膿性炎ヲ惹起シ、組織學的檢査ヲ行フモ各種細菌ヲ注入セル場合ト略ボ同様ノ炎症性變化ヲ認メ、蟲様突起内容ヨリ塗抹標本ヲ作り染色檢鏡スルモ又普通寒天培養基及ビ Bouillon 培養基等ヲ用ヒテ分離培養ヲ行フモ、大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、Welch-Fränkel 菌等ノ細菌ヲ認メタリ。之等ノ細菌ハ即チ吾々が最モ屢々人體蟲様突起炎ノ際ニ發見シ、且又余ノ實驗ニ於テ注入ニ使用セル菌ト全ク同一種類ノ菌ナリ。此事實ヨリ考フルモ吾々が急性蟲様突起炎ノ際ニ屢々見ル之等ノ細菌ハ特殊ノ病原菌ニ非ズ正常家兎腸内ニ生存セル細菌

が結紮ニヨリ毒力増強ヲ來シ發病斃死セルモノト想像セラル。

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色ニヨル病理組織學的變化ヲ見ルニ粘膜層ニ於テ表皮細胞ハ大部分壊死トナリ脱落シ特ニ固有層中ニハ圓形細胞滲潤セルヲ見ル。Lieberkühn氏腺細胞モ大部分破壊シ或ハ消失ス、然レ共粘膜層内ニ於ケル毛細血管ノ擴張充盈ハ殆ド見ザルカ極メテ輕度ニ存在スルニ過ギズ。淋巴腺胞ノ發育ハ良好又ハ中等度ニシテ其ノ境界モ亦概ネ明瞭ナリ。筋層ノ内輪層、外縱層ニハ細胞滲潤、肥厚等ヲ見ザルモ、筋纖維配列稍々粗鬆トナレルモノアリ。漿膜層ニ於テ特ニ著シキ所見ナキモ細胞ノ滲潤ヲ見ルモノアリ、膿苔ノ附着セルヲ見ルモノモアリ。

「グラム」氏組織染色法ニヨリ細菌ハ内腔中ノ脱落物質中ニ最も多數ニ認メラレ、表皮層及ビ固有層中ニモ多數ノ細菌ノ侵入繁殖セルヲ見ル。尚ホ膿胞及ビ筋層、漿膜層内ニモ極メテ少數ナラ細菌ノ侵入セルヲ見ル。細菌ノ種類ハ太短キ桿菌最も多ク其ノ他各種類ノ桿菌ヲ見ル。此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變化ハ(第4表)ニ見ルガ如ク手術後2時間ニテ既ニ可ナリノ減少ヲ見、8時間後ニハ更ニ

少々減少スルモ24時間後ニ於テハ稍々恢復ノ道程ニアルモノノ如シ。

第2項 内容ヲ指壓ニヨリ空虚トセル

場合(空+完結)

家兎ニ於テ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ注意シテ輕ク指ニテ壓迫シテ空虚ナラシメタル後、絹絲ヲ以テ之ヲ完全ニ結紮シ其ノ内容ヲ遮斷シ閉塞腔ヲ形成シタル際動物ハ如何ニナルヤヲ觀察シ之ガ斃死後ハ直ニ解剖ヲ施シ蟲様突起ノ變化ヲ肉眼的ニ精査シタル後、組織標本ヲ作リテ檢鏡セリ。(附表第1參照)

家兎第3號(空+完結) 2180 gr.

動物ハ手術後5日目稍々衰弱ノ徴アリシヲ以テ之ヲ撲殺開腹シ見ルニ腸管ハ輕度ニ癒着シアルモ容易ニ剝離シ得タリ。蟲様突起ハ長さ6.8 cm 直径1.8 cm ニテ表面ニ小白斑アリテ内容ハ膿汁ナリ。

家兎第6號(空+完結) 2320 gr. 26日

動物ハ3日後ニ斃死セルヲ以テ之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ蟲様突起ヲ中心トシ可ナリ強ク癒着ス。注意シテ之ヲ剝離セントスルニ突起周圍ニ膿瘍ヲ形成シ濃厚ナル膿汁ヲ漏出セリ。突起内容ハ同様白色ノ膿汁ナリ。

家兎第34號(空+完結) 2300 gr.

術後6日目ニ斃死ス依ツテ開腹ヲ行フニ結紮部ヲ中心トシ可ナリ廣ク周圍ノ腸管ニ白色膿苔附着ス。蟲様突起ハ長さ7.7 cm 直径2.7 cm ニ膨大シ先端ノ半分ハ漿膜面正常ナルモ結紮部附近ニ腸管ノ癒着ヲ離ス際漿膜ト同時ニ剝離セリ。内容ハ膿汁ナリ。(第6圖)

家兎第70號(空+完結) 2780 gr.

2日後斃死ス、之ヲ開腹スルニ腸管ノ一部ハ明カニ壊疽トナリ可ナリ惡臭アリ。蟲様突起ハ長さ6.0 cm 直径1.8 cm ニシテ稍々彎曲シ中央部ニ著明ニ壊疽ニ陥レルヲ見ル消息子ニテ壓スルニ容易ニ

第4表 (糞+完結)鹽素量變動表

動物番號	時 日					
	手術前	術後2時間	8時間	24時間	2日	3日
No. 67	0.541	0.512	0.518	0.529	0.530	
No. 110	0.496	0.471	0.470	0.460		
No. 112	0.488	0.476	0.462	0.474	0.480	0.490
平均	0.507	0.486	0.483	0.488	0.505	

穿孔セリ内容ハ血液様液ナリ

家兎第 111 號 (空+完結) 2230 gr.

2日後斃死ス開腹スルニ僅少ノ癒着アル外腹膜ニ炎症狀ハ著シキモノナシ。蟲様突起ハ長サ 5.5 cm 直徑 1.6 cm 結紮部ニ近ク漿膜面充血シ大豆大ノ膿苔ヲ附着ス。内容ハ粘液様物質ナリ。

以上ノ諸實驗成績ヲ小括シ見ルニ家兎ニ於テ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ輕ク指ニテ壓迫シテ盲腸部ノ方ニ押し上ケ、或ル可ク内容ヲ空虛ナラシメタル後、絹絲ヲ以テ之ヲ完全ニ結紮シ其ノ内容ヲ遮斷スル時ハ動物ハ2日乃至6日後、平均4日ニテ斃死ス。即チ内容ニ糞便ノ存在セルママ結紮セルヨリハ稍々長ク生存ス。之等ノ斃死セル動物ヲ解剖シ腹腔内ヲ檢スルニ何レモ肉眼的ニ著明ナル壞疽性蟲様突起炎又ハ化膿性蟲様突起炎ヲ惹起シ居タリ。而シテ此蟲様突起ノ内容ヲ塗抹標本トシテ檢鏡スルニ概ネ(糞+完結)ノ場合ト同様大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、Fränkel 菌等ノ諸菌ヲ認メタリ。

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色ニヨル病理組織學的變化ヲ見ルニ粘膜層ニ於テ表皮細胞ハ殆ド全ク脫落シ又壞死モ著明ニシテ粘膜固有層迄一様ニ「エオジン」ニヨリ汚ク染レルモノアリ、然レ其中ニハ殆ド壊死ヲ見ザルモノモアリ。腺細胞モ大部分破壊又ハ萎縮シ白血球ノ滲潤セルヲ見ル。

淋巴腺胞ノ發育ハ中等度ナルモ其ノ境界ハ細胞ノ滲潤ニヨリ不明瞭トナリ又ハ腺胞同志互ニ移行セルモノアリ。又胚中心部ニハ核ノ崩壊シ「ヘマトキシリン」ニ汚染セル細胞ノ滲潤アリ。毛細血管ハ充盈ス。筋層ハ内輪層、外縱層共ニ殆ド肥厚ナク筋纖維ノ配列モ亦概ネ整然タリ。漿膜層ハ輕度ニ浮腫狀ニ腫脹シ細胞滲潤アリ。小腸間膜ノ血管ハ充盈ス。

「グラム」氏組織染色ヲ行フニ粘膜層ノ内面ニハ無數ノ細菌ガ繁殖シ腺細胞内ニ侵入ス。腺胞ノ胚中心部ニハ散在性ニ細菌ノ侵入セルヲ認メ、漿膜層ノ細胞滲潤中ニモ細菌ヲ含有ス。細菌ノ種類ハ太短キ桿菌及ビ雙球菌ガ主

第 5 表 (空+完結)鹽素量變動表

動物番號	時				日			
	手術前	術後 2 時間	8 時間	24 時間	2 日	3 日	4 日	5 日
No. 34	0.550	0.538	0.494	0.491	0.528	0.511	0.542	0.554
No. 70	0.523	0.533	0.552	0.562				
No. 111	0.519	0.500	0.509	0.518				
平均	0.531	0.524	0.518	0.530				

ナリ。(附表第 1 参照)

此際ニ於ケル血中鹽素量ノ變動ハ手術後 2 時間ニテ可ナリ減少シ更ニ 8 時間後ニハ減少シ 24 時間後ニハ概ネ舊ニ恢復ス。(第 5 表參照)

第 3 節 蟲様突起結紮後各種細菌

單獨注入試驗

第 1 項 Fränkel 菌ヲ單獨注入セル場合 (完結+F)

家兎ノ蟲様突起ノ内容ヲ其ノ儘ニ或ハ指壓

ニヨリテ内容ヲ空虚トシ完全ニ結紮シ、閉塞腔ヲ形成シ其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル Fränkel 菌 24 時間 肉汁培養液ヲ 3cc ニ生理的食鹽水 7cc ヲ加ヘ 10cc トセルモノヲ 0.5cc 乃至 0.25cc ヲ注射器ニ依リ注入シ、射入孔ハ酒精綿球ヲ以テ清拭シ術ヲ終リ動物ヲ觀察シ斃死後ハ直ニ開腹シ蟲様突起ノ狀態ヲ精査セル後組織標本ヲ作リテ檢鏡セリ。(附表第 2 参照)

家兎第 64 號(糞+完結+F) 0.5 cc 2330 gr.

2 日後斃死ス之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内所々ニ應着アリテ之ヲ剝離スルニ蟲様突起ハ長サ 6.5 cm 直徑 1.8 cm ニシテ突起ノ約 2/3 ハ壞疽ニ陥リ其ノ結紮部ニ近キ位置ニ小穿孔アリテ内容タル血液様糞汁ヲ漏出ス。(第 7 圖)

家兎第 128 號(糞+完結+F) 0.5 cc 2560 gr.

2 日後斃死ス之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ所々ニ漿膜下出血アリテ小膿苔ヲ附着シ化膿性腹膜炎ノ症狀著明ナリ。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 1.4 cm ニシテ全面帶綠褐色ニテ壞疽ニ陥リ一部分殆ド自然的切断ヲ起サントス從ツテ内容ハ存在セズ。

家兎第 129 號(糞+完結+F) 0.25 cc 2550 gr.

一般ニ使用セシ菌ノ半量ヲ使用セシニ動物ハ 7 日間生存セル後斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニ腹水ノ滲溜アリ中等度ニ腸管ハ應着シ膿苔附着ス之ヲ剝離スルニ突起ノ周圍ニ膿瘍ヲ形成ス突起ハ長サ 6.5 cm 直徑 1.8 cm ニシテ壁ノ半バ以上ハ膿瘍壁ヲ形成ス。

家兎第 53 號(空+完結+F) 0.5 cc 2520 gr.

菌液 0.5 cc ヲ注入シタルニ動物ハ元氣次第ニ衰フルモ尙ホ 9 日間生存セルヲ以テ之ヲ撲殺シ開腹スルニ蟲様突起ハ腸管ト強く應着ス内容ハ淡キ膿汁ナリ。

家兎第 65 號(空+完結+F) 0.5 cc 2780 gr.

2 日後斃死セルヲ以テ腹腔ヲ開クニ腹水可ナリ多量ニ存在シ腸管ハ所々應着及ビ出血アリ蟲様突起ハ長サ 6.5 cm 直徑 1.6 cm ニシテ結紮部附近ニ拇指頭大ノ部ハ壞疽トナリ其ノ中央ニ小穿孔アリ。

以上ノ實驗成績ヲ小括シ見ルニ動物ノ多クハ 2 日後ニ穿孔性壞疽性炎ニテ斃死シ 0.25 cc ヲ注入シタル 1 例ハ 7 日後ニ蟲様突起周圍膿瘍ヲ起シ斃死シ、例外トシテ家兎第 53 號ハ手術後 9 日ニ到ルモ動物ハ生存セルヲ以テ之ヲ撲殺シ解剖スルニ、蟲様突起ハ周圍ノ腸管ト可ナリ強く應着セルモ之ガ剝離ニ際シ破レル事ナシ。蟲様突起ノ内容ハ白色ノ淡キ膿汁ナリキ。

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ一般ニ粘膜層ニ多少ノ壞死存在セルモ著シカラズ物質ノ缺損、表皮ノ脱落ハ中等度ニ見ル。毛細血管ノ充盈竝ニ組織内出血ハ輕少ナリ。

Lieberkühn 氏腺細胞ハ一部分破壊サルルモ細胞ノ滲潤ハ著シカラズ。淋巴髓胞ノ發育ハ不同ニシテ境界ハ稍々不明瞭ナルモノ多ク、胚中心ニハ淋巴細胞密集シ核ノ崩壊ヲ起セル大小ノ核ガ「ヘマトキシリン」ニ汚染セルヲ見ル。筋層ハ一般ニ内輪筋、外縱筋共ニ輕度ニ肥厚シ筋纖維ノ配列稍々粗裂トナリ、圓形細胞及ビ白血球ノ滲潤中等度ナリ。漿膜層ハ一般ニ肥厚シ浮腫狀ヲ呈シ、小腸間膜ノ血管ハ著シキ充盈ヲ見ズ血管周圍ノ細胞滲潤ナシ。漿膜層中ニ白血球、圓形細胞ノ浸出アリテ一部分ニハ膿苔トシテ集團セルヲ見ル。(家兎第 64 號第 7 圖参照)

「グラム」氏染色ニヨリ見ルニ腔中ニ脱落セル物質中ニ多數ノ桿菌ヲ見ル外、膿胞内特ニ其ノ胚中心部ニ桿菌ノ侵入セルヲ見ルモ筋層内ニハ比較の少ナク穿孔性壞疽ヲ起セルモノニ於テハ漿膜面ニモ細菌ノ繁殖セルヲ見

ル。此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ハ(第6表)ニ見ルガ如ク術後2時間及ビ8時間後ニハ可ナリ減少ヲ見ルモ夫レ以後ニハ既ニ稍々恢復ノ傾向ヲ示ス。

第 6 表 (完結+F) 鹽素量變動表

動物番號	時				日							
	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	
No. 64	0.519	0.480	0.473	0.480								
No. 128	0.509	0.507	0.507	0.490								
No. 129	0.543	0.532	0.567	0.567	0.550	0.547	0.550	0.565	0.564			
No. 53	0.480	0.454	0.440	0.465	0.461	0.457	0.489	0.450	0.434	0.450	0.505	
No. 65	0.532	0.538	0.528	0.530								
平 均	0.517	0.502	0.503	0.516								

第2項 大腸菌ヲ單獨注入セル場合

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ、其ノ内腔ヲ遮斷シ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル大腸菌寒天斜面純培養3白金耳ヲ10ccノ生理的食鹽水ニ溶解セルモノヲ0.5cc細小ナル注射針ヲ以テ注意シテ注入シ射入孔ハ酒精綿球ヲ以テ充分清拭セリ。

家兎第75號(糞+完結+大)0.5cc 2760 gr.

術後4日ニテ斃死ス之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ急性化膿性炎症症狀ナシ。蟲様突起ハ長サ7.5cm 直徑2.5cm 突起周圍ニハ應着膿瘍等ヲ認メズ漿膜面ヲ通シテ小白斑ヲ見ル。内容ハ膿汁ナリ。(第8圖)

家兎第117號(糞+完結+大)0.5cc 1950 gr.

術後3日ニテ斃死ス之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ輕ク應着セルモ容易ニ剝離シ得タリ。蟲様突起ハ長サ7.4cm 直徑2.3cm ニテ一般ニ漿膜面充血性ニシテ一部分ニ大ナル膿苔附着シ居レリ。内容ハ膿球ノ浮游セル液狀糞便ナリ。

家兎第135號(糞+完結+大)0.5cc 2350 gr.

3日後ニ斃死ス。開腹シ見ルニ腹膜炎症狀ハ僅少ニシテ蟲様突起ハ長サ8.0cm 直徑1.6cm ニテ表面一部分暗褐色ヲ呈セル以外ニ一面ニ膿苔ヲ附着ス。内容ハ血液ヲ含ム膿汁ナリ。(第18圖)

家兎第76號(空+完結+大)0.5cc 2600 gr.

術後2日目ニ動物ハ斃死セリ之ヲ開腹シ見ルニ蟲様突起ヲ中心トシ腸管ハ稍々應着セルモ比較の容易ニ剝離シ得テ周圍ニ膿瘍等ヲ見ズ。蟲様突起ハ長サ8.0cm 直徑2.0cm ニテ漿膜下ニ白色ノ膿ヲ透視シ得タリ。内容ハ白色濃厚ナル膿汁ナリ。

家兎第136號(空+完結+大)0.5cc 2340 gr.

動物ハ術後4日目ニ斃死セリ、之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニ少量ノ腹水滲溜シ腸管ハ可ナリ應着アリ。蟲様突起ハ長サ6.5mm 直徑1.9cm ニテ一部分漿膜下出血アリ。表面所々ニ膿苔ノ附着セルヲ見ル。内容ハ膿汁ナリ。(第9圖)

以上ノ實驗ヲ小括シ見ルニ動物ハ多クハ2日乃至4日間ニ化膿性蟲様突起炎ヲ起シ

テ斃死セリ。(附表第2参照)

横断切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ一般ニ粘膜層ノ物質缺損、表皮脱落、壊死等何レモ著明ニ見ラレ、只僅ニ一部分ノミ表皮細胞殘存セルモ壊疽ニ陥レルヲ以テ腺細胞ノ大部分ハ消失又ハ甚シク萎縮ス。粘膜固有層モ甚シク破壊セラレ正常ノ半分ノ厚サトナレルモノアリ。又ハ細胞滲潤ノ爲反ツテ肥厚セルモノアリ。血管充盈竝ニ出血ハ何レモ可ナリ著明ナリ。淋巴腺胞ノ發育ハ普通ニシテ境界モ亦中等度ニ明瞭ニシテ肥厚セルモノモアリ。一般ニ腺胞ノ胚中心ニハ白血球滲潤及ビ壊死ニ陥レル細胞ノ滲潤ニヨリ甚シク汚染シ、滲潤著明ノ爲ニ境界ノ稍々不明瞭トナレルモノモアリ。腺胞内出血又ハ毛細血管ノ充盈及ビ腺胞間結締織ノ發育共ニ中等度ニ證明セラル。筋肉層ハ内輪筋、外縦筋共ニ輕度ノ肥厚ヲ見ル。又筋纖維配列狀態ハ何レモ細胞滲潤ニヨリ稍々粗裂トナレルヲ見ル。漿膜層ハ僅カニ浮腫狀ニ肥厚シ輕度ニ細胞滲潤ヲ見ル。小腸間膜ノ血管ハ何レモ中等度ニ充盈セルモ血管周圍細胞滲潤竝ニ纖維素析出等ハ見ル能ハズ小腸間膜ノ一部ニ可ナリ大ナル膿苔ノ附着セルモノアリ。(第7圖参照)

「グラム」氏組織染色ヲ行フニ粘膜層特ニ Lieberkühn 氏腺窩内及ビ固有層中ニ多數ノ桿菌竝ニ少數ノ球菌ヲ見ル、腺胞ノ深部及ビ筋層内ニハ細菌極メテ少ナキモ、漿膜層面ニハ稍々多數ノ細菌ヲ見ル。

「グラム」陰性ノ大腸菌染色ノ目的ニテ Zieler'sche Färbung ニヨリ各層中ニ多數ノ大腸菌ノ侵入セルヲ認メタリ。

此場合ニ於ケル血中鹽素量ノ變動ハ(第7表)ニ見ルガ如ク術後急速ニ減少シ次第ニ恢復シ1晝夜後ハ反ツテ術前ニ比シ増加スル傾向アルヲ見ル。

第7表 (完結+大)鹽素量變動表

動物番號	時 日					
	手術前	術2時後	8時間	24時間	2日	3日
No. 75	0.540	0.508	0.491	0.533	0.555	0.561
No. 117	0.510	0.529	0.502	0.521	0.467	
No. 135	0.524	0.532	0.552	0.545	0.540	
No. 76	0.504	0.446	0.446	0.468		
No. 136	0.524	0.534	0.568	0.534		
平 均	0.520	0.510	0.512	0.521		

第3項 連鎖狀球菌ヲ單獨ニ

注入セル場合

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ、其ノ内腔ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル連鎖狀球菌ノ Bouillon 24時間培養3ccニ生理的食鹽水7ccヲ加ヘ、ヨク混合セルモノヲ0.5cc掬リテ注射器ヲ以テ注入セリ。

家兎第49號(糞+完結+連)0.5cc 1870 gr.

翌日斃死ス。死後之ヲ開腹スルニ腹腔内ハ比較的清淨ニシテ、蟲様突起ハ周圍ト稍々強ク癒着シアリ。蟲様突起ハ長さ6.0cm 直徑1.5cmニテ結紮部附近ニ壞直性部アリテ其ノ中央ニ小瘻孔ヲ認ム。内容ハ糞汁ナリ。

家兎第55號(糞+完結+連)0.5cc 2720 gr.

2日後斃死ス。死後之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ハ比較的清淨ニシテ腸管ノ癒着殆ドナシ。蟲様突起ハ長さ9.0cm 直徑2.0cmニシテ結紮部附近ニ漿膜下出血ヲ見ル外一般ニ漿膜面充血性ニシテ小白斑ヲ見ル即チ急性炎症症狀著明ナリ。内容ハ黃褐

色ヲ糞汁ナリ。

家兎第 139 號(糞ヲ完結+連) 0.5 cc 2220 gr.

4 日後斃死ス。死後之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ僅ニ癒着セル外著シキ腹膜炎症狀ヲ認メズ。蟲様突起ハ長サ 6.0 cm 直徑 2.3 cm ニテ漿膜ヲ通シテ白色ノ膿點ヲ見ル。内容ハ膿汁ナリ。

家兎第 50 號(空+完結+連) 0.5 cc 2150 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ稍々惡臭アル腹水ヲ滯溜シ。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 2.0 cm ニシテ漿膜一般ニ充血性ニシテ所々ニ膿苔ヲ附着シ概ネ中央部ニ小穿孔アリ。内容ハ血液様糞汁ナリ。(第 10 圖)

家兎第 56 號(空+完結+連) 0.5 cc 2565 gr.

翌日斃死ス。死後之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内所々ニ膿苔附着シ少量ノ腹水滯溜ス。蟲様突起ハ長サ 7.0 cm 直徑 1.8 cm ニシテ周圍ノ腸管ト稍々癒着セルモ容易ニ剝離シ得ル程度ナリ。漿膜面ニハ所々膿苔附着シ小膿點ノ散在セルヲ透視シ得タリ。

内容ハ膿球ヲ浮游セル血液様液體ナリ。(第 11 圖)

之ヲ小括シ見ルニ動物ハ翌日乃至 4 日後ニ穿孔性壞疽性蟲様突起炎、或ハ化膿性蟲様突起炎、加答兒性蟲様突起炎等ヲ惹起シテ斃死セリ。(附表第 2 參照)

橫斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ粘膜炎ニ於テ表皮ハ可ナリ多ク脱落セルモ中ニハ正常粘膜ノ殘存セルモノモアリ。又全ク壞死ニ陥レルモノアリ。殆ド壞死ヲ見ザルモノモアリ。毛細血管ノ充盈竝ニ出血ハ中等度ニ見ラレルモノ多シ。又時ニハ粘膜全部ガ脱落シ固有層迄破壊サレ、物質ノ缺損著シク固有層迄脱落シ其ノ下位ニアル膿胞ハ圓形ヲ呈セズシテ、唯漿膜ニ面スル側ノミ圓形細胞ノ集團トシテ僅ニ膿胞ノ跡ヲ認ムル程度トナレルモノ

アリ。

Lieberkühn 氏腺細胞モ大部分ハ脱落減少セルモノ一部ニハ比較的正常ノママ殘存セル事アリ。粘膜固有層ニハ白血球ノ滲潤中等度ニ見ラレ又時ニ出血著シク爲ニ組織ノ破壊サルル事アリ。淋巴膿胞ノ發育ハ中等度ニシテ境界ハ概ネ明瞭ナルモノ多シ。膿胞内及ビ中隔ノ結締組織ノ發育ハ中等度ニシテ其ノ内ニ出血セルモノアリ、且其ノ中ニ多數細菌ノ集團繁殖セルヲ見ル。膿胞中央部ニハ「ヘマトキシリン」ニ汚染セル細胞ノ滲潤シ壞死セル細胞ノ集團ヲ見ル事アリ。筋層ニハ輕度ノ細胞滲潤ノ爲其ノ纖維配列稍々不整トナレル事アルモ大部分ハ著シキ變化ヲ認メズ。漿膜モ亦輕度ノ浮腫狀腫脹ヲ見ル外著變ナキヲ普通トス。

「グラム」氏染色ニヨリ細菌ハ粘膜層内竝ニ膿胞層組織内ニ發育シ筋層内ニハ比較的小シ然レ共小腸間膜ノ附着部ニ集團的ニ繁殖シ膿苔ヲ形成セルモノアリ。細菌ノ種類ハ主トシテ注入セル連鎖狀球菌ナルモ尙ホ葡萄狀球菌、雙球菌等ヲモ認メ「グラム」陽性ノ大小桿菌ヲモ見ル。(家兎第 56 號第 11 圖參照)

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ル

第 8 表 (完結+連)鹽素量變動表

動物番號	時 日				
	手術前	術後 2 時間	8 時間	24 時間	2 日
No. 49	0.503	0.509	0.503		
No. 55	0.506	0.509	0.488	0.490	
No. 131	0.463	0.437	0.457	0.463	0.499
No. 50	0.462	0.470	0.468		
No. 56	0.472	0.481	0.493		
平 均	0.481	0.481	0.482		

ニ(第8表)ノ如ク術後2時間及ビ8時間共ニ著シキ變動ヲ見ズ、各例ニ於テハ寧ロ輕度ノ増加ヲ示セルモノ多シ。

第4項 葡萄狀球菌ヲ單獨注入セル場合

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ、其ノ内容ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ其ノ先端ヨリ、人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル葡萄狀球菌ノ寒天斜面純培養3白金耳ヲ10ccノ生理的食鹽水ニ溶解セルモノヲ0.5cc乃至0.25cc採リテ注射器ヲ以テ注入セリ。(附表第2参照)

家兎第73號(糞十完結十葡)0.5cc 2280 gr.

動物ハ翌日斃死ス。死後之ヲ開腹スルニ腸管及ビ大網膜ハ所々血塊附着シ互ニ癒着ス。蟲様突起ハ長サ7.0cm 直徑1.8cm 表面充血ス。壞疽又ハ穿孔ハ認めズ内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第137號(糞十完結十葡)0.5cc 2000 gr.

2日後斃死ス。開腹スルニ腸管ハ僅ニ癒着シ漿膜面ニ出血斑ヲ見ル。蟲様突起ハ長サ6.0cm 直徑1.8cm ニシテ所々膿苔ノ附着セルヲ見、尙ホ結紮部附近ニ暗紫色ノ壞疽部ヲ見ル。内容ハ膿汁ナリ。

家兎第138號(糞十完結十葡)0.5cc 2230 gr.

2日後斃死ス。開腹スルニ腸管ノ癒着中等度ニシテ少量ノ膿苔ヲ附着ス。蟲様突起ハ長サ7.0cm 直徑1.6cm 結紮部附近ニ暗褐色ノ壞疽性部アリ消息子ニテ檢スルニ容易ニ穿孔セリ。内容ハ糞汁ナリ。

家兎第74號(空十完結十葡)0.5cc 2430 gr.

2日後斃死ス。開腹シ見ルニ腸管壁ハ所々ニ漿膜下ニ小出血斑アリ。蟲様突起ハ長サ6.0cm 直徑1.7cm ニシテ輕ク周圍ト癒着シ、突起壁ハ中央部ニ漿膜下出血アリ其ノ附近ニ壞疽部ヲ見ルモ

穿孔ハ認めズ。内容ハ糞汁ナリ。(第19圖)

家兎第139號(空十完結十葡)0.25cc 2200 gr.

9日後斃死ス。死後之ヲ開腹スルニ一般ニ腹膜炎ノ症狀僅少ニシテ只僅ニ腸管ノ癒着セルヲ見ル。蟲様突起ハ長サ6.8cm 直徑約2.5cm ニシテ周圍腸管ト可ナリ強度ニ癒着シ注意シテ之ヲ剝離スルモ容易ニ穿孔シ内容タル膿汁ヲ漏出セリ。

以上實驗ヲ小括シ見ルニ動物ハ0.5cc注入セル例ハ1日乃至2日ニテ多クハ壞疽性蟲様突起炎、稀ニ加答兒性炎ヲ惹起シテ斃死シ、0.25cc注入セル例ニ於テハ9日後ニ壞疽性化膿性蟲様突起炎ヲ起シ斃死セリ。摘出蟲様突起横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ粘膜層ニ於テ物質缺損、壞死共ニ可ナリ著明ニシテ毛細血管充盈及ビ出血モ皆甚ダ著明ナリ從ツテ Lieberkühn 氏腺細胞ハ多ク減少又ハ萎縮消失シ、粘膜固有層ノ先端部ハ破壞サレ細クナリ「ヘマトキシリン」ニ汚染セル細胞ノ多數滲潤セルヲ見ル。淋巴細胞ノ發育ハ不同ニシテ良好ナルモノ中等ノモノ貧ナルモノ等アリ。又細胞ノ滲潤ニヨリ甚シク腫脹シ又ハ境界ノ不明瞭トナレルモノアリ細胞ノ滲潤セル部ニハ多數ノ細菌ノ集團セルヲ見ル。膿腔内ノ血管充盈竝ニ出血アリ。膿腔間結締組織ノ發育ハ稍々良好ナリ、筋層ニハ内輪筋外縱筋共ニ輕ク肥厚シ細胞滲潤ニヨリ纖維配列粗裂トナレルモノアリ。漿膜ハ輕度ニ浮腫狀ニ肥厚シ細胞滲潤著明ニシテ膿苔ノ附着セルモノ多シ。小腸間膜ノ血管ハ中等度ニ充盈シ血管周圍ニ細胞ノ滲潤ヲ明カニ認ムルモノアリ。

「グラム」氏組織染色ニヨリ全層ニ互リテ細菌ノ増殖アリテ特ニ粘膜固有層ノ先端ニ球菌

ノ集團附着セルモノアリ。内腔ニ脱落破壊セル細胞ト共ニ細菌ノ繁殖セルヲ見ル。細菌ノ種類ハ注入セル葡萄狀球菌ハ元ヨリ連鎖狀球菌、雙球菌等ノ球菌ノ外ニ太ク短キ桿菌、細ク長キ桿菌等何レモ中等度ニ認めラル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ハ(第9表)ニ見ルガ如ク術後僅ニ減少ヲ見ルモ次第ニ恢復シ1晝夜後ニハ稍々正常値ニ復スルヲ見ル。

第9表 (完結+衛)鹽素量變動表(%)

動物番號	時				日							
	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	
No. 73	0.538	0.481	0.466	0.527								
No. 137	0.490	0.493	0.523	0.510								
No. 138	0.517	0.503	0.492	0.511								
No. 74	0.499	0.491	0.502	0.510								
No. 139	0.509	0.460	0.491	0.501								
平 均	0.511	0.486	0.497	0.512	0.515	0.536	0.546	0.556	0.566	0.535	0.559	

第5項 本節概括

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シタル後此内ニ Fränkel 菌ヲ單獨ニ注入スル時ハ動物ハ多クハ2日乃至7日後ニ壊疽性蟲様突起ヲ起シテ斃死ス。又大腸菌ヲ單獨ニ注入スル時ハ動物ハ2日乃至4日間ニ總テ化膿性炎症ヲ起シテ斃死セリ。又連鎖狀球菌或ハ葡萄狀球菌等ヲ夫々單獨ニ結紮セル蟲様突起内ニ注入スルニ動物ハ1日乃至4日後ニ壊疽ニ陥リ又ハ化膿ヲ起シ或ハ單ナル加答兒ヲ起シテ斃死セルヲ見タリ。

次ニ之等ノ細菌ヲ完全結紮セル蟲様突起内ニ單獨ニ注入セル場合ノ血液内鹽素量ノ變動ハ何レモ概ネ同様ニシテ術後2時間ニ最モ甚シク減少シ8時間後ニモ尙ホ減少セルモ24時間後ニハ概ネ術前ト同様ニナルヲ見タリ。

第4節 蟲様突起結紮後2種類ノ細菌混合注入試験

此場合ニハ總テ單獨ニ細菌ヲ注入シタル場

合ノ丁度半量宛ヲ合セタルモノヲ使用セリ。即チ連鎖狀球菌ノ Bouillon 培養又ハ Fränkel 菌ノ Leber-Bouillon 培養等ノ液體培養ノモノハ其ノ24時間培養ヲ3ccニ生理的食鹽水7ccヲ加ヘ10ccトナシタルモノヲ用ヒ、葡萄狀球菌、大腸菌ノ如キハ寒天斜面ニ純培養ヲ行ヒ之ガ3白金耳ヲ生理的食鹽水10ccニ浮游セシメ、之等ヲ2種類混合シタルモノヲ0.5cc(時ニハ0.25cc)宛採リテ實驗ニ使用セリ。

第1項 Fränkel 菌ト大腸菌ヲ混合注入セル場合(完結+F+大)

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ、其ノ内容ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル Fränkel 菌ノ Leber-Bouillon 純培養、3ccニ生理的食鹽水7ccヲ加ヘタルモノト、大腸菌寒天斜面純培養3白金耳ヲ10ccノ生理的食鹽水ニ浮游セルモノヲ加ヘ、ヨク混合セルモノヲ

0.5cc 注射器ニ採リテ蟲様突起内ニ注入セリ。
(附表第3A 参照)

家兎第61號(糞+完結+F+大)0.5cc 2535 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ到ル所應着シ且漿膜下出血ヲ見ル。蟲様突起ハ長サ7.0 cm 直徑2.0 cm ニテ周圍ノ腸管ト輕ク應着ス之ヲ剝離スルニ結紮部ヨリ約2 cm 先端部ニ於テ小腸間膜ト反對側ニ暗黒色ノ壞疽部アリテ將ニ穿孔セントス其ノ附近ニ白色ノ膿苔附着セルヲ見ル。内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第88號(同上)2800 gr.

2日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ハ比較的清潔ニシテ腹水等ヲ見ズ。腸管ハ輕ク應着ス。蟲様突起ハ長サ7.5 cm 直徑2.0 cm ニテ表面充血シ一部分灰青色ヲ呈ス。内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第122號(同上)2620 gr.

2日後斃死ス。死後開腹シ見ルニ腸管ハ輕ク應着セル外ニ著シキ炎症症狀ヲ認メズ。蟲様突起ハ長サ6.7 cm 直徑1.7 cm ニテ中央部充血性ニシテ其ノ中心部ニ示指頭大ノ壞疽部アリ。附近ニ小腸苔ヲ附着ス。内容ハ綠色糞汁ナリ。

家兎第89號(空+完結+F+大)0.5cc 2960 gr.

2日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ蟲様突起ト腸管ハ比較的強ク應着シ之ヲ剝離スルニ漿膜ノ一部剝脱セリ。蟲様突起ハ長サ8.0 cm 直徑2.6 cm ニテ内容血液様糞汁ニテ充分膨脹ス。突起壁ニ膿瘍穿孔等ナシ。

家兎第124號(同上)2150 gr.

3日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ應着腹水膿苔等ノ炎症症狀比較的僅少ニテ蟲様突起ハ長サ8.0 cm 直徑2.2 cm ニテ一般ニ灰綠色ヲ呈シ漿膜下ニ小腸點ヲ透視シ白色ノ斑紋ヲ表ハセルヲ見ル。穿孔ヲ認メズ。内容ハ膿球ヲ多數浮游セル液便ナリ。

以上ノ實驗ヲ小括シ見ルニ此場合動物ハ1日乃至3日平均2日後ニ壞疽性、化膿性、又ハ加答兒性、炎症ヲ起シテ斃死セリ。之等ノ横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ、粘膜層ハ一般ニ中等度ニ脱落シ物質ノ缺損セルヲ見ル。粘膜層ノ壞死ハ固有層迄達セルモノアリ。本層内ニ毛細血管ノ充盈ハ著明ナルモ出血ハ著シカラズ。粘膜固有層内ニハ大圓形細胞ノ滲潤アリ。Lieberkühn氏腺ノ構造ハ多クハ破壊又ハ消失セラレ。又一部ニハ分泌物ニヨリ浮キ上リタルガ如ク見エ、所ニヨリテハ細小ニ萎縮シ特ニ原形質ガ減少シ核モ濃縮シ小サク「ヘマトキシリン」ニ濃ク汚染ス。淋巴腫胞ノ發育ハ中等度又ハ貧弱ニシテ大小不同ナルモノアリ境界ハ多クハ明瞭ナルモ中ニハ細胞滲潤ニヨリ稍々不明瞭トナルモノアリ。胚中心部ニハ「エオジン」ニヨリ不潔ニ染マレル古キ出血竈カト思ハルル構造ヲ見ルモノアリ。淋巴間隙ハ通常廣ク鬆粗トナリ腫胞中隔ノ結締組織ノ發育ハ良好ニシテ此部ノ毛細血管擴張シ充盈セルヲ見ル。粘膜下層ノ部分ニ小膿瘍ヲ見ルモノアリ。大小不同ノ原形質ガ腫脹シ「エオジン」ニ染マレル細胞ヲ見ルコトアリ。又破壊セル細菌ヲ喰菌セルモノアリ。又核ノ全ク消失シ原形質ノミ鮮明ニ染マレル部分アリ。筋層ハ一般ニ殆ド肥厚ヲ見ザルモ家兎第124號ニ於テハ特ニ著シキ肥厚アリ。纖維配列ハ整然タルモノト細胞滲潤ニヨリ配列鬆粗トナレルモノアリ、中ニハ内輪筋ト外縱筋ノ中間ニ多數ノ細菌集團ヲ見ル事アリ、又筋纖維ノ配列不整トナリ核ハ減少シ染色不同トナルモノアリ。漿膜層ハ炎症性腫脹

著明ニシテ浮腫狀ヲ呈シ小腸間膜血管ハ充盈シ血管周圍ノ細胞滲潤ノ明カナルモノアリ。漿膜面ニハ輕度ノ纖維素ヲ析出セルヲ見又細胞ノ集團シ膿苔ヲ形成セルモノアリ。

「グラム」氏染色ニヨリ腹腔中ノ脱落物質並ニ滲出液中ニハ多數ノ細菌ガ膿苔ト共ニ見出サレ、表皮中特ニ腺細胞内ニ細菌ノ侵入セルヲ見ル。粘膜固有層中及ビ臍胞ノ胚中心部ニモ多數ノ細菌侵入ス。深部ニ侵入セル細菌ハ多クハ形態破壊セラルルヲ見ル。又漿膜内ニモ多數ノ細菌繁殖シ蜂窩織炎狀外觀ヲ呈セルモノアリ。細菌ノ種類ハ注入セル Fränkel 菌様ノ「グラム」陽性ノ大小桿菌最モ多ク各種ノ球菌ハ極メテ少數ニ於テ見ラルルノミナリ。大腸菌染色ノ目的ニテ Zieler'sche Färbungヲ行フニ多數ノ大腸菌カト思ハルル短小桿菌ノ組織内ニ侵入セルヲ見タリ。

筋層ノ著シク肥厚セル家兎 124 號ニ於テ Van Gieson 氏染色ヲ施スニ筋層中ニ結締組織纖維ガ多數ニ入り込メルヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第 10 表)ノ如シ。即チ術後 2 時間ニハ可ナリ著明ノ減少ヲ來スモ 8 時間、24 時間ト時間ノ經過ト共ニ恢復ス。

第 10 表 (完結+F+大)鹽素量變動表

動物番號	時 日				
	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2日
No. 61	0.445	0.420	0.417		
No. 88	0.490	0.517	0.488	0.507	
No. 122	0.542	0.514	0.524	0.508	0.510
No. 89	0.531	0.475	0.463	0.428	
No. 124	0.452	0.474	0.539	0.512	0.468
平均	0.490	0.480	0.486	0.489	

第 2 項 Fränkel 菌ト連鎖狀球菌ヲ混合

注入セル場合(完結+F+連)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリ空虚ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内容ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル Fränkel 菌ノ Leber-Bouillon 純培養 3cc ニ生理的食鹽水 7ccヲ加ヘタルモノト、連鎖狀球菌ノ Bouillon 24 時間培養液 3cc ニ生理的食鹽水 7ccヲ加ヘタルモノトヲヨク混合シタル後之ヲ注射器ニ採リテ蟲様突起内ニ注入セリ。(附表第 3 A 參照)

家兎第 93 號(糞+完結+F+連)0.5 cc 2300 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ中等度ニ癒着ス。蟲様突起ハ長サ 5.8 cm 直徑 1.6 cm ニテ暗紫色ヲ呈シ其ノ中央部ハ將ニ穿孔セントス。内容ハ膿球ヲ浮游セル粘液様物質ナリ。(第 12 圖參照)

家兎第 146 號(同上)2270 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ癒着シ所々漿膜下出血ヲ認メ又到ル所ニ小膿苔ノ附着セルヲ見ル。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 1.7 cm ニテ廣ク壞疽ニ陥リ特ニ結紮部ニ近キ部ニ小穿孔ヲ認ム。内容ハ粘液様物質ヲ少量含有スルノミニテ大部分ハ腹腔内ニ流出シテ存在セズ。

家兎第 147 號(同上)2150 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ中等度ニ癒着シ表面所々ニ膿苔ヲ附着ス。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 1.8 cm ニテ先端部ハ正常ナルモ中心部ノ半バハ壞疽ニ陥リ其ノ中央部ニ小穿孔ヲ認ム。内容ハ液様糞汁ナリ。

家兎第 59 號(空+完結+F+連)0.5 cc 2550 gr.

4 日後斃死ス。開腹シ見ルニ腹腔内ハ比較的清

淨ニシテ炎症狀ヲ見ズ。蟲様突起ハ長サ5.0 cm 直径 2.3 cm ニテ内壓緊張シ表面灰白色ヲ呈ス。内容ハ灰綠色ノ液便ナリ。

家兎第 148 號 (同上) 2000 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ輕ク癒着シ表面所々ニ膿苔ヲ附着ス。蟲様突起ハ長サ 6.5 cm 直径 1.2 cm ニテ大部分ハ壊死ニ陥リ先端ヨリ 2/3 ノ部ニ大穿孔アリテ蟲様突起ハ爲メニ殆ド切斷セントセル狀態ナリ。從ツテ内容ハ殆ド認めズ少量ノ粘液様物質ヲ含有スルノミナリ。

以上ノ諸實驗ヲ小括スルニ内容タル糞便ノ存在セルママノモノハ何レモ翌日 24 時間内ニ穿孔性壞疽性蟲様突起炎ヲ惹起シテ斃死シ、内容ヲ指壓ニヨリ空虚ナラシメタル場合ハ 1 例ハ 4 日後ニ斃死シ 1 例ハ翌日死亡セリ。之等ノ場合ノ摘出蟲様突起ヨリ横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ大部分ハ表皮細胞脱落シ物質ノ缺損セルヲ認ムルモ、組織ノ壞疽ハ粘膜固有層迄著明ニ壞疽ニ陥リ一様ニ「エオジン」ニ染リ所謂「デフテリー」性壞疽(Diphtherische Nekrose)(動物第 148 號)トナレルモノト、殆ド全ク壞疽ヲ見ザルモノトアリ。粘膜層内毛細血管ハ何レモ多少充盈シ中ニハ出血ヲ起セルモノアリ。腺細胞ハ大部分破壊サレ或ハ全ク消失ス。粘膜固有層中ニ白血球ノ滲潤ヲ見ル事アルモ著明ナルモノナシ。淋巴腺體ノ發育ハ中等度或ハ寧ロ貧弱ナルモノ多ク其ノ境界ハ明瞭ナルモノアルモ多クハ細胞滲潤ノ爲メ不明瞭トナリ、或ハ破壊サレ又壞疽トナレルモノアリ。腺體中隔ノ結締組織ハ概ネ中等度ナルモ毛細血管ハ可ナリ著シク充盈ス。筋層ハ内外層共ニ

肥厚ナク細胞滲潤モ少キヲ以テ纖維配列ハ整然タルモノ多シ。漿膜層ニハ輕度ノ膿苔附着セル以外ニ特別ノ所見ナシ。

「グラム」染色ニヨリ各層内ニ細菌ノ侵入セルヲ見ルモ、特ニ粘膜層及ビ臍胞層ノ内部ニハ桿菌ノ侵入多ク、筋層竝ニ漿膜層ニハ連鎖狀球菌ノ侵入セル者多キヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第 11 表)ノ如ク術後 2 時間ニ於テ可ナリ著明ニ減少シ 8 時間後ニモ尙ホ可ナリ著明ニ減少セルヲ見ル。特ニ穿孔性腹膜炎ヲ惹起シ斃死セル動物第 146, 148 ニ於テハ鹽素量ハ著明ニ減少セルヲ見ル。

第 11 表 (完結+F+連)鹽素量變動表

動物番號	時 日					
	手術前	術後 2 時間	8 時間	24 時間	2 日	3 日
No. 93	0.546	0.540	0.551			
No. 146	0.541	0.469	0.478			
No. 147	0.538	0.510	0.494			
No. 59	0.505	0.485	0.494	0.543	0.525	0.530
No. 148	0.524	0.441	0.453			
平均	0.530	0.489	0.494			

第 3 項 大腸菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合(完結+大+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリテ空虚ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内容ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル大腸菌竝ニ葡萄狀球菌ノ寒天斜面純培養ヲ各 3 白金耳宛ヲ夫々 10cc ノ食鹽水ニ溶解シ之ヲ合セテ 20cc トシタル浮游液ヲ 0.5cc 注射器ニ採リテ前記家兎蟲様

突起内ニ注入セリ。

家兎第46號(糞+完結+大+葡)0.5cc 2100gr.

3日後斃死ス。之ヲ開腹スルニ腹腔内ハ比較的
清淨ナルモ所々膿苔ノ附着セルヲ見ル。蟲様突起
ハ長サ6.0cm 直径1.3cmニシテ表面綠褐色ヲ呈
シ一部分漿膜ノ剝離セルヲ見ルモ穿孔ハ認メズ。
内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第77號(同上)2270gr.

4日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ハ比較
的清淨ニシテ癒着等ヲ認メズ。蟲様突起ハ長サ
6.0cm 直径1.2cmニテ一般ニ暗紫色ノ壞疽ニ陥
レルヲ見ル。内容ハ粘液樣物質ナリ。

家兎第141號(同上)2260gr.

3日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹膜炎症狀ハ
殆ド認メズ。蟲様突起ハ長サ5.5cm 直径1.7cm
ニテ灰綠色ヲ呈シ少量ノ膿苔ヲ附着シ漿膜ノ一部
膿點ノ爲メ白色斑紋ヲ呈セルヲ見ル。内容ハ綠色
糞汁ナリ。

家兎第47號(空+完結+大+葡)0.5cc 2100gr.

3日後斃死ス。死後之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニ
ハ腹水等ノ滯留ハ見ザルモ腸管ハ互ニ輕ク癒着
ス。蟲様突起ハ長サ6.0cm 直径1.3cmニシテ内
容緊張シ先端ノ一部分ヲ殘シテ爾他ノ大部分ハ漿
膜ヲ缺損ス。内容ハ惡臭ヲ放ツ血液樣糞汁ナリ。

家兎第78號(同上)3020gr.

5日後ニ斃死ス。死後之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ
蟲様突起ヲ中心トシ互ニ輕ク癒着セルモ容易ニ剝
離シ得タリ。蟲様突起ハ長サ7.5cm 直径1.8cm
ニシテ表面ハ白色斑紋狀ヲ呈シ壞疽ニ陥レル部ヲ
見ズ。内容ハ濃厚ナル膿汁ナリ。(第21圖)

以上諸實驗ヲ小括シ見ルニ此場合ハ他ノ細
菌注入例ニ比シ其ノ毒力稍々弱ク3日乃至5
日間生存シ。平均4日後ニ多クハ壞疽性蟲様
突起炎ヲ惹起シ斃死セリ。之等ノ各摘出蟲様

突起ヨリ横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジ
ン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ、
粘膜層ニ於テ表皮細胞ハ何レモ壞死ニ陥リ全
ク脱落シ、甚シキハ動物第98號ニ見ルガ如
ク固有層迄全ク Diphtherische Nekrose ニ
陥レルモノアリ。(第21圖參照) 一般ノ粘膜
固有層ハ浮腫狀ヲ呈シ細菌ノ滲潤アリテ毛細
血管ノ充盈擴張アリ、Lieberkühn 氏腺細
胞ハ大部分消失又ハ甚シク減少ス。淋巴腺胞
層ノ發育ハ中等度又ハ稍々貧弱ニシテ境界ハ
通常明瞭ナルモ細胞滲潤著明ナル爲不明瞭ト
ナレルモノモアリ。胚中心部ノ細胞ハ核ノ崩
壞シ「ヘマトキシリン」ニ汚染セル圓形細胞ニ
ヨリ充滿スルモノ多シ。腺胞中隔結締組織ノ發
育ハ良好ニシテ此部ニ細胞ノ滲潤竝ニ血管ノ
擴張充盈ヲ認ム。全般ニ細菌ガ集團ニ繁殖
シ蜂窩織炎樣構造ヲ呈スルモノアリ。筋層ハ
通常細胞滲潤著明ノ爲内輪層、外縱層共ニ輕
度ニ肥厚シ其ノ纖維配列ハ粗裂トナリ浮腫狀
ヲ呈ス。又筋層ノ一部壞死ニ陥レルモノアリ。
漿膜層ニ汚染セル大小不同ノ核ヲ有スル
細胞又ハ「ヘマトキシリン」ニ汚染セル小粉末
ノ集團アリ。又纖維素析出シ網狀ノ膿苔ノ附
着セルモノアリ。然レ共多クノモノハ漿膜層
ヲ全ク缺損ス。

「グラム」氏組織染色法ニヨリ粘膜層表面特
ニ固有層ノ破壞セラレ、又ハ表皮ノ脱落セル
部ノ表面竝ニ脱落物質内ニ多數ノ短ク太キ桿
菌ヲ見ル又葡萄狀球菌及ビ雙球菌ヲモ見ル事
アリ。淋巴腺胞内ニ崩壞セル大小核ヲ有スル
細胞滲潤ノ部ニ多數ノ細菌集團シ繁殖ス。細
菌ノ種類ハ太短キ桿菌及ビ連鎖狀球菌、葡萄
狀球菌ヲ主トシテ、其ノ他各種ノ細菌ヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第12表)ノ如ク手術後2時間, 8時間ハ殆ド變化ナク24時間以後ニハ輕度ノ増加ヲ見タリ。

第12表 (完結+大+葡)鹽素量變動表

動物番號	時 日					
	手術前	術2時間後	8時間	24時間	2日	3日
No. 46	0.437	0.445	0.459	0.502	0.502	
No. 77	0.569	0.551	0.542	0.529	0.558	0.554
No. 141	0.514	0.512	0.530	0.552	0.551	
No. 47	0.469	0.465	0.528	0.552	0.554	
No. 78	0.467	0.476	0.488	0.558	0.549	
平均	0.491	0.490	0.509	0.538	0.542	

第4項 Fränkel 菌ト葡萄狀球菌ヲ混合
注入セル場合(完結+F+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリテ空虚ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内容ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル[Fränkel 菌ノ Leber-Bouillon 純培養3ccニ生理的食鹽水7ccヲ加ヘタルモノト、葡萄狀球菌ノ寒天斜面純培養3白金耳ヲ10ccノ生理的食鹽水ニ浮游セシメタルモノヲ混合シ注射器ニ採リテ蟲様突起内ニ注入セリ。(附表第3B参照)

家兎第81號(糞+完結+F+葡)0.5cc 2680 gr.

2日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ蟲様突起ヲ中心トシ堅ク癒着シ之ヲ剝離セントスルニ突起周圍ニ膿瘍ヲ形成ス。蟲様突起ハ長サ6.0 cm 直徑1.5 cm ニテ内容ハ膿球ヲ浮游セル糞汁ナリ。

家兎第115號(同上)2100 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ多量ノ腹水滯溜シ腸管ノ癒着アリ腹膜炎症狀ハ可ナリ。

著明ナリ。蟲様突起ハ長サ8.5 cm 直徑2.0 cm ニテ表面ニ膿苔附着シ漿膜下出血ヲ認ム。其ノ先端ノ一部ハ壞疽ニ陥リ其ノ中央部ニ小穿孔アリ。内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第149號(同上)2200 gr.

翌日斃死ス之ヲ開腹シ見ルニ腸管ノ癒着ハ著シカラザルモ所々ニ膿苔附着ス。蟲様突起ハ長サ8.5 cm 直徑2.0 cm 表面充血シ所々白色ノ膿苔附着セルヲ見ル。内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第80號(空+完結+F+葡)0.5cc 2150 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ輕ク癒着シ膿苔附着ス。蟲様突起ハ長サ6.0 cm 直徑1.2 cm ニテ先端ヨリ2/3ノ部ニ於テ大穿孔アリテ將ニ自然的切斷ヲ起サントス。其ノ附近ハ壞疽ニ陥レルヲ見ル。内容ハ少量ノ粘液ヲ含有ス。(第14圖)

家兎第151號(同上)2200 gr.

翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ輕ク癒着セルモ容易ニ剝離シ得タリ。蟲様突起ハ長サ7.0 cm 直徑1.7 cm ニテ中央部ニ拇指頭大ノ壞疽部アリ其ノ中央ニ小穿孔アリ。其ノ附近ニ膿苔附着ス。内容ハ粘液様物質ナリ。(第13圖)

以上ノ實驗ヲ小括シ見ルニ動物ハ大部分24時間内外ニテ穿孔性蟲様突起炎ヲ起シテ斃死シ1例ハ蟲様突起周圍膿瘍ニテ2日後ニ斃死セリ。之等ノ摘出蟲様突起ヨリ横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ表皮細胞竝ニ粘膜固有層共ニ中等度ノ壞死ニ陥レルモ物質缺損ハ輕度ナリ。粘膜層内ノ毛細血管ハ充盈擴張シ、出血ノ稍々著明ナルモノモアリ。腺細胞ハ正常ノ構造ヲ示スモノト全ク消失セルモノトアリ。細胞ノ滲潤ハ何レモ證明シ且中等度ニ細菌ノ組織内ニ侵入セルヲ見ル。淋巴腫胞ノ發育ハ中度度又ハ良好ニシ

テ、境界モ亦明瞭ナルモノ多キモ時ニ細胞滲潤ノ爲ニ排列不規則トナリ稍々不明瞭トナレルモノアリ、臍胞中隔ノ結締組織發育良好ニシテ浮腫狀ニ腫脹セルモノアリ。粘膜下層ノ血管ハ中等度ニ充盈擴張ス。筋層ハ内輪層、外縱層共ニ肥厚ハ殆ド認メザルモ細胞滲潤中等度ニ存在セル爲筋纖維ノ配列粗裂トナル、漿膜層ハ何レモ浮腫狀ニ腫脹シ輕度ノ白血球滲潤アリ纖維素ノ析出アリテ膿苔附着ス。小腸間膜血管ノ充盈中等度ナリ。

「グラム」氏組織染色法ニヨリ各種ノ細菌ノ粘膜表面上ニ附着繁殖シ尙ホ粘膜固有層組織中ニ侵入セルヲ見ル。臍胞層内ニモ細菌ノ侵入中等度ニ見ラルルモ筋層ニハ比較的少ナク漿膜面ニ又繁殖セルヲ見ル。細菌ノ種類ハ「グラム」陽性ノ桿菌及ビ葡萄狀球菌ノ外ニ少量ノ連鎖狀球菌及ビ重複球菌ヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第13表)ノ如ク手術後2時間ニハ可ナリ著シク減少シ、8時間後ニハ稍々恢復ノ途ニ在ルモ尙ホ正常ヨリ可ナリ減少シアリ。

第13表 (完結+F+葡)鹽素量變動表

動物番號	時 日				
	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2 日
No. 81	0.537	0.496	0.522	0.552	0.573
No. 115	0.510	0.491	0.500		
No. 149	0.441	0.432	0.450		
No. 80	0.518	0.512	0.547		
No. 151	0.527	0.473	0.473		
平 均	0.507	0.479	0.491		

第5項 連鎖狀球菌ト葡萄狀球菌ヲ混合
注入セル場合(完結+連+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘

ニ、或ハ指壓ニヨリ空虛ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内容ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ人體ニ於ケル蟲様突起炎ヨリ分離セル連鎖狀球菌ノ Bouillon 24時間培養3ccニ生理的食鹽水7ccヲ加ヘタルモノト、葡萄狀球菌寒天斜面純培養3白金耳ヲ10ccノ生理的食鹽水ニ浮游セシメタルモノヲヨク混合シタル後之ヲ注射器ニ採リテ蟲様突起内ニ注入セリ。(附表第3B参照)

家兎第85號(糞+完結+連+葡)0.5cc 2240gr.

家兎ハ手術ノ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ輕ク癒着シ且盲腸壁ニ所々漿膜下出血ヲ見ル。蟲様突起ハ長サ5.5cm 直徑1.0cmニシテ一般ニ暗紫色ヲ呈スルモ穿孔ハ認メラズ。内容ハ赤色ノ液體ニ膿球ヲ浮游ス。(第22圖)

家兎第125號(同上)2310 gr.

家兎ハ手術ノ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ僅少ノ癒着アル外著シキ腹膜炎症狀ヲ認メズ。蟲様突起ハ長サ7.0cm 直徑2.0cmニテ周圍ト輕ク癒着シ表面稍々充血ス。漿膜下ニ白色斑紋ヲ見ル。内容ハ膿汁ナリ。(第15圖及ビ第20圖)

家兎第126號(同上)1980 gr.

動物ハ手術ノ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ輕ク癒着シ且表面ニ所々膿苔ノ附着セルヲ見ル。蟲様突起ハ長サ7.3cm 直徑1.9cmニテ其ノ中央部特ニ著明ニ膨隆シ表面充血シ小腸間膜血管部附近ニ拇指頭大ノ部壞疽ニ陥レルヲ見ルモ穿孔ハナシ。内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第86號(空+完結+連+葡)0.5cc 2780gr.

動物ハ手術ノ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ニハ殆ド癒着ヲ認メズ腹膜炎症狀ナシ。蟲様突起ハ長サ8.0cm 直徑1.8cmニテ表面稍々蒼白色ヲ呈シ壞疽穿孔等ヲ認メズ。内容ハ血液樣糞汁ナリ。

家兎第 127 號(同上) 2300 gr.

動物ハ手術ノ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ
腸管ハ可ナリ著明ニ癒着シ所々膿苔附着シ又漿膜
下出血ヲ見ル等腹膜炎症狀可ナリ著シ。蟲様突起
ハ長サ 6.7 cm 直径 1.9 cm ニテ表面充血シ大ナル
膿苔附着シ且所々美麗ナル白斑ヲ見ル。内容ハ
液狀糞便ナリ。

以上ノ實驗ヲ小括シ見ルニ動物ハ何レモ翌
日 24 時間内外ニテ化膿性、加答兒性又ハ壞
疽性ノ蟲様突起炎ヲ起シテ斃死セリ之等ノ摘
出蟲様突起ヨリ

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重
染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ、粘膜
層ニ於テ表皮細胞ハ何レモ中等度ノ壞疽ニ陥
リ到ル所ニ脱落セルヲ見ル。又粘膜固有層ニ
モ壞疽トナリ脱落セルモノアリ。粘膜固有層
ヨリ膿胞層ニカケー様ニ「エオジン」ニ染リ所
謂 Diphtherische Nekrose トナル所アリ。腺
細胞ハ減少シ又ハ全ク消失セルモノアリ。(動
物第 85 號) 毛細血管ハ中等度ニ充盈擴張ス。
淋巴膿胞ノ發育ハ良好ナルモノアリ貧弱ナル
モノアリ境界モ亦多クハ明瞭ナルモ稍々不明
瞭ナルモノモアリ。白血球滲潤アリテ毛細血
管擴張ス。膿胞中隔ハ浮腫狀ニ腫脹シ多數ノ
細菌ガ集團的ニ繁殖シ蜂窩織炎様外觀ヲ呈ス
ルヲ見ルモノアリ。筋層ハ内輪層外縱層共ニ
多少浮腫狀ニ肥厚セルモノアルモ著シカラズ
筋纖維配列ハ白血球滲潤ノ爲ニ粗裂トナルモ
ノ多ク又中ニハ筋纖維ガ壞疽トナレルモノア
リ。漿膜ノ浮腫竝ニ細胞滲潤ハ何レモ中等度
ニ證明セラル。小腸間膜ノ血管ハ擴張充盈シ
靜脈内ハ細菌ノ發育ニヨリ栓塞サルヲ見ル
モノアリ。

「グラム」氏組織染色法ヲ行フニ粘膜層表面
ニハ可ナリノ細菌繁殖セルヲ見ルモ、粘膜固
有層内ヘノ侵入ハ比較的僅少ニシテ寧ろ膿胞
層ノ中隔部ニ多數ノ細菌ガ繁殖セルヲ見ル。
筋層内ニハ白血球滲潤ノ多キ部ニ細菌ノ侵入
セルヲ見ル。漿膜面ニハ一様ニ細菌ノ附着セ
ルヲ見ル。細菌ノ種類ハ注入セル連鎖狀球菌
及ビ葡萄狀球菌ノ外ニ各種桿菌ノ繁殖ヲ見
ル。(第 15 圖參照)

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ル
ニ(第 14 表)ノ如ク、手術後 2 時間ニハ可ナ
リ著明ナル減少ヲ見ルモ、8 時間後ニハ概ニ
概ネ手術前ノ價ニ恢復セリ。

第 14 表 (完結+連+葡)鹽素量變動表

動物番號	時 日		
	手術前	術後2時間	8 時間
No. 85	0.487	0.474	0.503
No. 125	0.518	0.448	0.476
No. 126	0.532	0.475	0.490
No. 86	0.482	0.487	0.521
No. 127	0.482	0.505	0.500
平均	0.500	0.478	0.502

第 6 項 大腸菌ト連鎖狀球菌ヲ混合注 入セル場合(完結+大+連)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘
ニ、或ハ指壓ニヨリ内容ヲ空虚ナラシメタル
後、之ヲ完全ニ結紮シ腹腔ノ交通ヲ遮斷シ所
謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ人體ニ於ケ
ル蟲様突起炎ヨリ分離セル大腸菌寒天斜面純
培養 3 白金耳ヲ 10cc ノ生理的食鹽水ニ浮游
セシメタルモノト、連鎖狀球菌ノ Bouillon
24 時間培養液 3cc ニ生理的食鹽水 7cc ヲ加
ヘタルモノトヲ加ヘヨク混合セルモノヲ注射

器ニ採リテ蟲様突起内ニ注入セリ。(附表第3 B 参照)

家兎第82號(糞十完結十大大連)0.5 cc 2570 gr.

動物ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ輕ク癒着ス。蟲様突起ハ長サ6.5 cm 直径2.3 cm ニテ一般ニ、暗紫色ヲ呈ス。内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第120號(同上)2070 gr.

動物ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ癒着シ表面ニ膿苔附着シ、漿膜下ニ出血アリ腸内ニ瓦斯ヲ充滿ス。蟲様突起ハ長サ6.2 cm 直径1.8 cm ニテ表面一般ニ充血シ表面僅ニ膿苔ヲ附着ス。内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第143號(同上)2300 gr.

家兎ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ノ癒着ハ殆ド無キモ漿膜下ニ小出血アリ表面所々ニ膿苔附着セルヲ見ル。蟲様突起ハ長サ8.5 cm 直径1.8 cm ニテ一般ニ稍々蒼白色ヲ呈シ結紮部附近ニ小膿疽部アリ附近ニ膿苔附着ス。内容ハ液狀糞便ナリ。

家兎第83號(空十完結十大大連)0.5 cc 2320 gr.

家兎ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ可ナリ著明ニ癒着ス。蟲様突起ハ長サ7.0 cm 直径2.2 cm ニテ腸管ト癒着ス。表面ハ一般ニ稍々充血シ中央ニ膿疽部ヲ見ルモ穿孔ハ認メズ。内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第121號(同上)2100 gr.

動物ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹膜炎症狀殆ド無シ。蟲様突起ハ長サ8.0 cm 直径2.0 cm ニテ表面一様ニ充血シ所々白色斑紋ヲ見ル。内容ハ血液様糞汁ナリ。

以上ノ成績ヲ小括スルニ動物ハ凡テ壞疽性又ハ加答兒性炎ヲ起シ1晝夜前後ニテ斃死セリ。之等摘出蟲様突起ヨリ横斷切片ノ「ヘマ

トキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ粘膜層ニ於テ表皮細胞等ハ半バ以上脱落セルモノ多キモ壊死ニ陥レルモノハ比較的輕少ナリ。而シテ表皮ノ脱落セル部分ハ細胞滲潤著明ナル爲ニ反ツテ肥厚セルヲ見ル事アリ。粘膜層内ノ毛細血管ノ擴張充盈竝ニ組織中ノ出血等モ中等度ニ認メラル。淋巴腺胞ノ發育ハ大部分良好ニシテ境界モ亦明瞭ナルモ1例ニ於テハ發育モ貧ニシテ境界モ細胞滲潤ノ爲ニ不明瞭トナレルモノアリ。腺胞中隔ノ結締組織ノ發育中等度ニシテ毛細血管モ可ナリ充盈ス。内輪筋ハ概ネ整然タル筋配列ヲ示セルモ外縱筋ハ細胞滲潤アリテ輕度ノ肥厚アリ纖維配列鬆粗トナル。漿膜層ニ輕キ浮腫性腫脹ヲ認ムル外著變ナク、小腸間膜ノ血管ハ充盈シ血管周圍ニ細胞滲潤アルモノアリ、血管内ニ細菌ノ繁殖セルモノモアリ。

「グラム」氏組織染色ニ依リ脱落セル表皮及ビ粘膜固有層ノ表面ニ多數ノ細菌集團アリ。又腺胞ノ胚中心部ニモ細菌ガ廣ク分散シ繁殖シ中隔部ニハ集團ニ存在ス。

筋層内ニハ比較的細菌ノ侵入少ナキモ漿膜面ニハ特ニ其ノ表面ニ多クノ細菌附着シ又小腸間膜ノ組織中ニモ侵入セルヲ見ル。細菌ノ種類ハ大小ノ桿菌及ビ連鎖狀球菌ノ外ニ少數ノ葡萄狀球菌、雙球菌等ヲモ見ル。

尙ホ「グラム」陰性ノ大腸菌ノ組織内侵入狀態ヲ檢スル目的ニ Zieler'sche Färbung ヲ行ヘルニ表皮細胞ノ脱落セル中及ビ腺細胞中ヨリ染リ腺胞内ニモ進入セルヲ認メ得タリ。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第15表)ノ如ク手術後2時間ニハ可ナリ鹽素量ノ減少ヲ來シ、術後8時間ニ於テモ

少々恢復ノ傾向ハ認ムルモ尙ホ手術前ニ比スレバ減少シアルヲ見ル。

第 15 表 (完結+大+連)鹽素量變動表

動物番號	時 日			
	手術前	術 後 2 時間	8 時間	2 日
No. 82	0.491	0.480	0.496	0.550
No. 120	0.537	0.524	0.507	
No. 143	0.525	0.484	0.544	
No. 83	0.469	0.486	0.463	
No. 121	0.533	0.495	0.514	
平 均	0.511	0.494	0.505	

第 7 項 本 節 概 括

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シタル後此腔内ニ Fränkel 菌、大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌等ノ純培養ヲ夫々單獨ノ場合ノ半量宛 2 種類宛混合シ注入セルニ動物ハ多クハ 24 時間前後又ハ遅クモ 2, 3 日後ニハ壞疽性、化膿性等ノ炎症ヲ起シテ斃死ス。即チ之等ノ細菌ヲ單獨ニ使用セルヨリモ半量宛 2 種類混合シ存在セル方ガ毒力ノ強キ事ヲ證明シ得タリ。之等ノ場合ノ血液中鹽素量ノ變遷ヲ見ルニ術後 2 時間ニハ可ナリ著明ニ減少シ、8 時間後ニハ少々増加ノ傾向ヲ見ルモ尙ホ正常値ニ比シ減少シアリ。斯カル鹽素量ノ減少ハ穿孔性壞疽性炎ニテ症狀激シキモノ程減少ノ度著明ナリ。而シテ症狀ノ輕キ例ニ於テハ血中鹽素量ノ減少セザル事アリ、又稀ニ僅ニ増加ヲ見ル事アリ。

第 5 節 蟲様突起完全結紮後 3 種類又ハ

4 種類ノ細菌混合注入試験

此場合ニハ總テ細菌ヲ單獨ニ注入シタル場合ト同一ノ菌ヲ 1/3 量宛ヲ各 3 種類混合シタ

ルモノヲ 0.5cc 注入ニ使用セリ。即チ家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリテ空虛ナラシメタル後之ヲ滅菌絹絲ヲ以テ完全ニ結紮シ内容ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ其ノ先端ヨリ Fränkel 菌ノ Leber-Bouillon 24 時間培養液ヲ 3cc ニ生理的食鹽水 7cc ヲ加ヘ、連鎖狀球菌ノ Bouillon 培養モ同様 3cc ニ 7cc ノ生理的食鹽水ヲ加ヘタルモノヲ作り、葡萄狀球菌、大腸菌ハ寒天斜面ニ純培養ヲナシ之ガ 3 白金耳ヲ生理的食鹽水 10cc 中ニ浮游セシメ、之等ヲ 3 種類宛混合シ針ノ細キ注射器ニ 0.5cc 採リテ徐々ニ蟲様突起内ニ注入セル後刺入口ハ酒精綿球ニテ充分清拭シタル後腹壁ヲ 2 重層ニ縫合セル後動物ヲ保温シツツ其ノ經過ヲ觀察セリ。

第 1 項 Fränkel 菌ト大腸菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合

(完結+F+大+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリテ空虛ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内容ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ Fränkel 菌 Leber-Bouillon 24 時間純培養 1cc ニ 9cc ノ生理的食鹽水ヲ加ヘ此内ニ更ニ寒天斜面ニ 24 時間純培養セル大腸菌及ビ葡萄狀球菌ヲ夫々 1 白金耳宛浮游セシメ、ヨク混合シタルモノヲ 0.5cc 注射器ニ採リタルモノヲ使用セリ。(附表第 4 参照)

家兎第 94 號(糞+完結+F+大+葡)0.5cc

2600 gr.

動物ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ少量ノ浸出液アリ腸管ハ互ニ癒着スル等腹膜炎症狀可ナリ著明ナリ。蟲様突起ハ長サ 6.5cc

直徑 2.1cc ニテ表面充血シ且大部分ハ暗紫色ヲ呈ス。突起内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第 95 號(空+完結+F+大+葡)0.5 cc
2840 gr.

動物ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ノ癒着其ノ他ノ腹膜炎症狀ハ殆ド之ヲ認メズ。蟲様突起ハ長サ 6.5 cm 直徑 1.7 cm 内容充滿シ從ツテ表面緊張ス。漿膜面ハ綠褐色ヲ呈シ中央部ハ特ニ著明ニ壞疽ニ陥レルヲ見ル。内容ハ血液様液便ナリ。

家兎第 97 號(糞+完結+F+大+葡)0.5 cc
2200 gr.

動物ハ 4 日後斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ト腸管ノ間ニハ殆ド癒着ナキモ蟲様突起ト腸管ノ間ニハ輕キ癒着ヲ見ル。蟲様突起ハ長サ 5.8 cm 直徑 2.0 cm ニテ表面ニ白色ノ斑紋ヲ見ル。内容ハ膿球ヲ浮游セリ液便ナリ。

以上ノ實驗ヲ小括スルニ動物ハ術後 1 日又ハ 4 日後ニ於テ壞疽性又ハ化膿性蟲様突起炎ヲ起シテ斃死セリ。此場合ノ摘出標本ヨリ

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ表皮細胞ノ壞死脱落共ニ中等度ニ認めラルルモ尙ホ全ク脱落セズニ殘存セルモノモアリ。毛細血管ノ擴張充盈及ビ組織内出血ヲモ見ル。粘膜固有層ノ細胞滲潤ハ所ニヨリ

テ可ナリ著明ナル部分アルモ中ニハ比較的輕少ノモノアリ。Lieberkühn 氏腺細胞ハ破壊減少又ハ全ク消失ス。脱落物質中及ビ之ニ接スル組織面ニハ多數ノ細菌附着シ且又組織内ニモ多數侵入セルヲ見ル。淋巴臚胞ノ發育ハ中等度ニシテ境界モ亦概ネ中等度ニ明瞭ナルモ、各淋巴臚胞ハ浮腫狀ニ腫脹シ細胞配列鬆粗トナレルモノアリ。又細胞ノ滲潤著明ナル爲ニ境界ノ甚ダ不明瞭トナレルモノアリ。臚胞内ニ於テモ血管ノ擴張充盈アルモ他ノ部程著シカラズ臚胞中隔ノ結締組織發育ノ狀況ハ普通ナリ。筋層ニハ肥厚ナキモ細胞滲潤ニヨリ配列ノ粗裂トナレルモノアリ。漿膜モ亦輕度ニ浮腫狀ニ腫脹シ小腸間膜血管ノ充盈モ亦著明ナルモ血管周圍ノ細胞滲潤ハ之ヲ認メズ。

「グラム」氏組織染色法ニヨリ檢鏡スルニ細菌ハ主トシテ粘膜層内及ビ其ノ表面ニ多ク臚胞内ニハ散在性ニ侵入シ血管内ニモ集團侵入セルヲ見ル。細菌ノ種類ハ大小各種ノ桿菌及ビ球菌ヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第 16 表)ノ如ク、手術後 2 時間ニハ可ナリ著明ニ降下スルモ 8 時間後ニハ既ニ概ネ術前ニ近ク迄増加シ更ニ 24 時間後即チ死ノ直前ニ於テハ反ツテ僅ニ増加ノ傾向ヲ見ル。

第 16 表 (完結+3 種類菌及ビ 4 種類菌)鹽素量變動表

動物番號	時				日							
	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	
No. 94	0.490	0.476	0.487	0.514	0.522	0.545						
No. 95	0.504	0.459	0.517	0.514								
No. 97	0.531	0.494	0.507	0.512								
平 均	0.508	0.476	0.504	0.513								

動物番號	時				日							
	手術前	術後 2時間	8時間	24時間	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	
No. 98	0.491	0.461	0.439									
No. 99	0.487	0.495	0.497	0.530	0.540	0.533	0.512	0.492	0.551	0.560	0.550	
No. 100	0.459	0.468	0.465									
平 均	0.482	0.475	0.467									
No. 101	0.451	0.458	0.445	0.484								
No. 102	0.488	0.510	0.514	0.515								
No. 103	0.474	0.458	0.485									
平 均	0.471	0.475	0.481	0.499								
No. 104	0.514	0.549	0.532									
No. 105	0.503	0.495	0.510									
No. 106	0.519	0.491	0.502									
平 均	0.512	0.512	0.515									
No. 107	0.509	0.517	0.532									
No. 108	0.507	0.512	0.520									
No. 109	0.512	0.472	0.503	0.537	0.588	0.570	0.556					
平 均	0.509	0.501	0.525									
總平均	0.493	0.489	0.498									

第2項 大腸菌ト連鎖狀球菌ト葡萄狀

球菌ヲ混合注入セル場合

(完結+大+連+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ
或ハ指壓ニヨリ空虚ナラシメタル後、之ヲ完
全ニ結紮シ内腔ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ
形成シ、其ノ先端ヨリ連鎖狀球菌 Bouillon
24時間純培養液 1cc ニ生理的食鹽水 9cc ヲ
加ヘ、此液中ニ更ニ寒天斜面ニ24時間純培
養ヲ行ヘル大腸菌及ビ葡萄狀球菌ヲ夫々1白
金耳宛浮游セシメ、ヨク混合シタルモノヲ
0.5cc 注射器ニ採リテ注入セリ。

家兎第98號(糞+完結+大+連+葡) 0.5 cc
2690 gr.

動物ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニ
ハ中等量ノ浸出液滲留シ腸管面ハ充血シ且所々癒
着シ膿苔ヲ附着ス。蟲様突起ハ長サ8.0 cm 直径
1.6 cm ニテ表面一般ニ灰綠色ヲ呈ス。内容ハ膿様

液便ナリ。

家兎第99號(空+完結+大+連+葡) 0.5 cc
2200 gr.

動物ハ手術後1箇月間生存セリ。最初ノ1週間
ハ元氣惡シク食慾不振ニテ體重減少セシモ10日
目頃ヨリ體重増加シ20日頃ヨリ再び稍々體重減
少シ元氣衰ロヘタリ。術後1箇月ニテ之ヲ撲殺シ
開腹シ見ルニ蟲様突起ヲ中心トシ極メテ輕ク腸管
ノ癒着ヲ見ル外腹膜炎症狀ノ著シキモノヲ見ズ。
蟲様突起ハ長サ10 cm 直径4 cm ニ膨大シ内容充
實シ表面新鮮ナル血管新生サレ充血ス。内容ハ粘
液様ノ濃厚粘稠ナル膿汁ナリ。(第16圖參照)

家兎第100號(糞+完結+大+連+葡) 0.5 cc
2760 gr.

動物ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニ
ハ腹水滲留シ漿膜下出血アリ中等度ニ腸管癒着
ス。蟲様突起ハ長サ6.0 cm 直径1.6 cm ニテ一般
ニ稍々充血ス結紮部ニ近ク大豆大ノ小膿疽部ヲ認
ム。内容ハ膿様液便ナリ。

之ヲ小括シ見ルニ糞便ノ存スルママ細菌ヲ注入セル2例ハ翌日壞疽性炎ニテ斃死シ内容ヲ空虚ニシ結紮注入セル例ニ於テ1箇月間生存シタルハ寧ろ異例トモ言フ可シ。之等ノ摘出標本ヨリ

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ物質ノ缺損表皮脱落ハ中等度ニ見ラルルモ壞死ハ比較的僅少ナリ。粘膜層内ノ毛細血管ノ擴張充盈ハ僅ニ認メラルルモ細胞ノ滲潤ハ殆ドナシ。臃胞ノ發育良好ニシテ境界モ亦明瞭、臃胞間結締組織ノ發育中等度ナリ、筋層ハ内輪層外縱層共ニ細胞滲潤ニヨリ纖維配列稍々粗裂トナル。漿膜層竝ニ小腸間膜ニハ著變ヲ認メズ。例外タル家兎第99號ハ1箇月間膿瘍ヲ形成セルモノナレバ其ノ檢鏡所見モ自ラ他ト大イニ異リ粘膜層ノ表皮細胞ハ比較的健存セルモ粘膜固有層ハ殆ド存在セズ從ツテ腺細胞モ著シク萎縮セルモノヲ少シク認ムルノミナリ。臃胞モ發育極メテ不良ニシテ境界明カナラズ僅カニ粘膜下層トノ間ニ紡錘狀ノ圓形細胞集團トシテ存在スルヲ見ル。筋層ハ可ナリ幅廣ク肥厚シ筋纖維配列甚シク不規則トナル。漿膜下層ノ血管擴張アリ。

「グラム」氏組織染色ニヨリ各種類ノ細菌ガ粘膜層臃胞層ノ組織内ニ侵入スルヲ認ムルモ、家兎第99號ニ於テハ漿膜表面ニ少量ノ細菌附着セルヲ見ルノミニテ組織内ニ侵入セルヲ見ズ。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ハ(第16表)ニ見ルガ如ク手術後2時間ニ稍々減少シ8時間後ニハ更ニ著明ニ減少セルヲ見タリ。家兎第99號ニ於テハ手術後ニ於テモ減

少スル事ナク漸次増加ノ傾向ヲ見ル。

第3項 Fränkel 菌ト連鎖狀球菌ト葡萄狀球菌ヲ混合注入セル場合 (完結+F+連+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ内腔ヲ指壓ニヨリ空虚ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内腔ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ Fränkel 菌ノ Leber-Bouillon 24 時間培養 1cc ニ連鎖狀球菌ノ Bouillon 培養 1cc ヲ加ヘ更ニ之ニ生理的食鹽水 8cc ヲ加ヘ、之ノ中ニ葡萄狀球菌寒天斜面純培養 1 白金耳ヲ浮游セシメ、ヨク混合シタルモノヲ 0.5cc 注射器ニ採リテ注入セリ。(附表第4参照)

家兎第101號(糞+完結+F+連+葡)0.5cc
2730 gr.

動物ハ2日後斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ輕ク癒着シ且膿苔附着ス。蟲様突起ハ長サ 5.5 cm 直徑 1.5 cm ニテ一般ニ暗紫色ヲ呈シ先端ヨリ 1/3 ノ部ニ小穿孔アルヲ認ム。内容ハ膿球ヲ含ム液便ナリ。

第兎第102號(同上)2520 gr.

動物ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニハ浸出液滲溜シ、腸管ハ互ニ可ナリ強ク癒着シ漿膜下出血ヲ見ル。蟲様突起ハ長サ 6.0 cm 直徑 1.4 cm ニテ表面ハ一般ニ紫褐色ヲ呈シ所々膿苔附着シ、中央部ニ大豆大ノ穿孔アリテ周圍ニ糞汁附着ス。内容ハ殆ド無ク少量ノ粘液ナリ。

家兎第103號(空+完結+F+連+葡)0.5cc
2260 gr.

動物ハ翌日斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腸管内ニハ瓦斯充滿シ漿膜下出血アリ。表面ニ膿苔附着ス。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 1.8 cm ニテ表面充血シ結紮部ニ近ク稍々膨隆シ一部分壞疽ニ陥レ

ルモ穿孔ヲ見ズ。内容ハ液便ナリ。

以上3實驗ヲ小括シ見ルニ動物ハ1日又ハ2日後ニ壞疽性蟲様突起炎ヲ起シ然カモ2例ニ於テハ明カニ穿孔性腹膜炎ヲ起セルヲ見タリ之等ノ摘出蟲様突起ヨリ

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ表皮細胞層ヨリ粘膜固有層迄廣ク壞疽ニ陥リ、時ニハ淋巴腫胞ノ中央迄壞死トナレル部分アリ。而シテ壞死ニ陥レル固有層内ニハ所々ニ多數ノ細菌集團繁殖セルヲ見ル表皮ノ脱落ハ比較の僅少ナリ。毛細血管ハ輕度ニ充盈シ細胞ノ滲潤アリ。淋巴腫胞ノ發育ハ普通ニシテ境界モ中等度ナリ。然レ共1例ニ於テハ細胞滲潤ノ爲境界不明瞭トナル。胚中心部ニハ強ク「ヘマトキシリン」ニ染マレル大ナル顆粒ヲ見、腫胞間結締組織ノ發育ハ稍々良好ニシテ其ノ内ノ血管ハ擴張シ赤血球ノ充盈セルヲ見ル。筋層ハ内輪筋ハ概ネ纖維細胞ノ配列整然タルモ、外縦筋ノ配列ハ細胞滲潤ノタメ稍々粗裂トナル。漿膜ノ浮腫様肥厚ハ輕度ニ存在スルモ著シカラズ。細胞滲潤アリテ蜂窩織炎様ニ細菌ノ繁殖セルヲ見ル。小腸間膜血管ノ擴張ハ殆ド見ラズ。

「グラム」氏組織染色法ニヨリ壞死ニ陥レル表皮細胞及ビ固有層中ニ多數ノ細菌集團アリ。淋巴腫胞ノ中央及ビ筋層、漿膜層内ニハ細菌ノ繁殖比較の僅少ナリ。細菌ノ種類ハ注入セル各種ノ菌ヲ全部認メ得タリ。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第16表)ノ如ク手術後2時間ニハ既ニ僅ニ増加シ8時間モ略ボ同様ニシテ24時間後ニハ可ナリ著明ニ増加セリ。

第4項 Fränkel 菌ト連鎖狀球菌ト大腸

菌ヲ混合注入セル場合

(完結+F+大+連)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリ空虚ナラシメタル後、之ヲ完全ニ結紮シ内腔ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ其ノ先端ヨリ生理的食鹽水8ccニFränkel 菌ノ Leber-Bouillon 24時間培養1ccト連鎖狀球菌 Bouillon 24時間純培養1ccヲ加ヘ、更ニ此内ニ大腸菌寒天斜面純培養1白金耳ヲ浮游セシメテ、ヨク混合シタルモノヲ0.5cc注射器ニ採リテ注入セリ。(附表第4参照)

家兎第104號(糞+完+F+大+連)0.5cc
2260 gr.

家兎ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ輕ク癒着セル外著シキ腹膜炎症狀ヲ見ズ。蟲様突起ハ長サ8.5cm 直徑2.0cmニテ先端ノ1/2ハ正常ナルモ結紮部ニ近キ1/2ハ帶綠白色ヲ呈シ壞疽ニ陥レルヲ見ル。内容ハ膿球ノ浮游セル液便ナリ。

家兎第105號(空+完結+F+大+連)0.5cc
2420 gr.

家兎ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ中等度ニ癒着シ漿膜下出血ヲ見ル。腹膜面及ビ腸管壁等ニ膿苔ノ附着セルヲ見ル。蟲様突起ハ長サ7.5cm 直徑2.0cmニテ表面ニ膿苔附着シ白色ノ斑紋ヲ見ル。内容ハ膿汁ナリ。

家兎第106號(糞+完結+F+大+連)0.5cc
2610 gr.

動物ハ5日後ニ斃死ス。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ハ所々癒着シ膿苔附着シ腹膜炎症狀著明ナリ。蟲様突起ハ長サ6.4cm 直徑1.9cmニテ結紮部附近ニ壞疽部アリ内容ハ血液様液便ナリ。

以上3實驗ヲ小括スルニ動物ハ總テ24時

間前後ニ壞疽性化膿性蟲様突起ヲ起シテ斃死セリ。之等蟲様突起横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ表皮細胞ハ一部分ニ於テ破壊脱落シ輕度ニ壞疽ニ陥レルヲ見ルモ著シカラズ。毛細血管ハ輕ク擴張シ之ヨリ外方固有層内ニ細胞滲潤アリ爲ニ膿胞トノ境界稍々不明瞭トナレルモノアリ。膿胞ノ發育ハ中等度又ハ良好ニシテ其ノ境界ハ明瞭ナリ。膿胞中隔ノ結締織ハ中等度ニ發育シ粘膜下層ハ浮腫様ニ腫脹シ、筋層ニ肥厚ナク纖維配列ハ整然タリ。筋層ヨリ漿膜下層ニカケ蜂窩織炎様ノ細胞滲潤ヲ見ル。小腸間膜モ浮腫様ニ腫脹シ細胞滲潤アリ靜脉内ニハ淋巴球及ビ壞死ニ陥レル細胞ノ栓塞セルヲ見ル。漿膜面ニ膿苔ハ附着セザルモ纖維素ノ析出ハ輕ク證明シ得タリ。

「グラム」氏組織染色ニヨリ脱落セル表皮ヨリ固有層内ニカケテ多數ノ細菌集團アリ又膿胞ノ中央ニモ多數ノ細菌ガ散在性ニ繁殖セルヲ見ル。筋層内ニハ殆ド細菌ナク漿膜表面及ビ小腸間膜中ニモ多數球菌ノ集團繁殖アリ。細菌ノ種類ハ各種注入セル細菌其ノ他ノ桿菌及ビ球菌ヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第16表)ノ如ク、術後2時間及ビ8時間共ニ手術前ト著シキ變動ヲ見ズ。

第5項 4種類ノ細菌ヲ混合注入セル場合(完結+F+大+連+葡)

家兎ノ蟲様突起ノ内容タル糞便ヲ其ノ儘ニ、或ハ指壓ニヨリ空虚ナラシメタル後之ヲ完全ニ結紮シ其ノ内腔ノ交通ヲ遮斷シ所謂閉塞腔ヲ形成シ、其ノ先端ヨリ Fränkel 菌ノ

Leber-Bouillon 培養、連鎖狀球菌ノ Bouillon 培養液ヲ夫々 3cc = 7cc ノ生理的食鹽水ヲ加ヘ、大腸菌及ビ葡萄狀球菌ノ寒天斜面純培養 3 白金耳宛ヲ 10cc ノ生理的食鹽水中ニ浮游セシメタルモノヲ全部混合シタルモノヲ 0.5cc 採リテ注射器ヲ以テ注入セリ。

家兎第 107 號(糞+完結+F+大+連+葡)

0.5 cc 3180 gr.

動物ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管ハ互ニ癒着シ膿苔附着スル等可ナリ腹膜炎ノ症狀著明ナリ。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 2.1 cm ニテ表面一般ニ充血性ニシテ中央部ニ暗褐色ニ壞疽部アリテ小穿孔ヲ見ル。内容ハ血液様糞汁ナリ。

家兎第 108 號(空+完結+F+大+連+葡)

0.5 cc 2540 gr.

家兎ハ翌日斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腸管内ニハ瓦斯充滿セルモ、癒着其ノ他ノ腹膜炎症狀ハ殆ド認メズ。蟲様突起ハ長サ 6.5 cm 直徑 1.7 cm ニテ一般ニ蒼白色ヲ呈シ結紮部附近ニ壞疽ニ陥レルヲ見ル。内容ハ血液様液便ナリ。

家兎第 109 號(糞+完結+F+大+連+葡)

0.5 cc 2320 gr.

家兎ハ5日間生存シタル後斃死セリ。之ヲ開腹シ見ルニ腹腔内ニ少量ノ腹水滯溜シ、腸管ハ蟲様突起ヲ中心トシテ可ナリ強ク癒着セルモ、比較的容易ニ剝離シ得タリ。蟲様突起ハ長サ 8.0 cm 直徑 2.2 cm ニテ表面ニ白色ノ斑紋ヲ現ハス。内容ハ膿汁ナリ。

之等ノ實驗ヲ小括スルニ動物ハ概ネ翌日壞疽性蟲様突起炎ヲ起シ斃死シ 1 例ニ於テハ 5 日間生存セル後化膿性蟲様突起炎ヲ起シ死亡セリ。摘出セル蟲様突起横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ粘膜層ニ於テ物質ノ缺損竝ニ

壊死ハ中等度ニ見ラレ Lieberkühn 氏腺細胞ハ破壊サレ又ハ消失ス圓形細胞ノ滲潤アリ。臚胞ノ發育ハ不同ニシテ境界亦明カナルモノト不明瞭ナルモノトアリ。臚胞中隔ノ結締組織發育中等度ニテ毛細血管ノ擴張充盈アリ。内輪筋及ビ外縦筋共ニ肥厚ハ殆ド無キモ細胞滲潤アリテ纖維配列ハ稍々粗裂トナル。漿膜層及ビ小腸間膜ニハ特ニ著シキ變化ヲ認メズ。

「グラム」氏組織染色ニヨリ注入シタル各種類ノ桿菌及ビ球菌ガ繁殖シ粘膜層内ニ最も多ク侵入シ臚胞内ニモ繁殖セルヲ見ルモ筋層中ニハ殆ド見ズ、漿膜面ニ少量ノ細菌ヲ見ル。

此場合ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ(第16表)ノ如ク術後2時間ニハ僅ニ減少シ以後次第ニ増加ノ傾向ヲ示スモノノ如シ。

第6項 本節 概 括

3種類ノ細菌ヲ混合シ結紮ニヨリ閉塞腔内ニ注入セルニ、其ノ組合セノ如何ニヨリテ特ニ著シキ變化ヲ見ズ。何レモ1日又ハ數日後ニ壊疽性、化膿性蟲様突起炎ヲ起シテ斃死セリ。此場合ノ組織標本ヲ見ルニ各層ニ於テ可ナリ著明ニ炎症性變化ヲ認メタリ。血中鹽素量ノ變動モ概ネ各場合類似ニシテ術後2時間ニハ可ナリ著明ニ減少シ8時間後ニハ稍々恢復ノ途ニ在ルヲ見ル。而シテ穿孔性腹膜炎等ヲ起セル場合ニハ鹽素量ノ減少亦著明ナリ。

第6節 蟲様突起結紮後食鹽水注入

試験(完結+食鹽水)

蟲様突起ヲ絹絲ニテ完全ニ結紮シ所謂閉塞腔ヲ形成シ其ノ内ニ生理的食鹽水0.5ccヲ注入セリ。動物ハ次第ニ衰弱シ術後5日及ビ8日ニテ蟲様突起周圍膿瘍ニテ斃死セリ。尙ホ

膿瘍ノ一部分ハ破レ汎發性化膿性腹膜炎ヲ併發セリ。蟲様突起ノ内容ハ膿瘍ノ内容ト同様濃厚ナル胆汁ナリ。之ヲ塗抹標本トシ染色檢鏡セルニ「グラム」陽性ノ太短キ桿菌、雙球菌、葡萄狀球菌、「グラム」陰性ノ大腸菌等ヲ認ム。

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色標本ノ病理組織學的所見ヲ見ルニ、粘膜層ノ表皮細胞ノ脱落比較の輕度ニシテ壊疽モ殆ド認メズ。毛細血管ノ擴張充盈アリ。之ヨリ内方腔内ニ於テ一様ニ染色セル多數ノ細胞ヨリナル幅廣キ膿苔様物質ヲ認ム。尙ホ固有層内ノ圓形細胞滲潤中等度ニシテ所々可ナリ大ナル出血ヲ見ル。淋巴臚胞ノ發育良好境界明割ニシテ臚胞ノ中央部ニハ褐色ニ染マレル細胞様集團アリ脂肪細胞カト思ハル。筋層ニハ輕度ノ肥厚アリ特ニ内輪層ニ著シク且細胞滲潤ノ爲メ纖維ノ配列粗裂トナル。漿膜層ニハ輕度ノ浮腫性腫脹アリテ膿苔附着シ且漿膜層内ニ臚胞ヲ形成セルヲ見ル。細胞ノ浸潤中等度ニシテ小腸間膜血管ノ充盈セルヲ見ル。

今 Sudan III. 染色ヲ行フニ臚胞内ニ多數ノ脂肪細胞ヲ認ム。カカル脂肪變性ハ臚胞ノ中央部ニ多ク周邊部ニ少ナシ。表皮細胞内ニモ所々 Sudan ニ染マレル粉末狀物質ヲ認ム。小腸間膜中ニハ著明ニ Sudan ニ染リ鮮紅色ヲ呈スル脂肪球多數ニ存在セルヲ見ル。光線ヲ Doppelbrechen スル Lipoid ハ殆ド見ズ主トシテ中性脂肪ガ蓄積セルモノナラン。

「グラム」氏組織染色法ニヨリ粘膜層内ニハ多數ノ細菌侵入スルヲ見ル。淋巴臚胞ノ胚中心部ニハ散在性ニ細菌ノ繁殖セルヲ見、漿膜中ノ細胞滲潤セル中ニモ一様ニ細菌ノ分布セ

ルヲ見ル。細菌ノ種類ハ各種多樣ナリ。(第 17 表)ノ如ク最初ノ數時間ハ殆ト變動無
此場合ニ於ケル血中鹽素量ノ變動ヲ見ルニ キモ 1 晝夜前後ヨリ可ナリ著明ニ増加ス。

第 17 表 (完結+食鹽水)鹽素量變動表

動物番號	時				日					
	手術前	術後 2 時間	8 時間	24 時間	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
No. 69	0.504	0.487	0.489	0.502	0.547	0.538	0.569	0.555	0.577	0.580
No. 72	0.466	0.475	0.497	0.485	0.500	0.482	0.478			
平 均	0.485	0.481	0.493	0.493	0.523	0.510	0.523			

第 7 節 蟲様突起完全結紮ノ際ニ

於ケル白血球數ノ變動

家兎ノ蟲様突起ヲ完全結紮シ所謂閉塞腔ヲ形成シ蟲様突起炎ヲ惹起セシメタル際血液中ノ白血球數ノ變動ヲ検査スルモ亦興味アル實驗ナリ。余ハ之ニ關シテ次ノ實驗ヲ行ヘリ。

動物第 8 號(完結)

家兎蟲様突起ヲ完全ニ結紮シタルノミニテ腹壁ヲ 2 層ニ縫合シ耳殻靜脈ヨリ採血シ白血球數ヲ「トーマツアイス」計算板ニテ計算セリ。然ルニ動物ハ 15 日後斃死シタルヲ以テ之ガ解剖ヲ行フニ腸管ノ一部ガ蟲様突起結紮部ニ癒着シ、結紮セル蟲様突起ハ萎縮性ニ縮小シ暗褐色ヲ呈ス。結紮部ニハ消息子ヲ通ジ得ザルモ内腔ヲ開クニ少量ノ糞便存在スルヲ見タリ。

此場合ノ白血球數ノ變動ハ(第 18 表)ニ見ルガ如ク術後 2 日ヨリ 3 日ニ最モ多ク以後概ネ 1 萬前後ヲ上下ス。

横斷切片ニ於テ筋肉層ガ可ナリ著明ニ肥厚シ筋纖維配列粗製トナレル外ニ特別著シキ變化ヲ認めズ。

動物第 9 號(不完結)

家兎ノ蟲様突起ヲ不完全ニ弛ク結紮セルニ動物ハ 1 箇月間生存シタルヲ以テ之ヲ撲殺シ解剖ヲ行

フニ、蟲様突起ノ先端ハ腹壁縫合部ト輕ク癒着シ其ノ先端部ハ多少膨隆ス。内腔ヲ開クニ結紮部ニハ容易ニ消息子ヲ通過シ得テ内容ハ軟柔ナル灰綠色糞便ナリ。

此際ニ於ケル白血球數ノ變動ハ(第 18 表)ニ見ルガ如クヤハリ 2 日目 3 日目ニ最モ多キモ完結ノ場合程著シカラズ後間モナク正常ニ復ス。

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色ノ病理組織學の所見ヲ見ルニ、粘膜層ニ於テ Lieberkühn 氏腺細胞ノ輕度ノ萎縮ヲ見。表皮細胞ノ一部脱落ヲ見ル外著變ナシ。體胞層ノ發育良好。境界明瞭ニシテ中隔部ノ結締組織發育中程度ナリ。粘膜下層ニ少量ノ出血アリ。筋層ニ肥厚ナク纖維配列整ニシテ細胞ノ滲潤ハ殆ト無ク漿膜層及ビ小腸間膜ニ著變ナシ。

家兎第 10 號(完結+F)

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ其ノ先端ヨリ Fäenkel 菌 24 時間 Leber-Bouillon 培養液 3 cc ニ 7 cc ノ生理的食鹽水ヲ加ヘタルモノヲ 0.5 cc 注射器ニ採リテ注入ス。動物ハ次第ニ衰弱シ 8 日後ニ斃死セリ。死後之ヲ解剖シ見ルニ腹腔内ニハ到ル所ニ膿苔ノ附着セルヲ見、小腸内ニハ腸瓦斯ガ充滿シ、大網膜及ビ腸間膜ニ特ニ多數ノ膿苔附着セルヲ見ル。蟲様突起ハ先端部附近一部正常ナルノ

ミニテ他ハ殆ド全部壞疽トナリ穿孔破裂セリ。即チ動物ハ穿孔性壞疽性蟲様突起炎ヨリ急性化膿性腹膜炎ヲ惹起シ斃死セルヲ知ル。

此場合ニ於ケル白血球數ノ變動ハ(第18表)ニ見ルガ如ク第2日第3日ニ増加セル白血球ハ其ノ儘減少セズニ維持セラレアリテ死亡セリ。

横斷切片ノ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色ノ病理組織學的所見ハ粘膜炎ニ於テ可ナリ著シキ物質缺損及ビ細胞滲潤アリ。筋層ニ輕度ノ肥厚アリテ纖維配列不整トナル。漿膜外ニ膿胞ノ新生セラレタルヲ見ル。

以上實驗ヲ小括スルニ蟲様突起ノ結紮ニヨリ白血球數ハ翌日ヨリ可ナリ著明ニ増加シ完結ノ場合ハ永ク持續シ、不完結ノ場合ハ次第ニ減少シ正常價ニ近クナル。

第18表 結紮試驗ノ際ノ血液内
白血球數ノ變動表

時 日	實 驗					
	No. 8 (完結)		No. 9 (不完結)		No. 10 (完結+F)	
	體重	白血球	體重	白血球	體重	白血球
術 前	2080	7000	2400	5800	3000	7100
翌 日	1900	12700	2200	10200	2800	10200
第2日	1880	13100	2150	11200	2750	12100
第3日	1880	11800	2280	10000	2730	11100
第4日	1760	9800	2370	9600	2650	10900
第5日	1950	10300	2300	7900	2570	11000
第6日	1770	8400	2350	8200	2530	9200
第7日	1700	10300	2400	8800	2400	11800
第8日	1660	9400	2310	8000	2300	10800
第9日	1500	10400	2320	7500	斃死	
第10日	1480	10000	2400	7000		

第8節 家兎蟲様突起内細菌ノ結紮

ニヨル毒力増強試驗

以上ノ諸實驗ニ依リ正常家兎蟲様突起内ニ常ニ生存スル細菌ヲ結紮セル蟲様突起内ニ注

入スレバ炎症ヲ起スノミナラズ、之等ノ細菌ヲ注入セズトモ單ナル完全結紮ノミニテモ炎症ヲ起シ、之ト反對ニ種々ノ細菌ヲ注入スルモ結紮不完全ナル場合ハ炎症ヲ起ス事ナシ。之ニ依ツテ是ヲ觀ルニ正常腸管内又ハ蟲様突起内ニ生存スル細菌ガ平時ハ毒力弱キモ結紮ニヨリ所謂 Cavit close ヲ形成スル事ニヨリ毒力増強シ發炎スルカト思ハル。犬養氏(1926)ハ先ヅ正常家兎ノ蟲様突起内細菌ノ毒力ヲ檢査シ、然ル後蟲様突起ニ「ペンツオール」「テレピン」油「キシロール」等ヲ塗布シ炎症ヲ惹起セシメタルニ蟲様突起内細菌ノ毒力ハ發炎前ニ比シ著シク増加セル事ヲ證明セリ。

余ハ健康家兎ヲ型ノ如ク無菌的ニ開腹術ヲ施行シ、蟲様突起ヲ腹腔内ニ露出シ該突起ノ根部ヲ左拇指及ビ示指ノ間ニ把持シテ輕度ノ壓ヲ加ヘ右手ヲ以テ豫メ 3.0cc ノ生理的食鹽水ヲ滿セル、太キ針ヲ有スル注射器ヲ以テ蟲様突起ノ先端ヨリ刺入シ、食鹽水ヲ少量宛注入シテハ又吸引シ數回之ヲ繰返シ、注射器中ニ糞便ノ溶解セル食鹽水ヲ取り出セリ。注射針ヲ引拔キタル部分ハ酒精ニテ充分清拭シ漿膜ヲ縫合ス。然ル後ニ蟲様突起ヲ根部ニ於テ完全ニ結紮シ閉塞腔ヲ形成シ發炎セシム。斯クノ如クシテ得タル食鹽水ニ溶解セル蟲様突起内容ヨリ Bouillon 培養基、寒天平板培養基等ヲ用ヒ分離培養シ之ヨリ純培養ヲ行ヒ其ノ毒力ヲ檢セリ。次デ蟲様突起ヲ結紮セル動物ハ通常 2—3 日後ニ斃死セルヲ以テ、死ノ直後ニ解剖シ前回同様ノ方法ヲ以テ毒力ヲ檢セリ。

毒力(Virulenz)檢査ニ便用セル細菌ハ分離

第2代菌株ノ24時間培養1白金耳ヲ1ccノ食鹽水ニ浮游セシメ、11—12 gr.ノMausヲ3匹用意シ菌浮游液ヲ夫々1.0, 0.5, 0.3cc宛腹腔内ニ注射シ4日間觀察シ其ノ生死ニヨリ細菌ノ毒力ノ有無ヲ檢セリ。即チ1.0cc注射セルMausノミ死セル時ハ(+)トシ、0.5cc注射ノMaus迄死セル時ハ(++)、1.0 0.5 0.3 cc注射ノMaus何レモ死セバ(+++), 24時間以内ニ全部死ヌ時ハ之ヲ(++)ト記載シタリ。

家兎第174號

正常家兎蟲様突起ヲ手術ニ露出シ太キ針ヲ有スル注射器ニテ3ccノ生理的食鹽水ヲ注入シ蟲様突起内容ヲ洗ヒ出シ、得タル食鹽水ヨリ細菌ノ分離培養ヲ行ヒ次ノ諸菌株ヲ得タリ。其ノ家兎ノ蟲様突起ハ之ヲ基根部ヨリ結紮シタルニ動物ハ2日間生存後斃死セリ。死後之ヲ解剖セルニ腹腔内ハ一面ニ膿ヲ充滿シ、腸管ハ互ニ癒着シ腹水ノ滲漏アリ。盲腸ノ漿膜下出血著明ナリ。蟲様突起ノ大サハ正常ニシテ所々ニ暗褐色ノ壞疽ニ陥レル部分アリ。突起内容ハ惡臭アル膿汁ナリ。

結紮前ノ分離菌並ニ其ノ毒力ハ

(I) 葡萄狀球菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 40 時間死 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 4日間生存 } 毒力(++)
 〇 0.3 〇 〇

(II) 連鎖狀球菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 4日間生存 }
11.5 gr. { 〇 0.5 〇 〇 } 毒力(ナ)
 〇 0.3 〇 〇

(III) 大腸菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 4日間生存 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 〇 } 毒力(ナ)
 〇 0.3 〇 〇

結紮ニ依リ斃死後ノ分離菌種並ニ毒力ハ

(I) 葡萄狀球菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 24 時間死 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 48 時間死 } 毒力(++)
 〇 0.3 〇 4日間生存

(II) 連鎖狀球菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 24 時間死 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 4日間生存 } 毒力(+)
 〇 0.3 〇 〇

(III) 大腸菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 18 時間死 }
11.5 gr. { 〇 0.5 〇 24 時間死 } 毒力(++)
 〇 0.3 〇 4日間生存

家兎第175號

前同様ノ方法ニ依リ結紮前ノ細菌ヲ分離シ其ノ毒力ヲ檢シタリ。動物ハ蟲様突起結紮ニヨリ24時間ニテ壞疽性蟲様突起炎ヲ起シ斃死セリ。

結紮前ノ分離菌並ニ其ノ毒力

(I) 大腸菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 4日間生存 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 〇 } 毒力(ナ)
 〇 0.3 〇 〇

(II) 黃色葡萄狀球菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 4日間生存 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 〇 } 毒力(ナ)
 〇 0.3 〇 〇

結紮ニ依リ斃死後ノ分離菌並ニ毒力

(I) 大腸菌

マウス { 菌液 1.0 cc 注射 15 時間死 }
12 gr. { 〇 0.5 〇 18 時間死 } 毒力(+++)
 〇 0.3 〇 3日後死

(II) 黃色葡萄狀球菌

分離シ得ズ

家兎第176號

前回同様ノ方法ニヨリ結紮前ノ細菌ヲ分離シ其ノ毒力ヲ檢セリ。動物ハ蟲様突起結紮ニヨリ24時間ニテ壞疽性炎ヲ起シ斃死セリ。

結紮前ノ分離菌並ニ其ノ毒力ハ

(I) 大腸菌

マウス { 菌液 1.0cc 注射 4日間生存 } 毒力(ナ)
 12 gr. { 〃 0.5 〃 〃 } 毒力(シ)
 { 〃 0.3 〃 〃 }

(II) 連鎖球菌

マウス { 菌液 1.0cc 注射 24 時間死 } 毒力(+)
 12 gr. { 〃 0.5 〃 2 日 死 } 毒力(++)
 { 〃 0.3 〃 4日間生存 }

(III) Fränkel 菌

マウス { 菌液 1.0cc 注射 2 日 死 } 毒力(+)
 12 gr. { 〃 0.5 〃 4日間生存 } 毒力(++)
 { 〃 0.3 〃 〃 }

結紮ニ依リ斃死後ノ分離菌種並ニ毒力ハ

(I) 大腸菌

マウス { 菌液 1.0cc 注射 10 時間死 } 毒力(++)
 12 gr. { 〃 0.5 〃 24 時間死 } 毒力(++)
 { 〃 0.3 〃 4日間生存 }

(II) 連鎖球菌

マウス { 菌液 1.0cc 注射 10 時間死 } 毒力(++)
 12 gr. { 〃 0.5 〃 1 日 死 } 毒力(++)
 { 〃 0.3 〃 1 日 死 }

(III) Fränkel 菌

マウス { 菌液 1.0cc 注射 15 時間死 } 毒力(++)
 12 gr. { 〃 0.5 〃 35 時間死 } 毒力(++)
 { 〃 0.3 〃 4日間生存 }

第 19 表 結紮ニヨル毒力増強試験表

動物番號	分離セル細菌	結紮前 ノ毒力	結紮後 ノ毒力
No. 174	葡萄球菌	+	++
	連鎖球菌	—	+
	大腸菌	—	++
No. 175	大腸菌	—	++
No. 176	大腸菌	—	++
	連鎖球菌	++	++
	Fränkel 菌	+	++

符號説明 (十)ハ菌液 1.0cc 注射セル「マウス」ノミ死亡ス
 (++)ハ菌液 1.0cc 及ビ 0.5cc 注射セル「マウス」ノミ死亡ス
 (++)ハ各「マウス」何レモ 3 日以内ニ死亡ス
 (++)ハ各「マウス」何レモ 24 時間以内ニ死亡ス

此實驗ノ結果ヲ小括スルニ豫メ想像サレタルガ如ク正常家兎蟲様突起内ニ存在スル各種細菌ハ、蟲様突起ヲ完全結紮シ所謂 Cavité close ヲ形成スル事ニヨリ著シク其ノ毒力ヲ増強スル事ヲ證明シ得タリ。(第 19 表参照)

第 9 節 異物嚥下試験

蟲様突起炎ト異物ノ關係ハ古來各方面ヨリ論議セラレシモ、今日ノ見解ニ於テハ腸内寄生蟲、或ハ二次的ニ炎症ニ因リ成生セラレタル糞石ガ蟲様突起炎ト多少ノ關係アル事ハ事實ニシテ内容鬱滯ノ原因ヲナス事アリ。特ニ穿孔性蟲様突起炎ノ場合ニ甚ダ屢々糞石ヲ證明スルハ吾々臨牀家ノ等シク首肯スル所ナリ。然レ共往時ニ於テ廣ク信ゼラレ且現在ニ於テモ一部民間ニ傳ヘラレルガ如ク蜜柑、葡萄、西瓜等ノ果實ノ種子、或ハ小石等ヲ經口的ニ嚥下スル時ハ之等ノ異物ガ蟲様突起内ニ引カカリテ所謂閉塞腔(Cavité close)ノ形成ニ幾許カノ素因ヲ成スヤ否ヤハ不明ナリ。事實吾人ハ日常蜜柑、葡萄、西瓜等ノ種子ヲ嚥下スル事甚ダ屢々ナルモ、之ガ爲ニ蟲様突起炎ヲ惹起セル事明カナ例ハ殆ド無ク且又手術的ニ切除セル蟲様突起中ニ之等ノ種子ヲ見タル事ナシ、余ハ動物ノ場合實驗的蟲様突起炎ニ閉塞腔ノ絶對必要ナル事ヲ認メシガ、更ニ異物ヲ嚥下セシメ、之ガ蟲様突起ニ停留スルヤ否ヤヲ實驗セリ。

實驗用動物ハ家兎ヲ用ヒ、實驗用異物トシテ直徑約 0.6 乃至 0.8 cm ノ硝子球、及ビ長徑約 1.0 cm 横徑 0.8 cm ノ紡錘形ノ小形梅干ノ種子ヲ用ヒ、之等ノ異物ヲ家兎ノ食道ノ入口迄暴力ヲ以テ挿入スレバ、動物ハ之ヲ直ニ嚥下セリ。

實驗第1(家兎第160號δ)

先ヅ實驗第1日ニ梅干核2箇、硝子球2箇ヲ嚥下セシメ翌日ヨリ毎日全身狀態ヲ觀察シツツ糞便ヲ檢查セリ。然ルニ第10日目ニ至ルモ動物ノ全身狀態ニ變化ナク且糞便中ニ排出セラレズ。依ツテ第10日目ニ更ニ硝子球3箇ヲ嚥下セシメタリ。然ルニ第13日目ニ到リ切メテ硝子球1箇ヲ糞便中ニ排泄シ、更ニ第16日ニ梅干核1箇ヲ排出シタリ。其ノ後第1回嚥下以來20日ヲ經過スルモ動物ハ元氣旺盛ナルヲ以テ撲殺シ解剖スルニ梅干核1、硝子球4箇ハ何レモ胃中ニ存在セリ。

實驗第2(家兎第161號δ)

先ヅ實驗第1日ニ梅干核2箇、硝子球2箇ヲ嚥下セシメ翌日ヨリ毎日全身狀態ヲ觀察シツツ糞便ヲ檢查セリ。然ルニ動物ハ第6日迄元氣旺盛ニシ

テ糞便中ニ異物ヲ見ズ。第7日ニ至リ動物ハ下痢ヲ起シ。第8日ニ元氣無ク衰弱ノ徵ヲ見タルヲ以テ之ヲ撲殺シ解剖シタルモ嚥下セル異物ハ其ノ儘胃中ニ存在セルヲ認メタリ。蟲様突起ニ炎症ヲ認メズ。

實驗第3(家兎第162號δ)

前實驗同様先ヅ實驗第1日ニ梅干核2箇、硝子球2箇ヲ嚥下セシメ翌日ヨリ毎日全身狀態ヲ觀察シツツ糞便ヲ檢查セリ。然ルニ第3日ニ到リ糞便中ニ硝子球1箇ヲ、次デ第8日ニ梅干核1箇ヲ排出セリ。其ノ後依然動物ハ食慾良好元氣旺盛ナルヲ以テ。第10日目ニ梅干核3箇、硝子球3箇ヲ再ビ嚥下セシメタルニ、翌第11日目ニハ梅干核1箇、第12日目ニハ硝子球2箇、第13日目ニハ梅干核、硝子球各1箇ヲ排泄シ、更ニ第16日目

第20表 異物嚥下排出試驗表

動物番號 異物ノ種類	No. 160		No. 161		No. 162		No. 163	
	梅干核	硝子球	梅	硝	梅	硝	梅	硝
第1回嚥下個數	2	2	2	2	2	2	5	5
翌2日目排出個數	0	0	0	0	0	0	1	2
第3日目	0	0	0	0	0	1	0	1
第4日目	0	0	0	0	0	0	1	0
第5日目	0	0	0	0	0	0	0	1
第6日目	0	0	0	0	0	0	0	0
第7日目	0	0	0	0	0	0	0	1
第8日目	0	0	撲殺		1	0	0	0
第9日目	0	0			0	0	0	0
第10日目再嚥下個數	0	3			3	3	0	0
第11日目排出個數	0	0			1	0	0	0
第12日目	0	0			0	2	1	0
第13日目	0	1			1	1	0	0
第14日目	0	0			0	0	0	0
第15日目	0	0			0	0	0	0
第16日目	1	0			1	0	0	0
第17日目	0	0			0	0	0	0
第18日目	0	0			0	0	0	0
第19日目	0	0			0	0	0	0
第20日目撲殺時胃中ニ殘存セシ個數	1	4	2	2	1	1	2	0

ニ梅干核 1 箇ヲ排出セリ、以後第 20 日目ニ到ルモ動物ハ元氣旺盛ナルヲ以テ之ヲ撲殺シ解剖スルニ胃中ニ殘リノ硝子球 1 箇、梅干核 1 箇殘存セルヲ見タリ、蟲様突起ニ炎症ヲ認メズ。

實驗第 4 (家兎第 163 號)

實驗第 1 日ニ梅干核 5 箇、硝子球 5 箇ヲ嚥下セシメ、翌日ヨリ全身狀態ヲ觀察シツツ糞便ヲ檢スルニ翌第 2 日目ニ既ニ硝子球 2 箇、梅干核 1 箇ヲ排出、第 3 日ニハ硝子球 1 箇、第 4 日ニハ梅干核 1 箇、第 5 日ニ硝子球 1 箇、第 7 日目ニ硝子球 1 箇、第 12 日目ニ梅干核 1 箇ヲ排出シ以後第 20 日ニ達ル迄異物ヲ排出セズ、動物ハ元氣旺盛ナルヲ

以テ撲殺解剖スルニ殘リノ異物梅干核 2 箇ノ胃中ニ存在セルヲ認メ、蟲様突起ニ異常ナシ。

以上實驗成績ヲ表示セバ(第 20 表)トナル。

此異物嚥下試驗ニ於テ見ルニ家兎ニ於テハ嚥下セル異物ハ可ナリ長時間胃中ニ停留スルモノナリ、而シテ一度幽門ヲ通過スルヤ比較的速ニ糞便中ニ排出セラルルモノニシテ彼ノ巨大ナル盲腸部或ハ之ニ接續セル蟲様突起中ニ停留又ハ陷入スル事無キ事ヲ證明シ得タリ。

第 6 章 總 括 並 ニ 考 案

余ハ實驗動物トシテハ常ニ家兎ヲ使用シ、先ヅ正常時ニ於ケル血液内鹽素量ヲ Bang 氏法藤井氏變法ニヨリ測定シタル後、動物ヲ何等麻酔ヲ施サズシテ開腹シ蟲様突起ヲ露出シ之ヲ絹絲ヲ以テ弛ク不完全ニ結紮セリ、而シテ動物ノ其ノ後ノ一般狀態ヲ觀察シ且術後 2 時、8 時間、24 時間、2 日、3 日ト血中ノ鹽素量ヲ測定セリ。不完全結紮ノ場合動物ハ 2、3 日間ハ食欲不振ニシテ元氣消沈スルモ間モナク恢復シ元氣旺盛トナル、之ヲ一定期間觀察セル後撲殺シ開腹シ見ルニ蟲様突起ニハ癒着、炎症等ヲ認メズ又腹腔内ハ清潔ニシテ化膿性腹膜炎ノ症狀ヲ見ズ横斷切片ヲ「ヘマトキシリン・エオジン」重染色ニ依リ檢鏡スルモ概ネ正常像ヲ示セルヲ見ル。此際不完全結紮セル内腔ニ各種細菌ヲ單獨又ハ混合シテ注入スルモ同様ニ炎症症狀ヲ起サザリキ。此場合ノ血中鹽素量ハ手術後 2 時間ニシテ一時的ノ減少ヲ來スモ 8 時間後ニハ既ニ正常値ニ恢復シ其ノ後ハ概ネ一定不變ナリ。

次ニ家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ所謂閉塞腔(Cavité close), ヲ形成スル時ハ動物ハ通常 3、4 日間ニテ斃死ス。此場合蟲様突起ノ内容タル糞便ガ存在スル儘デ完全結紮ヲ行フト、内容タル糞便ヲ指ニテ輕ク壓迫シ其ノ内容ヲ空虛トナシ置キテ結紮セル場合ヲ比較スルニ後者ハ前者ニ比シ稍々長時間生存シ平均 4 日間ニテ斃死ス。死後之ヲ解剖シ見ルニ蟲様突起ニハ明カニ肉眼的ニモ炎症ヲ惹起セルヲ見ル。其ノ内容ノ塗抹標本又ハ分離培養ノ結果其ノ中ニ大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌、Fränkel 菌等ヲ認メタリ。之等ノ細菌ハ即チ吾々が最も屢々人體蟲様突起炎ノ際ニ發見シ、從ツテ余ノ實驗ニ於テ注入ニ使用セシ菌ト全ク同一ノモノナリ。此事實ヨリ考フルモ吾々が急性蟲様突起炎ノ際ニ屢々見ル之等ノ細菌ハ特殊ノ病原菌ニハ非ズシテ正常糞便内ニ存在スル細菌ガ結紮ニヨリ毒力増強シ發炎菌トナルニ非ルヲト想像セシム。

此場合ノ血中鹽素量ハ手術後 2 時間ニシテ

最モ著明ニ減少シ其ノ後ハ漸次ニ恢復スルモノノ如シ。

家兎ノ蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ其ノ内腔ニ人間ノ蟲様突起炎ヨリ分離培養セル Fränkel 菌、大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌等ノ各純培養ヲ夫々單獨ニ液體培養ナレバ其ノ24時間培養液3ccニ7ccノ生理的食鹽水ヲ混ゼルモノヲ0.5cc用ヒ、寒天培養ナレバ其ノ3白金耳ヲ10ccノ生理的食鹽水ニ浮游セシメタル液ヲ0.5cc注射器ニ採リテ注入スル時ハ動物ハ概ネ2日乃至9日後ニ蟲様突起炎ヲ起シテ斃死セリ。而シテ各細菌ノ間ニハ著シキ差異ヲ認メズ。特ニ菅野、本名氏ノ認メシ如ク壞疽性炎ハ Fränkel 菌ニ特有ノモノトハ思ハレズ。他ノ細菌ニ於テモ惹起セシメ得タリ。

此際ニ於ケル血中鹽素量ノ變動ハ術後2時間ニテ可ナリ減少スルモ8時間目ニハ既ニ概ネ恢復シ居レリ。

次ニ人體ノ蟲様突起炎ヨリ分離セル Fränkel 菌、大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌等ヲ夫々2種類混合シ、單獨ニ注入シタル場合ノ半量宛ヲ合セテ注入セルニ動物ハ多ク24時間前後ニテ斃死シ、3種類又ハ4種類ノ細菌ヲ混合シ注入セル場合モ同様概ネ1晝夜内外ニテ化膿性又ハ壞疽性蟲様突起炎ヲ起シテ斃死セリ。即チ細菌ハ單獨ニ存在スルヨリモ寧ろ2種類或ハ夫レ以上ガ同時ニ存在セル場合ノ方ガ毒力強大トナル。而シテ蟲様突起ヲ單ニ結紮ノミ行ヒタル場合モ單一ノ細菌ヲ注入セル場合ニモ常ニ其ノ内容物竝ニ組織内ニ侵入セル細菌ヲ詳細ニ檢索セバ多少ノ量ノ差ハアレ人體蟲様突起炎ノ場合ニ多ク見ラルル

前記 Fränkel 菌、大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌等ヲ證明シ得ルモノニシテ之等ノ細菌ハ又正常家兎蟲様突起内ニモ發見セラル。

然カモ正常家兎蟲様突起内ニ存在スル時ハ殆ド毒力ヲ有セザル菌ガ完全結紮ニヨリ蟲様突起ニ炎症ヲ起ス時ハ、之等細菌ノ毒力ハ可ナリ著明ニ增強スル事ヲ實驗ニヨリ確カムル事ヲ得タリ。以上ノ諸實驗ニヨリ蟲様突起ノ成因ニハ内腔ノ閉塞、所謂 Cavité close ヲ形成スル事が最モ必要重大ナル要素ナリ。而シテ閉塞腔形成ノ原因ハ一般小腸及ビ大腸ノ炎症ニ起因シ蟲様突起粘膜ノ腫脹ヲ起シ輕度ノ狭窄ヲ生ズル時ハ爲ニ分泌物ノ滯溜ヲ來シ更ニ粘膜ノ浮腫腫脹ヲ起シ内容ノ清淨排泄ガ障礙セラレ益々炎症ヲ亢進セシム。

然ラバ古來廣ク信ゼラレタル、異物糞石等ニヨリ閉塞ガ起リ得ルヤ否ヤニ就テモ動物ニ異物ヲ嚥下セシメ實驗セルニ家兎ニ於テハ嚥下セル異物ハ可ナリ長時日胃中ニ停滯シ一度胃ノ幽門ヲ通過セル後ハ小腸及ビ大腸ヲ急速ニ通過シ間モナク便中ニ排泄サル。即チ經口的異物ハ蟲様突起内ニ停滯又ハ陥入スルハ稀有ノ事實ニシテ Cavité close ノ原因ハ異物以外ノ原因ニ因ル事多シ。猶ホ人工的蟲様突起炎ノ際血中鹽素量變動ハ各場合ニヨリ夫々多少ハ異レル成績ヲ示セルモ、全體トシテノ平均ハ手術後2時間ニハ可ナリノ程度減少ス。術後8時間、24時間頃ニハ稍々増加シツツアルモ尙ホ術前ニ比シ可ナリ減少シアリ。又此場合ニ於ケル血液中白血球ノ變動ヲ檢査セシニ、翌日ヨリ可ナリ著明ニ増加シ、完結ノ場合ハ其ノ後モ引續キ白血球増加ヲ持續ス。不完結ノ場合ハ一時減少セシ白血球ハ漸次減少

シ正常價ニ近クナル。而シテ蟲様突起炎ヲ惹起セシムル細菌ハ何等特別ノ細菌ニ因ルモノニ非ズシテ正常糞便中ニ認メタル各種ノ好氣性及ビ嫌氣性ノ細菌ガ原因トナルモノニシテ、各種ノ細菌ガ存在シテ内腔ノ交通杜絶シ所謂閉塞腔ヲ形成スル際ニ細菌ノ毒力増強シ炎症ヲ惹起スルモノナラン。

余ハ實驗全部ニ互リ可ナリ詳細ニ病理組織學的所見ヲ検査セルニ概ネ加答兒性、化膿性炎(蜂窩織炎)性、壞疽性ノ3ニ分類セリ。

加答兒性蟲様突起炎 (Appendicitis katarrhialis)

肉眼的ニ粘膜ハ稍々肥厚シ潤濁シ所々ニ暗赤色ノ溢血斑點ヲ認ム。漿膜面ニハ毛細血管ノ擴張充盈ヲ見ル爲ニ表面鮮紅色ヲ呈シ、内容ハ液狀糞便ナル事多シ。組織學的ニ粘膜層、臃胞層等ノ毛細血管強ク擴張シ、内腔ニハ主トシテ赤血球ヲ充滿シ之ガ眞珠紐様ニ連ナリ。次デ表皮細胞表面ニ纖維素性滲出物及ビ粘膜ノ脱落物質等ガ膿苔トシテ附着ス。又表皮細胞ニ原形質ノ濃縮、核ノ崩壊汚染等ノ退行性變化ヲ見ル外、時ニハ核ノ分裂、表皮細胞ノ再生増殖性變化ヲ見ル事モアリ、同時ニ表皮層ノ直下ニ圓形單核細胞及ビ中性多核白血球ノ滲潤ヲ見ル。之等ノ炎症性變化ノ外ニ常ニ多少ノ出血ヲ見ルト同時ニ表皮層ノ下ニ毛細血管ノ充盈擴張アリ。

然シテ加答兒性炎ノ場合ト雖モ炎症ガ明瞭ニ粘膜層ノミニ限局サルルモノニ非ズシテ粘膜下層及ビ筋層迄細胞滲潤及ビ細菌ノ侵入セルヲ見ル事多シ。而シテ細菌ノ組織内侵入ハ表皮ノ脱落セル部分ヨリ侵入ス。而シテ時ニハ遊走セル白血球中ニ喰菌セラレタル細菌

ヲ見ル。表皮細胞ノ一部脱落シ淺キ潰瘍ヲ坐ジタル部分ニ細菌ノ附着侵入セルヲ見ル事アリ。(寫眞第17圖參照) 漿膜層表面ニモ通常少數ノ細菌附着セルヲ見ル。

化膿性(蜂窩織炎性)蟲様突起炎

(Appendicitis phlegmonosa)

漿膜ハ肉眼的ニ可ナリ腫脹シ血管ノ怒張モ亦著明ニシテ毛細管ノ充血ニヨリ發赤セルヲ見ル。時ニハ内容ノ増加ニヨリ極度ニ緊張シ光線ヲ反射シ爲ニ血管ハ反ツテ不明瞭トナレル場合モアリ。(第16圖參照)

又組織内ニ膿瘍ヲ形成シ外面ヨリ見テ美シキ白色ノ斑點トシテ認ムル事アリ。

内容ハ膿球ヲ浮游セル糞汁或ハ血液ヲ混ゼル膿性粘液ナル事アリ。粘膜面ハ通常糜爛性ニシテ暗褐色乃至灰白色ヲ呈セリ。

檢鏡的所見ハ先ヅ細胞ノ滲潤ハ臃胞ヨリ粘膜下層ヲ經テ筋層ニマデ達ス。毛細管ノ擴張充盈或ハ白血球梗塞ヲ見ル外組織内ニモ圓形細胞ノ游出アリ。又時ニハ表皮ヲ通過シテ蟲様突起内腔中ニモ排出ス。又表皮細胞ノ配列弛緩シ前記加答兒性炎ノ場合ニ見タル如キ退行性變化ヲ見ル。且各層ニ血管ノ充盈及ビ組織内出血ヲ見ル淋巴臃胞ハ其ノ境界稍々不明瞭トナリ胚中心部ニハ既ニ原形質濃縮及ビ核ノ崩壊等ノ退行性變化ヲ起シ細胞ノ配列弛緩シ浮腫狀ニ腫脹ス。同時ニ圓形單核細胞、中性多核白血球等ノ滲潤ヲ見ル。粘膜層ハ可ナリ強度ニ壞疽ニ陥リ核ノ崩壊シ「ヘマトキシリン」ニ汚染シ又ハ殆ド染色セズ、強ク遮光スルニ非レバ認メ得ズ様ニ「エオジン」ニ染色シ僅ニ Lieberkühnsche Drüse ノ深部ニ存スル表皮細胞ノミガ「ヘマトキシリン」ニ染リ

テ殘存セル事アリ。又表皮ノ脱落等ノ物質缺損モ常ニ認メラレ其ノ下方ニ膿性滲潤ヲ起セル粘膜固有層又ハ淋巴腫色ガ内腔ニ露出セルヲ見ル。又粘膜面ニ廣ク壞疽性變化ヲ呈シ、深部ニハ幅狹ク扇形壞疽ヲ形成セルヲ見ル事アリ。(第18圖参照)

斯クノ如キ楔狀壞疽ハ小腸間膜附着側ト反對側ノ壁ニ見ラルル事多シ。尙ホ或ル1箇ノ膿胞ノミニ限リテ炎症性腫脹著シク所謂膿胞炎 *Folliculitis* ノ狀態ヲ呈スル事アリ。(第19圖参照) 小腸間膜ノ血管モ概ネ擴張充盈シ血管壁内及ビ壁周圍ニモ細胞ノ滲潤及ビ細菌ノ栓塞ヲ見ル事アリ。然レ共之ヲ以テ直チニ血行性感染説ヲ意味スルモノト思惟スルハ早計ナリ。「グラム」氏染色ニヨリ蟲様突起内ノ脱落物質内及ビ粘膜潰瘍表面ニ無數ノ細菌ノ繁殖セルヲ見ル。粘膜層内ニハ多數ノ細菌ガ侵入シ滲潤セル白血球内ニ喰菌セラレシモノアリ。重症ノ蜂窩織炎ニシテ粘膜廣ク破壊セラレタルモノハ粘膜下層及ビ筋層漿膜下層等ニ廣ク細菌侵入シ、多數ノ小膿瘍ヲ形成セル事アリ。(第20圖参照) 一般ニ言ヘバ粘膜層及ビ漿膜ノ表面ニ繁殖セル細菌ニハ桿菌多ク、組織内ニ深く侵入セルモノニハ球菌ヲ見ル事多シ。小腸間膜ノ血管内ニモ白血球ノ栓塞セル中ニ多數ノ細菌ノ集團ノ増殖ヲ營メルヲ見ル事アリ。

壞疽性蟲様突起炎

(Appendicitis gangraenosa)

肉眼的ニハ漿膜層ヲ通ジテ帶青暗紫色ヲ呈シ時ニ灰白色ニシテ穿孔ヲ有スル事多ク、然ラザル場合ト雖モ將ニ穿孔セントスル狀態ニ在ル事アリ。顯微鏡検査ニヨルニ少クモ粘膜層ニ著明ノ壞疽ヲ認メ、時ニハ膿胞層、筋層ニ迄達シ、限局性壞疽ノ場合ニハ楔狀ヲ呈スルモノアル事ハ前記化膿性炎ノ場合ト同様ナリ。壞疽部ニ於テモ尙ホ其ノ構造ヲ概ネ認メ得ル場合ト、*Lieberkühnsche Drüse* ノミガ稍々明瞭ニ殘存セルヲ見ル事アリ、尙ホ又全然其ノ構造ヲ認メ得ズニ様ニ纖維素ガ析出サレ「エオジン」ニヨリ淡ク紅染シ所謂「ヂフテリー」性壞疽トナレル事アリ。又廣ク壞疽ニ陷レル中ニ健康粘膜ガ島嶼狀ニ殘存セル事アリ。(第21圖及ビ第22圖参照) 又血管内ニ血球充盈シ所々ニ大出血ヲ起シ之ガ爲ニ組織ガ壓迫セラレ破壊シ壞疽トナレルヲ見ル事アリ。筋層内ニモ細胞滲潤ヲ來シ筋纖維ノ配列不整トナリ且甚シク鬆粗トナリテ核ノ染色不良トナル。壞死ニナレル部ハ潰瘍トナリテ脱落ヲ來シ其ノ邊緣ニ白血球ノ浸潤ヲ見ル。壞疽ガ全層ニ及ベバ通常容易ニ穿孔ヲ來ス事勿論ナリ。然カモスカル穿孔ノ最モ多キハ小腸間膜附着部ト反對側ナリ。

「グラム」氏染色ニヨリ多數ノ細菌類ガ各層組織内ニ侵入セルヲ見ルモ其ノ内桿菌ハ多ク球菌ハ比較的僅少ナリ。

第7章 結 論

1) 家兎ノ蟲様突起ニ於テ不完全結紮ヲ行フ場合ハ之ニ各種ノ細菌ヲ注入スルモ實驗的蟲様突起炎ヲ惹起セシメ得ズ。

2) 蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ閉塞腔ヲ形成スルニ内容タル糞便ノ存在スル儘結紮スルモ、指ニテ輕ク壓迫シ内容ヲ空虛トシ結紮ス

ルモ、共ニ動物ハ加答兒性、化膿性、壞疽性ノ蟲様突起炎ヲ惹起シ得タリ。而シテ前者ハ後者ニ比シ炎症症状著明ニシテ、後者（空十完結）ノ場合ハ平均1日長ク約4日間生存セル後斃死セリ。

3) 家兎蟲様突起ヲ完全ニ結紮シ其ノ腔内ニ人體ノ蟲様突起炎ヨリ分離培養セル Fränkel 菌、大腸菌、連鎖狀球菌、葡萄狀球菌等ノ一定量ヲ注入スル時ハ、動物ハ蟲様突起炎ヲ起シ平均2日後ニ斃死ス。前記各種細菌ヲ1/2量宛2種類混合シ注入スルカ、或ハ1/3量宛3種類混合シ注入スル時ハ一層著明ナル炎症ヲ惹起シ概ネ24時間内外ニテ斃死ス。即チ細菌ハ單獨ニ存スルヨリ2種類以上混合シテ存在スル方が毒力増強ス。

4) 家兎蟲様突起ヲ單ニ完全結紮ヲ行ヘル場合モ、單一種類ノ細菌ヲ注入シテ實驗の蟲様突起炎ヲ惹起セシメタル場合ニ於テモ、斃死シタル後其ノ内容ヲ詳細ニ檢索スル時ハ何レモ前記4種類ノ桿菌並ニ球菌ガ混合存在セル事多キヲ知レリ。

5) 實驗ニヨレバ之等ノ細菌ハ何レモ正常ノ蟲様突起内ニ常時存在セルモノニシテ、通常ハ其ノ毒力無キカ或ハ極メテ弱キモ、閉塞腔ヲ形成シ炎症ヲ惹起セシムル時ハ其ノ毒力著シク増強セリ。

6) 家兎ニ於テ經口のニ嚥下セシメタル異物ハ可ナリ久シク胃中ニ停滯シ一度幽門ヲ通過スレバ速ニ糞便中ニ排泄シ蟲様突起内乃至ハ盲腸部ニ陷入スル事ナシ。即チ經口の異物が直接閉塞腔ノ原因トナル事ハ稀ナリ。

7) 各實驗ニ於ケル血液中鹽素量ノ變動ハ大差ナク何レモ結紮後2時間ニハ可ナリ著明

ニ減少スルモ、爾後漸次恢復ノ傾向ヲ示スモ8時間後、及ビ24時間後ニハ猶ホ術前ニ比シ減少シアリ。而シテ穿孔性腹膜炎ヲ併發シ早期ニ死亡セルモノ、或ハ組織學的ニ著明ナル變化ヲ見タルモノ等ハ亦鹽素量ノ減少著シク、久シク生存シ又ハ症状輕キモノハ鹽素量ノ減少僅少ナルカ或ハ反ツテ若干増加セル事モアリ。

8) 蟲様突起炎ノ原因ニ關シテハ諸説アルモ未ダ確定セラレタルモノ無シ。然レ共閉塞腔ノ形成ガ重要ナル役割ヲ演ズル事ハ實驗ニ徴シテ明カナリ、而シテ臨牀上閉塞腔ノ原因タルベキ局所的要素ニハ、陳舊性炎症、彎曲、癒着、瘰癧、肥厚、莢塊、糞石其ノ他一般大腸小腸ノ炎症性粘膜炎等ノ場合ニ狹窄ヲ起シ内容ノ排泄障礙セラレ、且一方ニハ之ガ刺激トナリ分泌物ノ増加鬱滯ヲ起シ、細菌ノ好培養基トナリ其處ニ生存セル細菌ノ繁殖並ニ毒力ノ増強ヲ起シ組織内ニ侵入シ發病スルモノト思考スルヲ適當トセン。

9) 要スルニ Aschoff ノ言フガ如キ特種ノ催炎菌ヲ認ムル必要モナク、又細菌ノ種類配合ニヨリテ症状、經過ノ輕重ヲキタシ得ベキモ、最モ肝要ナルハ管腔ノ閉塞ニシテ、次デ細菌ノ毒力増強ヲキタシ急性蟲様突起炎ヲ惹起スルニ至ル。又實驗のニハ少クトモ壞疽性蟲様突起炎ノ場合モ特別ナル嫌氣性細菌ヲ認ムル必要ナシ。次ニ從來屢々行ハレタル實驗の家兎蟲様突起炎ニ於テ、家兎蟲様突起内細菌ノ存在ヲ顧慮セザリシハ大ナル誤謬ナリ。

摘筆スルニ際シテ終始懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリシ恩師津田教授ニ衷心感謝ノ意ヲ表ハスト共ニ種々御教示ヲ賜ハリシ西山助教授ニ深謝ス。

組織學的所見(「ヘマトキシリン・エオジン」重染色)

[illegible]

合 場 セル 用 テ 菌 細 ノ 類 種 2 第 3 表 附

[illegible]

[illegible]

附表第4 3種類及ビ4種類ク細菌ヲ使用セル場合

動物番號	實驗方法	動物轉歸	解剖診斷上	組織學的所見 (ヘマトキシリン・エオジン重染色)	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					「グラム」氏染色 細菌組織內細菌	組織學 起 因	肉 眼 的 診 斷	動 物 轉 歸	實驗方法	組織學的所見 (ヘマトキシリン・エオジン重染色)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										粘 膜 層	層	層	層	層	層	層	層	層	層	層	層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
94	完結+(F+大+葡)	翌日斃死	痘	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液便	血液

主 要 文 獻

- 1) *Aschoff*, G. fischer Jena. 1908; Med. Klin. Nr. 24, 1905; Dtsch. med. Wschr. Nr. 25, S. 985, 1906; Ergebnis. d. inn. Med. Bd. 9, 1902; Berl. klin. Wschr. Nr. 32, S. 1504, 1914; Berl. klin. Wschr. Nr. 44, S. 1041, 1920; Zieglers Beitrag. Bd. 77, S. 141, 1927; Verlag von Julius Springer. 1930; Zieglers Beitrag. Bd. 87, S. 481, 1931; Klin. Wschr. Jg. 12, Nr. 28, S. 1081, 1933.
- 2) *Aschoff u. Pokorny*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 203, S. 175. 3) *Albu*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 17, S. 349, 1909. 4) *Albrecht*, Wien. klin. Wschr. Nr. 40, S. 1359, 1909. 5) *Adrian*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 7, S. 407, 1901. 6) 青山徹藏, 日本外科雜, 19回, 1號, 73頁, 大正7年. 7) 赤岩八郎, 日本外雜, 14回, 161頁, 大正2年. 8) 赤岩八郎, 吉田美壽利, 日新醫學, 第20年, 6號, 870頁及1032頁, 昭6. 9) 有光藤三郎, 日新醫學, 6年, 9號, 1523頁, 大正5年. 10) 青木吉兵衛, 東京醫事新誌, 第2274號, 大正11年. 11) 阿部四郎, 臨床醫學, 第13年及第14年. 12) *Beitzke*, Berl. klin. Wschr. Nr. 30, 1917. 13) *Boas und Wissing*, Ref. Zbl. Chir. Nr. 44, S. 880 und Nr. 30, S. 587, 1919. 14) *Brünn*, Ergebniss. d. Chir. und Orthop. Bd. II, S. 358; Brunns Beitr. Bd. 42, S. 61, 1904. 15) *Böhne*, Arch. klin. Chir. Bd. 171, S. 692, 1932. 16) *Becker*, Zieglers Beitrag. Bd. 68, S. 171, 1921. 17) *Bettmann*, J. Americ. med. assoc. No. 16, P. 1216, 1924. 18) *Böhning*, Zieglers Beitr. Bd. 87, S. 611, 1931. 19) *Brütt*, Brunns Beitr. Bd. 129, S. 175, 1923. 20) *Backmann*, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 93, S. 358, 1922. 21) *Borchard*, Dtsch. med. Wschr. Jg. 53, Nr. 26, S. 1074, 1928. 22) 朴乾源, 朝鮮醫雜, 第20卷, 11號, 1752頁, 昭和5年11月. 23) *Canon*, Dtsch. Zeitsch. Chir. Bd. 95, 1908. 24) *Cohn*, Arch. klin. Chir. Bd. 85, S. 663, 1908; Fortschr. Röntgenst. Bd. 38, S. 26. 25) *Colleg*, Arch. klin. Chir. Bd. 103, S. 177. 26) *Dmitrijewa*, Russkaja Klinika. Bd. 1, S. 572, 1924; (Ref. Zbl. Chir. Nr. 26, S. 1434, 1925). 27) *Eichhoff u. Pfannenstiel*, Brunns Beitr. Bd. 151, S. 171, 1930. 28) *Ewald*, Arch. klin. Chir. Bd. 60, S. 80, 1900. 29) *Ferster*, Bruns Beitr. Bd. 128, 1923. 30) *Feriz*, Dtsch. med. Wschr. Jg. 54, Nr. 47, S. 1970, 1928; Bruns. Beitr. Bd. 142, S. 565, 1928. 31) *Fonio*, Schweiz. med. Wschr. Nr. 41, S. 947, 1923. 32) *Fischer*, Dtsch. med. Wschr. Nr. 17, S. 477, 1921; Oxyuren u. App. Dtsch. Z. Chir. Bd. 183, S. 222. 33) *Reginald Fitz*, Americ. J. of med. sciences. Vol. 134, P. 321, 1886. 34) *Franke*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 84, S. 424. 35) *Friedjng*, Wien. med. Wschr. Nr. 47, 1908. 36) 藤井尙久, 日本消化器病學會雜誌, 25卷, 9號, 499頁, 大正15年12月; 醫學中央雜誌, 22卷, 643頁, 大正13年; 中外醫事新報, 1056號及1057號. 37) *Gross*, Arch. klin. Chir. Bd. 157, S. 812, 1929; Arch. klin. Chir. Bd. 148, S. 626. 38) *Gelinsky*, Münch. med. Wschr. S. 743, 1917. 39) *Goldzieher*, Frankf. Zeitschr. f. Pathol. 2, 1909. 40) *Gohn und Namba*, Zieglers Beitr. z. patli. Anatom. Bd. 52, S. 130, 1912. 41) 吳一承, 朝鮮醫雜, 第21卷, 第3號, 343頁, 昭6. 42) *Heile*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 226, S. 309, 1930; Arch. klin. Chir. Bd. 162, S. 175, 1930; Zbl. f. Bakt. Org. Bd. 56, S. 233, 1910; Arch. klin. Chir. Bd. 90, S. 191, 1909; Münch. med. Wschr. Jg. 72, S. 209, 1925; Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 14, 1905, Mitt. a. d. Med. u. Chir. Bd. 22, S. 58, 1910. 43) *Hilgermann und Pohl*, Dtsch. med. Wschr. Nr. 28, S. 1161, 1929; Münch. med. Wschr. Nr. 40, 1929; Arch. klin. Chir. Bd. 154, S. 243, 1929. 44) *Haim*, Arch. klin. Chir. Bd. 78, 1906 und Bd. 82, 1907; Zbl. Chir. Nr. 35, 1917. 45) *Hausemann*, Mitt. a. d. Grenzgeb. med. u. Chir. Bd. 12, S. 514, 1903. 46) *Hausemann, Sonnenburg u. Kraus*, Dtsch. med. Wschr. Nr. 18, S. 769, 1908. 47) *Haslhofer*, Bruns Beitr. Bd. 148, S. 120, 1929. 48) *Helly*, Münch. med. Wschr. Nr. 20, S. 812, 1926. 49)

- Heyde*, Bruns Beitr. Bd. 76, 1911. 50) *Hasberlin*, Dtsch. med. Wschr. Nr. 9, 1909. 51) *Horn*, Arch. klin. Chir. Bd. 109, 1918. 52) *Hippius u. Lewinsohn*, Dtsch. med. Wschr. Nr. 43, 1907. 53) 堀江, 日本外科學會雜誌, 28回, 8號. 54) 本名文任, 菅野尙夫, 臺灣醫學會雜, 第30卷, 10號, 1123頁, 昭6. 55) 濱田, 稻積, 河村, 日本外科實函, 8卷, 1號, 100頁, 昭6. 56) 廣瀬速水, The Tohoku J. of Experim. med. 15卷, Nr. 5, 昭5, (抄) 醫學中央雜, 31卷, 675頁, 昭5, 及 軍醫團雜, 第176號, 昭3. 57) *Isabolinsky*, Münch. med. Wschr. S. 496, 1914. 58) 犬養六郎, 慶應醫學, 6卷, 407頁, 大15, 慶應醫學, 第6卷, 457頁. 59) *Jennings*, New York state med. j. u. med. record. Vol. 117, P. 682, 1923. 60) *Jores*, Münch. med. Wschr. S. 1021, 1914. 61) *Kretz*, Wien klin. Wschr. Nr. 49, 1900; Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. und Chir. Bd. 17, S. 1, 1907; Derselbe Bd. 20, S. 325, 1909. 62) *Klemm*, Bruns Beitr. Bd. 3, 1918. Dtsch. Z. Chir. Bd. 61, S. 427, 1906; Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Nr. 16, 1906. 63) *Koch, Emil, F.*, Arch. f. Path. u. lab. Med. Bd. 3, S. 851, 1927. 64) *Kümmel*, Münch. med. Wschr. Nr. 19, S. 920, 1905; Wien med. Wschr. Nr. 22, 1896. 65) *Kraus* Dtsch. med. Wschr. Nr. 9, 1909. 66) *Kramer*, Annals Surg. 1902, (Ref. Zbl. Chir. Nr. 48, S. 1233, 1902). 67) 鎌田愛治, 京都府立醫科大學雜誌, 第1卷, 379號, 昭和2年. 68) 加藤竹男, 日本病理學雜, 7卷, 205頁, 大7. 69) 河村謙二, 京都府立醫大雜, 6卷, 1號, 404號, 昭7. 70) 菅野尙夫, 臺灣醫雜, 30卷, 12號, 1531頁, 昭6; 臺灣醫雜, 33卷, 1號, 2號, 117頁, 及222頁, 昭9. 71) 吉川春次郎, 蟲様突起炎, 昭和 年. 72) 吉川精一, 京都醫學會雜, 20卷, 234頁, 大12. 73) *Krecke*, Münch. med. Wschr. S. 299, 1933. 74) *Löhr u. Rassfeld*, Wien. med. Wschr. Nr. 52, S. 1380, 1931; Zbl. Chir. S. 2871, 1928. 75) *Lanz*, Bruns Beitr. Bd. 18, S. 1, 1903. 76) *Lang*, Ref. Zbl. Chir. Nr. 51, S. 3215, 1928. 77) *Lehmann*, Arch. klin. Chir. Bd. 151, S. 107, 1928. 78) *Lévai*, Zbl. Chir. Nr. 48, S. 3019, 1928. 79) *Lamprecht*, Arch. klin. Chir. Bd. 150, S. 328, 1928. 80) *Mori*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 73, S. 123, 1904. 81) *Mannel*, Bruns Beitr. Bd. 55, S. 396, 1907. 82) *Meyer*, Dtsch. med. Wschr. Bd. 54, S. 1202, 1928. 83) *Müksam*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 55, H. 1, 1900. 84) *Mordwinkin*, Russki Wratsch. S. 485, 1916, (Ref. Zbl. Chir. Nr. 4, S. 92, 1920). 85) *Melchior u. Löser*, Bruns Beitr. Bd. 79, S. 615, 1912. 86) *Miloslavich*, Wien. med. klin. Wschr. Nr. 12, S. 442, 1912. 87) *Morris*, Americ. J. Obster. Vol. 11, P. 180, 1926. 88) *Marsch*, Bruns Beitr. Bd. 126, S. 65, 1926. 89) *Mac Lean*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 21, S. 36, 1917. 90) *Meisel*, Bruns Beitr. Bd. 40, S. 529, 1903. 91) *Meyer, Javenal, Ricardo*, Annal. Fac. med. Sao Paulo 4, S. 139; (Ref. Z. Org. Chir. Bd. 52, S. 793, 1931). 92) 松倉三郎 日本消化器病學會雜誌, 29卷, 1號, 47頁, 昭和6年. 93) 増田正徳, 朝鮮醫雜, 20卷, 11號, 1756頁, 昭和5年. 94) 松永嘉晨, 日本外雜, 33回, 7號, 昭7. 95) 増田中留, 軍醫團雜, 213號, 昭6. 96) 宮村秀雄, 軍醫團雜, 235號, 31頁, 昭8, 1. 97) 松尾信吉, 日外雜, 第25回, 1559頁, 大13. 98) *Nagoya*, Frankf. Z. f. Pathol. Bd. 14, S. 106, 1913. 99) *Nishikawa*, Virchows Arch. Bd. 205, S. 736, 1926. 100) *Noll*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 17, S. 249, 1907. 101) *Naab*, Münch. med. Wschr. Nr. 42, 1907. 102) *Nicolaysen*, Nord. med. Artiv. Vol. 34, No. 3, (Ref. Zbl. Chir. S. 719, 1903). 103) *Oguro*, Virchows Arch. Bd. 197, S. 548, 1909. 104) *Oschner*, Münch. med. Wschr. Nr. 8, 1902. 105) *Oberndorfer*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 15, S. 653, 1906; Münch. med. Wschr. Bd. 11, S. 1329, 1928. 106) 大藤敏三, 耳鼻咽喉科, 4卷, 6號, 昭6. 107) *Payer*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 200, S. 307, 1927. 108) *Renn*, Frankf. Z. f. Pathol. Nr. 19, 1916. 109) *Ritter*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 200, S. 364, 1927. 110) *Ruge*, Klin. Wsch. Nr. 40, S. 1915, 1925. 111) *Reischauer*, Bruns

- Beitr. Bd. 148, S. 283, 1929. 112) *Ricker*, Dtsch. Z. Chir. Bd. 202, S. 125, 1927. 113) *Ribbert*, Virchows Arch. Bd. 132, S. 66, 1892; Dtsch. med. Wsch. Nr. 23, 1903. 114) *Ruf*, Ziegler's Beitr. Bd. 75, S. 135, 1926. 115) *Runeberg*, Berlin S. Karger. 1918. 116) *Rössel*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 42, H. 1. 117) *Steilchele*, Arch. klin. Chir. Bd. 135, S. 373, 1925. 118) *Selberg*, Münch. med. Wschr. Nr. 12, S. 325, 1919. 119) *Schrumpf*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 17, S. 167, 1907. 120) *Schmütz*, Zbl. Bakt. I, Org. Bd. 117, S. 378, 1930. 121) *Schmidt*, Arch. f. mikr. Anatom. Bd. 66, S. 12, 1905. 122) *Sitsen*, Wien. med. Wschr. S. 1453, 1928. 123) *Shiota*, Wien. klin. Wschr. Nr. 31, S. 1101, 1909. 124) *Sudzuki*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 7, S. 516, 1901. 125) *Schaumann*, Dtsch. med. Wschr. Nr. 44, 1900. 126) *Siegel*, Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 17, S. 242, 1907. 127) *Sakhi*, Verh. d. 13 Kongr. f. inn. Med. S. 194, 1895. 128) *Sprengel*, Deutsche Chirurgie. Lieferung. 1906. 129) 清水勝, 岡醫雜, 43年, 2號 521頁, 昭6, 2; 岡醫雜, 44年, 103頁及923頁, 昭7. 130) 關口蕃樹, 日本消化器學雜, 28卷, 7號, 昭4; 日外雜, 22回, 日外雜, 14回, 194頁. 131) 鈴木五郎, 千葉醫學, 5卷, 1號, 202頁, 昭2. 132) 菅沼清治郎, 醫事公論, 941號, 昭5; 實驗醫報, 第2年, 22號. 133) 仙波嘉清, 日本醫學會雜誌, 第17回, 大正15年. 134) 高木喜寬, 臨床醫學, 第7年, 11號. 135) *Tedesco*, Arbeiten auf dem Gebiete der path. Anat. u. Bakteriologie. Bd. 6, 1908. 136) 富永錦吾, 東京醫學會雜誌, 43卷, 2號, 昭和4年. 137) 高橋與市, 日本外科學會雜誌, 28回, 臨時號, 昭和2年. 138) 富永忠司, 芦川竹造, 北越醫學會雜誌, 34年, 6號, 482頁, 大正8年. 139) 上原茂久治, 日本消化器病學會雜誌, 22卷, 1號, 1頁, 大正12年. 140) 上田寛一, 關西醫事, 116號, 昭7. 141) *Vorschütz*, Dtsch. med. Wschr. S. 1073, 1922. 142) *Vasilenko*, Ref. Z. org. Chir. Bd. 41, S. 47, 1928. 143) *Westphal*, Mitt. a. d. Grenzgeb. Med. u. Chir. XI, II, 99, 1930. 144) *Warren*, Americ. J. path. Vol. I, P. 241, 1925. 145) *Witthauer*, Zbl. Chir. S. 423, 1909. 146) 吉田美壽利, 日新醫學, 第18卷, 328頁及470頁. 147) 山村正雄, 實驗醫報, 第178號, 昭4. 148) 柳澤實治, 細菌學雜, 296號, 大9. 149) 横田浩吉, 日本外科實驗, 第1卷, 大正13年. 150) *Zindel*, Zbl. Chir. Nr. 30, S. 668, 1917.

附 圖 說 明

- 第 1 圖 正常家兎蟲様突起 普通寫眞
小腸間膜ノ血管走行狀態ヲ示ス
- 第 2 圖 家兎第 200 號 普通寫眞
自發的蟲様突起炎ヲ起セルモノ
- 第 3 圖 正常家兎蟲様突起橫斷切片標本
(H. E 染色, Zeiss, Obj. 2, 0. Ok. ナシ
Kameralänge 30 cm)
- 第 4 圖 正常家兎蟲様突起縱斷切片標本
(H. E 染色, Zeiss, Obj. 2, 0. Ok. ナシ
Kameralänge 30 cm)
- 第 5 圖 家兎第 39 號 (不完結+大)
(Gram 染色, Zeiss, Obj. 2, 0. Ok. K7,
Kameralänge 20 cm)
表皮細胞ノ一部脱落セルヲ見ル
- 第 6 圖 家兎第 34 號 (空+完結)
化膿性蟲様突起炎
- 第 7 圖 家兎第 64 號 (糞+完結+F)
(H. E 染色, Zeiss, Obj. 10, Ok. ナシ
Kameralänge 30 cm)
臍胞内ノ膿瘍ガ筋層ヲ穿孔シ漿膜外ニ流
出シ膿苔トナリテ附着ス
- 第 8 圖 家兎第 75 號 (糞+完結+大)
化膿性蟲様突起炎 普通寫眞
- 第 9 圖 家兎第 136 號 (空+完結+大)
(H. E 染色, Zeiss, Obj. 2, 0. Ok. ナシ
Kameralänge 25 cm)
小腸間膜附近ニ大ナル膿苔附着シ間膜内
小血管中ニ白血球ノ栓塞セルヲ見ル
- 第 10 圖 家兎第 50 號 (空+完結+連)
穿孔性壞疽性蟲様突起炎 普通寫眞
- 第 11 圖 家兎第 56 號 (空+完結+連)
(Gram 氏染色, Zeiss, Oelimmersion,
1/12a, Ok. K7, Kameralänge 20 cm)
組織内ニ侵入セル連鎖狀球菌
- 第 12 圖 家兎第 93 號 (糞+完結+F+連)
(Gram 氏染色, Zeiss, Oelimmersion,
1/12a, Ok. K7, Kameralänge 20 cm)
組織内ニ侵入セル球菌ヲ示ス
- 第 13 圖 家兎第 151 號 (糞+完結+F+葡)
(Gram 氏染色, Zeiss, Oelimmersion,
1/12a, Ok. K7, Kameralänge 20 cm)
組織内ニ侵入セル桿菌ヲ示ス
- 第 14 圖 家兎第 80 號 (空+完結+F+葡)
將ニ自然的切斷ニ陥ラントセル穿孔性壞
疽性蟲様突起炎
- 第 15 圖 家兎第 125 號 (糞+完結+連+葡)
(Gram 氏染色, Zeiss, Oelimmersion,
1/12a, Ok. K7, Kameralänge 20 cm)
組織内ニ侵入繁殖セル連鎖狀及ビ葡萄狀
球菌
- 第 16 圖 家兎第 99 號 (空+完結+大+連+葡)
1 箇月生存シ甚シク膨大セル 蟲様突起炎
普通寫眞
- 第 17 圖 家兎第 39 號 (完結+大)
(Gram 氏染色, Zeiss, Oelimmersion,
1/12a, Ok. K7, Kameralänge 20 cm)
表皮層腺窩部ニ於テ表皮脱落シ此部分ニ
細菌附着シ一部組織内ニ侵入セルヲ見ル

第 18 圖 家兎第 135 號 (糞 + 完結 + 大)

(H. E. 染色, Zeiss, Obj. 1,0 Ok. 5, Kameralänge 30 cm)

楔状壊疽 = 陥レルヲ示ス

第 19 圖 家兎第 74 號 (空 + 完結 + 葡)

(H. E. 染色, Zeiss, Obj. 2,0. Ok. ナシ Kameralänge 25 cm)

單一ノ Folliculitis ヲ起セルヲ示ス

第 20 圖 家兎第 125 號 (糞 + 完結 + 連 + 葡)

(H. E. 染色, Zeiss, Obj. 1,0. Ok. ナシ Kameralänge 30 cm)

膿胞層附近 = 細菌ノ集團的發育著明ニシ
テ蜂窩織炎狀ヲ呈ス

第 21 圖 家兎第 78 號 (空 + 完結 + 大 + 葡)

(H. E. 染色, Zeiss, Obj. 2,0. Ok. ナシ Kameralänge 25 cm)

一部分「デフテリー」性壊疽 = 陥レルヲ示ス

第 22 圖 家兎第 85 號 (糞 + 完結 + 連 + 葡)

(H. E. 染色, Zeiss, Obj. 2,0. Ok. ナシ Kameralänge 20 cm)

廣ク壊疽 = 陥レル中ニ島嶼狀ニ健康組織
ヲ殘存ス

三木論文附圖

第 1 圖

第 3 圖

第 4 圖

第 5 圖

第 2 圖

第 6 圖

三木論文附圖

第 7 圖

第 10 圖

第 8 圖

第 11 圖

第 9 圖

第 12 圖

三木論文附圖

第 13 圖

第 16 圖

第 17 圖

第 14 圖

第 15 圖

第 18 圖

三木論文附圖

第 19 圖

第 21 圖

第 20 圖

第 22 圖