20.

617.581:616-089.226

Calvé-Legg-Perthes 氏病ニ就テ

岡山醫科大學津田外科教室（主任津田教授）

橋 本 健

[昭和8年7月13日受稿]

*Aus der chir. Abteilung der Okayama Med. Fakultät
(Direktor: Prof. Dr. Seiji Tsuda).*

Über die Calvé-Legg-Perthes'sche Krankheit.

Von

Assistent Dr. Ken Hashimoto.

Eingegangen am 13. Juli 1933.

Neuerdings behandelte ich 3 Fälle der Calvé-Legg-Perthes'schen Krankheit. Der 1. Fall. Ein 9 jähriger Knabe, der seit etwa einem halben Jahr linkseitig hinkte, war von einem Landarzt auf Hüftgelenktuberkulose diagnostiziert worden und zeigte 1 cm Verkürzung am linken Bein, leichte Muskelatrophie am Oberschenkel und Einschränkung der Abduktion. Der Röntgenbefund galt als 1. Stadium nach Amstad. Der 2. Fall. Ein 11 jähriger Knabe bekam seit etwa einem Jahre linkseitigen Hinkengang, der sich langsam aber immerhin merklich verschlimmerte. Bei ihm waren zu sehen Muskelatrophie am Oberschenkel und Abduktionsstörung. Der Röntgenbefund galt als 1. Stadium. Der 3. Fall. Bei einem 8 jährigen Knabe, der seit etwa 1 Jahr linkseitig hinkte, waren Muskelatrophie am Oberschenkel und Abduktions- und Abduktionsstörung zu finden.

Die Krankheit trifft gewöhnlich gesunde Kinder, meist Knaben von 4-13 Jahren, und beginnt ganz allmählich, manchmal im Anschluss an unbedeutendes Trauma, mit wenig Schmerzen, Hinken und Ermüdbarkeit. Später treten Abduktions- und Rotationsstörung des Hüftgelenks und Verkürzung des Beines auf. Das Trendelenburgsche Phänomen ist positiv. Das Röntgenbild zeigt eine eigentümliche Deformität des Femurkopfes und -halses. Die Prognose ist meistens günstig. Die hochgradige Bewegungsstörung bleibt nicht sehr oft. Als Behandlung lässt sich nur konservativer, entlastender Abduktionsgipsverband und Gehapparat empfehlen. (Autoreferat).

緒言及ビ沿革

Röntgen 線ガ醫學上診斷學ニ應用サルルニ至リ、從來不明ノ疾患トサレシモノノ中ニ、獨立セル特有ノ病患ノ多々存在セルコトヲ證明シ、診斷學上ニ一大光明ヲ與ヘタルハ周知ノ處ナリ。今其ノ恩惠ニ浴シ、發見サレシモノノ中ニ Calvé-Legg-Perthes 氏病ナルモノ有リ。

本症ハ少年性畸形性股關節骨軟骨炎、Osteochondritis deformans coxae juvenilis, Coxa plana, (Waldenström), Malum coxae (Sundt), 又ハ Calvé-Legg-Perthes 氏病等各種ノ病名ノモトニ諸家ニヨリテ研究サル。

抑々本病ノ記載ハ1909年Stockholmノ外科學會ニ於テ、Waldenströmニ依リ、或ル一種ノ股關節疾患ヲeine benigne Form der Collumtuberkulose(Der obere tuberkulöse Collumherd)トシテ報告サレシヲ以テ嚆矢トナス。Sourdat(1909)ハ本病ノ數例ノRöntgen像ヲ記載シテ、之ヲCoxa varaト唱ヘ、Legg(1910)ハ本症ノ5例ヲAn obscure affection of the hipjointトシテ報告シ、1910年9月CalvéハLeggノ業績トハ全ク無關係ニ其ノ10例ヲ報告シ、Forme particulière de pseudocoxalgieト命名セリ。Ludloff(1910)ハ又本病ヲ數年間ニ互リ研究シ、之ヲCaput deformatumト稱シ、同年Perthesハ36例(其ノ中6例ハ自家ノ經驗例)ニ就テ、其ノ發生、經過竝ニ治療ヲ論ジ、高年者ニ認ムルガ如キOsteoarthritis deformansガ同様少年期ニモ發生シ得ルモノト解シ、之ニOsteoarthritis deformans juvenilisト命名セシモ、

1913年ニ至リ、其ノ1例ニ就テ關節切開術ヲ行フノ機會ヲ得、其ノ病理組織學の檢索ヲ行フニ及ビ、本病ヲ普通ニ見ル畸形性關節炎及ビ結核性關節炎等ト區別シ、改メテコレニOsteochondritis deformans coxae juvenilisナル名稱ヲ與ヘ、關節軟骨下ニ於ケル骨組織ノ破壞ニヨル1ツノ獨立セル股關節疾患ナル事ヲ立證セリ。而シテ本病ノ名稱ニ就テ、其ノ後Waldenström(1920)ハ病理組織學の檢索ヲナシ、炎衝性所見、即チ圓形細胞、或ハ肉芽組織ノ認メラレザリニ處ヨリCoxa planaト唱ヘ、Sundtハ(1921)又同ジ考ヘノ下ニMalum coxaeト稱ス。斯ノ如ク本病ノ名稱ハ區々ニシテ、歸一スル處ヲ知ラザルノ感有リ。然レドモ從來研究ノ諸家ハ一般ニ之ヲCalvé-Legg-Perthes氏病ト稱セリ。爾來本病ニ關スル業績ハ東西ヨリ續出シ、我國ニ於テハ1921年田代及ビ高木兩氏ノ「小兒ノ股關節ニ於ケル畸形性骨軟骨炎、所謂Calvé-Legg-Perthes氏病」4例ノ報告ニ濫觴シ、次デ京都帝大小川氏ハ3例ヲ日本外科學會ニ發表シ、其ノ後丸田實喜、淺田爲義、太田弘毅、前田和二郎、山本順、舟山鐵雄、鈴木爲吉、神川一格、松丸寛、長坂清人氏等ノ報告有リテ、其ノ數正ニ50ニ垂ントスルモ、尙ホ股關節疾患中殊ニ多キ股關節結核ト誤タレ、又老人ニ屢々見ル畸形性關節炎トノ關係ニ就テ、興味深キモノナリ。余ハ最近津田外科教室ニ於テ本病ノ3例ニ遭遇シ、例症増補ノ徒爾ナラザルヲ感じ、以テ聊カ文獻例症ト考量敘説シ、諸家ノ教示ヲ乞ハントス。

自家臨牀例

第1例

患者 田中某 9年ノ男兒

主訴 左側跛行

家族歴 父系ノ祖父ハ已ニ高年ニテ病死、病因不明、祖母尙々健在ス。母系ノ祖父母共ニ健在、兩親健在、同胞2人ニシテ、患者ハ長男、妹1名有リ、健在、結核其ノ他ノ遺傳の疾患ナシ。

既往歴 出産平易、成熟兒ニシテ、母乳ヲ以テ育マル、種痘善感、今日ニ至ルマデ著患ヲ知ラズ。

現病歴 1箇年前左足ニ靴傷ヲ生ジ、其ノ部ノ化膿ヲ來シ、左側鼠蹊淋巴腺ノ腫脹ヲ生ジ、自覺的疼痛ハ殆ドナキモ、半年前ヨリ左側跛行ヲ來ス、地方醫ニヨリ左側股關節結核ノ診斷ヲウケ、當科ニ送ラレシモノナリ。

初診所見 患者ハ體格營養共ニ中等度ニシテ、顔貌正常、瞳孔左右同大、正圓形ニシテ、瞳孔反應迅速、眼瞼結膜稍々充血ス、舌ハ濕度正常、舌苔ナク、咽頭ニ異狀ナシ、呼吸安靜、胸腹式呼吸ヲナシ、喀痰咳嗽共ニナシ、脈搏頻數正常整調、緊張良好ニシテ、睡眠障礙ナク、食慾普通、便通ハ整調ナリ。

尿所見 黃色透明、酸性、比重1010。

糖(一) 蛋白(一) 顯微鏡的ニ病的所見ナシ。

糞便所見 硬度正常、消化便ニシテ寄生蟲卵ヲ見ズ。

頭部頸部ニ異狀ナク、胸廓ノ形狀正常、心臟境界正常、心音純、肺臟ハ打診及ヒ聽診上異狀ヲ認めズ、肺肝境界ハ第6肋間腔ニ位ス、膝蓋腱反射左側正常ナルモ、右側稍々高シ。

局所所見 脚ノ位置ハ正常、左側上腿部ニ輕度ノ筋萎縮ヲ認ム、上腿部ノ中間ニ於ケル周圍ノ大サハ左側29cm、右側32cmナリ、脚ノ長サハ棘蹠間距離ハ左側52.5cm、右側ハ53.5cmニシテ、

左側ノ大轉子ハRoser-Nélaton氏線ノ稍々上方ニ位ス、運動検査ニ於テ屈曲運動ハ左側ハ直角、ソレ以上ハ不能ナリ、其ノ他ノ運動機態ハ總テカサレザルニ、外轉運動ハ全ク犯カサレタリ、腰椎ニ左側凸面ノ側彎有リ、Trendelenburg氏症狀陽性ナリ。

Röntgen所見 (附圖第1圖參照) 左側大腿骨頭ハ中等度ニ壓平サレ、莖笠ノ如キ形狀ヲトリ、骨頭ノ外半部ハ關節窩ヨリ外側ニハミ出シ、骨頭關節面ノ中央ニ於テ關節窩邊緣ノ壓迫ニヨリ階段狀ノ凹ミヲ示セリ、頸部ハ稍々短縮シ上半部ハ濃淡相半バシ内側上端ニハ楔狀ノ基底ヲ骨端線ニ向ケタル透明部ヲ認ム、其ノ輪割ハ却ツテ濃クナレリ、而シテ骨端線モ不規則ニシテ關節裂隙ハ骨頭ガ側方ヘ稍々不全脫臼セルガ爲メニ健側ヨリ幅廣シ。

治療 荷重減退ノ目的ニテ歩行裝置使用。

第2例

患者 川上某 11年ノ男兒

主訴 左側跛行

家族歴 父系ノ祖父母共ニ58年健在、母系ノ祖父ハ64年健在、祖母63年健在、兩親各32年何レモ健在ナリ、同胞ナシ、結核其ノ他ノ認ムベキ遺傳の疾患ナシ。

既往歴 分娩通常母乳ヲ以テ育マレ、全ク健康ニシテ著患ヲ知ラズ。

現病歴 1年前ヨリ何等誘因ナクシテ左側跛行ヲ來シ、益々増強スルガ如シ、疼痛ハ殆ド覺エズ。

初診所見 體格、營養共ニ中等度ノ男子ニシテ、顔貌正常、瞳孔左右同大、正圓形、瞳孔反應迅速、眼瞼結膜ニ貧血ナシ、舌ニ病的變化ナク、咽頭亦異狀ナシ、呼吸安靜、胸腹式呼吸ニシテ、喀痰咳嗽共ニナシ、脈搏數正常、整調、緊張良好ニシテ

睡眠良好，食慾通常，便通ハ規則正シ。

尿所見 黃色透明。酸性。比重 1012。

糖(一) 蛋白(一) 顯微鏡的ニ病的所見ナシ。

糞便所見 硬度正常，消化便ニシテ寄生蟲卵ヲ認明セズ。

頭部，頸部其ノ他ニ淋巴腺腫脹ヲ見ズ。肺臟心臟ハ打診，聽診上異狀ヲ認メズ。且身體他部ニ於テモ病的所見ナシ。

局所所見 脚ノ位置ハ正常ニシテ，左側ハ一見短キガ如ク見ユルモ，棘蹠間距離ハ左右各々 57cm ナリ。左側大腿筋群ニ輕度ノ筋萎縮ヲ認ム。大轉子ノ高サハ左右變リナシ。運動検査ニ於テ外轉運動ノ制限ヲ見ル。股關節ニ向ツテ反動打撲ヲ加フルモ疼痛ナシ。Trendelenburg 氏症狀陽性ナリ。

Röntgen 所見 (附圖第 2 圖參照)

左側大腿骨頭ハ其ノ球形ヲ失ヒテ，扁平トナリ一文字ノ濃密ナル陰翳トナル。骨端線ハ健側ニ比シテ稍々明瞭ナリ。而シテ髌臼ノ形狀不規則ニシテ鋸齒狀ヲ呈シ，關節裂隙ハ健側ヨリ廣シ。頸部ハ甚ダシク短縮シ幅廣クナリ上半部骨端線ニ接シテ帶狀ニ透明トナレリ。

治療 歩行裝置。

第 3 例

患者 山根某 8 年ノ男兒

主訴 右側跛行

家族歴 父系ノ祖父ハ高年ニシテ腦溢血ニテ死亡ス。祖母心臟病ニテ 37 年ノ時，病死ス。母系ノ祖父母共ニ高年ニ病死ス。父ハ本年 42 年ニシテ健在，母ハ 40 年ニシテ健康。同胞 7 人ニシテ，患者ハ 5 番目ナリ。1 番目ハ 6 箇月，2 番目ハ 8 箇月ニシテ何レモ死産セル以外，他ノ同胞總テ健康ニシテ，結核性疾患其ノ他ノ遺傳的疾病ヲ認メズ。

既往歴 出産平易，成熟兒ニシテ，母乳ヲ育マレ，種痘善感，今日マデ健康著感ヲ知ラズ。

現病歴 約 1 箇年前，何等誘因ナクシテ右側跛行ヲ來ス。疼痛全クナシ。跛行ハ益々増強スル傾向アルモ，疼痛ハ全クナシ。

初診所見 患者ハ體格，營養共ニ佳良ノ男子ニシテ，頭部，頸部ニ異狀ナシ。又其ノ他ノ所ニ於テモ淋巴腺其ノ他ノ腫脹ヲ見ズ。肺吸ビ心臟ハ打診，聽診上全ク病的所見ヲ認メズ。爾他ノ部分ニ於テモ亦病的所見ナシ。

尿所見 黃色透明。酸性。比重 1012。

糖(一) 蛋白(一) 顯微鏡的ニ病的所見全クナシ。

糞便所見 硬度正常，消化便ニシテ寄生蟲卵ヲ見ズ。

膝蓋腱反射，左右稍々亢進ス。

局所所見 脚ノ位置ハ正常，右側下肢ハ一見短キガ如ク見ユルモ棘蹠間距離ハ左右各々 53 cm ナリ。右側大腿部ニ輕度ノ筋萎縮ヲ認ム。右側股關節部ノ腫脹ナク，大轉子ノ右ハ Roser-Nélaton 氏線ヨリ稍々上方ニ有リ。運動検査ニ於テ外轉及ビ内轉運動ハ何レモ犯カサル。股關節裂隙ハ壓痛ヲ感ゼズ。

Röntgen 所見 (附圖第 3 圖參照)

右側ノ大腿骨頭ハ不規則ニシテ，其ノ球形ヲ失ヒ，著シク扁平トナリ，Fragmentation ヲ認ム。其ノ中央部ニ於テ Fragment ハ濃密ナル陰影ヲ有スルモ，其ノ左右ニ於テハ透明ナリ。頸部ハ著明ニ短縮シ幅廣クナリ，骨端線ニ接シテ透明ナリ。頸部内側ニ於テ，扁豆大楔形ノ透明部ヲ認ム。其ノ輪廓ハ却ツテ濃影トナル。楔形ノ基底ハ骨端線ニ向ヘリ。關節裂隙ハ健側ヨリ稍々廣シ。

治療 安靜，歩行裝置使用。

考 案

症狀

本症ハ健康ナル幼少年者ヨリ春期發動期前マデノ少年少女ニ見ル疾病ニシテ、先ヅ4年ヨリ13年位マデノ間ニ發病スルモノトサル。Perthes, Platt 並ニ Schwarz ハ5—12年ノ間, Forsell ハ5—9年, Sinding-Larsen ハ7—9年, Waldenström ハ7—12年, Brandes ハ4—13年, Calvé ハ2—15年ノ間ニ發病スト稱ス。而シテ少年ハ少女ヨリ多シ。Roderick ハ50例ノ本症ノ中49例, Perthes ハ28例ノ中20例, Legg ハ39例中32例ハ男子ナリキト。Schwarz ハ男女ノ頻度ハ3:2ト唱ヘタリ。Schoonevelt ハ男子ハ女子ノ4倍ナリト稱ス。併シ之ト反對ニ Brandes ハ女性ニ多シトナス。我々ノ自家例ハアマリニモ少數ニシテ、大勢ハ決シ難キモ、男性ハ女性ヨリ多キガ如シ。

本症ノ初期ニ現ルル症候トシテハ、跛行及ビ疼痛ヲ主訴トスルモノ多シ。跛行ハ所謂振子様跛行ニシテ Trendelenburg 氏症狀陽性ナリ。疼痛ハ其ノ程度千差萬別ニシテ、アルモノハ全ク缺如シ、タダ跛行ノミ存スルコトアリ。視診上第一ニ注目ヲ惹クハ、罹患部下肢ノ輕度ノ筋萎縮ナリ。而シテ腫脹、發赤等ノ炎衝性所見ヲ呈スルモノハ稀ナリ。次ニ本症ニ於テ最も特有ナル症狀ニシテ、且重要ナルモノハ運動検査ナリ。即チ股關節ニ於テ、屈曲、伸展運動自由ナルニ反シ、本症ハ早期ヨリ外轉運動 (Abduktion) ノ制限ヲ常ニ證明ス。疾病進行セル時期ニ於テハ、附近ノ筋萎縮益々著明トナリ、脚ハ股關節部ニ於テ内

轉ノ位置ヲトリ、跛行及ビ疼痛モ一般ニ増進シ、大轉子ハ隆起シテ側方ニ突出シ、Roser-Nélaton 氏線ヨリ高位ニ位ス。從ツテ病脚ノ短縮ヲ證明ス。而シテ骨盤ハ稍々斜位トナリ、一見左右非對稱ヲ呈スルガ如キ觀アリ。

以上ノ如キ症候ナルヲ以テ、初期ニ於テハ屢々股關節結核トノ鑑別ニ困難ナルコト有リ。而シテ股關節結核ト異ル點ハ、患者ノ全身狀態、他ノ器官ノ結核病竈ノ有無、Tuberculin 反應、赤血球沈降速度以外ニ、其ノ跛行狀態及ビ運動障礙ノ特長ガ重要ナリ。即チ股關節結核ニ於テハ、早期ヨリ伸展運動障礙サレ、患部ヲ特ニ保護スルガ如キ姿勢ヲトリ、其ノ跛行狀態ハ一言ニシテ云ヘバ、即チ股關節結核ニ於テハ Ängstliches Schonungshinken ニシテ、患足ヲイタワルガ如ク、足先ヲ以テ恐ル恐ル歩ムニ反シ、本症ニ於テハ通常ノ場合、足趾全體ヲ地ニツケテ走ル。且本症ニ於テハ絕對ニ寒性膿瘍ヲ作ルコトナシ。

股内髒症トハ局所所見ノミニテハ區別シ難シ。

Röntgen 所見

Röntgen 線的ニ股關節ニ證明セラルル第一ノ變化ハ骨頭ニ於ケル所見ナリ。即チ骨頭ニハ浮雲狀ノ透明斑點ヲ生ジ、又其ノ間ニハ却ツテ陰翳ノ濃厚ナル斑點ヲ交ヘ、甚シクレバ骨頭ハ之ニ等數多ノ透明或ハ濃厚ナル斑點ニ分割セラレ、所謂 Legg ノ Segmentation 又ハ Fragmentation ヲ形成ス (山根ノ例)。カカル變化ハ骨頭部營養障礙ニヨリ骨質ノ石灰吸收又ハ沈着ニ基因スルモノニシテ、透明斑點

ハ骨頭内ノ軟化窟、軟骨島、出血、囊腫形成ニヨルモノトセラレ、濃厚斑點ハ石灰化セル腐骨ナリトナシ、或ハ正常骨組織ノ反應的ニ骨形成ヲ促セルモノナリトナセリ。要スルニ正常ノ石灰分量ガ不規則ニ分布セラルル様ニナリ、從ツテカク變化セル骨頭ハ荷重ニ對シテ脆弱ナルガ爲メニ、骨頭ハ髌臼ノ壓迫ニヨリ次第ニ扁平トナリ、高サヲ減ジ、其ノ丸ヲ失ヒ、左右ニ向ツテ膨脹ス(3例共)。殊ニ外上方部ハ之ガ爲メニ髌臼内ニ納マリカネテ、髌臼ヨリ外方ヘ向ツテハミ出スニ至ル(田中例)。又或場合ニハ上述ノ Segmentation ヲ呈スルコトナク、單ナル扁平濃厚ナル一文字狀ノ陰翳ヲ示スコトアリ(川上、田中例)。カカル變化行ハレツツアル間モ骨頭關節軟骨ニハ少シモ變化ナク、平滑ニシテ何レモ軟骨下層ノミノ病變ナリ。骨端線モ永キ間變化ナク、タダ骨頭ノ變形竝ニ頸部ノ變化加フルニ及ンデ變形シ、波狀トナリ、又斷裂スルニ至ル。頸部ノ上端、骨端線ニ接スル部ハ常ニ骨頭ト共ニ同様ノ變化ヲ受クルモノニシテ、透明竝ニ濃密ナル斑點ヲ示シ、次第ニ荷重ノタメニ長軸ニ短縮シ、頸部ノ角度モ亦或ハ大トナリ、或ハ小トナリテ、股外離症、股内離症ヲキタス。吾ガ3例共ニ頸部ニ於ケル變化ヲ認ム。髌臼ノ變化ハ極メテ小ニシテ稍々淺クナルモタダ時ニ縁提隆起或ハ髌臼遊走等ヲナスコト有リ。之ハ骨頭ノ變形ニ應ジテ變化セルモノナリ。川上例ニ於テ髌臼ニ凹凸ノ輪畫アリ。髌臼ノ變化少ナク、骨頭、頸部ハ扁平トナルガ故ニ關節裂隙ハ寧ロ擴張シ、從ツテ關節ノ骨性强直ヲ招來セズ(川上例)。カカル變化ハ3—4年繼續スルモノニシテ、遂ニハ骨頭及ビ

頸部ノ復舊工事ニヨリテ正常ニ近キ骨頭ヲ形成シテ、甚ダシキ關節運動ノ障礙ヲ貽サザルモノナリ。Perthes ハ末期ニ於ケル骨頭ノ形狀ヲ2ツニ分テリ。第1ハ即チ球形トナルモノニシテ、主トシテ破壞作用ハ骨端線以下ニ及バザル病變輕度ナリシモノナリ。從ツテ運動障礙ヲキタスコト殆ドナシ。第2ハ乳頭形又ハ蕈形ニシテ骨頭ハ頸部ト相融合シテ、股内離症ヲ來タシ、變形甚ダシク從ツテ關節運動ノ障礙ハ著明ナリ。吾ガ3例ハ未ダ經過中ニアレバ末期ノ所見ハ認メ難シ。

畸形性關節炎トノ關係

已ニ Perthes ヨリ以前ニ於テモ Frangenheim 及ビ Levy ハ Osteochondritis deformans coxae juvenilis ヲ普通ノ Arthritis deformans coxae ノ中ニ編入スベカラザルコトヲ主張セリ。即チ Arthritis deformans coxae 畸形性關節炎ハ關節軟骨壞死及ビ其ノ缺損ガ其ノ特長ニシテ、露出セル骨部ハ同時ニ増殖的現象ヲ開始ス。而シテ緩徐ニ、而モ留ルコトナク進行シテ、著明ナル疼痛、高度ノ舉上運動ノ障礙ヲ來スモノナリ。Calvé-Legg-Perthes 氏病ハ關節面ニ現ルル疾患ニ非ズシテ、最初ノ罹患部位ハ大腿骨頭軟骨下組織、即チ大腿骨頭内部及ビ頸部ナリ。多クノ學者ハ組織學的及ビ Röntgen 學的ノ所見ヨリ、少クトモ其ノ初期ニ於テハ非炎衝性ニシテ、關節軟骨ノ破壞無ク、大腿骨頭内部ニ於ケル破壞機轉ナリト認ム。

Perthes ハ外轉運動ノ障礙サレ、2年ヲ經過セル例ニ關節切開術ヲ施シ、股關節結核ト鑑別スル目的ニテ、検査ヲ行ヒタルニ、前者ハ關節軟骨ハ正常、滑液膜モ亦正常ニシテ、全

ク平滑ナルモ、骨頭ハ高度ノ破壊ヲ來タシ、其ノ丸味ヲ完全ニ失ヒ、壓迫ニ依リ扁平トナリ、組織學的検査ニ於テ、健全ナル硝子様軟骨有リテ、其ノ核染色良好ナリ。而シテ炎衝性ノ徴候ナク、滑液膜ノ病的變化ハ認メズ。コノ關節軟骨及ビ滑液膜ノ正常ナルコトハ、畸形性關節炎トハ全ク異ナル點ナリ。其ノ他 Edberg, Riedel, Sundt, Vogel, Frangenheim 等モ亦組織學的ニ検査ヲ行ヒ、大體上述ト同様ノ所見ヲ述ベタリ。斯ノ如ク Calvé-Legg-Perthes 氏病ハ畸形性關節炎トハ、其ノ本質ヲ全ク異ニスルモノト言フベシ。

次ニ、本症ガ第二次的ニ畸形性關節炎ヲ發シ、又ハ移行スルコトノ有ルコトナリ。即チ Nicolaysen, Platt, Sundt ハ本症ハ將來畸形性關節炎トナルベシト稱ス。Taylor ハ老年ニ於ケル畸形性關節炎ノ一原因トシテ本症ヲ舉ゲタリ。Müller モ亦本症ハ Locus minoris resistentiae トナリテ、畸形性關節炎ノ基礎ヲナスト稱ス。Aschoff, Axhausen, Heitzmann 等モ亦畸形性關節炎ヘノ移行ヲ承認ス。Tavernier ハ Ostéochondrite sans Ostéoarthritis 及ビ Ostéochondrite avec Ostéoarthritis トニ分チ、前者ハ罹患部ハ大腿骨頭内ニ局限シ、變化輕度ニシテ、關節炎ヲ伴ハズ、從ツテ機能障礙ヲ殘サザルモノニシテ、後者ハ關節炎ヲ伴フモノニシテ、骨頭ノ變形甚ダシク恢復遲延シ、永ク自覺の苦痛著明ニ伴ヒ、機能障礙高度ニシテ、本症ト畸形性關節炎トノ移行型ヲナスモノナリ。

本症ノ成因ニ就テ

本症ノ成因ニ就キテハ種々議論サレ、或ハ

病理組織學所見ヨリ說ヲ立テ、或ハ實驗的根據ニヨリ、或ハ Röntgen 線像ヨリ解釋シ、或ハ全身症狀ヨリ歸納シテ、諸報告混沌トシテ歸一スル處ナシ。今之ヲ项目的ニ羅列センニ

1) 畸形性關節炎ノ少年型トナスモノ

(Kreuter, Lang, Rhonstein 等)。

畸形性關節炎ト本症トノ關係ニ就キテハ特ニ前節ニ述ベタルガ如ク、一般的ニハ本症ハ全ク別箇ノ疾患ナリトスルヲ可トスルガ如シ。但シ畸形性關節炎ヘ移行シ得ルコトアルハ前述ノ如シ。

2) 外傷說 Perthes, Widerøe, Kappis,

Nussbaum, Aschoff 等ハ外傷ニヨリテ頸部ノ營養血管ノ損傷ヲ來シ、カクシテ骨頭及ビ頸部ノ營養障礙ヲ起セルモノナリト。Legg, Schanz, Wieting 等ハ1回ノ打撃ニヨリ起リタル營養障礙ニアラズシテ、日々相加ハル打撃ノタメニ荷重變形(Belastungsdeformität)ヲ來タセルモノナリト。外傷ガ本症ト確實ニ關係アリト見做サルルハ先天性股關節脱臼ノ整復後ニ本症ノ續發スル事ニシテ、整復ニヨリ骨頭ノ受ケル打撃ガ原因ナリト(Pürkhammer, Bibergeil 等)。又見逃ガサレタル先天性股關節不完全脱臼ガ本症ノ成因ナリト言フ說(calot, Calieu 等)アルモ亦外傷說ニ左祖スルモノナリ。抑々頸部血管ハEndartherienニ屬スルモノニシテ、Waldenström ニヨレバ下圖ノ如ク上頸部血管、下頸部血管、骨頭内側下面ノ小血管及ビ圓靱帶ノ血管ヨリナレリ。之等血管ノ通過障礙ハ容易ニ骨頭及ビ頸部ノ營養障礙ヲ起スモノナリ。

大腿骨頭及ヒ頸部ノ血管分布圖

1. 上頸部血管
(Das obere Collumgefäß)
2. 下頸部血管
(Das untere Collumgefäß)
3. 骨頭内側下面ノ小血管
(ein kleines Gefäß für die mediale untere Epiphysenecke)
4. 圓靱帶ヨリノ血管
(Die Arterie im Lig. teres)

3) 頸部血管 Embolie 説

Axhausen ハ頸部血管ノ Embolie ニヨリテ血行障礙ヲ來タシ、骨頭及ヒ頸部ノ營養障礙ヲ來タスト、而シテ *blande mykotische Embolie* トシテ認メタリ。

4) 傳染説

Axhausen ハ細菌性 Embolie ヲ認メタルガ Kidner ハ手術ニヨリ得タル病竈ヨリ白色葡萄狀球菌ヲ培養シ得タリト。

5) 全身疾患又ハ體質ニ關スル説

Fromme, Frangenheim 等ハ *Rachitis*, *Spätrachitis* 又ハ *rachitisch-malacischer Prozess* ヲ主張シ、Erkes, Sundt 等ハ内分泌臓器特ニ生殖腺ノ障礙ヲ、Brandes ハ *hypoplatisch-dystrophische Zustände* ト稱スベ

キ體質ノ異狀ヲ認メ、又 Perthes, Calvé 等ハ遺傳或ハ家族の發生ヲ認ム。又 *tropisch-neurotische Genese* ニヨルト云フモノアリ (Landmeyer)。

6) 纖維性骨炎ノ一種ナリト言フ説

(Riedel)

上述ノ如ク成因ニ關スル説ハ種々難多ニシテ、何レヲ信賴シテ可ナルカ去就ニ迷フ處ナルモ、吾々ノ3例ヨリ見ルニ(5)ニ述ベタルガ如キ諸因ハ認ムルコトヲ得ズ。又外傷説ヲ肯定スベキ1回ノ激シキ外傷ノ存在ヲモ舉グル事ヲ得ズ。

要之、本症ハ諸説アルガ如ク、種々ノ原因ニヨリテ起リ得ルモノナレドモ、通常見ラルモノハ頸部血管ノ損傷又ハ Embolie ニヨリテ骨頭頸部ノ營養障礙ヲ起シ、日々相加ハル身體ノ荷重ノ爲ニ骨頭頸部ハ脆弱トナリ、押シ潰サルモノニシテ、Röntgen 像ハ此病變ノ爲メニ起ル骨壞死、骨形成、石灰消失又ハ沈着等ヲ示ス。而シテ關節窩又ハ骨頭軟骨ニ行ハルル如キ炎症又ハ畸形性關節炎ニハアラズ。カクシテ數年後ニ初メノ血行障礙ガ副行血管ノ形成ニヨリテ、營養ヲ回復スル時ハ今迄ノ病竈ハ清掃セラレテ殆ド原形ニ近キ形態マデ復舊スルモノナリト解スルヲ妥當トナスベシ。

豫後

本症ハ大腿骨頭内部ノ破壊ト變形ニシテ、骨頭ハ扁平トナリ、或ハ透明ニ或ハ陰翳濃厚トナリ、而モ關節裂隙ハ狭小トナラザルノミナラズ、却ツテ廣大トナリ、3—4年ノ經過ノ中恢復シ、健康骨組織トナルモノニシテ、生命上ノ危險ハ無ク豫後ハ一般ニ良好ナリ。然

レドモ時ニハ輕度ノ跛行ヲ殘スモ強直ヲ殘スガ如キハ稀有ニ屬ス。

療法

本症ハ其ノ成因未ダ詳ナラズ。從ツテ原因的療法ヲ缺クハ勿論ナルモ豫後良好ナルヲ以テ、保存的療法ニテ充分ナリ。即チ本症ノ狀

結

余ハ最近3例ノ Calvé-Legg-Perthes 氏病ニ遭遇セリ。第1例ハ9年ノ男兒ニシテ、約1/2年前ヨリ左側跛行ヲ起シ、地方醫ニヨリ結核性股關節炎ト診斷サレシモノニシテ、左脚ハ1cmノ短縮ヲ來タシ、大腿ハ輕度ノ筋萎縮ヲ認メ、外轉運動著シク障礙サル。Röntgen 所見ハ Amstad 氏分類ノ第1期ニ相當セリ。第2例ハ11年ノ男兒ニシテ、約1年前ヨリ左側跛行ヲ來タシ、徐々ニ增強セルモノニシテ、大腿部筋萎縮、外轉運動障礙存セリ。Röntgen 所見ハ第1期ニ相當セリ。第3例ハ8年ノ男兒ニシテ、約1年前ヨリ右側跛行ヲ來タセルモノナリ。大腿部筋萎縮並ニ内、外轉運動障礙存セリ。Röntgen 所見ハ第2期ニ相當セリ。

本症ハ主トシテ少年期(4—13年)ノ男兒ニ起ル疾患ニシテ、發生ハ徐々、跛行、股關節疲勞、輕度ノ疼痛ヲ主訴トス。外轉、廻旋運動障礙ヲ起シ、大腿骨頭ノ變化進行スルニ從

況ニ應ジテ、歩行裝置或ハ Gips 綑帶ヲ用ユレバ疼痛及ビ跛行ハ自然ニ消失スルヲ常トス。其ノ後ハ「マツサージ」等ヲ施ス。著シキ運動障礙ヲ殘シ治癒セル場合ハ手術的療法ヲ施スコトアルモ (Hildebrand), 本法ハ骨成長完成後ニ於テ施スベキモノナリ。

論

ヒ脚短縮ヲ來タシ、Trendelenburg 氏症狀ヲ表スニ至ル。特有ナルハ Röntgen 所見ニシテ大腿骨頭ノ雲樣濃淡陰翳ノ出現ニ始リ、次第ニ破壊ヲ起シ、骨頭ノ變形ヲ來タシ、或ハ破壊シ多數ノ破片形成ヲ起スニ至ルモノナリ。大腿、頸部モ亦骨頭ト同様ノ變化ヲ示ス。

豫後ハ一般ニ良好ニシテ、化膿ヲ起スコトナシ。而シテ大腿骨頭ハ再ビ形成サルルモ、運動障礙ヲ殘スコト有リ。

鑑別診斷トシテハ初期股關節結核、股内齶症ガ舉ゲラル。

療法トシテ對症的療法ニ止ル。即チ外轉位 Gips 綑帶或ハ加重輕減ノ目的ニ歩行裝置ヲ使用セシムレバ、其ノ治癒ヲ促進セシムルモノノ如シ。

擧筆スルニ際シ終始御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ賜ハリシ恩師津田教授並ニ西山助教長ニ深謝ス。

橋本論文附圖

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

文 献

- 1) *Brandt*, Arch. f. Chir. Bd. 166, 1931. 2) *Davidson*, American Journal of röntgen and radium therapy Bd. 12, Nr. 4, 1924. 3) *Heimer*, Zschrif. f. orthop. Chir. Bd. 46, 1925. 4) *Jurt, Emil*, Wien. klin. Wschr. 1931. 5) *Kirschner, Nordmann*, Chirurgie II. 2. Teil, S. 1269, 1930. 6) *Lang, Max*, Verh. dtseh. orthop. Ges. 1930. 7) *Paul Coan*, Osteochondritis def. juv. coxae. Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie, Bd. 17, 1924. 8) *Quervain*, Schweiz. med. Wschr. Bd. 58, 1920. 9) 浅田爲義, 太田弘毅, 日本外科學會雜誌, Nr. 26, 大正14年. 10) 舟山鉄雄, 朝鮮醫學會雜誌, 69號, 大正15年. 11) 神川一格, 松丸寛, 愛知醫學會雜誌, 37卷, 6號, 昭和5年. 12) 丸田實喜, 岡醫雜, 413號, 大正13年. 13) 長坂清人, 福岡醫科大學雜誌, 第22卷, 第4號, 昭和4年. 14) 長坂清人, ベルテス氏病(少年性畸形性股關節骨軟骨炎ノ本態及成因論). 15) 鈴木藤吉, 北海道醫學會雜誌, 7年8號, 昭和4年8月. 16) 田代義徳, 高木憲二, 日新醫學, 大正12年.

附 圖 説 明

第1圖 骨頭ハ中等度ニ壓平サレ, 菱笠狀ヲ呈シ, 且其ノ骨頭ノ外半部ハ關節窩ヨリ外側ニハミ出ス. 頸部ハ稍々短縮シ, 上半部ハ濃淡相半バス.

第2圖 骨頭ハ其ノ球形ヲ失ヒ, 扁平トナリ, 一文字ノ濃密ナル陰翳トナル.

第3圖 骨頭ハ其ノ球形ヲ失ヒ, 著シク扁平トナリ, 其ノ中央ニ Fragmentation ヲ生ズ.