10.

618.1

婦人科産科の開腹手術壹千餘例ノ統計的觀察

徳島市紙屋町赤枝病院

赤 枝 守 一

[昭和9年11月2日受稿]

Statistische Beobachtungen auf Grund der gynäkologischen
und tokologischen Laparotomien bei mehr
als tausend Fällen.

Von

Moriiti Akaeda.

Eingegangen am 2. November 1934.

Ich schreibe zuerst über die Desinfektionsmethode, Narcose und Operationsmethode und will dann die dabei mir vorgekommenen 1018 Fälle von Laparotomien statistisch bearbeiten.

Die statistischen Resultate sind die folgenden:—

1. Uteruskrebs. Das Uteruscarcinom beträgt 8.7% aller Laparotomien, und zwar Corpuskrebs: Zervixkrebs = 13.0 : 87.0%. Das durchschnittliche Alter der Krebskranken beträgt 45 Lebensjahre. Der Uteruskrebs mit Schwangerschaft beträgt 3.3% aller Uteruskrebsfälle, welche alle mehr als 3 mal geboren hatten.

Die Sterblichkeitsziffer bei den totalen Exstirpationen des Uteruskrebses beträgt 11.1%.

2. Uterusmyom. Myomoperation beträgt 19.2% aller Laparotomien; unter ihnen, Zervicalmyom : Corpusmyom = 6.6 : 93.4%.

Interstitielle Myome sind am häufigsten von allen Myomoperationen (81.1%).

Uterusmyom ist in den Lebensjahren von 40—50 am häufigsten zu finden und beträgt 60.6% in diesem Alter.

Unter allen Myomkranken:— Nullipara 52.0%, I-Para 14.5% und II-Para 10.9%.

Unter den Multipara, bei denen 11—20 Jahre nach der letzten Geburt verstrichen sind, wird der Myomträger am häufigsten gefunden; er beträgt 56.8%.

Myom mit Schwangerschaft beträgt 0.5%.

Todesfälle bei Myomlaparotomien schliesslich sind 3.5%.

3. Extrauterinschwangerschaft. Diese Krankheit beträgt 20.8% aller Laparotomien und wird im 30.—40. Lebensjahre am häufigsten beobachtet (60%).

Die Tubengravidität besitzt die Majorität bei diesen Krankheiten; es gibt zwischen der linken und der rechten Tube keinen Unterschied hinsichtlich der Befruchtung.

Tubenabort ist viel häufiger (87.2%) als Tubenbersten. Die Todesfälle bei dieser Operation betragen 4.7%.

4. Ovarialgeschwülste. Diese Krankheit ist am häufigsten und macht 30.6% aller Laparotomien aus.

Ovarialcyste nimmt den grössten Teil von allen Ovarialgeschwülsten (29.4% aller Laparotomien) ein; unter ihnen beträgt die Darmoidcyste 16% aller Ovarialgeschwülste.

Ovarialcyste ist am häufigsten im Alter von 30 Jahren zu finden.

Die gestielte Cyste 89.7%, Intraligamentäre Entwicklung 6.6%, pseudointraligamentäre Entwicklung 3.6%; Entwicklungsseite ist, ob links, ob rechts, fast gleich.

Ovarialcyste mit Schwangerschaft 5.3%; sie tritt am liebsten bei der Dermoidcyste auf.

Die Todesfälle bei der Cystotomie betragen 2.3%. Ovarialkrebs besitzt 1.6% aller Ovarialgeschwülste; in allen meinen Fällen handelte es sich um bösartige Entartung der gutartigen Cyste.

Ovarialsarcom macht 1.9% aller Ovarialgeschwülste aus und ist in relativ

junger Jahren zu finden.

5. Narcose. Bei der allgemeinen Chloroformnarcose ist die mittlere Chloroformmenge für eine Kranke 18.0 cc; von der dabei gebrauchten Chloroformmenge ist der erste Flatusabgang nach der Operation, welcher zu Prognose der Operation sehr wichtig ist, unabhängig. Der erste Flatusabgang erfolgt in meinen Fällen durchschnittlich in der 47. Stunde nach der Operation.

Bei der allgemeinen Chloroformnarcose mit Äther ist die mittlere Menge für eine Kranke 15 cc. Chloroform und 31 cc Äther; in diesem Falle ist die Leitspanne bis zum ersten Flatusabgang etwa ebenso lang wie bei der reinen Chloroformnarcose.

Bei der Lumbalanästhesie ist die mittlere Tropacocainmenge für eine Kranke 0.035 g (in vielen Fällen von Laparotomie wird 0.05 g gebraucht); von der gebrauchten Tropacocainmenge ist die Zeitspanne bis zum ersten Flatusabgang unabhängig; in diesem Fall erfolgt der erste Abgang durchschnittlich 51 Stunden nach der Operation (etwas später als bei der Chloroformnarcose).

Bei der gemischten Narcose (Tropacocain mit Chloroform) ist die mittlere Chloroformmenge 10 cc.

Die verschiedenen Neben- und Nachwirkungen (z.B. Kopfschmerz, Uebelkeit, Erbrechen, Harnretention etc.) sind bei allgemeiner Narcose mit Chloroform und Lumbalanästhesie mit Tropacocain fast gleich; derartige Symptome sind meistens vorübergehend, weswegen man sie fast immer ausser Acht lassen kann. Nur ist die Harnretention häufiger bei Lumb-

alanästhesie als bei allgemeiner Narcose. Doch kommt echte Blasenlähmung äusserst selten vor.

Bei der Laparatomie habe ich bisher gewöhnlich Scopolamin-Morphin, Pantopon-scopolamin oder neulich Narcopon-scopolamin als ein Hilfsmittel für die Narcose injiziert, welches niemals eine gefährliche Nebenwirkung auf das Leben ausübt. Man kann sogar dadurch, dass man das Hilfsmittel geschickt benützt, beim Hauptnarkosemittel merklich sparen.

6. Die Zeitdauer der Operation hat weder bei Lumbalanästhesie noch bei all-

gemeiner Narcose auf den ersten Flatusabgang einen Einfluss.

7. Die Aufenthaltszeit im Krankenhaus beträgt durchschnittlich 25 Tage für eine Kranke, und zwar ist sie am längsten bei Krebsoperation und am kürzesten bei Cystenoperation.

8. Die primäre Wundheilung der Bauchwand beträgt 93.7% in meinen Operationsfällen.

9. Die Todesfälle bei allen Laparotomien betragen ca 4%, und zwar sind sie am häufigsten bei Krebsoperation und am seltensten bei Cystenoperation.

(Autoreferat.)

内 容 目 次

第1章 緒 言

第2章 手術方法

第1項 手術前處置

第2項 手術式

第3項 手術後處置

第3章 疾病別統計

第1項 子宮癌腫

第2項 子宮筋腫

第3項 子宮外妊娠

第4項 卵巢囊腫

第5項 其ノ他ノ手術例

第4章 麻酔統計

第1項 全身麻酔

第2項 局所麻酔

第3項 混合麻酔

第4項 麻酔補助藥

第5章 手術成績統計

第1項 手術式統計

第2項 手術所要時間統計

第3項 腹壁創面癒合統計

第4項 手術後入院日數統計

第5項 死亡率統計

第6項 再 發

第6章 總括及ビ結論

第1章 緒 言

予ハ、明治45年1月ヨリ昭和7年12月ニ至ル21年間ニ於テ、婦人科産科の開腹手術患者、1120例ヲ有ス、然レドモ、記載不明瞭ノモノアリ、又大正3年度病床日誌一部紛失セル爲、其ノ記載明瞭ナルモノノミヲ選ビ1018例ニ就キテ統計のニ觀察セシテ以テ、茲ニ報告セントス。

抑、手術ノ統計タルヤ甚ダ難事ニ屬ス、是レ蓋シ、疾病ノ多種多様ナルト、又一ハ同様ノ疾病ニテモ個人的ニ差異アリ、又疾病ノ程度ニヨリテ、手術操作ニ難易アリ。從ツテ手術時間ニ長短ヲ生ジ、又術者及ビ助手ノ巧拙

等ニヨリテ、手術ノ經過ニ影響ス。故ニ眞ノ統計ハ、殆ド、不可能ナリ。

予ハ、自己ノ手術例ヲ總括的ニ、又各疾病別ニ觀察シテ、手術ト麻醉ノ關係、手術式ト時間ノ關係及ビ手術成績等ニ就キ、統計的ニ調査セリ。

第2章 手術方法

予ハ、統計調査ノ報告ニ先ダテ、從來予ノ採リタル手術方法ニ就キ、大略ヲ述ベントス。

第1項 患者ノ手術前處置

(A) 患者身體ノ検査

手術ニ當リテハ、局所的ニ診斷ヲ確實ニシ、合併症ノ有無及ビ其ノ状態ヲ精査シ、全身のニハ、企圖セル手術ニ堪ヘ得ルヤ、又豫後ニ惡影響ヲ及ボスベキ障碍ナキカヲ検査セリ。殊ニ循環器、呼吸器、泌尿器ノ異常、血友病ノ有無ヲ顧慮シ、時トシテハ、内外科的ニ權威アル専門醫ノ意見ヲ徵シタリ。而シテ斯ク全身の検査ノ結果、手術成績ニ影響ヲ及ボスベキ障碍ヲ發見セバ、直ニ適當ナル處置ヲ施セリ。例之、心臟機能障碍アル者ニハ強心劑、榮養不良ニハ滋養劑、甚シク神經質ナル者ニハ鎮靜劑ヲ投與セリ。尙ホ糞便中ニ寄生蟲卵ヲ有スル者ニハ驅蟲ヲ行ヘリ。

(B) 被手術患者身體ノ準備

以上ノ局所的竝ニ全身の検査ヲ經テ開腹手術ヲ行フベク決定シタル患者ハ、手術ノ前日夕方、「リチネ」油 20cc (大人)、赤酒 10cc 桂皮油數滴ヲ合シタルモノヲ頓服セシメ、手術當日早朝石鹼灌腸ヲ行ヒ、且當日ノ朝晝2食ヲ絶シ胃腸内容ヲ空虛ナラシム。尙ホ下腹部

及ビ外陰部ヲ剃毛セリ、下腹ノ「フオルマリン」濕布ハ之ヲ行ハズ。

(C) 消毒法

I. 術者手指ノ消毒

之ハ Fürbringer 氏ノ方法ヲ基礎トシテ、次ノ如ク行ヘリ。

- (1) 爪ヲ切り其ノ先端ヲ鑢ニテ圓滑ニシ、消毒刷毛ニ石鹼精ヲ灌ギ、高溫滅菌流水ノモトニ手指ヲ肘關節ノ上方ニ至ルマデ摩擦ス。(2—3 回刷毛ヲ交換ス、約5 分間)
- (2) 爪牀ノ汚物ヲ鑢ノ尖端ニテ除去ス。
- (3) (1) ノ方法ヲ繰返ス。(約5 分間)
- (4) 60%酒精ニ浸セル刷毛ニテ摩擦スルコト約3 分間。
- (5) 1000倍昇汞水中ニテ之ニ浸セル刷毛ニテ摩擦スルコト約5 分間。
- (6) 1%「リゾール」又ハ「ラーボン」水中ニ浸セル刷毛ニテ摩擦スルコト約1—2 分間。
- (7) 乾燥セル滅菌「ガーゼ」ニテ水分ヲ拭ヒ去リ、毛筆ヲ以テ爪牀ニ沃度丁幾ヲ塗布シ、消毒シタル「メリヤス」製手袋ヲ着ス。然ル後、消毒シタル帽子、口掩及ビ手術衣ヲ着ス。

II. 腹壁ノ消毒

之ハ手指ノ消毒ト同様ニシテ、次ノ如クセリ。

- (1) 消毒シタル刷毛ニ石鹼精ヲ灌ギ、腹壁ノ皮膚ヲ摩擦ス。
- (2) 微溫トナシタル 1%「ラーボン」液又ハ「リゾール」液 1.000cc ヲ腹壁ニ灌ギツツ、刷毛ヲ用ヒテ之ヲ摩擦ス、此際、臍ノ垢ヲ除去ス。

(3) 微温 0.1% 昇汞水 1,000 cc を用ヒテ前法ヲ繰返ス。

(4) 再ビ (2) ノ方法ヲ行ヒテ昇汞ヲ除ク。

(5) 消毒「ガーゼ」ニテ腹壁ヲ拭ヒ、廣ク上腹部及ビ大腿内面ニ至ル迄沃度丁幾ヲ塗布ス。次ニ乾燥滅菌「ガーゼ」ヲ腹壁上ニ擴ゲ、「アルコール」ヲ以テ之ヲ潤ホス。

次ニ外陰部ヲ同様ニ消毒シ、次デ導尿ヲ行ヒ、腹部及ビ外陰部ヲ滅菌布ニテ包ミ、後、腰髓麻醉或ハ全身麻醉ニ移行セリ。

而シテ執刀ノ(開腹)直前ニハ今一度切開部ニ沃度丁幾ヲ塗布シ、乾燥後、「アルコールガーゼ」ニテ沃度ヲ拭除セリ。

但シ新鮮ナル子宮外妊娠中絶手術ノ如ク急速ヲ要シ、且腹部ニ壓力ヲ加フルコトノ不可ナル場合ニハ Grossich 氏沃度丁幾塗布法ヲ行ヒタリ。

III. 外陰部及ビ腔ノ消毒

之ハ子宮癌腫其ノ他ノ場合ニテ、子宮全別出ノ必要アル場合ニハ、腹部ノ他、外陰部及ビ腔ノ消毒ヲ行フ。

(1) 外陰部ヲ剃毛シ、消毒棉花ニ石鹼精ヲ灌ギ、外陰部及ビ腔粘膜ヲ摩擦ス。

(2) 微温 1% 「ラーボン」液 1,000 cc を灌ギツツ外陰部及ビ腔粘膜ヲ消毒棉花又ハ滅菌「ガーゼ」ニテ摩擦ス。

(3) 微温 0.1% 昇汞水ニテ、前法ノ如ク摩擦ス。

(4) 再ビ (2) ノ方法ヲ繰返シ、外陰部及ビ腔粘膜ヲ乾燥滅菌「ガーゼ」ニテ能ク清拭ス。

(5) 60% 酒精ヲ滅菌「ガーゼ」ニ浸シ、之ヲ

腔腔ニ挿入ス。

其ノ他近時ハ、單ニ沃度丁幾塗布方法ヲモ行ヘリ。

IV. 器械及ビ手術材料ノ消毒

(1) 金屬製器具ハ煮沸消毒ヲ行フ。

(2) 「ガーゼ」、棉花、手袋、敷布等ハ Schimmelbusch 氏消毒罐ニ入レ、蒸氣消毒ヲ行フ。

(3) 縫合絲ノ消毒

(a) 絹絲又ハ麻絲ハ 10—15 分間 煮沸消毒シ、後 60% 酒精中(時トシテ 3% 石炭酸中)ニ貯フ。

(b) 銀線ハ用ニ臨ミ、煮沸消毒ス。

(c) 腸線ハ之ヲ輪狀ノ束トナシ、「エーテル」中ニ浸スコト 24 時間、次イデ之ヲ 5% 「フオルマリン」水中ニ浸スコト 4 晝夜、後之ヲ 0.8% 生理的食鹽水中ニ 1 晝夜浸シ、「フオルマリン」ヲ除ク、後、0.1% 昇汞酒精(94%)中ニ 1 晝夜、爾後、毎 1 週間目ニ昇汞酒精液ヲ交換シテ保存ス。

第 2 項 手術式

14 例ノ腔式開腹手術ヲ除キ、他ハ總テ腹式開腹手術ヲ行ヘリ。而シテ腹式開腹ハ、其ノ大多數ニ於テハ縱切開法ニ從ヒ、只少數ニ於テノミ、Pfannenstiel 氏横切開(十字切開)ヲ行ヘリ。

腹式開腹術ニアリテハ、縱切開ハ總テ中線切開法ヲ採リ、切開ノ長サハ、病類ニヨリテ異ナレドモ、多クノ場合ニ臍下 1—2 指横徑ノ所ヨリ、耻骨縫際ノ上部ニ至リ、更ニ大ナル切開ヲ要スル場合ニハ、之ヲ臍ノ左方ヨリ上

方ニ延長セリ。

横切開ハ、左右腸骨前上棘ヲ通ズル、上方ニ凹ナル弓狀曲線ヲナセル皮膚皺襞ニ沿ヒ、約10 cmノ切開ヲ加ヘタリ。

腹壁ノ縫合ハ、腹膜ト筋膜トニハ、腸線又ハ絹絲ノ連續縫合ヲ行ヒ、皮膚ニハ、絹絲ノ結節縫合又ハ銀線ノ纏絡縫合ヲ行ヘリ。而シテ縦切開ト横切開トヲ間ハズ、經産婦ノ總テ及ビ未産婦ニテモ、腹直筋ノ離間甚シキモノニハ、常ニ筋膜縫合ノ前ニ、腹直筋ニ腸線ノ結節縫合ヲ、2—3箇所ニ於テ行ヘリ。

腔式開腹術ハ、前及ビ後腔開腹術竝ニ輪狀腔切開法ニ從ヘリ。

第3項 手術後處置

A. 局所創傷療法

(1) 腹壁ノ壓迫。 腹式開腹術ニアリテハ、手術後、腹部ノ創面ニ3—4枚ノ消毒「ガーゼ」ヲ貼シ、之ヲ繃帶液ニテ固定シ、腹部ニハ輕キ壓迫繃帶ヲ施シ、腹上ニ離被架ヲ置ク。

(2) 繃帶交換。 術後ノ經過良好ナル場合ニテモ、術後第3—4日目ニ第1回繃帶交換ヲ行フ。

先ヅ、1%「リゾール」水、次デ酒精ヲ浸シタル棉花ニテ、輕ク創面ヲ清拭シタル後、創面接觸ノ模様、創面分泌物ノ有無、殊ニ刺管炎又ハ化膿ノ有無ヲ檢シ、刺管炎アル場合ニハ、鑷子ニテ、刺管ヲ壓搾シテ、其ノ分泌物ヲ排除清拭シ、化膿アレバ、其ノ部ノ縫合絲ヲ拔絲シ、創面ヲ開キテ充分排膿セシム。

創面ニ異常無キ時ハ、清拭後、直チニ

3—4枚ノ滅菌「ガーゼ」ヲ置キ、更ニ廣キ滅菌「ガーゼ」ニテ覆ヒ、之ヲ繃帶液ニテ固定セリ。但シ發熱又ハ創面ノ疼痛ヲ訴フル場合ニハ、第2日ニテモ、交繃ヲ行ヘリ。

次ニ子宮痙攣ノ全剔出ノ場合ニハ、骨盤腔ノ創面ニ沿ヒテ、腹膜外「ガーゼドレーン」ヲ腔腔ニ至ルマデ施シ、毎日又ハ隔日ニ、之ヲ交繃セリ。

B. 一般療法

(1) 食事。 手術後第1回放屁アル迄ハ、絶食セシムルヲ原則トセリ、但シ、最近ヨリハ、消化器障礙ナキモノニハ、第2日ヨリ少量ノ重湯ヲ與ヘ、第1回放屁ヲ見タル時ヨリ、粥食ニ移行セシメ、約1週間後（抜絲後）ヨリ常食ニ復セシメタリ。

(2) 大便通。 術後第3日目ニ至リ、第1回放屁アリテモ、便宜ナキ時ハ、「グリセリン」灌腸ヲ行ヘリ、此際、石鹼液等ノ高位灌腸ヲ避ケタリ。蓋シ、術後、放屁ナク、腸ノ尙ホ多少麻痺状態ニアル場合ニハ高位灌腸ハ却テ、鼓腸ヲ膨大セシムルコトアレバナリ。故ニ便通ナクシテ、而モ鼓腸アル時ニハ、予ハ直腸「カテーテル」ヲ用ヒテ排氣セリ。之ニテ排氣セズ、鼓腸依然トシテ甚シキ時ニハ、挿入「カテーテル」ヲ其ノ儘肛門ニ固定シ置キ腹部ニ熱氣浴（最近ハ「デアテルミー」浴）ヲ行ヒ、又ハ「ベリスタルチン」、「ビツイトリン」等ヲ注射セリ。

「ビツイトリン」ハ鼓腸ニ對シテハ、緩和的ニ奏效スルガ如キモ、「ベリスタルチ

ン」ハ急ニ腸ノ蠕動ヲ起シ、爲ニ却テ腸閉塞ノ症状ヲ呈シタル1例アリ。

サレド、斯ル注射薬ノ必要ヲ認メタルコト甚稀ナリ。

(3) 尿利。 凡ソ術後ノ尿利ハ、仰臥位ニテ安靜ヲ保ツト、一ハ平素仰臥位ニテ排尿ノ經驗ナキ爲ニ、自ラ排尿シ得ルモノモ、術後ニハ自利シ得ザルコト多シ。殊ニ神経質ノ婦人ニ於テ然リ。斯ル場合ニハ、膀胱麻痺ト誤マルコトアリ、故ニ余ハ開腹手術患者ハ、必ズ術前ニ於テ、仰臥位ニテ排尿スル習慣ヲ付シ置ケリ。斯クシテモ、術後10時間ニシテ自然排尿ナキ時ハ導尿セリ。其ノ後引續キ尿閉アル時ハ8時間毎ニ導尿セリ。而シテ、膀胱麻痺ヲ認メタル場合ニハ、停留「カテテル」ヲ施シ、時々膀胱内ニ Baisch 氏法ニヨル注入ヲ試ミタリ。一般ニ尿閉アル時ニハ、予ハ「ヘサチラミン」ノ静脈内注射ヲ併用シテ、膀胱炎及ビ腎盂炎ノ襲來ヲ警戒セリ。

(4) 心臓衰弱。 開腹手術後、色々ノ原因ニヨリテ、心臓機能ノ衰弱ヲ起スヲ見ルコトアリ。斯ル場合ニハ、強心剤ノ注射及ビ「リンガー」氏液ノ静脈内又ハ皮下注射ヲ行ヘリ。近時斯ル場合ニ、「ロヂノン」液注射ヲ1日1—數回行ヒテ奏效セシコトアリ。

C. 離床期間

之ハ、術者ニヨリテ意見種々ナルモ、早期起立ト、後期起立トニ分ツ、予ハ術後第1日(術後24時間)ハ仰臥位ニテ絶對安靜ヲ守ラシメ、第2日(術後24—48時間)ハ脚ノ運動

ヲ患者ノ自由意志ニ任セ、且時々半仰臥位ニシ、背部、腰部及ビ脚部ヲ看護人ヲシテ輕ク摩擦セシム。斯クシテ術後第1回放屁ヲ認メタル時、即チ普通第3日目ニハ、全身ノ運動ハ、只、牀上ニ於テノミ、患者ノ自由ニ任ス。全部ノ拔絲ヲ終リタル日(普通8—10日目)ヨリ離牀セシムルヲ例トセリ。即チ予ハ、近時、安藤博士ノ唱道サルル早期體位變換法ニ從ヒテ離牀セシメタリ。

但シ、患者ハ無熱ニシテ、一般狀態可良ナルコトヲ條件トスルコトハ、論ヲ俟タザルトコロナリ。

第3章 疾病別統計

予ノ全手術例ヲ其ノ病名例ニ表記セバ次ノ如シ。即チ、第1表ニ觀ル如ク、最も多キハ、卵巢腫瘍手術ニシテ、312例ヲ有シ、全手術例ノ約 $\frac{1}{3}$ (30.6%)ヲ占ム。之ニ次グハ、子宮外妊娠中絶ニシテ212例(20.8%)ヲ有シ、次ニ子宮筋腫手術モ略ボ同數195例(19.2%)ヲ有シ、子宮癌腫ハ90例ニシテ、8.8%ヲ占ム。其ノ他ハ種々ナル疾病ニテ開腹セシモノノ總括ニシテ209例(20.5%)アリ。

第1表

全手術例ニ對スル各疾病ノ頻度

手術病名	患者數	%
子宮癌腫	90	8.8
子宮筋腫	195	19.2
卵巢腫瘍	312	30.6
子宮外妊娠中絶	212	20.8
其 他	209	20.5
計	1018	Ca 100

第1項 子宮癌腫

子宮癌患者ハ、90名ノ手術例ヲ有シ、開腹手術全例ノ8.8%ヲ占ム。今之ヲ子宮體部癌ト頸部癌トニ二大別スレバ、體部癌ハ12名ニシテ13%、頸部癌ハ78名ニシテ、87%ナリ。從來、内外諸家ノ統計報告ヲ觀ルニ、第2表Aニ示ス如ク、體部癌：頸部癌ノ%ハ、種々ニ列擧セラルルモ、佐藤氏ノ2:98ヨリ、

Winter氏ノ11—12:89—88又ハGampermann氏ノ16:84アリ、又Scheib氏ノ13:87アリ、要スルニ頸部癌ハ體部癌ニ比シ、著シク多數ナリ。予ノ例ニ於テモ、諸家ノ統計ニ一致セルモ、頸部癌ハ體部癌ニ比シ、諸家ノ統計ヨリモ、割合ニ多ク、同表ニ觀ル如ク、高率ヲ示シ、Scheib氏ノ統計ト同様ニシテ13:87ヲ示セリ。

第2表 A. 全子宮癌ニ對スル體部癌ト頸部癌トノ比

報告者	體部癌	頸部癌	報告者	體部癌	頸部癌
Gelbhard	6%		藏光	7.35%	92.65%
Küstner	9.4%		佐藤	2%	
Hofmeier	11%		山室	5.2%	
Koblanck	10.4%		Frank	6.2%	
Henkel	12%		Olshausen	12%	
Scheib	13%		A. Mager	18.8%	
Winter	11—12%		Gebhard u. Weibel	5.0%	
Schottländer	7.5% 10%		Zweifel	8.0%	
Gampermann	16%		著者	13.0%	87%
Fehling	9%		/	/	/
鈴木	2.96%	96.62%	/	/	/

次ニ、子宮癌腫ト年齢トノ關係ヲ觀ルニ、本症ハ、一般ニ高年者ニ多ク、30歳以下ノモノニ寡ナシ。今之ヲ體部癌ト頸部癌トニ分チテ、年齢のニ其ノ頻度ヲ比較スルニ、第2表Bニ觀ル如ク、獨逸ニ於ケル統計ニヨレバ、頸部癌ハ40年代ニ最モ多ク、33.7%ヲ示シ、次ハ30年代及ビ50年代ニシテ、各24%ヲ示セリ。體部癌ハ50年代ニ最モ多クシテ50%ヲ占メ、次ハ40年代ナリ。

我國ニ於テハ、藏光及ビ佐藤氏ノ統計ハ之ニ一致セルモ、鈴木氏ノ統計ハ之ト異ナリ、體部癌モ亦、40年代ニ最モ多シ。頸部癌ハ諸家ノ說ト一致ス。予ノ統計ニ於テハ、頸部癌ハ40年代ニ最モ多クシテ41%ヲ示ス。是レ獨逸及ビ内地諸家ノ報告ト一致スルモ、體部癌ハ、50年代ニ最モ多クシテ40年代ニ最モ多ク、50%ヲ示セリ。是レ鈴木氏ノ統計ト一致シ、諸家ノ報告ト異ナレリ。

第 2 表 B. 子宮體部癌ト頸部癌トノ年齢的頻度

發生部位 報告者	體 部 癌 (%)						頸 部 癌 (%)						
	20以下	20年代	30年代	40年代	50年代	60年代	20以下	20年代	30年代	40年代	50年代	60年代	70年代
獨逸ノ統計				20.8	50.0	17.3			24.0	23.7	24.0		
藏 光		3.3	13.3	33.3	50.0			8.2	35.3	38.8	16.7		
鈴 木			17.9	46.4	21.4	14.3		6.1	33.3	38.1	19.3	2.6	0.1
佐 藤				21.4	64.3	14			25	40	23.9		
著 者			16.7	50.0	25	8.3	1.3	6.4	38.5	41.0	11.5	1.3	

備考 1. 數字ハ % ヲ示ス.

2. 獨逸ニ於ケル統計ハ Hofmeier ノ統計及ビ Gusseraw, Koblanck 氏ガ夫々諸家ノ報告ヨリ得タル統計ヲ更ニ平均シタル結果ナリ.

次ニ子宮癌腫患者ノ平均年齢ヲ觀ルニ、次ノ如シ.

佐 藤 氏	西 島 氏	山 室 氏	相 馬 氏	藏 光 氏	鈴 木 氏
【52年7月（體部）	50年5月（體部）	49年9月（體部）	44 年 2 箇月	41 年 4 箇月	42 年 7 箇月
45年3月（頸部）	42年4月（頸部）	43年7月（頸部）			

予ノ統計ニヨレバ、平均年齢ハ45歳ニシテ、上記諸家ノ統計ヲ平均セシ數ニ相當ス.

癌腫ニ妊娠ヲ兼ネタルモノ3名(3.3%)アリテ、2箇月、4箇月及ビ6箇月ノ妊娠ナリキ。3例共腹式子宮全別出術ヲ施シ、母體ヲ救ヒ得タリ。此3例ノ分娩回数ヲ檢スルニ、第1例ハ9回、第2例ハ7回、第3例モ7回ノ分娩ヲ經過セリ。

從來、子宮癌腫ニテ妊娠ヲ兼ネタルモノノ大部分ハ經産婦ニシテ、3回以上ノ經産婦ニ比較的多シトセラルル、予ノ3例ニ就テ見ルモ、何レモ3回以上ノ多産婦ナリキ。

第2項 子宮筋腫

子宮筋腫ノ全手術例ハ195名ナリ。子宮ノ發生部位ニヨリ、之ヲ體部筋腫ト頸部筋腫トニ分テバ、子宮癌腫トハ反對ニ、體部筋腫ハ頸部筋腫ニ比シテ、著シク多シ。即チ體部筋腫ハ182例ニシテ、頸部筋腫ハ13例ナリ。又全子宮筋腫ニ對スル頸部筋腫ノ百分率ヲ舉グレバ、第3表A.ニ觀ル如ク、ザルヴェー氏ノ3%ヨリ、グイヨン氏ノ16%ニ至ル種々ノ數ヲ示スモ、之ヲ平均スル時ハ7%トナル、予ノ統計ニヨレバ、6.6%ニシテ、此平均%ニ近似シ、殊ニフランクル氏ニ、略ボ一致セリ。

第 3 表 A.

頸部筋腫ノ全子宮筋腫ニ對スル頻度(%)

フ ラ ン ク ル	6.9%
シ ヤ ウ タ ー	4.1%
ウ イ ン ケ ル	5.0%
シュレーデルシヨルレル	8.08%
ガ ル キ ッ シ ュ	4.5%
バ ラ バ ン	5.0%
グ イ ヨ ン	16.0%
安 藤	12.5%
山 崎 (正 董)	4.29%
サ ル ザ エ ー	3.0%
シ ヨ ル レ ル	8.0%
著 者	6.6%

又、筋腫ノ子宮壁ニ對スル發生部位ヨリ、之ヲ間質性、漿膜下性及ビ粘膜下性ノ3種ニ區別シテ觀察スルニ、第3表B.ニ觀ル如ク、其ノ統計成績ハ區々ナルモ、ウキンテル氏ヲ除キテハ、間質性發生ガ最多數ナルコトハ、一定セル所ナリ。予ノ例ニ於テモ、間質性筋腫ハ大多數ヲ占メ、81.1%ヲ示セリ。此百分率ハ、稍々高キニ過グルガ如キモ、予ノ例ニ於ケル筋腫ノ總數ハ、開腹手術ニヨリテ、剔出シタルモノノミニシテ、粘膜下筋腫ノ小ニシテ莖ノ細長ナルモノハ、開腹セズシテ、腔ヨリ捻取術ニヨリテ治療セシモノ少數アリ、斯ル例數ヲ本表ニハ含マザルガ故ニ、統計成

績ハ稍々當ヲ缺クベシト思惟スルモ、間質性ノモノノ最多數ナルコトハ事實ナリ。

第 3 表 B.

全子宮筋腫ニ對スル筋腫發生部位ノ頻度

子宮筋腫ノ 發生部位 報 告 者	間質性	漿膜下性	粘膜下性
山崎正董	43.5%	22.1%	18.4%
Sarway	37.5%	8.6%	9.4%
Garkisch	44.8%	23.3%	16.2%
Gusserow	56.5%	32.1%	11.3%
Hofmeier	68.8%	11.4%	19.6%
Winter	24.8%	45.8%	19.3%
著 者	81.1%	10.2%	8.7%

次ニ子宮筋腫ト年齢トノ係トヲ觀ルニ、第3表C.ノ如ク、諸家ノ報告ハ、40年代ニ最も多ク、Ca 37—55%ヲ示シ、30年代之ニ亞ギ、Ca 29—43%ヲ示シ、20年未満及ビ60年以上ニハ甚稀ナリ。予ノ成績モ亦之ニ一致シ、40年代ハ60.6%ヲ示シ、30年代之ニ亞ギ、22.3%ナリ。元來、子宮筋腫ハ、急性ニ發生スルモノニ非ザルヲ以テ、本成績ハ、安藤博士ノ說ノ如ク、40年代ニ最も多ク發見サルル事實ヲ示スモノニシテ、必ズシモ40年代ニ最も多ク發生スルモノニハ非ザルベシ。

第 3 表 C. 子宮筋腫ノ年代別

年 齡 別 報 告 者	20 年以下	20 年代	30 年代	40 年代	50 年代	60 年代
山 崎 (163例)	0%	24.5%	42.94%	47.24%	7.36%	0%
Gusserow (953例)	1.6%	17.0%	38.8%	36.7%	3.9%	1.8%
Schuhmacker (189例)	0.5%	9.5%	29.6%	44.8%	13.2%	2.4%
Schröder	0.25%	7.5%	28.69%	51.0%	11.77%	1.0%
Kleinhaus	0.2%	2.7%	29.5%	54.8%	10.5%	1.9%
著 者	0%	2.6%	22.3%	60.6%	13.4%	1.1%

子宮筋腫患者ト、其ノ分娩數トノ關係ヲ觀ルニ、予ノ統計ハ、次表ニ示スガ如ク、總筋腫患者ノ過半數(52%)ハ未產婦ニシテ、1回分娩之ニ亞ギ(14.5%)、2回經產婦ハ10.9%ヲ占メ、3回經產婦ハ8.1%ニシテ、4—5回經產婦ハ甚少シ、6回以上ノ經產ハ9%ニシテ、稍々多キガ如キモ、6回以上、各回ノ總

和ナリ。要スルニ、トロエル氏ノ統計(次表)ト近似シ、未產婦ノ次ハ一兒性不妊症ニ最も多ク、分娩回數ヲ増スニ從ツテ、筋腫發性ノ頻度ハ次第ニ減少ス。然レドモヒンデルマン氏ハ、子宮筋腫ト、妊娠トノ間ニ特別ノ關係無シト云ヘリ。

子宮筋腫ト分娩回數トノ關係

分娩回數 報告者	0	I	II	III	IV	V	VI以上
ト ロ エ ル	61.1%	9.8%	9.5%	6.9%	3.9%	1.6%	/
予 ノ 例	52.0%	14.5%	10.9%	8.1%	3.6%	1.1%	9.0%

子宮筋腫兼妊娠ノ1例アリ、47歳ノ2回經產婦ニシテ、妊娠第3箇月末ナリキ、最終分娩後、18年ヲ經過セシ者ニシテ、慢性腎炎及ビ糖尿病ヲ合併セリ。腹式腔上部切斷術(ボロー氏手術)ヲ行ヒ、術後ノ經過ハ良好ナリキ。

又經產婦ニ於テ、最終分娩後、筋腫發見マデノ年數ヲ觀ルニ、最終分娩後、多クノ年月ヲ經タルモノニ多ク發見セラル。換言スレバ、續發性不妊症ニ多シ、即チ第3表D.ニ示ス如ク、分娩後11年乃至20年ヲ經タルモノニ最も多クシテ、過半數ヲ占メ、56.8%ナリ。6—10年ヲ經タルモノ之ニ次ギ16.9%ヲ占メ、21—25年ヲ經タルモノハ11.3%ニテ、1—5年ヲ經タルモノハ僅ニ9.4%ニ過ギズ、而シテ、26年以上ヲ經タルモノハ5.6%ナルモ、之ハ年齡ノ關係上當然ナリ。

筋腫患者ガ、妊娠シタル場合ニ、其ノ中絶ノ頻度ハ、非筋腫妊婦ヨリモ遙ニ大ニシテ、

第3表 D.

最終分娩後、筋腫發見迄ノ年數

1—5年	9.4%
6—10年	16.9%
11—15年	28.4%
16—20年	28.4%
21—25年	11.3%
26年以上	5.6%

アウステルリッツ氏ハ、26.5%(非筋腫妊婦9.4%)ナリト言ヒ、山崎氏ハ31.6%(非筋腫妊婦18.4%)ナリト云ヘリ。然レドモ、妊娠末期迄持續スルモノモ少ナカラズ。予ハ筋腫兼妊娠ノスル例證ヲ實驗シ得ザリキ。

第3項 子宮外妊娠

子宮外妊娠ハ、往時ハ、甚稀有ナル疾病ト稱セラレシモ、近時著シク其ノ數ヲ増シ、予ノ本症手術例ハ、212例ニシテ、全開腹手術例

ノ 20.8% ヲ占ム。就中、2 名ノ卵巣妊娠ヲ除キ、他ハ總テ輸卵管妊娠ナリキ、殊ニ興味アル 3 例ハ、壺腹部妊娠(3 箇月)ニテ、將ニ破裂セントスル状態ニアリシモノ 1 例及ビ輸卵管間質性妊娠中絶ノ例及ビ腹腔妊娠ノ 1 例之ナリ。

輸卵管妊娠中絶ニテハ、次表ニ示スガ如ク、破裂(外破裂)ハ 25 名ニシテ 12.8%、流産(内破裂)ハ 185 名ニシテ 87.2% ヲ占ム。即チ、流産ハ破裂ヨリモ著シク多シ。

輸卵管流産ト破裂トノ比較

中絶別 報告者	流 産	破 裂
Küstner	75%	16.0%
Lindenthal	81.0%	18.0%
Döderlein	52.0%	2.0%
酒 井	69.0%	23.0%
著 者	88.1%	11.9%
	平均 69.2%	平均 12.2%

此點ハ諸家ノ統計ト一致スルモ、予ノ例ニテハ、流産率ガ諸家ノ率ヨリモ割合ニ大ナリ。即チ、流産:破裂ハ、Küstner 氏ハ 75:16% Lindenthal 氏ハ 81:18, Döderlein 氏ハ 52:2 酒井氏ハ 69:23 ナリト云ヘリ。予ノ例ニテハ、破裂ノ率ハ、諸家統計ノ平均率ト一致スルモ、流産率ハ、諸家統計ノ平均率ニ比シテ大ナリ。

子宮外妊娠中絶ハ、妊娠ノ極初期ニ於テハ流産多ク、妊娠月數ノ進ムニ從ヒテ破裂ノ數ヲ増ス。予ノ例ニアリテハ、妊娠 1 箇月及ビ 2 箇月ニテハ、流産 160 名(92.1%)、破裂 10 名(5.9%)ニシテ、其ノ後ハ、流産 25 名(62.5%)、破裂 15 名(37.5%)ナリ。

破裂ハ峽部妊娠ニ多ク、流産ハ壺腹部妊娠ニ多ク見ラル。酒井氏ニヨレバ、壺腹部妊娠

ニテハ、流産 85.7%、破裂 14.0% ナリ。又峽部妊娠ニテハ、流産 18.1%、破裂 81.8% ナリト。

子宮外妊娠患者ノ年齢ヲ見ルニ、第 4 表 A. ニ觀ル如ク、30 年代ニ最モ多ク、約 60% ヲ占メ、20 年代之ニ亞ギ、約 26% ヲ占メ、40 年代ハ 13.8% ヲ占ム。20 歳未満及ビ 50 歳以上ニ少キハ當然ト云フベシ。

諸家ノ統計ニヨルモ、第 4 表 B. ニ見ル如ク、30 年代ニ最モ多ク、20 年代之ニ次グ。

予ハ 20 歳未満ノモノ(18 歳、未産婦、輸卵管妊娠破裂)ニ 1 例ヲ觀タリ。

第 4 表 子宮外妊娠年齢別表

A. 著者ノ統計

例 數 年齢別	人 數	百 分 率
20 年未満	1	0.5%
20 年 代	54	25.7%
30 年 代	125	59.5%
40 年 代	29	13.8%
50 年 代	1	0.5%

B. 諸家ノ統計

年齢別 報告者	21— 25年	26— 30年	31— 35年	36— 40年
磐 瀨	/	31.9%	29.3%	
酒 井	/	19.7%	35.1%	
Stamm	11.2%	31.9%	31.0%	22.4%
Runge	19.0%	30.4%	27.2%	19.6%
Dobbert		最多數		
Martin				
Küstner			最多數	
Döderlein				

輸卵管左側及ビ右側ノ妊娠例ヲ比較スルニ、予ノ例ニアリテハ、左右側トモ大差ナク、

左側 110 名ニシテ、52.4%，右側 100 名ニシテ、47.6%ヲ占メ、左側ノ方、稍々多シ。

諸家ノ報告ヲ觀ルモ、第4表 C. ニ示ス如ク、磐瀨氏及ビ其ノ他 13 氏ノ總括統計ノ成績ハ、右側 577 例、左側 581 例、酒井氏ハ、右側 54、左側 57 例、Stamm 氏ハ、右側 137 例、左側 143 例ニシテ、總括的ニ觀ルモ、左側ノ方、稍々多キガ如シ。

第 4 表 C.

喇叭管妊娠左右ノ別

左右別 報告者	左	右
磐瀨、外 13 氏	577	581
酒 井	54	57
Stamm	137	143
著 者	100	110
合 計	868	891

第 4 項 卵巢腫瘍

予ノ手術セル卵巢腫瘍ハ、總計 312 例アリテ、全開腹手術例中、最多數ニシテ 30.6%ヲ占ム。

第 1 目 卵巢囊腫

之ハ囊狀腺腫(假性「ムチン」性囊腫、漿液性囊腫)及ビ畸形腫ノ一タル、皮膚様囊腫ノ總括ニシテ、全卵巢腫瘍中、大多數ヲ占メ、其ノ總手術例ハ 300 例ニシテ、全開腹手術例ノ 29.4%ナリ。就中、重量 33.75 kgノ巨大ナル、多胞性假性「ムチン」性囊腫アリキ。

發生側ヲ觀ルニ、第 5 表 A. ニ示ス如ク、右側 137 例(45.66%)、左側 119 例(39.66%)ニシテ、右側稍々多シ。尙ホ同時ニ、兩側ニ發生セルモノ 44 例(14.66%)アリ。

發育ノ狀態ヲ觀ルニ、有莖性ノモノ 269 名

(89.66%)ニシテ、大多數ヲナシ、廣靱帶内發育 20 名(6.66%)、偽靱帶内發育ヲナセルモノ 11 名(3.66%)ナリキ。

第 5 表 A.

卵巢囊腫發生部位及ビ狀態(300名)

例 數		人 數	百分率
發生側 及ビ發生ノ狀態	右 側 左 側 兩 側		
囊腫ノ發生	右 側	137	45.66
セル卵巢側	左 側	119	39.66
發生狀態	兩 側	44	14.66
發生狀態	有 莖 性	269	89.66
	靱 帶 內	20	6.66
	偽靱帶內	11	3.66

卵巢囊腫ト年齡トノ關係ヲ觀ルニ、第 5 表 B. ノ如ク、30 年代ニ最モ多ク、31.4%ヲ占メ、20 年代ニハ稍々少ク、30.4%ヲ示シ、40 年代之ニ亞ギ、50 年以上ニハ稀ナリ。本症ハ弱年者ニ割合多ク、20 歳未滿ノモノニ 11 例(3.6%)アリ。就中、最弱年者ハ 10 歳ナリキ。

第 5 表 B.

卵巢囊腫ト年齡トノ關係(300名)

例 數 年齡別	人 數	百 分 率
20 年 未 滿	11	3.6%
20 年 代	91	30.4%
30 年 代	94	31.4%
40 年 代	67	22.4%
50 年 代	26	8.6%
60 年 代	8	2.6%
70 年 代	3	1.0%

卵巢皮膚様囊腫ハ、50 名アリテ、全卵巢腫瘍ノ 16.0%ヲ占メ、全卵巢囊腫ノ 16.7%ニ當ル。此成績ハ、我國ニ於ケル諸家ノ統計ト相近似シ、第 5 表 C. ニ示ス如ク、歐洲人ニヨル統計成績中、最高率ヲ占ムル Segalowitz 氏

ノ 12.67% ヨリモ多シ。是レ白哲人種ハ、他ノ人種ヨリモ、皮膚様囊腫少シ、ト言ヘル Strassmann 氏ノ見解ヲ裏書スルモノト謂ツベシ。

第 5 表 C.

皮様囊腫ノ全卵巣腫瘍ニ對スル頻度

日 本		歐 洲	
報告者	% 數	報告者	% 數
吉 田	12	Zweifel	5.7
山 田	11.6	Schauta	9.6
北 川	10.3	Fehling	7.1
芳 賀	30.0	Martin	9.9
池 田	25.0	Fritsch	8.99
緒 方	17.45	Lippert	10.35
佐藤(勤)	33.37	Pfannenstiel	11.0
佐藤(松)	23.0	Mühlenbein	11.0
山 崎	34.99	Segalowitz	12.67
著 者	16.0	/	/

副卵巣囊腫ハ 6 名ニシテ、右側發生及ビ左側發生、各 3 名宛ナリキ。

卵巣囊腫ニテ、妊娠ヲ兼ネタルモノ 16 名ニシテ、全卵巣囊腫ノ 5.3% ナリ。妊娠第 2 箇月ヨリ、第 5 箇月ニ至リ、2 箇月ノモノ 4 名、3 箇月ノモノ 5 名、4 箇月ノモノ 4 名、5 箇月ノモノ 3 名ナリ。此場合ニ於ケル囊腫ノ發生側ハ、右側 7 名、左側 8 名ニシテ、左右側ニ大差ナシ。又兩側發生ニカカハラズ、妊娠セルモノ 1 例アリキ。而シテ妊娠ニ合併スル卵巣囊腫中、最モ多キハ、皮膚様囊腫ナルコトハ、成書ニ記載サレ居レリ。予ノ例ニ於テモ、16 名ノ妊娠兼囊腫患者中、皮膚様囊腫ハ 6 例ノ多キヲ發見セリ。

第 2 目 卵巣癌腫

之ハ、上皮性腫瘍中惡性ノモノニシテ、予

ノ手術例ハ 5 例ニシテ、全卵巣腫瘍ノ 1.63% ニ相當ス。年齢ハ、30 年代ニ 3 名、40 年代ニ 2 名ナリ。何レモ良性卵巣囊腫ノ癌性變性ナリキ。

第 3 目 卵巣纖維腫

之ハ、良性ノ、卵巣結締織性ノ腫瘍ニシテ、予ハ、本腫瘍ト思フモノ 1 例ヲ見タリ。患者ハ、27 歳ニシテ、分娩ヲ經過セズ。外診上、下腹部ハ平等ニ膨大シ、上界ハ臍高ニアリ、腫瘤ハ、右側卵巣ヨリ發シ、過手拳大ニシテ、稍々球形ヲ呈シ、表面滑澤ニシテ、處々、膨隆シテ結節狀ニナレリ。且其ノ切面ハ、白色ヲ呈セリ。全卵巣腫瘍ノ 0.32% ニ當ル。諸家ノ統計ハ 1.5—2.0% ナリト云フ。

第 4 目 卵巣肉腫

之ハ、惡性ノ結締織性腫瘍ニシテ、全卵巣腫瘍ニ對スル頻度ハ、諸家ノ統計ヲ觀ルニ、Schröder 氏 1.6%, Fitzgibbon 氏 1.7%, Lippert 氏 2.5%, Pfannenstiel 氏 5.38%, Hofmeier u. Velits 氏 7.5% ナリ。予ハ 6 例ノ、肉腫ト思ハルル 1 例發性ノ卵巣腫瘍ヲ手術セリ。其ノ全卵巣腫瘍ニ對スル頻度ハ 1.9% ナリ。而シテ、其ノ多クハ若年者ニシテ、20 歳未滿ニ 2 名、20 年代ニ 2 名、他ハ 30 年代及ビ 50 年代ニ、各 1 名ニシテ、孰レモ急速ニ發育シ、1 例ヲ除キ、他ハ總テ、殆ド、腹腔ヲ充タセル狀態トナリ、腫瘍上界ハ、胸骨劍狀突起下、2 横指徑ニ達シ、腹水ヲ合併シ、全身衰弱可成リ高度ノモノナリキ。

1 例ハ、53 歳ノ 1 回經産婦ニシテ、腫瘤ハ割合ニ小ニシテ、鶏卵大ナリシモ、手術後 1

箇月ニテ再發ヲ見タリ。都合アリテ、患者ハ中途ニテ退院シタルタメ、其ノ後ノ經過不明ナルヲ遺憾トス。

又1例ニ、右側鼠蹊腺ニ鶏卵大ノ轉移ヲ認メタルモノアリ。

第5項 其ノ他ノ手術例

敍上疾病ノ外、種々ナル婦人科的疾患ノ爲メ、開腹手術ヲ施セシモノ209例アリ。(第6表參照)。

(1) 子宮附屬器炎

本症ハ、高度ノ、慢性輸卵管炎、又ハ、輸卵管卵巣炎ニテ、周圍ノ臟器ト癒着シ、所謂、炎症性附屬器腫瘍ヲ呈シ、種々ノ非手術的療法ヲ講ズルモ輕快セザル場合ニ手術セシモノノミニシテ、第6表ニ觀ル如ク、總數69例ヲ有シ、全手術例ノ、6.7%ヲ占ム。年齢ハ、30年代ニ最多ク、35名アリ。20年代之ニ次ギ、25名アリ。

(2) 全腔及ビ子宮脱出症

本症ノ手術例ハ、41名ニシテ、全手術例ノ4%ニ當ル。年齢ハ、40年代ニ最も多ク、50年代之ニ次グ。60年代ニ於テモ30年代ト同數ヲ示スハ、本例ニ特異ナル點ナリ。本症ハ、割合ニ高年者ニシテ、且勞働者ニ多キヲ以テ、予ハ、腔整形術ト同時ニ、子宮腹壁固定術、又ハ子宮舉上術(Doléris)ヲ行ヘリ。

(3) 癒着性子宮後屈及ビ後傾症

之ハ、子宮、又ハ周圍臟器ノ炎症ノ結果、

子宮ハ後屈下垂シ、且、周圍ニ堅ク癒着シ、爲ニ、働作又ハ性交時ニ、甚シク苦痛ヲ訴フルモノニ開腹手術セシ場合ニシテ、19例(1.8%)アリ。

(4) 高度慢性子宮實質炎

本症ハ、理學的療法及ビ藥劑の療法ニテ輕快著シカラザルモノニ開腹セシモノニシテ19例ヲ有ス。但シ、本症ノ中ニハ、之ヲ子宮筋腫ト臨牀的ニ誤診サレシモノ數例ヲ含ムコトヲ遺憾トス。

(5) 輸卵管水腫 14例(1.3%)

(6) 卵巣輸卵管囊腫 13例(1.2%)

(7) 惡性脉絡膜上皮腫 8例

(8) 人工避妊手術 8例

(9) 葡萄狀鬼胎 4例

本例ハ總テ、所謂、惡性葡萄狀鬼胎ニ屬スルモノニシテ、子宮内容ヲ除去スルノミニテハ、有害無益ナルモノノミナリ。總テ子宮全剔出ヲ施セリ。

(10) 帝王切開手術 2例

本症ノ1例ハ骨軟化症性狹窄骨盤ノ妊婦ニ本法ヲ施シテ、母兒共ニ健ナルヲ得タリ。他ノ1例ハ、廣汎性癰痕性腔狹窄ノ妊婦ニ本法ヲ施シ、同様ニ、母兒共ニ健ナルヲ得タリ。

(11) 其ノ他ハ第6表ニ示ス如ク、種々ノ疾病ノ爲ニ開腹手術セシモノニシテ、1例乃至2例宛ヲ有ス。

第 6 表 種々ナル疾病ノ手術例及ビ年齢ニ對スル關係

番 號	年 齡 別 病 名	20年 未滿	20年代	30年代	40年代	50年代	60年代	計	%
1	子 宮 附 屬 器 炎 (炎症性附屬器腫瘍)	/	25 名	35 名	7 名	2 名	/	69 名	6.7
2	腔及ビ子宮全脱出症 (子宮腹壁固定及ビ提舉)	/	2	7	15	9	8	41	4.0
3	癒着性子宮後傾症	/	8	5	6	/	/	19	1.8
4	高度慢性子宮實質炎	/	1	4	12	2	/	19	1.8
5	輸 卵 管 水 腫	/	3	7	4	/	/	14	1.3
6	卵 巢 輸 卵 管 囊 腫	/	1	3	9	/	/	13	1.2
7	惡性脉絡膜上皮腫	/	2	2	4	/	/	8	0.8
8	人 工 避 妊 術	/	4	4	/	/	/	8	0.8
9	葡 萄 狀 鬼 胎	/	/	/	4	/	/	4	0.4
10	帝 王 切 開 術	/	/	2	/	/	/	2	0.2
11	出 血 性「メトロパチー」	/	/	/	4	/	/	4	0.4
	輸卵管血腫 (非妊娠性)	/	1	/	1	/	/	2	0.2
	子宮及ビ輸卵管血腫 (腔 缺 損 症)	/	1	/	/	/	/	1	/
	術後腹壁「ヘルニア」	/	/	1	/	/	/	1	/
	腎 臓 囊 腫	/	1	/	/	/	/	1	/
	脾 臓 囊 腫	1	/	/	/	/	/	1	/
	腹壁人工造肛術(直腸癌)	/	/	/	/	/	1	1	/
	腹 腔 膿 瘍	/	/	/	/	1	/	1	/
計		1	49	70	66	14	9	209	19.6

第4章 麻酔統計

予ノ麻酔例ハ、總數786例アリ。手術患者中、只麻酔補助藥ノミヲ用ヒテ麻酔主藥ヲ施サザリシモノ及ビ手術薄ノ麻酔記載不明瞭ナルモノヲ除キタル殘數、786例ノ麻酔記事ニ就キ調査セリ。

第7表 A. ニ觀ル如ク、全身麻酔ヲ用ヒテ開腹手術セシモノ348名アリテ、其ノ内「クロロフォルム」ノミヲ用ヒシ場合317名、之ニ「エーテル」ヲ加ヘテ用ヒタル場合31名アリ。腰髄麻酔ヲ用ヒテ開腹手術セシ場合ハ、336名アリ。シュライヒ氏浸潤麻酔例ハ10名ニシテ、腰髄麻酔兼「クロロフォルム」全身麻酔ヲ施セシ例92名アリ。

第7表 A.

麻酔藥ノ種類	手術 人數	1人平均使用量	第1回 放屁時間
クロロフォルム	317	18cc	47
クロロフォルム 加エーテル	31	クロロフォルム15cc エーテル31cc	46
鹽酸トロバ コカイン	336	0.035g	51
シュライヒ氏液	10	/	35
鹽酸トロバ加 クロロフォルム	92	クロロフォルム10cc	56

第1項 全身麻酔

「クロロフォルム」ハ、新鮮ナルDuncan製ノモノヲ使用セリ。然レドモ、其ノ使用前ニハ、毎回、必ズ其ノ性状ヲ檢シ、其ノ優良ナルコトヲ認メタル後使用スルヲ例トセリ。

(1) 「クロロフォルム」

317名ノ「クロロフォルム」ノミヲ用ヒシ場合ニハ、其ノ1人ニ對スル使用量ハ、第7表

A. ニ示ス如ク、2.0cc乃至60.0ccニシテ、平均18.0ccナリ。

病名別ニ、各病例ニ就キ、平均使用量ヲ檢スルニ、第7表 B. ノ如ク、輸卵管卵巢囊腫ノ場合ニハ、使用量最少ク、12ccナリ。次ハ子宮附屬器腫瘍ニシテ、13cc、次ハ卵巢囊腫ニシテ、14cc、次ハ子宮外妊娠ニテ、16ccヲ要シ、子宮實質炎及ビ腔子宮脱出症ハ、同量ニシテ、18ccナリ。子宮筋腫及ビ癒着性子宮後傾症ニハ、平均、20ccヲ要シ、子宮癌腫ニハ19ccナリ。喇叭管水腫ノ場合ニハ、最少量ニシテ、27ccヲ要シタリ。

第7表 B.

病 名	手術時間	クロロ フォルム 平均使用量	第1回 放屁時間
子宮癌腫	100分 (50—150)	19cc (5—30)	53 (30—135)
子宮筋腫	76 (40—100)	20 (8—45)	45 (25—94)
卵巢囊腫	48 (20—90)	14 (2—60)	43 (7—94)
子宮外妊娠	68 (25—100)	16 (4—35)	44 (20—90)
子宮附屬器炎	100 (40—120)	21 (3—50)	50 (18—76)
子宮腹壁固定	30 (25—50)	18 (15—25)	37 (29—60)
子宮實質炎	130 (120—150)	18 (10—30)	43 (23—71)
癒着性 子宮後屈症	67 (60—80)	20 (9—45)	56 (24—82)
輸卵管水腫	48 (45—50)	27 (11—40)	51 (41—76)
子宮附屬器腫瘍	75 (60—90)	13 (8—18)	45 (36—65)
輸卵管卵巢囊腫	60	12	49 (40—100)
平 均	73 (20—150)	18 (2—60)	47 (7—135)

今、「クロロフォルム」量ト、術後第1回放屁時間トノ關係ヲ、各病名別ニ就キ觀ルニ、第7表B.ニ示ス如ク、「クロロフォルム」量、最少キ輸卵管卵巣嚢腫(平均12cc)ノ場合ニハ、術後平均、49時間ニシテ、第1回放屁ヲ見タリ。「クロロフォルム」最多キ輸卵管水腫(平均27cc)ノ場合ニハ術後平均、51時間ニシテ第1回放屁ヲ見タリ。即チ、「クロロフォルム」12ccノ時モ、27ccノ時モ、第1回放屁時間ニ大差ナシ。又子宮附屬器炎ノ場合ニハ、平均「クロロフォルム」量21ccニシテ、第1回放屁時間、50時間ナリ。然ルニ、之ヨリモ「クロロフォルム」量少キ子宮癌腫(平均19cc)

ノ場合ニハ、却テ、第1回放屁時間長ク、平均53時間ナリ。又全子宮脱及ビ子宮實質炎ノ場合ニハ、孰レモ、「クロロフォルム」同量(18cc宛)ヲ要シタルニ、第1回放屁時間ハ、前者ハ37時間、後者ハ43時間ヲ要シ、放屁時間ニ6時間ノ差アリ。要スルニ、全身麻酔ノ場合ニハ、使用「クロロフォルム」ノ多少ハ、第1回放屁時間ニ比例セズ。此關係ヲ曲線表ヲ以テ示ス時ハ、第8表ノ如シ。而シテ「クロロフォルム」全身麻酔ノ場合ニ於ケル、術後第1回放屁時間ハ、各例ヲ通ジテ、平均47時間後ナリ。

第8表 手術時間ト「クロロフォルム」量ノ第1回放屁時間ニ對スル關係

又手術例ノ、「クロロフォルム」使用量ヲ、次ノ5種ニ分チテ、「クロロフォルム」量ト、放屁時間トノ關係ヲ檢スルモ、次表ノ如ク、矢張り、「クロロフォルム」量ノ増加ハ、放屁時間ヲ遲延セシメズ。

「クロロフォルム」量	第1回放屁時間
1—9cc	50時間
10—19cc	50 〃
20—29cc	50 〃
30—39cc	42 〃
40cc以上	42 〃
平 均	47 〃

(2) 「クロロフォルム」及ビ「エーテル」ヲ混合使用セシ場合

此場合、其ノ各使用量ハ1人平均「クロロフォルム」15ccニシテ、「クロロフォルム」ヲ單獨ニ使用セシ場合ニ比シ、少々使用量ヲ節約セラルルモ、同時ニ、「エーテル」使用量ハ、平均31ccヲ要シタリキ。

此混合麻酔ノ場合ニ於ケル、術後第1回放屁ハ、平均46時間ナリキ。

(3) 「エーテル」ノミヲ使用セシ場合ニハ、1人平均使用量ハ40ccナリ。

第2項 局所麻酔

局所麻酔ニヨル手術例ハ、第7表A.ニ示ス如ク、346例アリ。就中、336例ハ、腰髄麻酔ニシテ、10名ハ、シュライヒ氏浸潤麻痺ヲ行ヒタリ。

(I) 腰髄麻酔

予ハ、開腹手術ニ際シ、腰髄麻酔ヲ施スニハ、常ニ患者ノ軀幹ハ、直立位トシ、注射部位ハ、主トシテ、第3腰椎間腔(時トシテ第

4、甚稀ニ第2腰椎間腔)ヲ選ベリ。而シテ此部ノ腰髄蜘蛛膜下腔ニ、麻痺藥ノ注入ヲ終レバ、直ニ患者ヲ約2—3分間、約30度ノ骨盤高位トナス。此際、同時ニ顔部ヲ、約5分間、前胸壁ニ(高キ枕ヲ入レテ)密着セシメ、以テ藥液ノ延髄上昇ヲ豫防セリ。骨盤高位約3分間ノ後、靜ニ水平位トナス。而シテ後、麻痺上昇シテ、臍部マデ及ビタル時、(注射後約7—10分後)始メテ執刀セリ。

腰髄麻酔全例336名ニ使用セシ藥品ハ、常ニ島久製ノ「アンブル」入、鹽酸「トロバコカイン」液ヲ使用セリ。「アンブル」入ノ藥品ハ、種々ノ副作用アリ、又ハ、其ノ效果弱シトナス者アルモ、予ハ常ニ之ヲ吟味シテ使用セシニ、多クノ場合、麻痺ノ目的ヲ達シ、且、不快ナル副作用ヲ認メザリキ。

鹽酸「トロバコカイン」ハ、1%乃至6%液1cc入ノ「アンブル」ヲ、使用前、昇汞水中ニ投ジ置キ、其ノ全量(1cc)ヲ5cc入ノ注射器ニ採リ、此中ニ脊髓液ヲ吸出シ、全量ヲ5ccトナシ、注射器内ニテ、能ク混和セシメ、器中ノ氣泡ヲ除去シ、(穿刺ノ際、脊髓液ノ1ccヲ流失セシム)之ヲ穿刺針ニ連結セシメ、極、徐々ニ全量ヲ注入シタル時ハ、急ニ穿刺針ヲ拔去ス。

高年者及ビ弱年者ニハ、注意シテ、少量ヲ用ヒタリ。本麻酔ノ絕對禁忌症ハ勿論、妊婦及ビ子宮外妊娠中絶ノ手術ニ際シテハ、予ハ、可及的、本法ヲ避ケ、全身麻酔法ヲ用ヒタリ。是レ妊婦ニハ、本法ハ時トシテ、不慮ノ危險ヲ惹起スルコトアルト、子宮外妊娠中絶ノ場合ニハ、全身麻酔ハ本法ニ比シ、身體ヲ動搖セシムルコト少キト、一ハ、少量ノ「クロロ

フオルム」ニテ手術シ得ルヲ以テナリ。

鹽酸「トロバコカイン」ノ使用量ハ、第9表 A. ニ示ス如ク、1回量ハ1—6% 液 1cc、即チ 0.01—0.06 g ニシテ、予ハ、開腹手術ニ際シ、多クノ場合 5% 液 1cc (0.05 g) ヲ使用セリ。コノ場合ハ 206 例ニシテ、又 4% 液 1cc ヲ用ヒシ場合ハ 61 例、又 6% 液 1cc ヲ用ヒタル場合ハ 23 例アリ。尙ホ麻酔補助藥ノ著シク奏效セル場合ニシテ、簡單ナル開腹手術ノ場合ニハ、1%、2% 乃至 3% 液 1.0cc ヲ用ヒタリ。而モ、1% 液ニテ、子宮癌全剔出術ヲ終リタル數例ヲ經驗セリ。

而シテ、1人ノ平均使用量ハ、0.035 g ナリ。

第 9 表 A.

鹽酸「トロバコカイン」%	同用量	例 數	第 1 回 放屁時間
1% 1cc	0.01 g	6	43
2% 1cc	0.02 g	6	46
3% 1cc	0.03 g	34	56
4% 1cc	0.04 g	61	53
5% 1cc	0.05 g	206	54
6% 1cc	0.06 g	23	52
平 均	0.035 g	(計)336	51

腰髓麻酔ヲ施セシ場合ニ於ケル、麻酔藥量 (鹽酸「トロバコカイン」量) ト、第 1 回放屁時間トノ關係ハ、第 9 表 B. ニ示ス如ク、麻酔藥量最少キ卵巢囊腫手術 (平均 0.024 g) ノ場合ニハ、術後 52 時間ニシテ、第 1 回放屁アリ、然ルニ、麻酔量最多キ子宮癌腫手術 (平均 0.044 g) ノ場合ニハ、第 1 回放屁ハ却テ早く、術後 50 時間ニシテ之ヲ認メタリ、又 子宮外妊娠ノ場合ニハ、麻酔量平均 0.033 g ニシ

テ、術後 53 時間ニシテ第 1 回放屁アリ。然ルニ、子宮脱開腹手術ノ場合ヲ見ルニ、使用量ハ、前者ヨリモ多ク、0.036 g ナルニカカハラズ、術後第 1 回放屁ハ却テ早く、42 時間ナリ。其ノ他ノ場合ニ於テモ、同様ニ、使用鹽酸「トロバコカイン」量ノ多少ハ、術後ノ放屁時間ニ關係セザルヲ觀ル。今之ヲ、曲線表ヲ以テ示セバ、第 10 表ノ如シ。而シテ、各例ヲ通ジテ、術後第 1 回放屁迄ノ所要時間ハ、平均 51 時間ナリ。

第 9 表 B.

腰髓麻酔ノ場合ニ於ケル「トロバコカイン」量ト手術時間トノ術後放屁時間ニ對スル關係

病 名 別	「トロバコカイン」量 (平均 1 人使用量)	手術時間	手術後 第 1 回 放屁時間
卵 巢 囊 腫	0.024 g	50 分	52 時間
子宮外妊娠	0.033	59	53
癒 着 性 子宮後屈	0.034	62	58
高度子宮 實 質 炎	0.034	90	51
輸卵管水腫	0.034	50	48
子宮筋腫	0.035	58	51
全子宮脱	0.036	25	42
高度子宮 附 屬 器 炎	0.037	50	52
炎 症 性 附 屬 器 腫 瘤	0.037	57	54
輸 卵 管 卵 巢 囊 腫	0.038	50	53
子宮癌腫	0.044	90	50
平 均	0.035	58	51

第 10 表 手術時間ト「トロバコカイン」量ノ第 1 回放屁時間ニ對スル關係

(II) シュライヒ氏浸潤麻痺

之ハ、高年者、又ハ、簡單ナル開腹手術（移動性卵巣嚢腫、「ヘルニア」、子宮腹壁固定術等）ノ場合ニテ、且、麻酔補助藥著シク奏效セル時ニ、只、シュライヒ氏第 2 液ノミノ浸潤麻痺ニヨリテ、完全ニ手術ヲ終リタルモノニシテ、10 例ヲ有ス。此場合ニ於ケル第 1 回放屁迄ノ時間ハ、甚早ク、術後 35 時間ナリ（第 7 表 A. 参照）。

第 3 項 混合麻酔

之ハ、腰髄麻酔ニ、「クロロフォルム」吸入ヲ併用セシ場合ニシテ、總數 92 例アリ。

此場合ニ於ケル「クロロフォルム」使用量ハ、平均 1 例 10cc ニシテ、單獨「クロロフォルム」全身麻酔ノ場合ニ比シ。其ノ使用量著シク少シ。混合麻酔ノ場合ニハ、術後、第 1 回放屁迄ノ所要時間ハ稍々長ク、平均 56 時間ヲ要シタリ。

術後麻酔藥ニヨル副作用

予ハ、「クロロフォルム」全身麻酔、「トロバコカイン」腰髄麻酔及ビ兩者ノ混合麻酔患者 745 例ニ就キテ、麻酔副作用及ビ後作用ト思ハルモノヲ調査セシニ、次ノ如シ。第 11 表ニ示ス如ク、術後、惡心及ビ嘔吐ヲ催セシモ

ノハ、全身麻酔(以下單ニ全麻ト記ス)ノ場合ニ66名、腰髄麻酔(以下單ニ腰麻ト記ス)ノ場合ニ32名、混合麻酔(以下單ニ混麻ト記ス)ノ場合ニハ12名アリ。惡心ノミヲ訴ヘシモノハ、全麻ニテ14名、腰麻ニテ16名、混麻ニテ4名アリ。尿閉ハ、全麻ニテ68名、腰麻ニテ134名、混麻ニテ36名アリ。嘔吐及ビ尿閉ハ、全麻ニテ42名、腰麻ニテ56名、混麻ニテ18名ナリ。頭痛ノミヲ訴ヘシモノハ、腰麻ニテ2名アリシノミ、嘔吐及ビ頭痛、又ハ嘔吐、頭痛及ビ尿閉ヲ兼ヌルモノハ、全麻ニ於テ、各2名宛アリ。惡心ト尿閉ハ、全麻ニテ20名、腰麻ニテ6名アリ。惡心ト頭痛ハ、全麻及ビ腰麻ニ於テ、各2名宛アリ。頭痛ト尿閉ハ、腰麻ニ於テ4名アリシノミナリ。呼吸麻痺ヲ起セシモノハ、腰麻ノ場合ニ1名アリ。之ハ、「トロバコカイン」注射後20分ニシテ、手術中、患者ハ、急ニ奔轉狂躁ヲ極メタル時、突然、呼吸麻痺ヲ起セシモ、約40分間ニ亙ル人工呼吸及ビ酸素吸入ニヨリテ、全治セリ。其ノ他、術中、顔面蒼白、嘔吐、脉搏緩徐トナリシ場合ヲ時々認メタルモ、心臟麻痺ト認ムベキ副作用ハ、麻酔ノ各場合ヲ通ジテ1例モナカリキ。

要スルニ、惡心、嘔吐ヲ訴ヘシモノハ、全麻ニテ、148名(46.7%)、腰麻ニテ112名(33.3%)ナリ。頭痛ヲ訴ヘシモノハ、全麻、腰麻トモ大差ナキモ、尿閉ハ、全麻ニテ132名、腰麻ニテハ、更ニ多ク、200名、混麻ニテハ、54名ナリ。之等ノ副作用及ビ後作用ハ多クハ一過性ニシテ、2—3日ニシテ消退シ、特別ノ處置ヲ要セシモノナシ。殊ニ、尿閉ハ、上記ノ如ク、腰麻ノ場合ニ多キコト明カナル

モ、特別ノ處置ヲ施スコトナク、只2—3回ノ導尿ニヨリテ、自己排尿ヲ營ミ得タルモノ多シ。即チ尿閉ト稱スルモ、膀胱麻痺ヲ起サズシテ、第2章、手術後處置ノ項ニ述ベシ如ク、自己排尿ノ可能ナルモノガ、仰臥位排尿ノ習慣ナキタメ、排尿シ得ザル場合ニ於ケル尿閉ヲ含ムモノナリ。近時、手術前ニ、仰臥位ニテ排尿スルコトノ練習ヲ豫行セシムルコトニヨリテ、此種尿閉ヲ著シク、減少シ得タリ。要スルニ麻酔主藥ニヨル副作用ハ、全身麻酔ト腰髄麻酔トハ間ハズ大差ナシ。

第11表

麻酔藥ニ對スル副作用及ビ後作用

麻酔藥ノ 種類 副作用	クロロ フォルム (全身 麻酔)		鹽酸ト ロバコ カイン (腰髄 麻酔)		クロロ フォルム及 ビ鹽酸ト ロバコカ イン (全身及 ビ腰髄 麻酔)		計
	人員	%	人員	%	人員	%	人員 %
惡心及ビ嘔吐	66	(20.8)	32	(9.5)	12	(13.0)	110 (14.8)
惡心	14	(4.4)	16	(4.8)	4	(4.3)	34 (4.6)
尿閉	68	(21.5)	134	(39.9)	36	(39.1)	238 (31.9)
嘔吐及ビ尿閉	42	(13.2)	56	(16.7)	18	(19.6)	116 (15.6)
頭痛	0		2	(0.6)	0		2 (0.3)
頭痛及ビ嘔吐	2	(0.6)	0		0		2 (0.3)
頭痛嘔吐尿閉	2	(0.6)	0		0		2 (0.3)
惡心ト尿閉	20	(6.3)	6	(1.8)	0		26 (3.5)
頭痛ト惡心	2	(0.6)	2	(0.6)	0		4 (0.5)
頭痛ト尿閉	0		4	(1.2)	0		4 (0.5)
呼吸麻痺	0		1	(0.3)	0		1 (0.1)
心臟麻痺	0		0		0		0
直腸障礙	0		0		0		0
計	216	(68.0)	253	(75.0)	70	(76.0)	539 (72.3)
各種麻酔 實施人員	317		336		92		745

第4項 麻醉補助薬

予ハ、全身麻醉ト、局所麻醉トヲ問ハズ、殆ド全例ニ於テ開腹術患者ニハ、麻醉補助薬ヲ使用セリ。即チ、手術(執刀)ノ1時間半前及ビ半時間前ノ2回ニ、補助薬ノ注射ヲ行フ。但シ、第1回注射ハ少量、0.2—0.3cc(アンブル)ヲ用ヒテ、醗酵作用ヲ見タル後、第2回注射ノ量ヲ加減ス。或ハ、手術前30分ニ、唯1回注射ヲナセシコトモアリ。

補助薬ハ、大正元年ヨリ大正5年マデハ、「スコボラミンモルフィン」ヲ使用セリ。其ノ使用量ハ、1人全量0.5—0.7cc(アンブル)ニシテ、平均0.6cc(アンブル)ナリキ。

大正5年頃ヨリ、昭和3年迄ハ、「バントボン、スコボラミン」ヲ使用セリ。使用量ハ1人全量0.5—0.9ccニシテ、平均0.7cc(アンブル)ナリ。昭和3年以後ニ於テハ、「ナルコボン、スコボラミン」ヲ使用セリ。用量ハ、1人ノ全量0.3—0.8ccニシテ、平均0.6ccナリ。

本劑ハ、他ノ麻醉補助薬ニ比シ、術中及ビ術後ニ於テ、悪心、嘔吐ヲ催スコト少シ。

心臓疾患、脚氣患者、又ハ、小兒、老人ニハ其ノ使用ヲ避ケ、只「バビナール」ヲ使用セリ。使用量ハ平均0.8cc(アンブル)ニシテ、術前30分ニ、只1回注射スルコトトセリ。

一般ニ、斯ル麻醉補助薬ノ使用ニヨリテ、患者ノ、手術ニ對スル恐怖心ヲ轉換セシメ、又麻醉主薬ヲ減量セシメ得ル利益アリ。而モ從來、其ノ使用ニヨリテ只口渴ノ外何等ノ副作用ヲ認メタルコトナシ。故ニ、此麻醉補助薬ヲ注意シテ巧妙ニ使用スルコトニヨリテ、麻醉主薬ヲ減量シ、從ヒテ、主薬ニ對スル種

種ノ副作用ヲ輕減シ得。

第5章 手術成績統計

予ハ、手術成績ヲ統計スルニ當リ、之ヲ手術式別ニ分類シテ其ノ例數ヲ調査シ、且、各式ノ手術所要時間、手術中及ビ手術後ノ經過、殊ニ手術時間ト麻醉薬量トノ、術後第1回放屁時間ニ對スル關係、開腹創面ノ癒合状態、再發ノ有無、入院日數及ビ死亡率ニツキ、統計的ニ調査セリ。

尙ホ術後、後年ノ所見ニ就キテハ、問合ハセタルモ、種々ノ事情ノタメニ、返答數少ナク、且、不得要領ノモノ多カリシヲ以テ、茲ニ報告ヲ中止ス、從ツテ、子宮癌ノ他ハ、疾病再發ノ統計其ノ他ヲ調査シ得ザリシヲ遺憾トス。

第1項 手術式統計

第12表 A. ニ示ス如ク、腹式子宮腔上部切斷術260名、廣汎性竝ニ單純性腹式子宮全別出術120名、腔式子宮全別出術7名、腹式(子宮)附屬器別出術535名、腔式(子宮)附屬器別出術7名、子宮提舉又ハ腹壁固定術47名、試験的開腹術20名、子宮癒着剝離術6名、廣韌帶内圓韌帶短縮術8名、人工避妊術8名、囊腫壁切開手術3名、開腹排膿手術3名、腹式帝王切開術2名、其ノ他ナリ。而シテ、2種以上ノ手術ヲ同時ニ、併ビ行ヒタル數例アルモ、便宜上、主ナル手術式名ヲ採リタリ。

第 12 表 A.
手術式統計

手術式名	例 數	人 數
腹式腔上部切斷術		260
腹式子宮全剔出術		120
腔式子宮全剔出術		7
腹式(子宮)附屬器剔出術		535
腔式(子宮)附屬器剔出術		7
腹壁子宮固定術		47
試験的開腹術		20
子宮癒着剝離術		6
廣韌帶内圓韌帶短縮術		8
人工避妊術		8
囊腫壁切除術(腹式)		3
開腹排膿術		3
腹式帝王切開術		2
「ヘルニア」整復術		1
腎臟剔出術		1
人工肛門形成術		1
總 計		1029

備考 本表人員ノ全手術患者數ニ一致セザルハ
同一患者ニシテ2種以上ノ手術ヲ施セシ
者アルニヨル。

第2項 手術所要時間統計

手術時間ノ長短ハ、全身麻醉ト腰髄麻醉ト
ヲ問ハズ一般ニ、疾患ノ種類、癒着ノ有無、
個人的體格及ビ體質ノ相違、麻醉經過ノ良否、
術者及ビ助助者ノ巧拙等ニヨリテ、長短一様
ナラザルモ、今、予ノ例ニ就キ、各病名別ニ
分チテ、同病名例ノ各々ヲ平均スレバ、第7
表B.及ビ第9表B.ニ示スガ如シ。但シ、予

ノ手術時間ハ、全開腹手術例ヲ平均シタルモ
ノナルヲ以テ、簡單ナルモノアリ、又ハ難病
ニシテ癒着其ノ他合併症アルモノヲ含メリ。
加之、予ノ術タルヤ拙劣ニシテ、且、助手ニ
乏シ、從ツテ、所要手術時間頗ル長キモノアリ。
本項ニ於ケル手術時間ハ、皮膚切開ノ始
メヨリ、皮膚縫合ヲ終ルマデノ時間ナリ。

今、開腹手術ノ所要時間ヲ次ノ如ク、「クロ
ロフォルム」全身麻醉ノ場合ト、腰髄麻醉ト
ノ場合ニニ分チテ觀ルニ、

(A) 「クロロフォルム」全身麻醉ノ場合

最モ手術時間短キハ、子宮腹壁固定術ニシ
テ、25—50分、平均30分ヲ要シ、次ハ、卵
巢囊腫及ビ輸卵管水腫ニシテ、各48分ナリ。
前者ハ20—90分、後者ハ45—50分ヲ要セリ。
次ハ輸卵管卵巢囊腫ニシテ、60分間、次ハ癒
着性子宮後屈症ニシテ67分、次ハ子宮外妊娠
中絶ニシテ、25—100分、平均68分、次ハ子
宮筋腫ニシテ、40—100分、平均76分、次ハ
子宮附屬器炎ニシテ45—120分、平均100分
ナリ。次ハ子宮癌腫ニシテ50—150分、平均
100分ナリ。次ハ子宮實質炎ニシテ、120—
150分、平均130分ナリ。尚ホ本表括弧ノ數
字ハ最短—最長手術時間ヲ示スモノニシテ、
同種ノ疾病ニテモ、各個ノ場合ニ於テ、如何
ニ相違スルモノナルカヲ觀ヒ知ルニ足ル。總
手術例ヲ通ジテ20—150分ニシテ、1人平均
73分トナル。

平均手術時間ノ第1回放屁ニ對スル關係ヲ
觀ルニ、全身麻醉ノ場合ニハ、第7表B.及
ビ第8表(曲線表)ニ示ス如ク、所要手術時
間長キ子宮實質炎(平均130分)患者ニテハ、
第1回放屁迄ノ所要時間ハ43時間ナルモ、子

宮癌腫患者(平均100分)ニテハ53時間ナリ。又所要手術時間最短キ卵巢囊腫又ハ輸卵管水腫(平均48分)患者ニテモ、第1回放屁迄ノ所要時間ハ43—51時間ニシテ、子宮癌又ハ子宮實質炎手術ノ場合ニ比シテ割合ニ長シ。子宮筋腫ノ場合ノ如キ、平均手術時間76分ヲ要セシ時ニモ、第1回放屁迄ノ時間ハ、45時間ニシテ、之ヨリモ手術時間短キ輸卵管水腫ノ場合ヨリモ早シ。故ニ、所要手術時間ト放屁時間トハ、相併行セズ。

(B) 腰髄麻酔ノ場合 (第9表)

此場合ニ於テモ、「クロロフォルム」全身麻酔ノ場合ト同様ニシテ、第9表 B. ニ示ス如ク、手術所要時間最短キハ、全子宮脱ニ於ケル腹壁子宮固定術ニシテ、平均25分ヲ要シ、次ハ卵巢囊腫、輸卵管水腫ニシテ、各50分ヲ要シ、高度ノ慢性子宮實質炎及ビ子宮癌ノ手術ニ於テ最長時間(平均各90分)ヲ要セリ。

腰髄麻酔ノ場合ニ於テ、手術所要時間ノ、術後第1回放屁ニ對スル關係ハ、「クロロフォルム」全身麻酔ノ場合ト同様ニシテ、例ヘバ手術時間最長キ子宮癌腫(平均90分)ニテハ、術後50時間ニシテ第1回放屁アリ。然ルニ、之ヨリモ手術時間短キ卵巢囊腫ニアリテハ、術後第1回放屁ハ却テ遅ク、平均52時間目ニ之ヲ認メタリ。其ノ他ノ諸例ニアリテモ、同表ニ見ル如ク、手術所要時間ハ、第1回放屁所要時間ト相併行セズ。

以上ノ關係ヲ、曲線表ヲ以テ示セバ、第10表ノ如シ。

第3項 腹壁創面ノ癒合状態

第12表 B. ニ示ス如ク、婦人科開腹手術例

1018例中、第1期癒合ヲ營マザリシモノ、65名アリ。全手術例ノ6.3%ニ當ル而シテ、此第2期癒合ヲ營メルモノニ就キ、之ヲ病名別ニ調査スルニ、創面ノ癒合ハ、子宮癌手術ノ場合ニ於テ最悪シクシテ、13.3%ヲ示シ、次ハ、惡性脉絡膜上皮腫ニ於テ12.5%、次ハ子宮筋腫ニ於テ8.2%、次ハ子宮外妊娠中絶ノ場合ニシテ6.1%、次ハ腹壁子宮固定術ニシテ、5.1%ヲ示セリ。要スルニ、術後第1期癒合ヲ營マザリシ數ハ、一般ニ、手術所要時間ニ比例スルガ如シ。近時、予ハ、開腹手術ニ於テ、筋膜下結紮縫合ヲ行ヒ、完全ニ第1期癒合ヲ營マシムルヲ得タリ。

第12表 B.

腹壁創面ノ第2期癒合ヲ爲セルモノ

病 名	手術數	第2期癒合 セルモノ	同 %
子 宮 筋 腫	195	16	8.2
子宮外妊娠中絶	212	13	6.1
卵巢囊腫及ビ 炎症性腫瘍	381	17	4.4
子 宮 癌 腫	90	12	13.3
「デントンチオーム」	8	1	12.5
葡 萄 狀 鬼 胎	4	1	/
腹壁子宮固定術	41	2	5.1
「ヘルニア」整復術	1	1	/
試験的開腹術	20	2	/
其ノ他ノ手術	66	0	/
計	1018	65	6.3

第4項 術後入院日數

開腹手術後ノ入院日數ヲ、全治セシモノニ就キ調査セシニ、第12表 C. ニ示ス如ク、最モ短日數ハ8日間ニシテ、卵巢囊腫剔出術ヲ

行ヒシモノナリ。又最長日數ヲ要セシモノハ106日間ニシテ、子宮外妊娠中絶症ノ手術後ニシテ、術後、骨盤結締織炎ヲ續發セシ場合ナリ。而シテ、全手術例ノ平均入院日數ハ、25日間ナリ。

今、術後入院日數ヲ、病名別ニ表示セバ、第12表C.ノ如ク、卵巢囊腫及ビ癒着性子宮後屈症ハ、入院日數同日ニシテ、平均21日ヲ示シ、子宮筋腫ハ案外早クシテ之ニ次ギ、平均22日ヲ示シ、子宮脱及ビ輸卵管卵巢囊腫ハ23日、子宮附屬器腫瘍及ビ輸卵管水腫ノ25日、子宮附屬器炎ノ26日之ニ次ギ、子宮實質炎ハ長クシテ、30日ヲ要シ、子宮癌腫ハ最長クシテ、平均31日間ヲ要セリ。

第12表 C.
手術後入院日數

病 名	手術後入院日數
子 宮 癌 腫	31 (11—87)
子 宮 筋 腫	22 (11—56)
卵 巢 囊 腫	21 (8—67)
子 宮 外 妊 娠	24 (11—106)
子 宮 附 屬 器 炎	26 (13—40)
子 宮 腹 壁 固 定	23 (15—50)
子 宮 實 質 炎	30 (13—33)
癒着性子宮後屈症	21 (13—43)
輸 卵 管 水 腫	25 (14—50)
子宮附屬器腫瘍	25 (14—51)
輸 卵 管 卵 巢 囊 腫	23 (17—37)
平 均	25 (8—106)

第5項 死亡率

手術後、數時間乃至數日間ニ死亡セシ者、

即チ所謂、手術死ト思ハルルモノヲ調査セシニ、全數1018例中、41名アリテ、4.02%ノ死亡率トナル。今、之ヲ表示スルニ、第12表D.ノ如ク、子宮癌腫手術ノ場合ニ於テ最モ多ク、11.1%死亡率ヲ示ス。同ジ子宮癌ニアリテモ、其ノ疾病ノ程度及ビ術者ノ巧拙ニヨリテ、死亡率ニ變化ヲ來スベキモ、予ノ例ニアリテハ、初期ノモノアリ、又、高度ノ骨盤結締織浸潤及ビ淋巴腺轉移ヲ有セシモノアリ。

從來、子宮癌ノ手術ニヨル死亡率ハ、10—20%或ハ、10—30%トセラレ、熟練ナル手術者ニ於テモ、10%内外ノ率ヲ示セリ。慶應大學ニ於ケル子宮癌手術死亡率ハ8%ナリト云フ。子宮筋腫ノ手術死亡率ハ、予ノ例ニアリテハ3.5%ナリ。子宮外妊娠中絶症ノ死亡率ハ4.7%、卵巢囊腫ノ夫レハ2.3%ナリ。

第12表 D.
手術死亡率

病 名	人 數	%
子 宮 癌 腫	10	11.1
子宮外妊娠中絶	10	4.7
子 宮 筋 腫	7	3.5
卵 巢 囊 腫	7	2.3
輸 卵 管 囊 腫	3	/
卵 巢 癌 腫	2	/
腎 臟 水 腫	1	/
小 腸 膿 瘍	1	/
計	41	4.02

第6項 再 發

卵巢癌腫、卵巢肉腫、其ノ他子宮ノ惡性腫瘍ノ、術後ニ於ケル再發狀態ヲ調査セシモ、

不明ニ終レリ。

唯、子宮癌腫ニアリテハ、90名ノ手術患者中、10名ノ手術死亡者ヲ除キ、所謂第一次治癒者（全治退院者）80名ニ就キ調査セシニ、次ノ如キ結果ヲ得タリ。

1. 最發死亡 8名 $\left\{ \begin{array}{l} \text{術後1年以内} \quad 4\text{名} \\ \text{術後2年以内} \quad 4\text{名} \end{array} \right.$
2. 他病ニヨル死亡 8名
3. 經過不明ナルモノ 43名
4. 全治者（術後5箇年以上、今日迄再發ナキモノ）21名

第6章 總括及ヒ結論

産科婦人科領域ニ於テ、予ノ方法ニヨリテ開腹手術ヲ施シタル總數1018例ノ、臨牀の總計ヲ總括セバ、次ノ如シ。

(1) 子宮癌腫

- (1) 本症ハ全開腹手術例ノ8.7%ヲ占ム。
- (2) 子宮體部癌、對、頸部癌ハ13.0%對、87.0%ニシテ、Scheib氏ノ統計ト一致ス。
- (3) 子宮癌ノ平均年齢ハ、45歳ニシテ、體部癌モ、頸部癌モ、共ニ、40年代ニ最多シ。
- (4) 子宮癌ニテ妊娠ヲ兼ネタル場合ハ、子宮癌腫全例ノ3.3%ニシテ、何レモ3回以上ノ多産婦ナリ。
- (5) 子宮癌全別出ノ手術死亡率ハ11.1%ナリ。再發死亡8名、不明ナルモノ43名、全治ノ判明セルモノ21名ナリ。

(2) 子宮筋腫

- (1) 本症ハ、全開腹手術例ノ19.2%ヲ占

ム。

- (2) 子宮頸部筋腫ハ、體部筋腫ニ比シ、著シク少數ニシテ、6.6%ヲ示シ、諸家統計ノ平均數ニ近似ス。

- (3) 間質性子宮筋腫ハ、最多數ニシテ、全子宮筋腫ノ81.1%ヲ占ム。

- (4) 子宮筋腫ハ40年代ニ最多ク發見セラレ、60.6%ヲ占ム。

- (5) 子宮筋腫患者ノ過半数ハ未産婦ニシテ、52.0%ヲ示シ、1回分娩之ニ亞ギ、14.5%ナリ。2回經産婦ハ10.9%ナリ。即チ、分娩回数ヲ増スニ從ツテ、筋腫發生ノ頻度ハ、次第ニ減少ス。又經産婦ニシテ、最終分娩後、筋腫發見迄ノ年數ヲ觀ルニ、最終分娩後、多クノ年月ヲ經タルモノニ多ク、就中、11—20年ヲ經タルモノニ最多ク、56.8%ナリ。

- (6) 子宮筋腫兼妊娠ハ甚稀ニシテ、0.5%ナリ。

- (7) 子宮筋腫ノ手術死亡率ハ、3.5%ナリ。

(3) 子宮外妊娠

- (1) 本症ハ案外多數ニシテ、全開腹手術例ノ20.8%ヲ占ム。

- (2) 其ノ大多數ハ、輸卵管妊娠ニシテ、其ノ中絶ヲ觀ルニ、流産ハ破裂ヨリモ著シク多ク、87.2%ヲ占メ、諸家ノ統計ヨリモ稍々多シ。

- (3) 本症ハ、30年代ニ最多ク、約60.0%ヲ占ム。

- (4) 其ノ左右、妊娠側ノ頻度ハ、大差ナク、左側妊娠ガ、右側妊娠ヨリモ、稍々多

シ。之ハ、諸家ノ統計ト略ボ一致ス。

(5) 本病ノ手術死亡率ハ、4.7% ナリ。

(4) 卵巣腫瘍

(1) 卵巣腫瘍ハ、全開腹手術例中、最多數ニシテ、約 $\frac{1}{3}$ ヲ占メ、30.6% ナリ。

(2) 卵巣嚢腫ハ、全卵巣腫瘍中最多ク、全開腹手術例ノ 29.4% ヲ占ム。卵巣皮膚様嚢腫ハ、全卵巣腫瘍ノ 16.0% ヲ占メ、全卵巣嚢腫ノ 16.7% ニ當ル。我國ニ於ケル諸家ノ統計ト一致スルモ、歐洲諸家ノ統計ヨリ大ナリ。

(3) 卵巣嚢腫ノ發生側ハ、右側稍々多ク、45.7% ナリ。

(4) 有莖性ノモノ最多ク、89.7% ヲ占メ、廣韌帶内發育之ニ亞ギ 6.6% ヲ示シ、偽韌帶發育ハ 3.6% ナリ。

(5) 年齢ハ、30 年代ニ最多ク、31.4% ナリ。20 年代之ニ次グ。若年者ニ割合ニ多ク、50 年以上ノ人ニハ稀ナリ。

(6) 卵巣嚢腫兼妊娠ハ、割合ニ多ク、全卵巣嚢腫ノ 5.3% ヲ占ム。就中、皮膚様嚢腫ノ場合ニ多シ。

(7) 卵巣癌腫ハ、全卵巣腫瘍ノ 1.6% ニシテ、良性卵巣嚢腫ノ癌性變性セシモノナリキ。

(8) 卵巣肉腫ハ、全卵巣腫瘍ノ 1.9% ニシテ、20 年代及ビ 20 年末滿者ニ多シ。

(9) 卵巣嚢腫ノ手術死亡率ハ 2.3% ナリ。

(5) 麻酔

(1) 「クロロフォルム」全身麻酔ノ場合ニ於ケル、1 人ノ平均「クロロフォルム」使用

量ハ、18cc ニシテ、其ノ使用量ノ増減ハ術後第 1 回放屁時間ニ關係ナシ。而シテ、術後第 1 回放屁ハ、各例ヲ通ジテ、平均 47 時間ナリ。

(2) 「クロロフォルム」加「エーテル」混合麻酔ニアリテハ、1 人ニ對スル平均使用量ハ、「クロロフォルム」15 cc、「エーテル」31cc ナリ。此場合ニ於ケル、術後第 1 回放屁時間ハ、平均 46 時間ニシテ、「クロロフォルム」ノミノ場合ト大差ナシ。

(3) 腰髄麻酔ノ場合ニ於ケル、鹽酸「トロバコカイン」ノ 1 人ニ對スル平均使用量ハ、0.035 g ニシテ、開腹手術ニハ、多クノ場合、0.05 g ヲ使用セリ。而シテ、「トロバコカイン」量ノ多少ハ、術後第 1 回放屁ニ關係ナシ。此場合ニ於ケル、術後、第 1 回放屁迄ノ所要時間ハ、平均 51 時間ニシテ、「クロロフォルム」ノ場合ヨリモ稍々長シ。

(4) 混合麻酔(「クロロフォルム」及ビ「トロバコカイン」)ノ場合ニハ、「クロロフォルム」ノ 1 人ニ對スル平均使用量ハ、10 cc ニシテ、單獨「クロロフォルム」使用ノ場合ニ比シ、使用量著シク少ナシ。

(5) 「クロロフォルム」全身麻酔ト、「トロバコカイン」腰髄麻酔トノ場合ニ於ケル、副作用及ビ後作用ヲ比較スルニ、惡心、嘔吐、頭痛等ハ、全身麻酔ト腰髄麻酔トニヨリテ大差ナシ。之等ノ症狀ハ一過性ニシテ、顧慮スルニ足ラズ。但シ、尿閉ハ、腰髄麻酔ノ場合ニ多キモ、眞ノ膀胱麻痺ト思惟セシ場合ハ尠ナシ。

(6) 腰髄麻酔ニ使用スル、鹽酸「トロバコカイン」ハ、島久製「アンブル」ヲ使用

シテ、何等ノ悪影響ヲ見ザリキ。

(7) 麻醉補助薬、「ナルコボン、スコボラミン」ハ、之ヲ巧妙ニ使用スルコトニヨリテ、麻醉主薬ヲ著シク減量スルコトヲ得、而シテ、此補助薬ニヨル危険ヲ認メタルコトナシ。

(6) 手術所要時間ハ、全身麻醉ノ場合ニ於テモ亦、腰髄麻醉ノ場合ニ於テモ、術後第1回放屁時間ニ影響セズ。

(7) 開腹手術後入院日數ハ、1人平均、25日間ナリ。子宮癌手術ノ場合ニ最長ク、卵巢囊腫手術ノ場合ニ最も短シ。

(8) 腹壁創面ノ、第1期癒合率ハ、93.7%ナリ。最近、予ハ、筋膜縫合ニ際シ、筋膜下

結紮縫合ニヨリテ、此成績ヲ向上セシメ得タリ。

(9) 手術死亡率ハ、全手術例ニ對シテ、40.2%ニシテ、子宮癌腫手術ノ場合ニ最高ク、卵巢囊腫手術ノ場合ニ最低シ。

(完)

稿ヲ終ルニ臨ミ八木教授ノ御懇篤ナル御校閲ヲ賜リタルコトヲ深謝ス。

文 獻

- 1) 安藤博士、婦人科手術學。2) *Döderlein, Krönig, Operative Gynäkologie.*