66.

611.31.12.36.61.41

亞硝酸「アミール」ノ爲メ起ル心筋, 顎下腺, 耳下腺,
肝臓, 腎臓並ニ脾臓ノ組織學的變化ニ就テ

岡山醫科大學解剖學教室 (主任八木田教授)

竹 本 巖

[昭和 9 年 8 月 17 日受稿]

*Aus dem Anatomischen Institute der Okayama Med. Fakultät**(Vorstand: Prof. Dr. K. Yagita).*

Über die histologische Veränderung der Herzmuskulatur,
Unterkieferdrüse, Ohrspeicheldrüse, Leber, Niere,
und Milz, die durch Amylnitrit zutage tritt.

Von

Iwao Takemoto.

Eingegangen am 17. August 1934.

Bei Kaninchen injizierte der Verfasser Amylnitrit in die Ohrvene, und zwar zuweilen so viel bis die Tiere sterben, zuweilen nur ein Zehntel der Dosis letalis. Im letzteren Falle tötete der Verfasser die Tiere 20 Minuten, 1, 3, 6, 12, 24, 48 und 72 Stunden nach der Injektion. Nach Sterben der Tiere wurde ein Stück jedes Organes möglichst schnell herausgenommen und histologisch untersucht. Ausserdem unterband der Verfasser bei Kaninchen die Milzarterie oder Milzvene und tötete die Tiere bald danach durch Luftembolie oder durch die Injektion des Amylnitrites, um ihren Milzbefund

mit der Folgeerscheinung der einfachen Injektion zu vergleichen. Daraus ergibt sich das Folgende:

1) Nach Injektion des Amylnitrites erweitern sich grössere Blutgefässe im Herzen, in der Unterkieferdrüsen, Ohrspeicheldrüse, Niere und Milz, wobei sich die Intima, die glatten Muskelfasern der Media, sowie das Bindegewebe der Adventitia in ihrer verdünnten Wand dehnen. Die glatten Muskelfasern vereinigen sich stellenweise und bilden kleine Bündel, die locker vorhanden sind. In der Leber sieht man diesen Zustand 20 Minuten nach der Injektion, während

die Gefässe des Herzens und der Niere sich unmittelbar nach der Injektion erweitern und schon nach 20 Minuten eine Wiederherstellung zeigen.

Die kleinen Gefässe, besonders Kapillaren und kleine Venen erweitern sich sehr verschiedenartig je nach dem Organe, indem der Grad und die Dauer der Erweiterung eine grosse Schwankung zeigen. Die Gefässerweiterung in der Unterkieferdrüse, Ohrspeicheldrüse, Niere und Milz tritt unmittelbar nach der Injektion auf und springt in die Augen 20 Minuten lang, während sie nach einer Stunde zurücktritt. Dagegen dauert sie im Herzen 12 Stunden, in der Leber 6 Stunden und im Nierenglomerulus sogar 48 Stunden lang, wobei ihr Grad im Herzen am stärksten ist.

2) Amylnitrit lässt die Parenchymzellen verschiedener Organe aufquellen und die Speichelsekretion befördern.

Die Herzmuskelfasern zeigen bis 20 Minuten nach der Injektion keine deutliche Veränderung, doch quellen sie eine Stunde nach der Injektion auf und zeigen eine lockere Struktur. 3 Stunden nach der Injektion sind sie infolge der starken Erweiterung der Blutkapillaren stark gedrückt, aber von der 24 Stunden nach der Injektion an tritt die Gefässerweiterung in den Hintergrund und die Faseranschwellung wird wieder deutlich, was 48 Stunden nach der Injektion sein Maximum erreicht.

In der Unterkieferdrüse vermindern sich die gröbere Körnchen der Dunkelzellen bald nach der Injektion und von der 1 Stunde nach der Injektion an zeigen

die Netzmaschen in den Hellenzellen verschiedene Grösse nach und nach, wobei die Dunkelzellen selbst sich verkleinern, während die Hellenzellen eine Anschwellung zeigen, was 12 Stunden nach der Injektion am deutlichsten zu sehen ist.

In der Parotis werden die Granula der Drüsenzellen direkt nach der Injektion gröber und erfüllen den ganzen Zellleib 12 Stunden später. Jedoch an der 24 Stunde nach der Injektion verschwinden sie gänzlich und machen feinen Körnchen Platz, wobei die Zelle sich verkleinert.

In der Leber schwellen die meisten Leberzellen unmittelbar nach der Injektion an, aber 20 Minuten später werden sie durch die erweiterten Blutkapillaren gedrückt und verkleinert. Die Zellen behalten diesen Zustand eine Zeitlang, nur dass ihre Kerne eine Anschwellung zeigen. Nach 12 Stunden tritt die Erweiterung der Kapillaren zurück und die Leberzellen quellen wieder auf, indem sie sich dicht berühren.

In der Niere fangen die Blutkapillaren unmittelbar nach der Injektion sich zu erweitern an, und die Harnkanälchen werden eine Zeitlang gedrückt. Besonders zeigt der Glomerulus eine lange Zeit die Anschwellung. Von der 1 Stunde nach der Injektion an erweist das Harnkanälchen durch seine ganze Länge eine starke Anschwellung, aber von der 24 Stunde nach der Injektion an tritt die Wiederherstellung auf, indem das Kanälchen sich von seinem Endgebiet allmählich verkleinert.

In der Milz erweitern sich die intranodularen Arterien, die Hülsearterien und die Venensinus unmittelbar nach der Injektion, wobei das retikuläre Gewebe fadenartig wird und grössere Maschen zeigt. Dieser Zustand dauert nur eine kurze Zeit. Nach einer Stunde quellen die Wände der intranodularen Arterie, der Hülsearterie, sowie das retikuläre Gewebe auf, was nach 6 Stunden in die Augen springt, indem die Fäden des Retikulums miteinander verschmelzen und eine solide Masse bilden, während die intranodularen Arterien und die Hülsearterien eine verdickte Wand und ein schmales Lumen zeigen. Dabei enthält der Milzsinus nur die Lymphozyten, verliert fast alle Erythrozyten, die aber den Venensinus erfüllt. Dieser Zustand ist 48 Stunden nach der Injektion am deutlichsten. Die genannte Anschwellung der Arterienwand und des retikulären Gewebes trägt zur Verhinderung des Blutstromes in der Milz bei.

3) Wenn man die Milzarterie oder die Milzvene unterbindet oder darauf folgend Amylnitrit injiziert, so tritt stets

keine Erweiterung der milzgefässe auf, sondern man sieht eine Anschwellung der Gefässwand und des retikulären Gewebes. Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass Amylnitrit in allen diesen Fällen in die Milz nicht hineintritt. Dasselbe gilt auch für den Fall der Venenunterbindung, denn in diesem Falle Blutstauung verhindert das Eintreten des Amylnitrites in die Milz selbst, wenn es injiziert wird. Auf Grund der genannten Tatsache ist der Verfasser der Meinung, dass die gefässerweiternde Wirkung des Amylnitrites keine zentrale, sondern eine peripherische ist.

4) Durch Einführung des Amylnitrites in den Tierkörper wird der peripherische Parasympathicus in erster Linie erregt, was die Gefässerweiterung für Folge hat. Dann quellen die Zellen verschiedener Organe auf, wobei die Speichelsekretion befördert wird. In gewissen Organen zeigt die Blutgefässwand eine starke Verdickung, die das Gefässlumen beträchtlich verengert.

(Autoreferat.)

目 次

第1章 緒 論

第2章 實驗材料並=實驗方法

第3章 實驗成績

第1節 心筋ノ所見

第2節 顎下腺ノ所見

第3節 耳下腺ノ所見

第4節 肝臓ノ所見

第5節 腎臓ノ所見

第6節 脾臓ノ所見

a) 第1實驗所見

b) 第2實驗所見

第4章 總括並=考按

第5章 結 論

文 獻

附圖說明, 附圖

第1章 緒論

亞硝酸「アミール」ヲ吸入スル時ハ血管擴張シ、
血壓下降スルハ周知ノ事實ナリ。Brunton氏ハ頸
髓切斷後ニモ亞硝酸「アミール」ニテ血壓降下スル
ヲ見テ、本劑ハ血管中樞ヲ麻痺セシムルノミナラ
ズ、血管壁ニ直接作用スト見做セリ。之ニ反シ
Filehne氏ハ家兎ニ腦血行ヲ中絶セシメテ亞硝酸
「アミール」ヲ吸入セシメシニ、耳殻血管ハ擴大セ
ズ。而シテ耳殻血管ニ全ク亞硝酸「アミール」含有
ノ血液達セザルモ、中樞ニ藥物含有ノ血液循環ス
ルヤ。耳殻血管ノ擴張スルヲ見タリ。故ニ亞硝酸
「アミール」ノ血管擴張作用ハ主トシテ血管運動中
樞ノ麻痺ニヨルモノトセリ。然レドモ Kobert,
Thomson, Leeck, Marschall氏等ハ血管灌流實驗
ニ於テ、Cow氏ハ剔出懸生セシメタル動脈環ニ
於テ、本劑ノ血管擴張作用アルヲ觀察セリ。猶ホ
Meyer u. Friedlich氏等ハ腦血管ヲ結紮セル動物
ニ於テモ血管擴張ヲ來タストナセリ。殊ニ
Bayliss氏ハ神經ヲ遮斷セル顎下腺ニ於テPick氏
ハ同様處置セル下肢ニ於テ、本劑ノ血管擴張ヲ起
スヲ觀タリ。其ノ他 Sollmann u. Pilcher氏等ハ
犬ノ脾臓及ビ腎臓ニ於テ灌流試驗ヲ施シ、亞硝酸
「アミール」ハ中樞性ニ血管擴張作用ヲ有セズ、却
テ血管ヲ縮小セシム。是レ亞硝酸「アミール」及ビ
同様物質ニヨリ惹起セラルル中樞性緊張ノ弛緩ハ
只擇選的ニ一定ノ領域ニ限定セラルルニ據ルナラ
ント云ヘリ。寺田氏ハ腎臓ニ灌流試驗ヲ行ヒ、亞
硝酸「アミール」ヲ吸入セシメテ末梢性ニ血壓ヲ下
降セシムル時ニハ血管運動中樞ハ却テ刺激興奮セ
ラレ、血管ヲ收縮セシメントスルモノナリトシ、
又亞硝酸「アミール」ニテ鼻粘膜ヲ刺激スレバ交感
神經系ニハ反射的興奮ヲ起シ、血壓ヲ上昇セシメ
ントスルモノニシテ其ノ血壓下降作用ハ吸入ヲ止
メタル後初メテ現ハルモノトセリ。

以上ハ總テ藥物學的ニ研究セラレタル所ニ
シテ、亞硝酸「アミール」ノ血管擴張及ビ之ニ
伴フ血壓下降作用ハ或ハ中樞性ナリト云ハレ
或ハ末梢性ナリトセラル、特ニ腎臓、脾臓ノ
血管ニ對シテハ本劑ハ却テ中樞性ニ血管ノ狹
小ヲ來スト云ヘル論者アリテ、其ノ解決ハ頗
ル興味アル問題ナリトス。茲ニ於テ余ハ組織
學的方面ヨリ本劑ガ身體諸臓器、就中其ノ血
管系ニ如何ナル變化ヲ及ボズヤヲ檢セント企
テ本研究ニ着手セリ。

第2章 實驗材料並ニ實驗方法

動物ハ體重 1500—2000 gノ健康ナル雄性家兎
ヲ使用シ、試藥ハ Merk 製 Amylium nitrosumヲ
用ヒ、之ヲ耳靜脈ヨリ致死スルマデ注射セシモノ
(體重 1 kgニ就キ 1.2 cc宛) 及ビ其ノ 1/10 量ヲ同
様注射シ 20 分、1 時間、3 時間、6 時間、12 時間、
24 時間、48 時間、72 時間ヲ經テ空氣栓塞ニテ殺
シタルモノトニ就キ觀察セリ。動物ノ死後速ニ各
臓器ヨリ一定大ノ小片ヲ切取シ、心筋ハ 10 %ノ
「フオルマリン」液ニテ、他臓器ハ Orth氏液ニテ
24 時間固定シ、水洗後漸強「アルコール」ニ脱水テ
5 μ 厚ノ「パラフィン」切片ヲ作り、「エオジン・ヘ
マトキシリン」染色ニテ檢セリ。猶ホ動物ヲ無麻
醉ノ下ニ開腹シ、脾動脈或ハ脾靜脈ヲ結紮シ、其
ノ血行ヲ中絶セシメ、3 分後空氣栓塞ニテ殺シタ
ルモノ、及ビ動脈或ハ靜脈ヲ結紮シ、直ニ亞硝酸
「アミール」ヲ耳靜脈ヨリ致死スルマデ注射セシモ
ノニ就キ、前記ト同方法ニテ脾臓ノ一片ヲ處置シ
鏡檢ニ供シタリ。

第3章 實驗成績

第1節 心筋ノ所見

1) 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射

セシモノ、及ビ其ノ 1/10 量ヲ注射シ 20 分後ニ殺シタルモノノ心筋所見。

縦斷竝ニ横斷標本ニテ檢セシニ、心筋纖維ハ對照ニ比シ記載スベキ差違ヲ見ザルモ、致死スルマデ注射セシ家兎ノ心筋内ノ主ナル血管ハ著シク擴大シ、殊ニ動脈ノ壁ハ菲薄トナリ、内皮細胞ハ細長トナリ、輪狀筋纖維ハ延長シ互ニ集合シ疎在性ノ束トナリ、其ノ核モ細長トナレリ。靜脈管腔廣濶トナリ、其ノ壁ハ菲薄ニシテ細胞及ビ纖維ハ細長トナレルヲ見ル (Fig. 16)。加之所々ニ毛細血管及ビ小靜脈ガ破裂シ出血セル部アリ。少量注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ニ於テモ、心筋内ノ主ナル靜脈ハ前同様ノ所見ヲ呈スルモ、毛細血管破裂ニヨル出血竇極メテ多ク又太キ動脈ハ前例ニ比シ管腔稍々狭小トナリ、管壁ハ却テ厚サヲ増シ正常ニ近キ狀ヲ呈セリ。

2) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 1 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ心筋所見。

縦斷標本ニテハ筋纖維ハ膨脹シ其ノ太サヲ増シ、原纖維ハ増量セル肉漿ニ由テ鬆疎ナル小束ニ分タレ筋纖維ハ淡染セリ、核ハ膨大セルモノ多キモ其ノ周圍ノ肉漿ハ却テ多クハ殆ド消失シ或ハ只僅ニ殘留セルヲ見ル (Fig. 1)。横斷標本ニテハ纖維ノ斷口大且不正形トナリテ互ニ集在シ所々ニ大ナル間隙ヲ生ゼリ。纖維内ノ原纖維小束ハ疎在セルモ、核周圍ノ肉漿著シク減量セリ (Fig. 2)。心臓内ノ太キ血管ノ管腔ハ前例ニ比シ狭小トナリ、管壁ハ肥厚シ正常ノ狀ニ復セリ。然ルニ小血管殊ニ毛細血管及ビ小靜脈ハ所々ニ破裂シ多數出血竇現存セリ、其ノ内皮細胞ハ延長シ核モ細長トナレリ。一般筋纖維間ノ毛細血管ハ擴張シ充

血セリ。

3) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 3 時間、6 時間及ビ 12 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ心筋所見。

縦斷標本ニテハ一般ニ各筋纖維間ノ毛細血管ハ著シク擴張シ充血セリ、而モ筋纖維ハ稍々太クナリ肉漿ハ中軸部ヲ除キ増量シ、原纖維モ膨脹シ纖維ノ構造ハ鬆疎トナレリ。斯クノ如キ變化ハ注射後 12 時間ヲ經テ殺シタルモノニ最モ著シ (Fig. 3)。注射後 3 時間ニ殺シタル家兎ノ心筋纖維ノ核ハ細長ノモノ多キモ永ク生活スルニ從ヒ漸次膨大淡染セリ、殊ニ注射 12 時間ヲ經テ殺シタルモノノ心筋纖維ノ核ノ如キハ著シク膨大淡染セルモ、其ノ周圍ノ肉漿ハ著シク減少シ核ト原纖維トハ接在シ横紋ハ不明トナリ、間挿部ハ膨大シ其ノ太サヲ増シ筋纖維間毛細管ハ擴張充血セリ (Fig. 3)。横斷標本ニテハ纖維ノ斷面ハ擴張セル毛細血管ニ由テ、互ニ著シク離レテ存シ著シク不正形ヲ呈セリ、核周圍ノ不染部ハ全ク消失シ纖維ノ構造ハ鬆疎トナレリ (Fig. 4)。之等ノ標本ニ於テ心内ノ太キ血管ハ正常ノ狀ヲ呈セルモ毛細血管ハ著シク擴張シ、加之所々ニ小靜脈及ビ毛細血管ノ破裂ニヨル出血竇ヲ見ル (Fig. 17)。

4) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 24 時間及ビ 48 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ心筋所見。

縦斷標本ニテハ筋纖維ハ著シク膨脹シ其ノ太サヲ増シ互ニ接在セリ。肉漿一般ニ増量シ原纖維小束ハ著シク疎在シ、核ハ膨大シ横徑ヲ増シ纖維ハ一般淡染セリ。横紋ハ不明トナリ間挿部ハ膨脹シ帶狀ヲ呈セリ。而モ核周圍ノ肉漿ハ殆ド消失シ、核ト原纖維トハ接在セ

リ。但シ一少部ニ於テハ毛細血管擴大シ筋纖維ヲ壓迫シ纖維間間隙廣潤トナレルヲ見ル。横斷標本ニテハ纖維ノ斷口甚ダ太ク、原纖維小束ハ増量セル肉漿ニ由テ著シク分タレ平等ニ疎在セリ、而モ核周圍ノ肉漿ハ減量シ、核ト小束トハ接在セリ、又一小部ニ於テハ擴張セル毛細血管ノ爲メ纖維間間隙大トナレルヲ見ル。注射後 48 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ心筋ハ纖維ノ膨脹最モ顯著ニシテ一般ニ毛細血管ノ擴大ヲ見ズ、纖維ハ互ニ密着シ核モ膨大淡染シ間挿部ハ太キ帶狀ヲ呈セリ (Fig. 5)。横斷標本ニテハ纖維ノ斷口大ニシテ互ニ密着シ原纖維小束ハ平等ニ排列シ疎在セリ (Fig. 6)。之等ノ標本ニハ所々ニ毛細血管及ビ小靜脈ノ破裂ニヨル出血ヲ見ル。

5) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 72 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ心筋所見。

心筋纖維ハ著シク其ノ膨脹度ヲ減ジ、一般ニ良ク染色セリ。原纖維ハ稍々密ニ排列シ横紋ハ明カトナリ間挿部ハ不明トナレリ、核ハ一般ニ正常ノ狀ヲ呈セルモ未ダ膨大淡染セルモノ散在セリ。血管ハ一般ニ正常ノ狀ニ復セリ。

第 2 節 顎下腺ノ所見

1) 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシモノ、及ビ其ノ 1/10 量ヲ注射シ 20 分ヲ經テ殺シタル家兎ノ顎下腺所見。

弱擴大ニテハ辛ジテ明暗兩種細胞ヲ區別シ得ルモ、暗細胞ハ著シク減數セリ。強擴大ニテハ暗細胞ハ縮少シ、「エオジン」ニ染色セル粗大顆粒ハ減數シ、核ハ淡染シテ細胞基底ヲ離ルルモノ多シ。明細胞ハ縮少シ其ノ網眼小

トナリ多クハ基底部分ニ核ヲ有セリ。而シテ同細胞ノ構成セル腺胞間間隙ハ大トナレルヲ見ル (Fig. 10)。次ニ致死スルマデ注射セシ家兎ノ顎下腺内ノ主ナル血管ハ著シク擴張シ其ノ管壁ハ菲薄トナリ、内膜及ビ中膜ノ平滑筋纖維ハ伸展シ纖維ハ互ニ集在シ疎在ノ小束ヲ形成セリ、小血管殊ニ小靜脈竝ニ毛細血管モ著シク擴張シ腺胞ヲ壓迫セリ。小量注射後 20 分ニ殺シタルモノニ於テハ顎下腺内ノ主ナル動脈ハ管壁正常ノ狀ヲ保テルモ、靜脈及ビ殊ニ毛細血管ハ極メテ強度ニ擴張シ管壁菲薄トナリ其ノ諸細胞ハ伸展シ、腺胞ハ強度ニ壓迫セラレルヲ見ル。

2) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 1 時間竝ニ 3 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ顎下腺所見。

弱擴大ニテハ辛ジテ明暗兩種細胞ヲ區別シ得ルコト前例ト同様ニシテ、強擴大ニテ檢スルモ暗細胞ハ縮少シ、核ハ細胞基底ヲ離レ、「エオジン」好染顆粒ハ減數セルヲ見ル。然ルニ明細胞ハ膨大シ相互ニ接在シ其ノ網眼大小不同トナレリ、但シ核ハ細胞基底部分ニ存セリ。腺内ノ血管ハ一般ニ擴張セズ殆ド正常ノ狀ヲ保テリ。

3) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 6 時間、12 時間及ビ 24 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ顎下腺所見。

暗細胞ハ減數シ且縮少セリ、粗大顆粒モ亦減數シ、核ハ細胞基底ヲ離レ淡染セリ。明細胞ハ著シク膨大シ網眼大トナリ、核ハ細胞基底部分ニ壓セラレ縮少セリ。就中注射後 12 時間ヲ經テ殺シタルモノニ於テ腺細胞ハ最モ著明ニ變化シ且排泄管ノ細胞竝ニ主血管ノ平滑筋及ビ其ノ核ハ膨脹淡染セルヲ見ル (Fig.

11). 之ニ反シ注射後 24 時間ヲ經テ殺シタルモノニ於テハ變化ノ度減少セリ。

4) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 48 時間、竝ニ 72 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ顎下腺所見。

注射後 48 時間生活セシモノニ於テハ暗細胞稍々増數シ、粗大顆粒ハ其ノ數ヲ増シ核ハ多クハ細胞基底部に存在シ淡染セリ。明細胞ノ網眼ハ稍々小トナリ、核ハ細胞基底部に位シ圓形ヲ呈セリ。注射後 72 時間生活セシモノニ於テハ弱擴大ニテ檢スレバ判然明暗兩種細胞ヲ區別シ得テ暗細胞ハ増數セリ。強擴大ニテ檢スレバ暗細胞ハ稍々大トナリ、粗大顆粒ハ増數シ核ハ細胞基底部に位セリ。明細胞ノ網眼ハ小トナリ増數シ、核ハ細胞基底部に存シ稍々縮少濃染セリ。血管ハ一般ニ正常ノ狀ヲ呈セリ。

第 3 節 耳下腺ノ所見

1) 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシモノ、及び其ノ 1/10 量ヲ注射シ 20 分ヲ經テ殺シタル家兎ノ耳下腺所見。

致死量ヲ注射セシモノノ腺細胞ハ稍々小トナリ原形質顆粒ハ一般ニ稍々粗大トナレリ。小量注射後 20 分ヲ經テ殺シタルモノノ腺細胞モ縮少シ原形質顆粒粗大トナリ増數セリ、核ハタメニ覆ハレテ不明瞭トナリ細胞基底部に壓迫セラル、腺胞間ノ間隙ハ大トナレリ (Fig. 7)。血管殊ニ毛細血管ハ擴張シ腺胞ヲ壓セリ。然レドモ顎下腺ニ於ケルガ如ク著シカラズ、血管壁諸細胞及び纖維ハ伸展セリ。

2) 同上 1/10 量ヲ注射シ 1 時間、3 時間、6 時間、12 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ耳下腺所見。

腺胞ハ大トナリ互ニ接在シ、腺細胞顆粒ハ粗大トナリ増數セリ。殊ニ注射後 12 時間ヲ經テ殺シタルモノニ於テハ粗大顆粒著シク増數シ爲ニ、核ハ覆ハレテ認メラザルコト多シ (Fig. 8)。血管ハ注射後短時間生活セシモノニ於テハ正常ト大差ナシト雖モ、注射後 12 時間ヲ經テ殺シタルモノニ於テハ管壁ハ膨脹淡染シ、管腔稍々狹小トナレリ、且腺排泄管モ同様ノ變化ヲ示セリ。

3) 同上 1/10 量ヲ注射シ 24 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ耳下腺所見。

腺細胞ハ著シク縮少シ、腺胞間間隙大トナレリ、腺細胞内粗大顆粒ハ全ク消失シ、只極メテ小ナル顆粒ノミ現存セリ、核ハ細胞中央部に位シ著シク鮮明ナリ (Fig. 9)。排泄管細胞ハ膨脹シ高徑ヲ増シ其ノ核ハ膨大淡染セリ。血管ハ擴張セズ其ノ管壁ノ諸細胞及び核ハ膨脹淡染セリ。

4) 同上 1/10 量ヲ注射シ 48 時間竝ニ 72 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ耳下腺所見。

48 時間後ノモノニ於テハ腺細胞ハ粗大顆粒ヲ含ムコト極メテ僅ナリ、腺胞ハ大トナリ核ハ淡染シ胞體基底部にアリ。而シテ 72 時間後ノモノニ於テハ腺細胞ハ染色性ヲ恢復セルモ粗大顆粒ヲ有セズ只小顆粒彌蔓性ニ存在セルノミ、腺胞ハ其ノ大サヲ増シ核ハ圓形ヲ呈シ細胞基底部に存スルコト多シ。血管ハ一般ニ正常ノ狀ヲ呈セリ。

第 4 節 肝臓ノ所見

1) 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシ家兎ノ肝臓所見。

肝細胞ノ多數ハ膨脹シ容積ヲ増シ個々相接

シ細胞索稍々不明亮トナリ、胞體中ノ顆粒ハ一樣ニ散在シ、核ハ稍々膨大淡染セリ。星芒細胞ハ壓セラレ其ノ核ハ紡錘形ヲ呈セリ。然レドモ所々ニ毛細血管擴張シ、肝細胞ヲ壓セル部アルヲ見ル。中心靜脈ハ稍々縮少シ、大ナル血管特ニ動脈、門脈竝ニ膽管ノ壁諸細胞及ビ其ノ核ハ膨脹淡染シ、管腔ハ狹小トナレリ。

2) 同上 1/10 量ヲ注射シ 20 分ヲ經テ殺シタル家兎ノ肝臓所見。

一般ニ中心靜脈及ビ毛細血管ハ著シク擴張シ血球多數存セリ、爲ニ肝細胞ハ壓迫セラレ細長トナレルモ、比較的大ナル淡染核ヲ藏セリ。細胞索ハ甚ダ明瞭トナレルモ、個々ノ肝細胞境界ハ却テ不鮮明トナレリ。星芒細胞ハ膨大セル核ヲ有シ、肝細胞ハ一般ニ顆粒狀ヲ呈シ、所々ニ空泡ヲ有セリ (Fig. 12)。大ナル血管ノ滑平筋纖維ハ延長シ管腔ハ大トナレリ。

3) 同上 1/10 量ヲ注射シ 1 時間、3 時間及ビ 6 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ肝臓所見。

注射後 1 時間以上ヲ經テ殺シタル家兎ノ肝臓ハ注射後 20 分ヲ經テ殺シタルモノト大同小異ノ所見ヲ呈セリ。即チ肝細胞及ビ其ノ核ハ後者ノモノヨリ稍々淡染シ個々ノ境界一層不明トナリ胞體中ノ顆粒ハ稍々減數シ所々ニ空泡アルヲ見ル。中心靜脈ハ正常ノ狀ニ復セルモノ多ク、膽管及ビ大ナル血管ハ擴張セズ殆ド正常ノ狀ヲ保テルモ毛細血管ハ擴張シテ肝細胞ヲ壓迫セリ。

4) 同上 1/10 量ヲ注射シ 12 時間竝ニ 24 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ肝臓所見。

肝細胞ハ核ト共ニ著シク膨脹淡染シ、個々

互ニ接在シ其ノ境界不明トナリ、毛細血管ハタメニ壓セラレ著シク狹小トナリ或ハ不明トナレリ。胞體中ノ顆粒ハ減少シ却テ空泡ヲ含メルモノ多シ (Fig. 13)。然レドモ稀ニ毛細血管擴張シ肝細胞ヲ壓シ、之ヲ狹長ナラシムル部アルヲ見ル。中心靜脈ハ正常ノ狀ヲ呈セルモノ多ク、大ナル血管及ビ膽管ノ壁竝ニ其ノ周圍ノ結締組織ハ膨脹シ、核モ膨大淡染シ管腔ハ狹小トナレリ。

5) 同上 1/10 量ヲ注射シ 48 時間及ビ 72 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ肝臓所見。

中心靜脈ハ正常ノ狀ヲ呈シ、肝細胞及ビ其ノ核ハ染色性ヲ恢復シ、細胞個々ノ境界稍々明瞭トナレリ。胞體內ノ顆粒ハ瀰蔓性ニ存シ空泡全ク消失セリ。血管膽管ハ殆ド正常ト差異ナク、殊ニ注射後 72 時間ヲ經テ殺シタルモノニ於テハ全ク正常ノ狀ヲ呈セリ。

第 5 節 腎臓ノ所見

1) 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシモノ、及ビ其ノ 1/10 量ヲ注射シ 20 分ヲ經テ殺シタル家兎ノ腎臓所見。

致死スルマデ注射セシモノニ於テハ弓狀血管及ビ小葉間血管ハ著シク擴張シ、動脈壁殊ニ其ノ中膜ハ著シク菲薄トナリ、滑平筋纖維ハ延長シ互ニ集合シ疎在セル小束ヲ形成セリ、滑平筋ノ核モ細長トナリ濃染セリ、外膜ノ結締組織ハ鬆疎ノ構造ヲ有ス。靜脈壁モ薄クシテ細胞ハ延長シ核間ノ距離大トナレリ (Fig. 18)。注射後 20 分ヲ經テ殺シタルモノニテハ大靜脈ハ著シク擴張セルモ、動脈ハ最早擴張セズ管壁ハ肥厚シ略ボ正常ノ狀ヲ呈セリ。細尿管周圍ノ毛細血管ハ之等ノ時期ニハ

一般ニ著シク擴大シ充血セリ。細尿管ノ細胞ハ曲細尿管ノミナラズ直細尿管ニ於テモ一般ニ壓縮セラレ、核ハ稍々縮少シ細胞個々ノ境界不鮮明トナリ、管腔ハ著シク狭小トナリ或ハ不明トナレルヲ見ル。絲毬體ハ其ノ大サヲ増シ充血シ、Bowmann氏囊ノ間隙ハ著シク狭小トナレリ (Fig. 14)。

2) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 1 時間, 3 時間及ビ 6 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ腎臟所見。

注射後 1 時間以上ヲ經テ殺シタルモノニ於テテハ、腎内主血管ハ擴張セズ正常ノ狀ヲ呈セリト雖モ曲直細尿管ノ細胞ハ著シク膨脹淡染シ、其ノ高徑ヲ増シ管腔内ニ膨隆セリ。從ツテ管腔ハ甚シク狹隘トナリ或ハ消失セルモノ多シ。周圍ノ毛細血管モ壓迫セラレ細尿管ト密在シ、管腔著シク狭小トナリ或ハ全ク閉鎖セリ。絲毬體ハ膨大セル細尿管ノタメ壓セラルルニ拘ハラズ擴張シ、Bowmann氏囊間隙ハ著シク狭小トナリ或ハ全ク閉鎖セリ。

3) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 12 時間, 24 時間及ビ 48 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ腎臟所見。

注射後 12 時間ヲ經テ殺シタルモノノ腎ノ諸細胞ハ膨脹シ、太キ血管特ニ動脈ノ壁ハ膨脹シ管腔稍々狭小トナレリ。注射後 24 時間及ビ 48 時間ヲ經テ殺シタルモノニテハ主部ニ最モ顯著ナル膨脹の變化ヲ見ルニ拘ハラズ (Fig. 15)。Henle 氏係蹄、中間部、集合管ノ細胞ハ膨脹セルモノ時間ト共ニ減少シ、多クノ細胞ハ却テ縮少シ其ノ核ハ小トナリ稍々濃染セリ (Fig. 19)。注射後 24 時間ノモノニ於テハ腎内主血管特ニ動脈ハ管壁肥厚シ管腔狭

小トナリ、内膜ハ膨脹淡染シ彈力内膜ノ波濤ハ高徑ヲ増セリ、中膜ノ輪狀筋纖維ハ膨脹シ其ノ核ハ膨大淡染セリ、外膜ノ結締組織モ膨脹シ其ノ核ハ大トナリ淡染セリ (Fig. 19)。注射 48 時間後ノモノニテハ腎ノ動脈ハ前述ノモノヨリ著シク膨脹度ヲ減ゼルモ、絲毬體毛細血管ハ猶ホ擴大セリ。

4) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 72 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ腎臟所見。

大部ノ細胞ハ正常ノ狀ニ復シ良ク染色セリト雖モ曲細尿管ノ一部ニハ猶ホ膨脹セル細胞ヲ見ル。血管モ一般ニ絲毬體ニ至ルマデ正常ノ狀ヲ示セリ。

第 6 節 脾臟ノ所見

a) 第 1 實驗ノ所見

1) 亞硝酸「アミール」ヲ注射シ致死セシメタルモノ、及ビ其ノ 1/10 量ヲ注射シ 20 分ヲ經テ殺シタル家兎ノ脾臟所見。

脾小節ノ淋巴細胞ハ一般ニ稍々縮少濃染セリ。格網細胞ハ絲狀ノ突起ヲ出シ互ニ相連結シ大ナル網眼ヲ形成シ、其ノ核ハ長橢圓形トナリ濃染セリ、網眼中ニハ 1 箇乃至數箇ノ淋巴細胞ヲ含メリ。小節内動脈ノ壁ハ菲薄トナリ管腔著シク擴大セリ、其ノ内彈力膜ノ波濤ハ高徑低ク、内皮ノ核ハ濃染シテ管腔ニ向フテ突隆セリ、中膜ハ菲薄トナリ滑平筋纖維ハ伸展シ互ニ集合且疎在ノ束ヲ作り、其ノ核ハ長紡錘形トナリ濃染セリ、外膜ノ格網細胞ノ突起ハ絲狀網工ヲ形成シ、其ノ核ハ細長ニシテ彎曲セリ (Fig. 20)。脾被膜及ビ梁材ノ結締組織及ビ滑平筋ハ稍々縮少シ、其ノ核ハ稍々細長トナリ濃染セリ。脾竇ニ於ケル格網

ハ絲狀ニシテ大ナル網眼ヲ形成シ、其ノ核ハ紡錘形トナリ稍々濃染セリ、網眼中ニハ淋巴細胞並ニ多數ノ赤血球、赤血球ノ破片或ハ其ノ凝塊ヲ含メリ、又英動脈ハ擴大充血シ、管壁ハ菲薄トナリ、彈力內膜波濤ハ其ノ高サヲ減ジ內皮核ハ管腔ニ突出シ濃染セリ、靜脈竇ハ擴大シ其ノ周邊ハ紐狀ノ壁細胞ヨリ界セラレ、其ノ突起ハ脾竇格網ノ細胞ト連ナレリ、又管腔内ニ強く突出セル核ヲ有シ、竇内ニハ多數ノ赤血球及ビ淋巴球ヲ含メリ (Fig. 21).

2) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 1 時間及ビ 3 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ脾臓所見。

脾小節內淋巴細胞ハ對照ト大差ナシ。格網ハ紐狀トナリ、網眼稍々小トナレリ、其ノ核ハ稍々膨大シ橢圓形ニシテ淡染セリ。小節內動脈ノ管壁ハ稍々膨大シ正常ノモノト略ボ同様ノ管腔ヲ示セリ。脾被膜及ビ梁材ノ結締組織及ビ滑平筋ハ稍々膨脹セリ。脾竇ノ格網細胞ノ突起ハ稍々太キ紐狀トナリテ膨脹セリ、從ツテ網眼稍々狹小トナリ、其ノ内ニアル赤血球及ビ其ノ破片ハ稍々減數セリ。英動脈ノ管腔ハ狹小トナリ。靜脈竇ノ大サハ正常ト大差ナク竇内ニハ赤血球多數ニ存シ、竇ノ境界ハ紐狀ノ壁細胞ヨリナリ、脾竇ノ格網細胞突起ニ移行シ橢圓形ノ核ヲ有セリ。

3) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 6 時間、12 時間、24 時間及ビ 48 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ脾臓所見。

注射後 6 時間ヲ經テ殺シタルモノハ敍上ノ膨脹の變化極メテ顯著トナリ、更ニ久時生活シタルモノニ於テハ變化益々著明トナルヲ見ル。以下注射後 48 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ脾臓所見ニ就キ記述セン。

脾小節ノ淋巴細胞ハ一般ニ膨脹シ其ノ大サヲ増シ、格網組織細胞突起ハ「エオジン」ニ淡染シ膜様トナリテ小節ノ礎質ヲナシ恰モ淋巴細胞ヲ其ノ上ニ安置セルカノ觀ヲ呈セリ、從ツテ網眼ハ全ク消失シ、其ノ核ハ膨大セル長橢圓形トナリテ淡染セリ。小節內動脈ノ管壁ハ著シク肥厚シ、內皮細胞ノ核ハ膨大淡染セリ、又內彈力膜ノ波濤ハ高大トナリ、中膜ノ輪狀筋纖維ハ膨脹シ核ハ彎曲セル大紡錘形ヲ呈シ膨大淡染セリ、外膜ノ格網細胞ハ膨脹シ其ノ核ハ橢圓形トナリ淡染シ細胞突起ハ各連結シ密ニ接在中膜ヲ圍繞セル一帯ヲナシ且脾小節ノ格網組織ト相連續シ互ニ移行セリ、斯クテ小節內動脈ノ管腔ハ狹小トナリ、少量ノ血球及ビ凝固血漿ヲ容レ或ハ殆ト閉塞セルヲ見ル (Fig. 22)。然ルニ脾門ニ近キ梁材中ノ動脈ハ小節內動脈ト其ノ所見ヲ異ニシ、內膜ハ變化ナク、中膜ノ輪狀筋纖維モ肥厚セズ外膜ハ梁材ト連リ稍々膨脹シ其ノ核ハ橢圓形ヲ呈セリ、從テ管腔ハ狹小トナラズ (Fig. 24) 脾被膜ハ稍々膨脹シ其ノ核ハ彎曲シ橢圓形ヲ呈シ稍々膨大セリ。脾内部ノ梁材内ノ滑平筋纖維ハ被膜ノモノヨリ著シク膨脹シ核モ大トナリ彎曲セル紡錘形ヲ呈シ淡染セリ。脾竇ニ於ケル格網細胞ノ突起ハ其ノ幅ヲ増シ近隣ノモノト連リ「エオジン」ニ染色セル膜様ノ礎質ヲ構成シ、之ニ淋巴球附着シ赤血球ハ只僅ニ 1—2 箇宛散在性ニ存セルノミニシテ網眼ハ全ク消失シ、其ノ核ハ稍々彎曲セル長紡錘形トナリ膨大淡染セリ。英動脈ハ管腔著シク狹小トナリ或ハ全ク閉鎖シ、管壁ハ著シク膨脹淡染セリ。靜脈竇ハ稍々狹小トナリ赤血球充滿シ淋巴球ハ點々散在セリ、其ノ壁ヲ境セル

細胞ハ脾竇格網ト連リ、其ノ核ハ長橢圓形ヲ呈シ靜脉竇内ニ隆起セリ (Fig. 23).

4) 同上 1/10 致死量ヲ注射シ 72 時間ヲ經テ殺シタル家兎ノ脾臟所見.

脾小節ノ淋巴細胞ハ其ノ膨脹度ヲ減ジ染色性ハ恢復セリ、格網細胞ノ突起モ著シク膨脹度ヲ減ジ太キ紐狀物ヲ造リ網眼大トナリ、核ハ橢圓形トナリ稍々淡染セリ。小節内動脈ノ壁モ著シク膨脹度ヲ減ジ菲薄トナリ管腔大トナリ、外膜ノ格網細胞ノ突起ハ紐狀或ハ帶狀トナリ中膜ヲ圍メリ。脾竇ノ格網細胞ノ突起モ紐狀トナリ大網眼ヲ圍ミ其ノ内ニ多數ノ赤血球ヲ含メリ。英動脈管壁モ菲薄トナリ管腔大トナレリ。靜脉竇内ノ赤血球ハ著シク減少セリ。

附：以上實驗ニ於テ脾臟ト脾臟トノ間ニ存スル脂肪中ノ大ナル動靜脈ニハ組織學的變化ヲ見ザリキ。

b) 第 2 實驗ノ所見

1) 脾動脈ヲ結紮シ其ノ血行ヲ中絶セシメ 3 分後空氣栓塞ニテ致死セシメタル家兎ノ脾臟所見.

脾小節内ノ動脈ノ壁ハ稍々肥厚シ、内膜ハ膨大シ内皮細胞ノ核ハ淡染シ管腔内ニ突隆セリ、中膜ノ輪狀筋纖維モ膨脹淡染シ其ノ核ハ紡錘形ニシテ膨大セリ、外膜ハ帶狀ノ格網ヨリ圍マレ此物脾小節ノ格網ニ連ナレリ (Fig. 25). 英動脈ノ管壁ハ肥厚シ壁細胞ハ膨脹シ管腔著シク狭小トナレリ。脾竇及ビ脾小節内ノ格網組織及ビ梁材内ノ滑平筋纖維ハ稍々膨脹セリ。又脾竇及ビ靜脉竇内ニハ多數ノ赤血球ヲ見ル。

2) 脾動脈ヲ結紮シ其ノ血行ヲ中絶セシメ

タル後亞硝酸「アミール」ヲ耳靜脉ニ注射シ致死セシメタル家兎ノ脾臟所見.

單ニ脾動脈ヲ結紮スルノ後殺シタルモノノ所見ト大差ナク兩者ヲ區別スルコトヲ得ズ。即チ小節内動脈及ビ英動脈ノ管壁ハ膨脹肥厚シ管腔ハ狭小トナレリ (Fig. 26).

3) 脾靜脉ヲ結紮シ其ノ血行ヲ中絶セシメ 3 分ヲ經テ空氣栓塞ニヨリテ殺シタル家兎ノ脾臟所見.

單ニ動脈ヲ結紮シタル後殺シタルモノト大差ナク兩者ヲ區別スルコトヲ得ザリキ (Fig. 27).

4) 脾靜脉結紮後 3 分ヲ經テ亞硝酸「アミール」ヲ耳靜脉ニ注射シ致死セシメタル家兎ノ脾臟所見.

脾動脈ヲ結紮シ亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシモノト區別スルコトヲ得ザリキ (Fig. 28).

第 4 章 總括並ニ考按

血管系ノ變化ヲ主トシ以上ノ實驗成績ヲ總括センニ、亞硝酸「アミール」ヲ家兎耳靜脉ニ致死スルマデ注射セバ心筋、顎下腺、耳下腺、腎臟及ビ脾臟内ノ主動靜脉ハ擴張シ、管壁ハ菲薄トナリ、滑平筋纖維ハ延長シ、筋纖維ハ互ニ集束シ疎在ノ小束トナル。但シ肝臟ノ血管壁ノ諸細胞及ビ筋纖維ハ此時期ニハ却テ稍々膨脹シ血管腔稍々狭小トナル。同劑致死量ノ 1/10 ヲ注射シ 20 分ヲ經テ殺セシモノノ心臓及ビ腎臟内ノ主ナル動脈ハ既ニ恢復セル狀ヲ呈スルモ、肝臟ニテハ此時初メテ大ナル動靜脉ノ擴張、管壁ノ菲薄トナレルヲ觀ル、然レドモ注射後 1 時間ニハ正常ノ狀ニ復スル

モノトス。小血管殊ニ毛細血管並ニ小靜脈ハ注射直後ヨリ長時間ニ亙リ擴張ノ狀ヲ呈セリ。但シ其ノ度ハ各臓器ニ從ヒ差異アルノミナラズ、恢復ノ時間ニモ遲速アリ。即チ心臓ニ於テハ注射直後ヨリ毛細管ノ破裂ニ由ル出血竇ヲ生ジ、漸次増數シ注射48時間後ニハ多數ノ出血竇ヲ見ル、而シテ注射1時間後ヨリ毛細血管ノ擴張漸次顯ハレ注射後3時間ヨリ一般ニ筋纖維間ノ毛細管ハ著シク擴張シ膨脹セル筋纖維ヲ強く壓迫シ、纖維間ノ間隙ハ著シク大トナル。注射後12時間ヲ經ル時ハ筋纖維間毛細血管ハ最モ強度ニ擴張シ、其ノ後ハ漸次恢復スルモノトス。注射後48時間ヲ經シモノニテハ筋纖維ノ膨脹強度トナリ最早毛細血管ノ擴張ヲ見ザルニ至ル。

耳下腺、顎下腺ニテハ注入直後ヨリ20分後迄腺内ノ血管ハ毛細血管ニ至ルマデ一般ニ著シク擴張スルモ甚ダ短時間ニ恢復シ。注射後1時間ニハ最早一般血管ノ擴張ヲ見ザルニ至ル。注射後12時間ヲ經ル時ハ排泄管細胞ノ膨脹ヲ見ルノミナラズ、大ナル血管壁ノ諸細胞及ビ筋纖維モ膨脹シ管腔狹小トナル。

肝臓ニ於テハ注射直後、小血管及ビ毛細血管ノ擴張ハ只一少部ニ過ギザルモ、注射後20分ヨリハ頗ル著明トナリ、次デ漸次微弱トナルモ、注射後6時間マデハ猶ホ可成擴大シテ肝細胞ヲ壓セルヲ見ル、然レドモ其ノ後ハ肝細胞ガ膨脹シ最早小血管ノ擴大ヲ見ザルニ至ル。注射後12時間乃至24時間ニハ一般ニ肝細胞ノ著シク膨脹ノ變化ヲ見ルノミナラズ、大ナル血管ノ壁ハ膨脹肥厚シ管腔狹小トナルモ、其ノ後ハ速ニ恢復スルヲ見ル。

腎臓ニ於テハ注射直後ニ弓狀血管、小葉間

血管ノミナラズ細尿管周圍ノ毛細血管及ビ絨毛管ニ至ルマデ一般ニ著シク擴張シ、管壁非薄トナル。注射後20分ニハ大ナル動脈ノ管壁ハ肥厚シ正常ノ狀ニ復シ、注射後1時間ニハ最早一般血管ノ擴張ハ消失スルモ、絨毛管ハ猶ホ擴大シ、加之注射後48時間ニ於テモ猶ホ擴張セリ、其ノ後漸ク正常ノ狀ニ恢復スルヲ見ル。而シテ注射後12時間乃至24時間ニ於テハ一般實質細胞ハ膨脹シ、大ナル血管ノ管壁ハ膨脹肥厚シ管腔狹小トナル。

次ニ實質細胞ヲ主トシ所見ヲ總括センニ。

注射直後及ビ20分後ニハ心筋纖維ハ未ダ變化ヲ惹起セザルモ、顎下腺明暗兩種細胞ハ縮少シ、暗細胞ノ粗大濃染顆粒ハ減數シ、明細胞ヨリナレル腺胞ハ擴大セル毛細血管ノタメ壓迫セラレ腺胞間間隙大トナル。耳下腺ニ於テハ腺細胞ハ擴大セル毛細血管ノタメ壓セラレ、縮少スルモ同細胞内ノ顆粒ハ漸次粗大トナル。肝臓ニ於テハ注射直後ニハ細胞ハ大多數膨脹セルモ、小數ノモノハ擴大セル毛細血管ノタメ壓縮サルヲ見ル。但シ注射後20分ニテハ肝内毛細血管ハ一般ニ著シク擴大シ肝細胞ハ著シク壓縮セラレ、細胞索明瞭トナレリ。腎臓ニ於テハ注射直後及ビ20分後ニハ一般ニ血管ハ擴張シ、細尿管ハ壓縮セラレ管腔著シク狹小トナリ、絨毛體ハ其ノ毛細管ノ擴張ニ由テ膨大セリ。

注射後1時間以後ニ於テハ一般ニ諸臓器内ノ大ナル血管ノ擴張ヲ見ザルニ反シ、實質細胞ハ著シク膨脹スルモノトス。

心臓ニ於テモ原纖維ハ肉漿ト共ニ膨脹シ纖維ノ構造緩疎トナル、而モ核周圍ノ肉漿ハ著

或ハ閉鎖ノ狀ニアルト、脾臓ノ格網細胞ハ互ニ連續性ニ融合シ網眼消失シ内實性ノ組織ヲ形成シ共ニ血行ヲ妨グルモノト信ズ。

脾動脈或ハ靜脈ヲ結紮シ、或ハ更ニ亞硝酸「アミール」ヲ注射シ致死セシメタルモノニ於テモ小節内動脈及ビ莢動脈ノ壁殊ニ滑平筋纖維ハ膨脹シ管腔著シク狹小トナリ、格網細胞モ亦膨脹スルモノトス。

今亞硝酸「アミール」ノ血管擴張作用ヲ中樞性ナリトセンカ、假令動脈或ハ靜脈ヲ結紮シ血行ヲ中絶セシムルモ血管ハ擴張スベキ理ナリ。而シテ脾臓ノ神經ハ Tellyesniczky 氏ニ據レバ脾門ヨリ進入シ血管鞘内ヲ走り大部ハ無髓ノ交感纖維ヨリナリ運動性ニ屬セリ。其ノ他 Kölliker 氏ノ記載セシガ如ク、少數ノ知覺性有髓纖維アリテ迷走神經ヨリ來レリ。故ニ脾動脈或ハ脾靜脈ヲ結紮スルモ神經ノ傳達ハ阻害サレザルガ故ニ亞硝酸「アミール」ノ作用ハ中樞性ニアラズ。即チ余ノ實驗成績ニ於テ脾靜脈ヲ結紮シテ同劑ヲ注射スル時ハ血管擴張ヲ起サズシテ單ニ脾靜脈ヲ結紮シタル時ト同狀ヲ呈セリ。是レ畢竟鬱血ノ爲メ亞硝酸「アミール」ノ作用顯ハレザリシニヨルモノトス。故亞硝酸「アミール」ハ中樞性ニハ血管ヲ擴張セシメズ、末梢性ニ作用スルモノニシテ注射直後乃至數十分間ハ血管ヲ著シク擴大セシムルモ注射後1時間ヲ經ルトキハ小節内動脈及ビ莢動脈ノ壁ノミナラズ格網組織モ膨脹シ漸次血行ヲ阻害スルモノトス。

Sollmann u. Pilcher, 寺田諸氏ハ藥物學的ニ研究シ、亞硝酸「アミール」ハ血壓下降ノ際血管運動中樞ヲ刺激シ、腎臓脾臓ニ於テハ中樞的ニ却テ血管ヲ收縮セシムト云ヘリ。然レ

ドモ余ノ組織學的研究ニ於テハ腎臓脾臓ニ於テモ注入致死セシメシモノ及ビ其ノ1/10量注射後20分ノ標本ニテハ明カニ一般血管擴張セリ。而シテ腎臓ニテハ注射後1時間ヨリハ實質細胞著シク膨脹シ血行阻害セラルルモ絲毳毛細管ハ長時間擴張セルヲ見タリ。次ニ脾臓ニ於テモ同様ニ血管ノ擴張ヲ見ルノミナラズ、脾臓格網ノ網眼ノ擴大ヲ來セリ。然ルニ注射後1時間後ヨリハ漸次血管及ビ脾臓格網組織ハ膨脹シ網眼狹小トナリ或ハ閉鎖シ血行阻害セラルルニ至ル。是ヲ以テ見レバ亞硝酸「アミール」ハ最初血管ヲ擴張セシムル作用アルハ腎臓及ビ脾臓ニ於テモ認メラルル所ニシテ一般ニ起ル現象ナリト信ズ。然レドモ早晚實質細胞ヲ膨脹セシメ殊ニ脾臓ニテハ小節内動脈及ビ莢動脈ノ壁並ニ格網組織ヲ膨化セシメ爲ニ血流ヲ障碍シ、恰モ血管縮少セルカノ觀ヲ呈スルモノトス。

依是觀之亞硝酸「アミール」ハ末梢性ニ副交感神經ヲ刺激亢奮セシムルモノニシテ臟器内血管系ハ先ヅ擴張スルモノトス。其ノ際血管壁ハ伸展シ、滑平筋纖維ハ互ニ集束シ疎在性ノ小束ヲ作ルヲ見ル。次デ諸臟器ノ實質細胞ハ膨脹シ、血管殊ニ大血管ノ擴張ハ速ニ消滅スルモ、小血管特ニ毛細血管及ビ小靜脈ハ多少久シク擴張ノ狀ヲ保テリ。一般ニ實質細胞ノ膨脹其ノ極ニ達スルト共ニ諸臟器内ノ大血管ノ壁モ亦膨脹スルヲ見ル。就中脾臓ハ血管系ト親密ナル關係ヲ有シ、血流徑路ヨリ觀レバ1ツノ血管系トモ見做シ得ルモノナルガ故ニ、亞硝酸「アミール」ニヨリ一般ニ血管系ト等シク著シキ影響ヲ被リ格網細胞ノ突起ハ始

メ絲狀トナリ、次デ膨脹シ互ニ融合シ内實ノ組織塊トナルモノトス。

顎下腺、耳下腺ノ副交感神經ハHeidenhain氏ニ據レバ多數ノ分泌纖維ト、少數ノ營養纖維トヲ有スト。余ノ實驗成績ニ由レバ亞硝酸「アミール」ハ副交感神經ヲ刺激充奮セシメ、腺細胞ノ分泌機轉ヲ促進セシムルモノニシテ顎下腺ニ於テハ腺細胞中粗大顆粒及ビ網眼ノ減少ヲ來シ、耳下腺ニ於テハ水分及ビ鹽類ノ分泌ヲ促シ有機質ハ溶解スルガ故ニ細胞内顆粒ハ互ニ融合シ且水分ヲ吸收シテ粗大トナルモノトナリト思惟ス。

第5章 結 論

家兎ノ耳靜脈ニ亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射シ、或ハ其ノ1/10量ヲ注射シ種々ナル時間ヲ經テ之ヲ殺シ諸臟器ヲ檢セシニ次ノ如キ成績ヲ得タリ。

1) 注射直後ニハ心筋、顎下腺、耳下腺、腎臟竝ニ脾臟内ノ大ナル血管ハ一般ニ擴張シ、管壁ハ菲薄トナリ、内膜、中膜平滑纖維及ビ外膜結締組織ハ伸展シ、筋纖維ハ互ニ集合シ疎在セル小束ヲ形成シ、束間ニ大ナル間隙ヲ顯スルモノニシテ、其ノ時期ハ肝臟ニ於テハ注射後20分ヨリ擴張シ、心臓及ビ腎臟内ノモノハ注射直後ニ既ニ擴張シ20分後ニハ正常ノ狀ニ復スルニ至ル。一般他臟器ニ於ケル變化ハ注射後1時間ニシテ恢復スルヲ見ル。

小血管殊ニ毛細血管及ビ小靜脈ノ擴張ハ臟器ニヨリテ其ノ強弱及ビ其ノ持續時間ニ差違アリ、顎下腺、耳下腺、腎臟竝ニ脾臟ニ於テハ此血管ノ擴張ハ注射直後ヨリ注射後20分

マデハ著シク顯ハレ、注射1時間後ニハ消失スルヲ見ル。然レドモ心臓ニテハ12時間、肝臟ニテハ6時間、特ニ腎臟ノ絲絨毛細管ニテハ48時間擴張シ殊ニ心臓ニ於テ其ノ狀著シキヲ見ル。

2) 亞硝酸「アミール」ハ諸臟器ノ實質細胞ヲ膨脹セシメ、唾腺ノ分泌ヲ充進セシムモノナリトス。

心筋纖維ハ注射後20分マデニハ著變ヲ見ザルモ1時間後ヨリハ膨脹シ構造鬆疎トナリ、注射3時間後ニハ毛細血管ノ擴張著シキ爲メ膨脹セル筋纖維ハ強ク壓迫セラルルモ、注射後24時間ヨリハ血管ノ擴張消失シ、筋纖維ハ再び著シク膨脹シ、注射後48時間ニハ最も顯著ノ膨脹ヲ示スモノトス。

顎下腺ニテハ注射直後ヨリ暗細胞ノ粗大顆粒ハ減少シ、注射後1時間ヨリハ明細胞ノ網眼漸次大小不同トナリ、暗細胞ハ縮小シ、明細胞ハ膨大ス。此狀ハ注射後12時間ニシテ最も顯著トナルモノトス。

耳下腺ニテハ注射直後ヨリ腺細胞ノ顆粒ハ粗大トナリ、12時間後ニハ之ヲ以テ胞體中ヲ充滿スルニ至ル。然レドモ注射後24時間ニ於テハ粗大顆粒ハ全ク消失シ小顆粒ノミトナリ腺胞ハ縮小スルモノナリトス。

肝臟ニテハ注射直後ニ肝細胞ハ多クハ膨脹ス。注射後20分ニハ一般ニ毛細血管擴張スル爲メ肝細胞ハ壓縮セラル。爾後此狀態ヲ持續シ、只肝細胞核ハ膨大セルヲ見ル。注射後12時間ヲ經ルトキハ毛細血管ノ擴張消失シ、肝細胞ハ再び著シク膨大シ互ニ接在スルニ至ル。

腎臟ニ於テハ注射直後ヨリ毛細血管ハ擴張

シ細尿管ハ壓迫セラレ、絲球體ハ長時間膨大セリ、注射1時間後ヨリハ細尿管ハ全部ニ互リ著シク膨脹セルモ、注射24時間後ヨリハ同管ノ終部ヨリ漸次正常ノ狀ニ恢復スルモノトス。

脾臓ニ於テハ注射直後ヨリ小節内動脈、莢動脈、靜脈竇ハ擴張シ、格網組織ハ絲狀トナリ。注射1時間後ヨリハ小節内動脈、莢動脈ノ管壁及ビ格網組織ハ膨脹シ注射6時間後ニ至リ極メテ著明トナル。此際格網組織ノ網工ハ膨脹シ互ニ融合シ内實性組織トナリ網眼ハ殆ド消失スルヲ見ル、小節内動脈及ビ莢動脈ノ管腔ハ狭小トナリ、脾竇ニハ赤血球消失シ殆ド淋巴球ノミトナリ、靜脈竇ニハ赤血球充滿セリ。此狀ハ注射後48時間ニ於テ最モ著明ナリ。斯ク小節内動脈、莢動脈及ビ格網組織ハ皆膨脹シ血流ヲ停止セシムルモノトス。

3) 脾動脈或ハ靜脈ヲ結紮シ、或ハ結紮後亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射スルトキハ何レノ場合ト雖モ脾臓内血管ノ擴張ヲ見ズ却テ血管壁及ビ格網組織ハ膨脹スルモノトス。是レ孰レノ場合ニモ亞硝酸「アミール」ガ脾ニ達セザルニヨルモノニシテ靜脈結紮ノ場合ニ於テモ鬱血ノタメ、亞硝酸「アミール」ヲ注入スルモ同一結果ヲ來スニ由ルモノトス。之亞硝酸「アミール」ノ血管擴張作用ハ中樞性ニ有ラザルヲ立證スルモノナリト信ズ。

4) 敘上ノ組織學的變化ヨリ思考スルモ亞硝酸「アミール」ノ吸收セラルルトキハ末梢性ニ副交感神經刺激亢奮セラレ臓器内血管ハ先ヅ擴張スルモノトス。次デ諸臓器ノ實質細胞ハ膨脹シ、顎下腺、耳下腺ニ於テハ分泌機ノ亢進ヲ見ル。而シテ或ル臓器ニテハ一般膨脹

的變化ヲ起シ遂ニ血管壁モ膨脹肥大シ血管腔ハ縮少スルニ至ルモノトス。

拙筆スルニ臨ミ御懇篤ナル御指導ト御校閲ヲ
忝ウセシ恩師上坂名譽教授ニ謹ミテ滿腔ノ謝意
ヲ捧ゲ御好意ヲ深謝ス。

文 獻

- 1) Bayliss, Hefter's Handbuch d. exp. Pharm., 1. 2) Brunton, Journ. of Anat. and Physiol. 5, 1893; Ber. d. k. Sächs. Ges. d. Wissensch. zu Leipzig., 1869. 3) Cow, Journ. of Physiol., 42. 4) Ellenberger, Handbuch d. vergl. mikr. Anat. d. Haustiere, 1906. 5) Fühne, Pflüger's Arch., Bd. 9, 1874. 6) Heidenhain, R., Pflüger's Arch. f. ges. Physiol., Bd. 17, 1878. 7) Kölliker, Cit. nach Ellenberges. 8) Kobert, Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. 22, 1886. 9) Leech, Brit. med. Journ., I, II, 1893. 10) Meyer u. Gottlieb, Exp. Pharm. 5, Auflage, 1928. 11) Mollendorff, Handbuch d. mikr. Anat. d. Menschen, 1931. 12) Morawitz u. Zahn, Arch. f. klin. Med., Bd. 116, 1914. 13) Meyer u. Friedlich, Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. 5, 1876. 14) Pick, Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. 42, 1899. 15) Schmiedeberg, Grundriss d. Pharm., 1921. 16) Sollmann u. Pilcher, Journ. of Pharm. a. exp. Therap., Bd. 6, 1915. 17) Stöhr, Lehrbuch d. Histologie, 22, Auflage, 1930. 18) Tellysniczky, Cit. nach Ellenberges. 19) Tanaka, Arbeiten aus der Med. Univers. zu Okayama, I, Band 2, Heft, 1929. 20) 上坂, 日新醫學, 第20年, 第8號, 昭和6年. 21) 上坂, 解剖學雜誌, 第3卷, 第3號, 昭和5年. 22) 寺田, 實驗藥物學雜誌, 第2卷, 第1號, 昭和5年.

附 圖 説 明

- Fig. 1.** 亞硝酸「アミール」1/10 致死量注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ノ心筋縦斷
- Fig. 2.** 同上横斷
- Fig. 3.** 同注射後 12 時間ニテ殺シタル家兎ノ心筋縦斷
- Fig. 4.** 同上横斷
- Fig. 5.** 同注射後 48 時間ニテ殺シタル家兎ノ心筋縦斷
- Fig. 6.** 同上横斷
- Fig. 7.** 同注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ノ耳下腺
- Fig. 8.** 同注射後 12 時間ニテ殺シタル家兎ノ耳下腺
- Fig. 9.** 同注射後 24 時間ニテ殺シタル家兎ノ耳下腺
- Fig. 10.** 同注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ノ顎下腺
- Fig. 11.** 同注射後 12 時間ニテ殺シタル家兎ノ顎下腺
- Fig. 12.** 同注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ノ肝臓
- Fig. 13.** 同注射後 24 時間ニテ殺シタル家兎ノ肝臓
- Fig. 14.** 同注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ノ腎臓
- Fig. 15.** 同注射後 24 時間ニテ殺シタル家兎ノ腎臓
- Fig. 16.** 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシ家兎ノ心筋内動静脈
- Fig. 17.** 亞硝酸「アミール」ノ 1/10 致死量注射後 12 時間ニテ殺シタル家兎ノ心筋内血管
- Fig. 18.** 亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシ家兎ノ腎臓内血管
- Fig. 19.** 亞硝酸「アミール」ノ 1/10 致死量注射後 24 時間ニテ殺シタル家兎ノ腎臓内血管
- Fig. 20.** 同上注射後 20 分ニテ殺シタル家兎ノ脾臓小節内動脈及ビ脾小節
- Fig. 21.** 同上脾臓及ビ静脈竇
- Fig. 22.** 同上注射後 48 時間ニテ殺シタル家兎ノ脾臓小節内動脈及ビ脾小節
- Fig. 23.** 同上脾臓及ビ静脈竇
- Fig. 24.** 同上梁材動脈
- Fig. 25.** 脾動脈結紮後 3 分ニテ殺シタル家兎ノ脾小節内動脈及ビ脾小節
- Fig. 26.** 脾動脈結紮後亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシ家兎ノ脾小節内動脈及ビ脾小節
- Fig. 27.** 脾静脈結紮後 3 分ニテ殺シタル家兎ノ脾小節内動脈及ビ脾小節
- Fig. 28.** 脾静脈結紮後亞硝酸「アミール」ヲ致死スルマデ注射セシ家兎ノ脾小節内動脈及ビ脾小節
- 擴大, Okul, 5, Obj. 10, K. L. 25 cm. (Fig. 16, 17, 18, 19);
- 其ノ他ノ擴大, Okul. 7, Obj. 40, K. L. 30 cm.

竹本論文附圖

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

竹本論文附圖

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

竹本論文附圖

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.