岡山醫學會雜誌第47年第8號 (第547號)

昭和10年8月31日發行

OKAYAMA-IGAKKAI-ZASSHI

Jg. 47. Nr. 8. August 1935.

105.

116.617003.7

輸尿管結石ノ臨牀的觀察補遺

岡山醫科大學皮膚科泌尿器科教室 (主任根岸教授)

大道峰雄

[昭和9年11月3日受稿]

*Aus der Dermato-urologischen Klinik der Okayama Medizinischen Fakultät
(Vorstand: Prof. Dr. H. Negishi).*

Beiträge zur Kenntnis der Uretersteinkrankheit.

Von

Mineo Ohomichi.

Eingegangen am 3. November 1934.

Seit 1930 hat Verf. in seiner Klinik 29 Fälle von Uretersteinkrankheit beobachtet und kann zu folgenden Resultaten:

1) Die Uretersteine treten meistens beim Manne, seltener bei der Frau, und zwar im Verhältnis von 5:1 auf.

2) In Bezug auf das Lebensalter ist ihre Häufigkeit am häufigsten im dritten und dann im fünften und so weiteren

Jahrzehnten, im vierten Jahrzehnt aber sehr gering.

3) Gewöhnlich kommen sie in der rechten Seite, weniger in der linken, noch seltener in beiden Seiten zu gleicher Zeit vor.

4) Patienten sind meistens körperlich kräftig gebaut und gut ernährt.

5) Über die Prädispositionsstellen

der Uretersteine: Erstens in Pars pelvina (nimmt 2/3 der ganzen Fälle ein), zweitens in Pars lumbaris und drittens in Pars iliaca (am wenigsten).

6) Als subjektive Symptome pflegt man hauptsächlich über Schmerzen am Bauch- und Lendenteil seitlich der kranken Niere zu klagen; andererseits können die Beschwerden oft in Harnblase, Rektum und Genitalorganen verursacht werden, falls der Stein in Pars pelvina stecken bleibt.

7) Während der Harn im Anfang beinahe klar ist und makroskopisch sich nicht blutig zeigt, gibt es doch viele Fälle, bei denen man rote Blutzellen im Harn mikroskopisch nachweisen kann.

8) In der Regel fehlen allgemeine

Symptome, bzw. Fieber, nur mit der Ausnahme von Kolikfieber, welches bei 1/5 der ganzen Fälle vorkommt.

9) In der Anamnese konnte man konstatieren, dass die Sande oder die Steine in 60% aller Fälle spontan abgingen.

10) Lurzsches Phänomen auf der kranken Seite blieb bei allen Fällen negativ.

11) 3 von 9 Fällen sind konservativ, 2 intravesical, die übrigen sind operativ behandelt worden, und zwar mit gutem Erfolge.

12) Die exstirpierten Nieren zeigen das histologische Bild der Schrumpfniere infolge überstandener Hydronephrose.

(Autoreferat.)

緒 言

輸尿管結石ハ泌尿科疾患中比較的少數ニ遭遇スル疾患ナレドモ輸尿管疾患トシテハ屢々経験サルモノナリ。其ノ統計的觀察モ亦既往ニ於テ可ナリ多數研究者ニ依リテ發表サレタルモ余ハ本教室ニ於テ最近昭和7, 8及ビ9年度ノ2箇年半ノ間ニ於テ本疾患ノ12例ヲ得タルヲ以テ之ニ本教室從來ノ報告例ヲ合シテ統計的觀察ヲ行ヒ聊カ以テ本症ニ於ケル臨牀的補遺ヲナサントス。

症 例

第1例 田窪某 ♀ 29歳 無職

初診 昭和7年2月12日

主訴 右腹側部疼痛並ニ尿渾濁

診断 右側輸尿管結石(小骨盤部)

既往症

患者ハ昭和2年卵巣囊腫ノ診断ノ下ニ手術ヲウケ、後昭和4年2月腰部ノ兩側ニ疼痛及ビ尿渾濁アリテ排尿時小豆大白色表面滑澤ナル結石2箇ノ排出ヲ見タリ、今ヨリ2箇月前再度尿渾濁ニ氣付ケリ。當時患者ハ輕度ノ尿意頻度アリ。更ニ1箇月前ヨリ右腹側部ニ疼痛ヲ訴フルニ至レリ。

現症及ビ經過

患者ハ體格強健榮養佳良泌尿器以外ノ胸腹部臟器ニ異狀ナク發熱ナシ。Wa. R. 並ニ村田氏反應共ニ陰性、尿ハ中等度渾濁鏡檢上多數多核白血球中等度ノ粘液及ビ微量ノ蛋白ヲ認メシモ赤血球、淋菌、結核菌、大腸菌等ヲ認メズ只少數ノ雜菌ヲ證明セリ、左右腎臟ハ觸レ難ク觸診上膀胱部ニ壓痛ヲ訴フ。膀胱鏡檢査ヲ行フニ後壁粘膜ニ中等度ノ肉柱形成ト諸所輕度ノ充血ヲ認ム。輸尿管「カテテリスムス」ヲ行フニ左側ハ25cm挿入シ得ルニ

右側ハ約 15 cm ヲ挿入シ得ルニ過ギズ。「カテーテル」尿ヲ檢スルニ右側ニ於テハ弱酸性ノ輕度濁濁尿ヲ得。鏡檢上赤血球多核及ビ單核白血球、上皮細胞ヲ認ムルモ細菌ハ認メズ。蛋白陽性ナリ。左側ニ於テハ尿ハ殆ド透明且酸性ナリ。鏡檢上單核白血球ヲ少數認ムル外異常ナシ。次デ Indigokarmin 排泄検査ヲ行フニ左側ニ於テハ 6'45" ニシテ排出始マリ 8'35" ニシテ濃青色トナル。右側ハ 10'30" ニシテ漸ク出現ス由テ右腎臟機能障礙ヲ想見シ得可シ。引續キ氣積竝ニ沃度「ナトリウム」液注入ニヨル腎臟撮影法ヲ行ヒ見ルニ右側腎盂腎蓋ハ少シク擴大シ初期腎水腫ノ傾向ヲ呈シ輸尿管ノ小骨盤部ニ於テ結石ノ介在セルヲ認ム。左側腎盂、輸尿管ハ全ク正常ナリ。尙ホ全腎機能検査ノ爲メ早朝溫湯 1000 cc ヲ與ヘシ後排泄尿量及ビ比重ヲ精査セシニ 4 時間ニシテ全尿量 912 cc 最低比重 1003 ナリキ即チ全腎機能ハ全ク正常ナリ。自然排出セル結石 2 箇ハ何レモ小豆大表面平滑灰白色ニシテ主成分ハ尿酸鹽ナリキ。

治療及ビ經過

患者ハ治療ヲ受ケズ退院セリ。

第 2 例 田中某 8 48 歳 船員

初診 昭和 8 年 3 月 28 日

主訴 左側腹部疼痛

診斷 左側輸尿管結石（起始部）竝ニ第 3 期潜伏黴毒

既往症

患者ハ元來强健ニシテ 21 歳ノ時淋疾ヲ患ヒ更ニ 27 歳ノ時陰莖繫帶ニ潰瘍ヲ生セシモ横痃ヲ缺ケリ。其ノ外著患ヲ知ラズ。然ルニ昭和 6 年 9 月頃發作的ニ左腹側部ニ痙痛ヲ訴ヘ當時醫師ヨリ注射 2 回ヲ受ケテ輕快セルモ同年 11 月頃再度上記同様ノ場所ニ痙痛ヲ覺エ同時ニ尿濁ヲ認メタリト。患者ハ飲酒晩酌 2 合程度、菜食ヲ好ミ肉食ハ

稀ナリト。

現症

患者ハ榮養佳良體格强健左腎以外ノ胸腹部臟器ニ異常ナク、體溫脈膊亦平常ナリ。Pirquet 陰性ナルモ Wa. R., 及ビ村田氏反應共ニ陽性ナリ。觸診上兩側ノ腎臟觸レ難キモ左側上點ニ壓痛アリ。睪丸、副睪丸竝ニ攝護腺等ニ異常ナシ。只兩側鼠蹊腺ハ豌豆大ノモノ各數箇ヲ觸レタリ。尿ハ酸性ニシテ輕度ノ濁濁ヲ示シ鏡檢上多核白血球(+)、葡萄狀球菌(++)、淋菌及ビ結核菌ヲ認メズ。膀胱鏡検査ヲ行フニ兩側輸尿管口ニ異常ナク粘膜ハ一般ニ帶黃紅色ヲ呈シ底部ニ帶黃色ノ砂粒沈着セルヲ認メタリ。Lurz 氏現象兩側共ニ陰性ナリ。輸尿管「カテーテル」尿ヲ檢スルニ兩側共ニ殆ド清澄ニシテ酸性反應ヲ呈セリ。鏡檢上右側ノ尿ニハ全ク異常無ケレドモ左側ノ尿ニハ蛋白、粘液、赤血球、多核單核白血球及ビ上皮細胞ヲ少數ヲ認メタリ。色素排泄試験ヲ行フニ Indigokarmin

右側 5'45" 出現 7' 濃青色

左側 7'20" 出現 17'45" 濃青色

即チ左側腎臟ヨリノ色素排泄機能ハ右方ニ比シ著シク遲滯セルヲ見ル可シ。次デ氣積腎盂撮影法ヲ行フニ左側輸尿管起始部ニ拇指頭大ノ卵圓形結石ヲ、同時ニ同側下腎蓋内ニ更ニ 1 箇ノ豌豆大結石陰影ヲ明カニ證明シ得タリ。爲メニ左腎盂ハ著シク擴大シ居ルヲ認ム。

Phenolsulfonphthalein ヲ以テ兩腎總機能ヲ檢スルニ最初ノ 30' ニシテ 45%、次ノ 30' ニ 20%、合計 1 時間ニ 65% ノ排泄ヲ證シ得タリ。即チ兩腎總機能ハ正常ナルヲ知ル。

治療及ビ經過

左側腎臟摘出ヲ行ヒタリ。手術後經過良好ニシテ 28 日間後ニ退院セリ。

病理解剖の所見

摘出腎臟ハ重量 135 g 長サ 10 cm、幅 5 cm、厚サ

4 cm ナリ。次ニ組織ノ1小片ヲ「パラフキン」包埋、型ノ如ク切片ヲ作製シテHämatoxylin-Eosin van Gieson 染色等ヲ行ヒ検査セルニ皮質ニ於ケル絨毛體ハ大體ニ於テ正常ナルモ所ニヨリテハ形狀ノ大小不同ナルモノアリ。細尿管ハ或ハ著明ニ擴張シ、或ハ狭小ヲ來タセリ。基本部ニ於ケル上皮ハ皆膨脹シ中ニハ剝離セルモノアリ又空胞ヲ形成セルモノアリ。腎間質ニ於テハ多少結締組織ノ増殖ヲ認メ諸所圓形細胞ノ浸潤ヲ認ム。血管壁ハ肥厚シ殊ニ其ノ内膜ニ凸凹不同アリ。腎盂粘膜ハ其ノ厚サ不同ニシテ一般ニ細胞浸潤特ニ著明ナリ。主トシテ淋巴細胞ヨリ成ル。脂肪組織ハヨク發育セリ。要之スルニ本腎ハ輕度ノ萎縮腎ノ像ヲ示ス。

シ。Lutz 氏現象亦兩側共陰性ナリ。輸尿管「カテテリスミス」ヲ行フニ、左側ハ25 cm ヲ容易ニ挿入シ得タルモ右側ハ僅ニ1.5 cm ニテ停滯ス。Indigokarmin ノ排出狀態ヲ見ルニ、

左側 4'15" 出現 4'40" 濃青色

右側 12' ヲ經ルモ出現セズ。

即チ右側腎臟機能障礙ヲ想見セシム。更ニ「ピエログラム」ヲ檢スルニ腎盂及ビ輸尿管上部ニハ何等ノ異常所見ヲ得ズ。氣積膀胱撮影術ニ依レバ輸尿管ノ膀胱移行部ニ近ク1箇ノ小結石陰像ヲ認メタリ(圖参照)。Phenolsulfonphthalein ニ依リ全腎機能ヲ檢スルニ30'ニシテ70% 次ノ30'ニテ10% 計1時間ニテ80% ノ排出ヲ見タリ。

第 3 例

第3例 眞田某 ♂ 21 歳 商

初診 昭和7年6月9日

主訴 右側盲腸部疼痛

診斷 右側輸尿管結石 (小骨盤部)

既往症並ニ現病歴

生後2年ニシテ肺炎ヲ經過セリ。其ノ他著患ナシ。昭和6年12月左側腰部ニ發作的ニ強キ痙攣痛アリ(但シ背部、外陰部ニ放散セズト)當時醫師ノ注射ニ依リ輕快セリ。本年2月右側腰部ノ疼痛アリ5月ニ到リテ3回ノ同様ノ發作アリ。但シ此回ハ鈍痛ナリシト謂フ。尙ホ放尿時疼痛血尿等ヲ缺ケリ。

現症

患者ハ體格強壯榮養中等度泌尿器以外ノ胸腹部臟器ニ著變ナシ。Wa. R., 村田氏反應共ニ陰性。時々輕熱ヲ發ス。尿ハ輕度濁濁シ鏡檢上多核單核白血球膀胱表皮粘液ヲ認ムルモ細菌ヲ見ズ。觸診上兩側腎臟異狀無キモ右側側臍部ニ輕度ノ壓痛アリ。膀胱検査ヲ行フニ底部ニ黃灰色ノ結石ノ小片ヲ認メ、尙ホ所々ニ瀾漫性潮紅ヲ見ル外異常ナ

治療及ビ經過

擴張器ヲ以テ輸尿管口ノ擴張ヲ行ヒ、「ババベリン」ノ注射「グリセリン」ノ内服及ビ局所注入等ヲ行ヘルモ效ナカリシカバ、膀胱高位切開術ニテ所期ノ目的ヲ得タリ。

第4例 高森某 ♂ 31 歳 會社員

初診 昭和7年5月23日

主訴 血尿

診斷 右側輸尿管結石 (腰部)

既往症並ニ現病歴

患者ハ生來虛弱ナリト謂フ。昭和3年肺炎加答兒ヲ患ヒ、同5年ニハ高所ヨリ落下シ背部ニ打撲ヲ受ケタリ。後某醫ヨリ脊髓「カリエス」ノ診斷ノ下ニ治療ヲ受ケシガ輕快セズ。昭和7年2月頃雪上ニ放尿シテ尿ノ血色ニ染マレルヲ認メタルモ何等意ニ介セズ放置セリト。今ヨリ1週間前醫師ヲ訪レ診察ノ結果尿ニ結核菌及ビ赤血球ノ混在セルヲ指摘セラレ治療ヲ受ケタリト謂フ。其ノ後治療ヲ續行スレドモ依然トシテ輕快セズ。更ニ2,3日前ヨリ右盲腸部ニ激痛アリ。加之全身ノ倦怠及ビ頭痛ヲ覺ユルニ至レリ。

現症

患者ハ體格榮養共ニ中等度、泌尿器ノ外ハ何等胸腹部臟器ニ著變ナシ。體溫、脈膊共ニ全ク正常ナリ。尿ハ略ボ清澄、酸性ナリ。鏡檢上白血球、尿路上皮細胞ノ少量ヲ認ムレドモ蛋白及ビ糖ヲ缺ク。更ニ膀胱鏡検査ヲ行フニ同所粘膜ニ著變ナクLutz現象亦兩側共陰性ナリ。次デ輸尿管「カテテリスミス」ヲ行ヒテ兩側分尿ヲ檢スルニ兩側共ニ清澄ニシテ何等認ム可キ異常所見無シ。只左側ニ於テハ微量ノ赤血球、單核白血球及ビ蛋白ヲ認メタリ。「カテテル」ハ右側19cm左側ハ21cm送入シ得タリ。Indigokarminノ排泄狀態ヲ見ルニ右側ハ10'10''デ出現、10'15''デ濃青色トナレリ左側ハ3'35''ニテ出現、5'ニシテ濃青色トナレリ。「ヒエログラム」ニ於ケル所見ヲ檢スルニ腎盂ニ於テハ何等結石像ヲ見ザルモ輸尿管ノ骨盤腔ヘノ移行部位ニ近ク第4腰椎橫突起ノ高サニ於テ明カニ1箇ノ結石像ヲ認メタリ(圖參照)。

次ニPhenolsulfonphthaleinヲ以テ全腎機能ヲ檢スルニ注射後30'ニシテ39%、次ノ30'ニテ10%、合計1時間ニシテ49%ノ排出ヲ見タリ。水排泄試驗ニ於テハ4時間ニシテ922ccノ排尿アリ。最低比重ハ1001ナリキ。

治療竝ニ經過

第 4 例

輸尿管切開術ヲ行ヒテ結石ヲ摘出セリ。結石ノ大キサハ豌豆大褐赤色ヲ帶ビ主成分ハ「チュスチン」ナリ。患者ハ手術後ノ經過良好ニシテ32日後ニ退院セリ。

第5例 寺田某 8 24歳 會社員

初診 昭和8年7月4日

主訴 自然排石

診斷 左側輸尿管結石 (小骨盤部)

既往症及ビ現病歴

患者ハ本年3月肋膜炎ヲ患ミ醫師ノ治療ニ依リ40日後全治セリト謂フ。恰モ其ノ頃執拗ナル下痢ニ苦シミ某醫ノ加療ヲ受ク、而シテ去ル4月末尿中蛋白ノ陽性ナルコトヲ注意セラレタリト。本月中旬突然左側腹側ヨリ背部ニ放散スル痙攣様激痛ヲ覺ユ。同時ニ血尿2日間持續セリ。本月26日同様ノ痙攣發作ガ左腎部ニ來タリシガ、1回ノ注射ニ依リテ輕快セリト。爾來體動ニ際シテ左腎部邊ニ疼痛ヲ覺ユルニ至レリ。爰ニ於テ患者ハ本學科泌尿科ニ入院加療中50箇許リノ小結石片放尿ト

共ニ自然排出セリ。因テ患者ハ本科ニ轉科セリ。
患者ハ飲酒、喫煙ヲ嗜ミ、平常菜食ニ傾ケリト。

現症

體格、營養共ニ中等度ナリ。左肺ニ乾性囉音及
び濁音ヲ聽ク、其ノ他胸腹臟器ニ著變ナシ。Wa. R.,
Browning, 村田, Kahn 反應何レモ陰性ナリ。尿
ハ殆ド清澄、酸性ナレドモ顯微鏡的ニハ赤血球、
白血球、尿路上皮ノ少許ヲ見ル。細菌ヲ認メズ。
體溫、脈膊平常ナリ。膀胱鏡検査ニ於テハ右側輸
尿管口ニ異常ナシ。左側輸尿管口ハ少シク後上方
部ニ位置ス。其ノ他粘膜ハ所々瀰漫性ノ充血ヲ呈
セリ。Lutz 氏現象陰性ナリ。輸尿管「カテテリス
ムス」ヲ行ヒシニ、右側ニハ 26 cm 挿入、正常ノ尿
ヲ得、左側ニ於テハ「カテテル」僅ニ挿入 3 cm
ニシテ進マズ。鏡檢スルニ右側分尿ニ於テハ異常
ナキモ左側ニ於テハ強度ノ赤血球及ビ少許ノ白血
球ヲ認メタリ。Indigokarmin ノ排出状態ハ右側
ハ 4' ニシテ開始、8' 5" ニテ濃青トナリ、左側ハ
13' 40" ナルモ出現セズ。

「ピエログラム」ニ於テハ腎盂、輸尿管上部ニ
何等ノ病的所見ヲ見ズ。左側輸尿管ノ小骨盤部ニ
於テ結石ノ介在セルヲ發見セリ（圖參照）。次ニ
Phenolsulfonphthalein ニヨル全腎機能検査ニ於
テハ最初ノ 30' ニ 40%、次ノ 30' ニ 40%、合計 1
時間ニシテ 82% ノ排出ヲ見タリ。

第 5 例

治療及ビ経過

Papaverin ノ注射、大量ノ水攝取等ノ姑息の療
法ヲ行ヒタルニ、第 5 日目ニ至リ下腹部ニ不快緊
張感アリ次デ尿線ノ中絶ヲ覺エタリ。翌日午後體
溫急ニ 39.4C ニ上昇（所謂痼痛熱）シ結石ノ自然
排出ヲ認メタリ。其ノ際自覺的ニ殆ド尿路ニ疼痛
ナカリキ。結石ハ小豆大ニシテ灰褐色ヲ帶ビ表面
小顆粒ニ富ム。

第 6 例 高松某 39 歳 電氣具商

初診 昭和 8 年 8 月 1 日

主訴 放尿時疼痛及ビ尿意頻數

診斷 右側輸尿管口結石

既往症及ビ現病歴

患者ハ昭和 4 年 1 月膀胱結石ニテ當科ニ於テ治
療ヲ受ケタリ。本年 5 月頃ヨリ會陰肛門部ニ不快
感アリ、又 3—7 日間隔ヲ以テ下腹部ニ疼痛ヲ
感ゼリ。同時ニ尿意頻數ト輕度ノ放尿時疼痛ヲ覺
エト。然ルニ今ヨリ 1 週間前ニ夜間突然膀胱部ニ
激痛ヲ感ゼリ。此疼痛ハ膀胱内ニ尿ガ蓄積シ來ル
時ハ却ツテ減退シ、放尿末期ニハ著シク増加ス。

現症

體格強壯、營養佳良、胸腹部臟器ニ異常ナシ。
Wa. R., Browning, 村田反應何レモ陰性、Pirquet
亦陰性ナリ。溫體、脈膊共ニ平常ナリ。尿ハ微少
渾濁アリテ、檢尿スルニ多核、單核白血球多數ア
ルモ赤血球ヲ認メズ、雜菌アリ。膀胱鏡検査ヲ
行フニ右側輸尿管口ニ豌豆大ニシテ表面桑實狀
ノ結石ヲ認メ、同時ニ周圍組織ノ強度ノ腫脹ト
下ヲ粘膜ノ強度ノ浮腫ヲ認メタリ。左側輸尿管
口ハ正常ナリ。

治療及ビ経過

膀胱異物鉗子ニテ結石ヲ遊離抽出セリ。術後經
過良好ニシテ入院後 9 日目ニ退院セリ。腎臟機
能検査ヲ行フニ右輸尿管口ニ結石嵌頓中ハ着色

膀胱鏡検査法ニテ左側ハ4/50%ニテIndigokarminノ出現ヲ見タルモ右方ヨリハ10%ヲ經ルモ出現セズ。蓋シ右方ハ結石嵌頓ノ爲メ管口全ク閉塞サレタルガ故ニシテ、手術後輸尿管「カテーテリスムス」ヲ行ヒテ兩側腎分尿管ヲ檢スルニ共ニ異常成分ヲ證明セズ。Indigokarminノ排出モ

右方 4/20%出現 5/濃青

左方 4/50%出現 5/30%濃青

ニシテ全ク正常ナルヲ知レリ。摘出結石ハ蠶豆大ニシテ少シク扁平形ヲナセルモノ1箇、其ノ他破片數箇ナリ。表面粗大顆粒狀着色汚穢黃褐色ニシテ、其ノ主成分ハ尿酸鹽ナリ。

第7例 平川某 8 43歳 寫真商

初診 昭和9年1月25日

主訴 下腹部疼痛

診斷 左側輸尿管口結石

既往症及ビ現病歴

患者ハ生來強壯疾患ヲ知ラズト。昭和7年4月自轉車ニテ走行ノ後突然會陰部ニ激痛ヲ覺エタルガ當時ハ血尿放尿痛等ヲ知ラザリキ。2箇月後放尿末期出血ヲ氣付キシガ何等意ニ介セズ、越エテ翌年10月肛門ヨリ外尿道口ニ放射スル牽引性疼痛アリ。其ノ爲メ注射50回以上並ニ内服藥ヲ用ヒシガ寸效ナシ。其ノ間2回砂粒ノモノ排尿ト共ニ排出セラレシコトアリト。尿線モ亦幾分細少トナレリト謂フ。

現症

體格榮養中等度、胸腹部臟器ニ著變ナシ。Wa.R., 村田, M. K. R. II何レモ陰性、Pirquet弱陽性ナリ。尿ハ微濁酸性ナリ。鏡檢上尿ハ何等異常ナク只白血球ノ僅少ヲ證明スルノミナリ。膀胱鏡検査ヲ行フニ左側輸尿管口部ニ當リテ表面粗大顆粒狀ナル圓形結石アリ柄部ヲ以テ管口ト連絡セル様恰モ茸ノ生エタルガ如シ。周圍粘膜ニ浮腫性腫脹甚シ。

右側管口モ亦著明ニ浮腫腫脹アリ。蓋シ結石自然通過ノ跡ナラン乎(現病証參照)。Luz現象陰性ナリ(三色版附圖參照)。

治療及ビ經過

嵌頓セル結石ハ膀胱異物鉗子ニテ牽引遊離セシメ次デ碎石除去セリ。其ノ後經過良好ニシテ入院後1週間目ニ退院セリ。結石ノ形狀ハ恰モ松茸ニ似テ輸尿管口ニ根ヲ張り膀胱腔内ニ傘ヲ開ケルガ如シ。重量0.3g, 主成分ハ尿酸鹽ナリキ。退院ニ際シ輸尿管「カテーテリスムス」及ビ氣積腎盂攝影術ヲ施行セルニ腎盂、輸尿管ニ異常ナク、兩側分尿管亦全ク正常ナルヲ見タリ。

第8例 柁木某 8 30歳 無職

初診 昭和7年3月2日

主訴 血尿

診斷 左側輸尿管結石 (腰部)

既往症及ビ現病歴

從來著患ヲ知ラズ。患者ハ今ヨリ10日前突然血尿ヲ見タリト。同時ニ下腹部ニ不快感アリタルモ放尿時疼痛並ニ尿意頻數ヲ訴ヘズ。既往ニ於テ患者ハ性病ニ罹カリシコトナシト。

現症

患者ハ體格榮養中等度ニシテ、Pirquet弱陽性ナルモWa. R., Browning, 村田反應何レモ陰性、體溫及ビ脉膊共ニ平常ナリ。尿ハ輕度濁濁ヲ呈シ鏡檢上、赤血球及ビ多核單核白血球相共ニ少許ヲ認メタルモ、淋菌、結核菌、大腸菌並ニ雜菌ヲ證明セズ。腎臟ハ左右共ニ觸レ、左側輕度ノ壓痛ヲ訴フルモ右側ハ訴ヘズ。左右共ニ表面ハ平滑ナリ。更ニ輸尿管徑路ニ沿フテ之ヲ壓迫スルモ壓痛ヲ訴ヘズ。膀胱鏡検査ヲ行フニ輸尿管口ハ左右共ニ正常ナリ。只後壁粘膜ニ多少肉柱形成ヲ見タル外何等特別ノ所見ヲ認メズ。腎臟機能検査ヲ行フニ、「カテーテル」ハ左右共ニ26cm挿入シ得タリ。檢

尿スルニ右側ノ分尿ハ清澄、酸性ニシテ、蛋白、
圓埤、糖粘液並ニ細菌ヲ認メズ。赤血球ハ僅ニ存
ス。多核白血球無ク、單核白血球ハ少許及ビ腎盂
上皮ヲ認メタリ。左側分尿ヲ檢スルニ清澄、酸性、
蛋白、圓埤糖並ニ粘液ハ認メズ、赤血球ノ多數ト
多核單核白血球ノ少數ヲ證明セリ。Indigokarmin
ノ排泄狀態ヲ檢スルニ、

右側 4'45" 出現 5'20" 濃青色

左側 5' 出現 7' 濃青色

ナリ。Phenolsulfonphthaleinニ依ル全腎機能
検査ヲ行ヒシニ、開始後30'ニシテ60%、次ノ30'
ニ20%、合計1時間ニ80%ナリ。尚ホ水排泄試
験ハ略ボ正常ナリ。次ニ氣積膀胱鏡ヲ行フニ左側
第4腰髓ノ横突起ノ高サニ於テ小ナル結石像ヲ認
メタリ(圖参照)。

第 8 例

治療及ビ経過

患者ハ「アペルチン」直腸麻醉ト「エーテル」補助
麻醉ノ下ニ輸尿管截石術ヲ行ヒタルモ結石ハ輸尿
管「カテーテリスムス」等ノ操作ニヨリ激動性トナ
リ、自然降下シテ膀胱壁ノ近ク迄移動セルヲ認メ

シガ故ニ手術ヲ中止後姑息的治療ヲ行ヒテ37日
目ニ表面凸凹セル灰褐色豌豆大結石ノ自然排出ヲ
見タリ。結石ノ重量0.05g、結石ノ主成分ハ尿酸
鹽ナリ。

第9例 松本某 ♀ 24歳 商

初診 昭和8年1月20日

主訴 右腹部疼痛並ニ尿意頻數

診断 右側輸尿管結石 (腸骨部)

既往症並ニ現病歴

患者ハ今ヨリ10箇月前(當時妊娠6箇月)右腹
側部鈍痛アリ醫師ヨリ腎臓炎ノ診断ノ下ニ治療ヲ
受ケシガ效果ナシ。其ノ後2回程同様ノ發作アリ。
然ルニ4箇月前ヨリ10日ニ1度前記同様ノ發
作ト尿意頻數ヲ訴フルニ至レリト。當時尿渾濁ト
38.7°Cノ輕熱ヲ伴ヒタリ。最近患者ハ前記同様ノ
發作アリ今日ニ及ブ。但シ今度ハ尿意頻數及ビ熱
ノ出タルコトナシト。

現症

患者ハ體格榮養中等度ニシテWa.R., Browning,
村田反應陰性ナリ。Pirquet反應ハ強陽性ヲ示セ
リ。尿ハ肉眼の強度ノ渾濁ヲ示シ酸性、蛋白アレ
ドモ圓埤、糖共ニナシ。赤血球並ニ細菌ハ證明シ
得ズ、白血球ハ多核單核共ニ多數存在ス。膀胱鏡
検査ヲ行ヒシニ何等病の所見ヲ得ズ。

!! 次デ腎臟機能検査ヲ行フニ「カテーテル」ハ左側
25cm挿入シ得タルモ右側ニ於テハ10cmニシテ
停滯挿入シ得ズ、從ツテ「カテーテル」尿ヲ得ズ。
「カテーテル」ヲ拔去セル時管口ヨリ膿様渾濁尿ノ
噴出ヲ認メタリ。左側「カテーテル」尿ハ琥珀黃色
ニシテ強酸性ナリ。之ヲ檢スルニ蛋白、圓埤並ニ
糖ナキモ腎盂上皮ノ多數ト、單核白血球少シク存
在シ、赤血球ヲ認メズ。Indigokarminハ、

左側 3'40" 出現 4'10" 濃青

右側 15'ニテモ出現セズ。

Phenolsulfonphthalein ノ排泄ヲ檢スルニ最初 30' = 55%, 次ノ 30' = 10%, 合計 1 時間 = 65% ナリ。水排泄試験ニ於テハ 4 時間ニシテ 882 mm 最低比重 1005 ナリキ。Pyelographie ヲ行フニ、結石像ハ右側腸骨部ニ小指大ノ像トシテ認メラレタリ(圖參照)。

第 9 例

經過並ニ治療

患者ハ結石ニ因ル腎膿瘍ヲ起セルヲ以テ右側腎臓摘出ヲ行ヒタリ。

病理解剖的所見

摘出腎ハ重量 196 g, 長サ 11 cm, 幅 5.5 cm, 厚サ 3 cm ナリ。次ニ組織小片ヲ型ノ如ク「パラフィン」包埋, Hämatoxylin-Eosin, van Gieson 染色ヲ行ヒテ檢スルニ、腎實質ハ全體トシテ纖維化シ、被膜ハ著明ニ肥厚ヲ來タシ諸所ニ多少ノ出血竈ヲ認メルト同時ニ被膜直下ニ圓形細胞浸潤ヲ認ム。腎ノ皮質並ニ髓質ハ正常腎ノ夫レニ比シテ大約 1/4 位ニ狭小セリ。皮質ニ於ケル絲絨體ハ大小不同ニシテ多數蹄係トシテ殘レリ、且其ノ内ニ出血ヲ認ム。又中ニハ硝子樣變性ニ陷レルモノモ多數散見

セリ。細尿管ハ基本部並ニ中間部ニ於ケルモノ共ニ著シク擴張シ一方壓迫萎縮ヲ來タセリ尙ホ且内腔中ニ出血乃至ハ硝子樣物質或ハ無形物質化セル圓柱ヲ認メタリ。基本部ノ上皮ハ著明ニ膨脹シ、中ニハ内腔中ニ剝離セルモノアリ。中間部ノ夫レモ膨脹シ同時ニ萎縮ヲ來タシテ扁平化セルヲ認ム。腎間質ニ於テハ諸所ニ圓形細胞ノ浸潤ヲ認ム。主トシテ淋巴細胞ヨリ成ル。其ノ外結締組織細胞ノ増殖セルヲ見タリ。血管壁ハ非常ニ肥厚ヲ來タシ殊ニ其ノ内膜ニ於テ著明ナリ。腎盂粘膜ニ近ク圓形細胞浸潤並ニ結締組織細胞増殖ヲ認ム。上皮ハ皺襞ヲ作り鋸齒狀ヲ示セリ、是レ尿停滯ノ場所ナランカ。要之、本腎ハ腎臟水腫性萎縮ノ像ヲ示ス。

第 10 例 板野某 ♂ 60 歳 商

初診 昭和 8 年 2 月 15 日

主訴 下腹部疼痛

診斷 左側輸尿管結石 (輸尿管口ニ嵌頓)

既往症並ニ現病歴

患者ハ 10 箇年來年 1 回位偶發的ニ結石ノ排出アリト云フ。最近ハ 1 昨年之ヲ見タリト。昨年ハ認メザリキ。然ルニ今ヨリ 10 日前膀胱部疼痛アリ今日ニ及ブ。放尿終末時疼痛アレドモ血尿ハ之ヲ認メズ。時々左側腰部ニ偶發的疼痛ヲ覺ユト謂フ。

現症

患者ハ體格强健榮養中等度ナリ。尿ヲ檢スルニ清澄、酸性、少量ノ單核白血球ヲ認ムルノミ。膀胱鏡検査ヲ行フニ左側輸尿管口ニ於テハ異常ヲ認メズ。右側輸尿管口ハ之ニ反シ半球狀ニ潮紅腫脹セリ。且其ノ中心ニ結石ノ半バヲ露出セルヲ認メタリ。結石ノ表面ハ半球狀ニシテ顆粒ニ富ミ帶黃灰白色ヲ呈セリ。其ノ他腎、輸尿管等觸診上異變ナシ(三色版附圖參照)。

第11例 細羽某 ♀ 23歳 驛長ノ妻

初診 昭和7年9月30日

主訴 發作的下腹部疼痛

診断 左側腎臓並ニ輸尿管結石 (腰部)

既往症及ビ現病歴

家族的ニ特記スキモノナシ。患者ハ生來強健ニシテ初經ハ15歳ナリ。爾來順調ナリ。23歳デ結婚セリ。本年5月妊娠7箇月頃約1週間右腹側部ニ烈シキ疼痛アリ。同時ニ四肢ノ浮腫ヲ認メタリ。當時排尿ノ回数ハ1時間ニ5—6回ナリ。尙ホ惡心ノ傾向アリシモ發熱セシコトナシ。當時醫師ノ診断ハ腎臓結石ノ疑アリトセリ。患者ハ本年7月7日分娩ヲナセシ後四肢ノ浮腫ハ去リシガ下腹部ノ疼痛ヲ時々訴ヘタリ。同時ニ食欲無ク倦怠感アリ。患者ハ放尿時疼痛ヲ全然訴ヘズ。

現症

患者ハ體格榮養共ニ中等度ニシテ Wa. R., 村田反應共ニ陰性ナリ。Pirquet 亦モ陰性ニシテ體溫脈膊共ニ正常ナリ。初診ニ於ケル尿所見ハ輕度ノ渾濁ヲ呈シ、酸性ナリ。鏡檢上圓球、赤血球ヲ認メザルモ多數ノ多核白血球及ビ少數ノ單核白血球ヲ見ル。尙ホ淋菌、大腸菌、結核菌並ニ其ノ他細菌ヲ證明セズ。胸部臟器ニ異常無ク、左側腎ハ少シク腫大シ、同側輸尿管ニ沿ヒ壓痛アリ。右腎著シク大、觸診上極メテ可動性ニシテ深呼吸ノ場合ハ其ノ下端ハ臍高下1横指ノ所ニ達ス。膀胱鏡検査ヲ行フニ其ノ粘膜ニ著變ナシ。Laurz 氏現象右側陽性、左側陰性ナリ。次デ腎臟機能検査ヲ行フニ「カテーテル」ハ右側 25 cm 左側ハ 22 cm 挿入シ得タリ。兩側分尿ヲ檢スルニ左右共ニ弱酸性清澄ナリ。蛋白、兩糖、赤白兩血球ヲ認メズ。Indigokarmin ノ排泄ヲ見ルニ右側ニ於テハ4'20"デ出現シ、5'15"ニテ濃青色ヲ呈スルモ、左側ニ於テハ13'35"ニテ出現スレド35'ニシテ尙ホ濃青色ヲ呈セズ。由テ左側腎臟機能ノ障礙ヲ想見シ

得可シ。引續キ氣機腎盂攝影法ヲ行ヒ見ルニ、兩腎ノ位置ハ著シク下降シ其ノ下端ハ第4腰椎橫突起ノ高サニ達ス。從ツテ上端モ第12肋骨ヨリ脱シテ其ノ外廓ヲ明カニ認メ得可シ。兩腎ノ外形ニハ著變ナシ。左側輸尿管ノ腰部ニテ第3—4腰椎骨間ノ高サニ於テ結石ノ介在セルヲ見、尙ホ同腎盂内ニ於テモ夫レヨリ大ナル1箇ノ結石像ノ陰影ヲ認ム。全腎機能検査ノ爲メ、早朝溫湯1000ccヲ與ヘシ後排泄尿量並ニ比重ヲ精査セシニ4時間ニシテ全尿量824cc最低比重ハ1004ナリキ。又 Phenolsulfonphthalein ヲ以テスルモ1時間ニ60%ノ排泄ヲ證シ得タリ。即チ全腎機能ハ大體ニ於テ正常ト見做シ得可シ。

治療及ビ經過

患者ハ入院治療ヲ欲セズ退院セリ。

第12例 岩野某 ♂ 53歳 製鹽業

初診 昭和7年1月26日

主訴 左側腹側痙痛並ニ放尿時排石

診断 左側輸尿管口結石

既往症及ビ現病歴

患者ハ約5箇年前腎砂ノ尿中ニ混在セル事ヲ某醫師ヨリ注意サレタリシガ後屢々放尿時尿中ニ蜜柑種子大ノ結石排泄サルヲ認メタリ。但シ血尿ヲ見シ事ナシ。尙ホ排石時全身ニ發熱感ヲ訴フ。然ルニ去年12月31日左腹側ニ痙痛アリ當時醫師ノ鎮痛劑ノ注射數回ニ依リテ發作ハ止ミタルモ、其ノ後屢々同所ニ同様ノ痙痛アリ。而シテ2,3日前ヨリ痙痛ガ左腸骨部並ニ陰莖尖端ニ放散スル様ニナレリト。患者ハ飲酒セズ魚肉ヲ好ミ、10數年來毎日牛乳1合ヲ飲用ス。

現症

患者ハ體格榮養中等度ナリ。胸腹部臟器殊ニ腎、輸尿管ニ異常ヲ觸診セズ。體溫、脈膊ニ異常ヲ認メズ。Wa. R., 村田共ニ陰性ナリ。尿ハ輕度ノ渾

濁ヲ呈シ鏡檢上、蛋白、圓壻、糖及ビ赤血球ヲ認メズ。亦淋菌、結核菌、大腸菌並ニ雜菌モ證明シ得ズ。白血球ハ多核、單核共ニ僅少ニ存ス。膀胱鏡所見ハ粘膜一般ニ發赤シ、頂部及ビ側壁ニハ太キ擴張セル血管網ヲ認ム。膀胱三角部ハ強ク發赤腫脹セリ。左側輸尿管口附近ヲ見ルニ甚ダシク發赤腫脹シ其ノ中央管口ヨリ膀胱腔ニ突出セル棍棒狀結石ヲ認メタリ(三色版附圖參照)。尙ホ右側輸尿管一般ニ發赤セルノミニシテ其ノ内方ニ數箇ノ結石小片ヲ見ル。

經過及ビ治療

入院ノ翌日膀胱異物鉗子ニテ結石ヲ碎挫洗出セ

リ。同日午後自然ニモ亦2箇ノ排石ヲ見タリ。引續キ腎臟機能檢査ヲ行ヒシニ、左右共ニ正常ノ結果ヲ得タリ。即チIndigokarminノ排泄狀態ヲ見ルニ、

右側 3'50" 出現 4'35" 濃青

左側 2'55" 出現 4'35" 濃青

其ノ他兩腎分尿ハ共ニ清澄、弱酸性ニシテ鏡檢上共ニ、赤血球、白血球、細菌、圓壻、糖及ビ蛋白ヲ證明セズ。「ビエログラム」ニ於テモ腎盂、輸尿管ニ異變無ク、結石像モ亦認メズ。患者ハ3日目ニ退院セリ。

敍上ノ症例ヲ表示スレバ次ノ如シ。

番號	患者名	性 年齡	職業	體格 榮養	主 訴	X線 檢査 結石 陰影	患側	結石位置	疼痛	膀胱症狀	患側色素 排泄障礙	尿	發熱	膀胱内砂 粒、結石 自然排出
1	田窪	♀ 29	無	強壯 佳良	腰部疼痛 尿濁	+	右	小骨盤部	右腹側部	尿意頻數	+	強濁	ナシ	自然排出 1回
2	田中	♂ 48	船員	強壯 佳良	左腹側部 疝痛	+	左	輸尿管 起始部	左腹側部	ナシ	+	微濁	ナシ	砂粒アリ
3	眞田	♂ 21	商	中等度 中等度	右下腹部 疝痛	+	右	小骨盤部	右側腰部 右側下腹 部	ナシ	+	微濁	時々輕熱	砂粒アリ
4	高森	♂ 31	會社員	中等度 中等度	血尿	+	右	腰部	右側下腹 部	ナシ	+	殆ど 清澄	ナシ	ナシ
5	寺田	♂ 24	會社員	強壯 中等度	結石自 然排出	+	左	小骨盤部	左側腹部 左側腎部	ナシ	+	殆ど 清澄	輕熱 (疝痛時)	自然排出
6	高松	♂ 39	電氣商	強壯 佳良	放尿痛 尿意頻數	/	右	輸尿管口	會陰肛門 部 大腹部	尿意頻數 放尿痛 (腎機良)	+	微濁	ナシ	ナシ
7	平川	♂ 43	寫眞商	中等度 佳良	下腹部 疼痛	/	左	輸尿管口	會陰肛門 外尿道口	放尿痛 放尿未 期出血	+	微濁	ナシ	自然排出 2回
8	証木	♂ 30	商	中等度 中等度	血尿	+	左	腰部	下腹部	ナシ	-	微濁	ナシ	ナシ
9	松本	♀ 24	商	中等度 中等度	右腹側部 痛並ニ尿 意頻數	+	右	腸骨部	右腹部	尿意頻數	+	強濁	ナシ	ナシ
10	板野	♂ 60	商	強壯 中等度	下腹部 疼痛	/	右	輸尿管口	左腹部時 ニ左側腰 痛	膀胱痛	/	殆ど 清澄	ナシ	10年來 年1回宛 自然排出
11	細羽	♀ 23	驛長妻	強壯 佳良	發作的 下腹部 疼痛	+	左	腰部 腎臟	下腹部	ナシ	+	微濁	輕熱	ナシ
12	岩野	♂ 53	製鹽業	強壯 中等度	左腹側部 疼痛並放 尿時排石	/	左	輸尿管口	左側腹部 疼痛	ナシ	/	微濁	輕熱	自然排出 數回

既往ニ於ケル統計的觀察

曩ニ我教室ニ於テ中川, 大道, 荒田, 檜垣諸氏ニ依リテ 1920—1928 年間ニ 10 例ト 1929—1930 年間ニ中西氏ニ依リテ報告セラレタル 7 例合計 17 例ニ余ノ 12 例ヲ併セタル全 29 例ニ就キ患者ノ性別, 年齢竝ニ患側ヲ檢スルニ次ノ如シ.

性別

1920—1928 年間ニ 8 例(♂), 2 例(♀) 計 10 例 1929—1930 年間ニ 6 例(♂), 1 例(♀) 計 7 例 1931—1934 年間ニ 10 例(♂), 2 例(♀) 計 12 例 合計 15 年間ニ 24 例(♂), 5 例(♀) 總計 29 例

即チ本症ハ男子ニ多クシテ女ニハ少シ其ノ比ハ 5:1 デアル.

年齢別

多數文獻ニ據レバ, 本症ハ 21—30 歳ニ於テ最も多クシテ 31—40 歳迄之ニ次ギ, 40 歳以上ニハ少シト. 余ノ取扱ヒシ 12 例ニ就テ檢スルニ 21—30 歳最も多ク, 40 歳以上之ニ次ギ, 31—40 歳最も少シ. 即チ

21—30 歳—8 例 (即チ 66.7%)

31—40 歳—1 例 (即チ 8.3%)

41 歳以上—3 例 (即チ 25%)

結石ノ部位

前記中川, 中西氏等ノ既ニ報告セル 17 例中ニ於テハ.

右側—9 例

左側—6 例

左右兩側—1 例

不明ノモノ—1 例

余ノ 12 例中ニ於テハ

右側—7 例

左側—5 例

ニシテ, 合計 29 例中,

右側—16 例 即チ 55.5%

左側—11 例 即チ 37.0%

左右兩側—1 例 即チ 3.7%

患側不明—1 例 即チ 3.7%

ナリ.

余ノ取扱ヒシ 12 例ニ就テ, 全泌尿器科患者數ト本症竝ニ腎臓, 膀胱結石トヲ併列比較スレバ次ノ表ノ如シ.

患者 年度	輸尿管 結石	腎臓結石	膀胱結石	泌尿器科 患者數
昭和 7 年度	4 0.6%	3 0.5%	12 2%	494
8 年 度	6 1%	2 0.4%	4 0.7%	553
9 年 度	2 0.8%	1 0.4%	1 0.8%	233

昭和 7 年度ニ於ケル患者ヲ性別, 年齢別ニ分類スレバ

患者 性 年齢	輸尿管結石	腎臓結石	膀胱結石
1—10L.j.	0	0	0
11—20	0	0	0
21—30	2(♂) 1(♀)	0	1(♂)
31—40	0	3(♂)	2(♂)
41—50	1(♂)	0	1(♂)
51 以上	0	0	6(♂) 2(♀)

昭和8年度

性 患者 年 齡	輸尿管結石	腎臓結石	膀胱結石
1—10Lj.	0	0	1(♂)
11—20	0	0	0
21—30	3(♂) 1(♀)	0	0
31—40	1(♂)	2(♂)	1(♂)
41—50	0	0	0
50 以上	1(♂)	0	2(♂)

昭和9年度5月末迄

性 患者 年 齡	輸尿管結石	腎臓結石	膀胱結石
1—10Lj.	0	0	0
11—20	0	0	0
21—30	1(♂)	0	0
31—40	0	1(♂)	0
41—50	1(♂)	0	1(♂)
50 以上	0	0	1(♂)

結石ノ成因、組成及部位

本症ノ70%ハ腎石ガ下降シテ輸尿管内ニ滯溜セルモノト謂ハル。即チ其ノ成因及ビ組成ハ全ク腎石ト同一ナルガ故ニ之ヲ省略ス可シ。反之Hunner氏ハ輸尿管自體ノ先天的竝ニ後天的狭窄又ハ異狀屈曲ノ場合ニハ原發的ニ本症ヲ發スルト謂フ。蓋シ氏等ノ場合ニハ管内ニ尿ノ鬱積ヲ來シ、延テハ炎衝ヲ併發ス

ルニ因ルナル可シ。Pflauner氏モ亦本症ノ原發性發生ヲ報告セリ。而シテ從來一般ニ尿路結石ノ發生ニ密接ナル關係アリトシテ考ヘラレタル新陳代謝障礙、例之痛風、肥滿體質等モ必ズシモ本症ノ原因ナラズ。又人種、風土、職業、榮養ノ關係モ統計的ニ一致セル結論ヲ與ヘザルナリ。更ニ結石ノ核心ヲ作ス物質ハ加答兒性、有機性物質ニ非ズシテ却テ無機性結晶又ハ常ニ尿成分ノ沈積ナルコト知ラシメル今日ニ於テハv. Hemsbach, Ebstein氏等ノ各說ハ只ダ歴史的意義ヲ有スルニ過ギズ。實ニ結石ノ成因ハ今日尙ホ闡明ノ境ニ達セザルナリ。然レドモ近來之等ノ方面ニ於ケル物理化學的研究ノ進歩ニツレ聊カ本症ノ成因説明上ニ一歩ヲ進メタリト思考セラルルモノアリ。即チLichtwitz氏ノ說ニ從ヘバ尿ガ常尿タルト病尿タルトヲ問ハズ尿路ニ於テ沈澱ヲ生ゼザルハ其ノ中ニ含マレタル保護膠質ノ介在ニ因ルモノニシテ、今若シ此尿中平衡狀態ガ何等ノ原因ニヨリテ破ルル時ハ爰ニ尿成分ノ析出ヲ來タスモノナリ。而シテ斯クノ如キ現象ハ尿ノ酸或ハ「アルカリ」性又ハ成分ノ濃度ニ由ルモノニ非ズシテ全ク彼ノ保護膠質ノ量ニ基因スルモノナリ。サテ一度析出シタル尿中ノ一成分ハ時ニハ尿中ニ於ケル物理化學的平衡狀態ノ變化ニ從ヒテ再ビ溶解シ去ルコト有ル可キモ時ニヨリテハ尿ノ表面張力ノ變化ニ因リ或ハ尿路ニ炎衝ガ存在セル場合ニハ尿路壁ニ膠着シ爰ニ初メテ結石ノ心核ヲ形成スルモノナリト。而シテ氏ハ尿中保護膠質ノ充分ナル分量ヲ常ノ尿中ニ保持セシムルハ腎機能ノ健否ニ因ルモノナリト謂フ。然レドモ氏ノ說ハ尿路ニ於ケル各種ノ結石成因ヲ

説明スルニハ尙ホ多々無理ナル點無キ能ハザルナリ。

結石ヲ其ノ主成分ヨリ見ルトキハ尿酸鹽石ガ最多數ニシテ、尿酸鹽石之ニ次グモノナリト謂ハル。本教室ニ於ケル報告例ヲ見ルニ、村上氏ハ4例中悉ク尿酸鹽石ニシテ余ノ分析セシ5例中4例ハ尿酸鹽石ニシテ1例ハ「チステン」ナリキ。輸尿管結石ノ部位ハ之ヲ4ツニ區分スルコトヲ得、即チ腰部、腸骨部、骨盤部及ビ膀胱壁部ナリ。此中第1ノ部分トハ輸尿管起始部ヨリ大骨盤腔入口迄、第2腸骨部トハ大骨盤部ヨリ骨盤弧狀線迄、第3骨盤部トハ小骨盤部ヨリ膀胱壁迄、第4ハ輸尿管ガ膀胱壁内ヲ走行スル部分ナリ。此内最モ屢々見ラルルモノ即チ全輸尿管結石ノ3/5ハ第3及ビ4ノ部分ニ介在スルモノニシテ就中第3及ビ4ノ移行部ニ最モ多ク發見サル。之ニ亞グハ輸尿管ノ起始部ニシテ此所ハ生理的ニモ狹窄ヲ呈セルガタメナリ。余ノ12例中3例ハ腰部、1例ハ腸骨部、3例ハ小骨盤部、1例ハ輸尿管起始部、4例ハ輸尿管口ニ狹頓セリ。即チ全數ノ3/5ハ小骨盤内ニ位置シ、亞デ腰部、腸骨部ノ順序ニ頻度ヲ示セルコト先輩諸家ノ報告ト全ク一致セルモノナリ。

症狀

本症ノ主徴候トシテ尿ノ變化(殊ニ血尿)、疼痛、膀胱症狀及ビ發熱ヲ舉ゲ得ベシ。而シテ之等ノ症狀ガ總テ現レ來ルコトモアレド多クハ此内1—2ノモノヲ訴フルモノトス。疼痛ハ本症ノ症狀トシテ最モ重要ナルモノトシテ極メテ稀ニハ之ヲ缺クコトアレドモ大多數ノ場合ニ存在スルモノナリ。吾ガ12例ニ於テモ何レモ之ヲ訴ヘタリ。然レドモ其ノ強弱程度

及ビ位置ニ就テハ各例ニ於テ大差アリ。最モ定型のナル場合ハ痙攣ノ形ニテ來ル。余ガ例ニ於テモ田中、眞田、高森、寺田、岩野ノ5例ハ之ナリ。之ニ反シテ鈍痛ヲ訴ヘシモノハ田窪、高松、平川、柁木、松本、板野、細羽ノ7例ナリ。又或時ハ痙攣、或時ハ鈍痛ヲ訴フル者モアリ。眞田ノ例ノ如シ。次ニ疼痛ノ側位ニ就テハ多クノ場合患側ニ之ヲ覺ユルモノ(田窪、田中、高森、寺田、高松、平川、松本、板野、岩野ノ9例)ナレドモ時ニ側位ノ不明ニシテ何所ト云フコトナク腹部ニ痛ミアリト謂フモノ(柁木、細羽例)アリ。又眞田ノ例ノ如キハ或時ニハ患側或時ハ健側ニ訴フル者アリ。又本症ノ疼痛ハ屢々局所ヨリ附近ニ放散スルモノナリ。例ヘバ寺田例ノ如キハ左腹部ヨリ背部ニ、平川例ニ於テハ肛門部ヨリ外尿道口ニ放散セリト謂フ。結石ノ部位ガ輸尿管ノ上部ニ位セル時ハ腎結石ニ於ケル疼痛トノ區別屢々困難ナリ。反之小骨盤部ニ位セル時ハ多クハ膀胱、直腸、生殖器系ニ於ケル症狀ヲ表ハシ來ル。即チ尿意頻數、龜頭痛、睾丸痛、鼠蹊部痛、肛門痛、又ハ射精痛ヲ來タスコトアリ。而モ患側ノミニ來リテ膀胱ノ半側、腔ノ半側ニミ疼痛アルコトアリ。尿性ノ變化ニ就テ重要ナルハ血尿ナリ。余ガ12例中主訴トシテ又既往症ニ於テ確カニ血尿ノ認メラルルモノハ高森、平川及ビ柁木ノ3例ニシテ全例ノ3/4ニスギザルモ顯微鏡的ニハ田中、寺田、細羽ノ3例ニ於テモ陽性ニシテ他ノ6例ニ於テハ肉眼のニモ顯微鏡的ニモ陰性ナリキ。膿尿ニ就テハ余ガ12例中強濁ヲ呈シ多數ノ白血球ヲ有セシモノ僅ニ2例ニ過ギズ他ノ10例ニ於テハ何レモ肉眼のニハ

殆ど清澄又ハ微濁ニスギズ白血球モ亦多カラズ。膀胱症狀ハ結石ノ部位ニ拘ハラズ來ルコトアリ。腎結石ニ於テサヘ來ルコトアリ。然レドモ其ノ症狀ノ著明ナルハ結石ガ小骨盤部ニ介在セル時ニシテ余ガ12例中5例ニ於テ膀胱症狀ヲ呈セリ。而モ5例中3例ハ小骨盤部ニ結石ヲ有セシモノナリ。最後ニ發熱ハIsrael氏ニ據レバ $\frac{5}{12}$ 例ニ於テ之ヲ見ルト謂フモ余ガ例ニ於テハ $\frac{4}{12}$ 例ニ於テ之ヲ觀察シ得シノミ。何レモ疝痛時ニ見シモノニシテ所謂疝痛熱ニ屬ス。本症ノ際ニ屢々砂粒又ハ結石ノ放尿時ニ自然排出サルルコトアリ。余ガ12例中膀胱鏡のニ砂粒ヲ證明セシモノ2例(田中及ビ眞田例)、結石ノ自然排出ヲ見シモノ5例(田窪、寺田、平川及ビ板野、岩野例)ナリ。而モ板野ノ如キハ10年以來毎年1回宛自然排出アリシモノナリ。Indigocarmineヲ以テ色素排泄試驗ヲ行フニ全10例中9例ニ於テ患側ノ排泄遲滯ヲ認メタリ。然レドモ之ヲ以テ直チニ同側腎機能ノ障礙ト見做スハ妥當ナラズ。何トナレバ高松、平川及ビ岩野例ニ於テ余ハ結石除去後再び同様ノ試驗ヲ實施セルニ今回ハ兩腎機能殆ど同様ニシテ正常ナルヲ見タリ。因テ之等ノ例ニ於テハ腎機能ニ未ダ著變ナキモ結石ガ輸尿管腔ニ嵌頓セル爲メ色素ノ流出ガ妨ゲラルタルモノト考ヘラル。

診斷

本症ノ診斷ハ敍上ノ如ク疼痛、尿性、變化、膀胱症狀、結石ノ自然降下ノ既往症等ヲ參照ス可キコト言フ俟タザルモ此疼痛タルヤ其ノ種類、程度、部位種々多様ニシテ時ニハ又全然疼痛ヲ訴ヘザル場合モアリ。サリ乍ラ輸尿管ノ1箇所ニ於テ激シキ壓痛アラバ診斷上重

要ナル根據タル可シ。Guyon氏ニ據レバ腎結石ノ疝痛ハ發作去レバ同所ノ壓痛モ亦消退スルヲ常トストナセドモ輸尿管結石ノ場合ニハ發作後尙ホ終日同所ニ著明ナル壓痛ヲ存スルモノナリ。尙ホ膀胱附近ニ介在セル結石ナレバ男子ニ於テハ骨盤高位ノ位置ニ於テ直腸ヨリ指診ヲ行フ可ク、女子ニ於テハ陰ヨリ內診ヲ試ム可シ。確實ナル診斷ヲ下サンガ爲メニハ氣積膀胱鏡法又ハ氣積輸尿管攝影法ヲ行フ可シ。余ガ12例ハ膀胱鏡検査法ニヨリ又ハ氣積輸尿管攝影法ニ依リ結石像ヲ證明セルモノナリ。

治療

姑息的療法トシテ「ババベリン」ノ注射及ビ利尿劑、「グリセリン」等ヲ與ヘ、尙ホ輸尿管「カテーテル」ニ依ル「オリーブ」油、「グリセリン」注入或ハ「コカイン」、「ツトカイン」等ノ注入ニヨリテ輸尿管壁ノ痙攣ヲ解キテ結石ヲ膀胱内部ニ到達セシムル方法アリ。不可ナル場合ハ手術の方法ニヨル。余ノ12例中7例(田中、眞田、高松、高森、平川、岩野、松本例)ハ手術の摘出ヲ行ヒタルモ、2例(寺田、桎木例)ハ姑息的方法ニ依リテ何レモ所期ノ目的ヲ達セリ。

結 論

- 1) 輸尿管結石ハ男子ニ多ク女子ニ少シ。其ノ比ハ5:1ナリ。
- 2) 年齢ハ21—30歳ニ於テ最多數ニシテ、41歳以上之ニ亞ギ31—40歳ニ於テハ少シ。
- 3) 本症ハ右側ニ多ク左側ニ少シ。兩側性ノモノハ甚ダ稀ナリ。
- 4) 患者ハ體格強壯、榮養佳良ノ者ニ多シ。

5) 結石ノ部位ハ輸尿管ノ小骨盤部ニ位セルモノ最モ多ク、腰部之ニ亞ギ、腰骨部ニ來ルモノ少シ。而モ小骨盤部ニ來ルモノハ全數ノ $\frac{2}{3}$ ヲ占ム。

6) 自覺症狀（主ニ疼痛）ハ主トシテ患側腹、腰部ニ訴フレドモ小骨盤腔内ニ介在スル時ハ膀胱、直腸、生殖器症狀ヲ訴フル者多シ。

7) 尿ハ多クハ微濁ニシテ肉眼的ニ血尿ヲ呈セザル者ト雖モ顯微鏡的ニハ赤血球ヲ證明セシモノ多シ。

8) 全身症狀殊ニ發熱ヲ普通缺ク。但シ $\frac{1}{5}$ 例ニ於テ所謂痼痛熱ヲ見タリ。

9) 既往症ニ於テ砂粒又ハ結石ノ自然排出ヲ見シモノ多ク其ノ數60%ナリ。

10) Lurz ノ現象ハ全5例ノ患側ニ於テ總テ陰性ナリ。

11) 治療セシ全9例中3例ハ膀胱内操作ニヨリ、2例ハ姑息的療法ニ依リ殘ル4例ハ手術的ニ治療シ、何レモ好結果ヲ得タリ。

12) 摘出腎ハ2例ニ於テ何レモ腎水腫性萎縮腎ノ所見ヲ呈セリ。

終ニ臨ミ恩師根岸教授ノ御指導ト御校閲ヲ
深謝ス。

文 獻

- 1) K. Fillenz u. L. Haas, Zs. f. Urologie, Bd. 24, 1930. 2) E. M. Fuss u. H. Schulz, Ibid, Bd. 26, 1932. 3) W. Grossmann, Zs. Urol. Chir., 5. Heft, 1930. 4) R. Hofstättera, Zs. f. Urologie, Bd. 27, 1933. 5) R. Hansen, Ibid, Bd. 25, 1931. 6) Israel, Chirurgie d. Niere u. Harnleiters. 7) A. v. Lichtenberg, Handbuch der Urologie, Bd. 4. 8) S. Minami, 實地醫家ト臨牀, 第7卷, 第3號. 9) S. Minami, T. Murakami, 治療及ビ處方, 第113號. 10) K. Nakagawa, N. Ohomichi, I. Arata u. R. Higaki, Arbeiten aus der Medizinischen Universität zu Okayama, Bd. 1, Heft, 3. 11) M. Nakanishi, 12) E. Schmitz, Ibid, Bd. 27, 1933. 13) R. Tomikawa, 皮膚泌尿, 第1卷, 第4號. 14) H. Young, Practice of Urologi, Vol. 1. 15) Die Harnorgane im Röntgenbild (von Eugen Joseph). 16) A. K. Shiga, Röntgendiagnostik der Nieren u. Harnorganen.

大道論文附圖

第 7 例

第 10 例

第 12 例