岡山醫學會雜誌第48年第10號(第561號)

昭和11年10月31日發行

OKAYAMA-IGAKKAI-ZASSHI

Jg. 48. Nr. 10. Oktober 1936.

122.

611.013.38:611.814.3

「マウス」腦下垂體ノ發生ニ就テ

岡山醫科大學解剖學教室胎生學研究室(主任敷波教授)

河 内 武

[昭和11年3月1日受稿]

*Aus dem Embryologischen Laboratorium des Anatomischen Institutes der Okayama Med. Fakultät
(Vorstand: Prof. Dr. J. Shikunami).*

Über die Entwicklungsstudien bei der Hypophysis cerebri von *Mus musculus*.

Von

Takeshi Kochi.

Eingegangen am 1. März 1936.

Schon viele Autoren haben über die Entwicklungsgeschichte der Hypophyse von Mammalien berichtet, aber keiner hat die Frage entschieden, ob die epitheliale Hypophyse nur aus dem Ektoderm entstehe oder sich dazu auch Vorderdarmwandzellen oder Chordazellen vermischen. Hier will Verfasser nun die Hypophysenentwicklung der Maus ver-

gleichend mit der der Amphibien beschreiben, über welche letztere schon von ihm berichtet worden ist. Er kam zu folgenden Resultaten:

1) Die epitheliale Hypophyse entwickelt sich aus der Rathkeschen Tasche, welche am dorsocaudalen Teil der Mundbucht dorsalwärts ausgestülpt ist, und entsteht nur aus dem Ektoderm, während

sich Vorderdarmzellen und Chordazellen nicht vermischen. Die epitheliale Hypophyse der Amphibien entwickelt sich dagegen als solide Anschwellung der inneren Schicht der Epidermis. Es ist mit der Entwicklung bei der Maus ganz übereinstimmend, dass die Hypophysenanlage nur aus dem Ektoderm entsteht.

2) Die Hypophyse besteht aus 3 epithelialen Lappen und einem neuralen Lappen. Jene entstehen aus der Rathkeschen Tasche und teilen sich in Pars anterior, Pars intermedia und Pars tuberalis.

3) Der Vorderlappen, der sich aus der vorderen Wand der Rathkeschen Tasche entwickelt, wächst quer oval: d.h. der Querdurchmesser ist länger als der Längsdurchmesser, um sich später abzuplatten und in der ventralen Ansicht eine abgeplattete Spindel zu zeigen. Die Hypophysenhöhle liegt zwischen Pars intermedia und Pars anterior die sich rings um die Höhle mit Zwischenlappen verbinden und rostral mit einem nasalen Horn vereinigen. Der Vorderlappen der Amphibienhypophyse entsteht aus dem mittleren Hauptteil der soliden epithelialen Hypophysenanlagen und berührt direkt den Zwischenlappen.

4) Der Zwischenlappen, der aus der hinteren Wand der Rathkeschen Tasche gebildet wird, hat immer einen längeren Querdurchmesser, um ventrodorsal abgeplattet zu werden und in der dorsalen Ansicht eine abgeplattete Spindel zu zeigen. Der Zwischenlappen liegt zwischen Neural- und Vorderlappen, verbindet sich locker mit dem Neurallappen

und der Infundibularwand und befestigt sich mit dem Vorderlappen rings um die Hypophysenhöhle.

Der Zwischenlappen der Amphibien, der aus dem dorsocaudalen Teile der epithelialen Hypophysenanlage gebildet wird, befestigt sich mit dem Neural-lappen, verbindet sich jedoch nur sehr locker mit dem Vorderlappen.

5) Die Pars tuberalis entstammt der Pars lateralis, die sich aus den beiden unteren Vorderwandteilen der Rathkeschen Tasche entwickelt, und setzt sich aus dem nasalen und dem caudalen Horn zusammen. Das nasale Horn sieht scheibenartig aus, verbindet sich mit dem Vorderlappen an den Infundibularwand und verlängert sich nach vorn bis zum Chiasma opticum. Das caudale Horn, welches von dem Wurzelteil des nasalen Hornes differenziert ist, umarmt den Halsteil des Neurallappens mit dem Wurzelteil des nasalen Hornes. Die Partes tuberales der Amphibien entstammen den Partes laterales, die von den beiden Spitzen des cranialen Teils des Vorderlappens ausgestülpt sind. Die Partes tuberales von Urodelen (*Diemictylus pyrrhogaster*) verbinden sich immer mit dem Vorderlappen, die der Anuren (*Rhacophorus schlegelii*) anfangs mit dem Vorderlappen, finden sich aber nach der Metamorphose vom Vorderlappen isoliert.

Die Pars tuberalis der Mammalien entsteht aus folgenden 2 Partien: dem caudalen und dem nasalen Horn; bei den Amphibien findet sie sich aber immer paarig.

6) Der Neurallappen entwickelt sich von dem Infundibulum des Zwischenhirns aus und hat ein mit der Höhle des Infundibulums kommuniziertes Lumen. Der Lappen besteht aus Ependymzellen, nervösen Elementen, Bindegewebe und Cappillargefässen. Er hat eine von dorso-ventral abgeplattene Zungenform und berührt den Mittelteil der äusseren Wand des Zwischenlappens.

Der Neurallappen der Amphibien entsteht, wie bei Säugetieren, von dem Infundibulum des Zwischenhirns her; aber man findet Verschiedenheiten zwischen beiden Tierarten, derart, dass er sich bei den Amphibien mit dem Zwischenlappen innig verwächst und in sich kein Lumen enthält.

7) Die Hypophysenhöhle entstammt

der inneren Hähle der Rathkeschen Tasche, die mit der Mundhöhle kommuniziert, und ist ein schmaler Spaltraum, dessen Querdurchmesser immer länger ist als die Länge. Die Amphibien haben dagegen keine Hähle.

8) Im Entwicklungsverlauf rotiert allmählich die Hypophyse nach dorso-caudal, und zwar ca. 90 Grad. Die mechanischen Wirkungen, die in dem nach hinten wirkenden Druck des Infundibulums und in der nach dorsal drückenden Kraft der knorpeligen Anlage des Sphenoids bestehen, verursachen eine Verschiebung der Hypophyse nach dorso-caudal. Die Amphibienhypophyse rotiert nicht, aber ihr Vorderlappen verlagert sich infolge des Druckes des Infundibulums. (Autoreferat)

内容目次

- 第1章 緒言
- 第2章 材料及ビ研究方法
- 第3章 各胎兒及ビ初生兒ニ於ケル腦下垂體ノ觀察
- 第4章 總括及ビ考察
- 第5章 結論
 - 主要文獻
 - 挿圖説明

第1章 緒言

腦下垂體發生ニ關スル研究ニ於テ初メ Rathke (1838) ハ前腸前端ヨリ發生セル上皮性嚢ヲ發見シ之ガ後ニ腦下垂體主體ヲ成スコトヲ認メ腦下垂體表皮性葉原基ハ内胚葉性ノ

モノト思考セリ。其ノ後 Goette, Mihalkovics 及ビ Balfour 等ニヨリテ該上皮性嚢ハ前腸ト關係ナク咽頭膜直前ニ於ケル陷背壁ヨリ發生スルモノナル事實ガ證明サレ所謂 Rathke 氏嚢(以下 R. 氏嚢トス)ガ外胚葉性ノモノナルコトニ關シテハ既ニ明白トナレリ。然ルニ腦下垂體表皮性葉原基ハ R. 氏嚢ノ外胚葉組織ノミニヨリテ形成サレルモノナリヤ或ハ之ニ前腸ノ内胚葉組織又ハ脊索ノ中胚葉組織ガ參與シテ形成サレルモノナルカニ就テハ今日尙ホ所説ヲ異ニシ闡明スルニ至ラズ。即チ Miller (1916) ハ豚胎兒ニ就テノ研究ニ於テ脊索ハ腦下垂體表皮性葉原基タル R. 氏嚢ト密接ナル關係ヲ有セザルモ前腸前端ノ Seessel 氏嚢(以下 S. 氏嚢トス)ノ内胚葉組織ガ脊索

前端ノ媒介ニヨリテ二次的ニ R. 氏囊ニ混入セルヲ見, Parker (1917) ハ有袋類殊ニ Phascolarctos 及ビ Phascolumys ニ於テ脊索ハ同ジク R. 氏囊ニ對シテ密接ナル關係ナキモ前腸前端ノ S. 氏囊ガ直接 R. 氏囊ノ後壁ニ融合セルヲ觀察シ, 又 Nusbaum (1896) ハ犬ニ於テ脊索ト R. 氏囊ノ關係ニ就テハ記載セザルモ S. 氏囊ハ R. 氏囊ニ融合セルヲ見氏等ハ何レモ内胚葉組織ノ參與說ヲ唱ヘリ. 然ルニ Bonnet (1901) ハ „Beiträge zur Embryologie des Hundes“ ニ於テ脊索前端ハ R. 氏囊ニ融合セルヲ見タルモ上記 Nusbaum ノ所見ト相違シ S. 氏囊ノ R. 氏囊ニ對スル密接ナル關係ニ就テハ記載スルコトナク, 又 Woerdeman (1913) モ豚胎兒ニ於テ脊索前端ガ R. 氏囊ノ後壁ニ融合セルヲ觀察シ何レモ脊索組織ノ干渉ヲ強調セリ. 其ノ後 Atwell (1918) ハ家兎腦下垂體發生ニ關スル廣汎ナル業績ニ於テ S. 氏囊ノ組織ハ R. 氏囊ニ對シテ密接ナル關係ナク, 脊索前端ハ R. 氏囊ニ接スル場合アルモ組織的融合セルニ非ザルヲ確メ腦下垂體表皮性葉原基ハ内胚葉組織或ハ脊索組織ト關係ナク全ク外胚葉組織ニヨリテ形成サレルモノナルヲ記載セリ.

著者ハ囊ニ有尾及無尾兩棲類ノ腦下垂體發生ニ關シテ詳細ナル觀察ヲ遂ゲ其ノ成績ヲ既ニ本誌上ニ發表セリ. 著者ハ更ニ比較發生學的見地ヨリシテ哺乳類ニ就テ觀察スル要アルヲ痛感シ茲ニ「マウス」*Mus musculus* ヲ研究材料トシテ用ヒ極メテ早期ノ胎兒ヨリ初生兒ニ互リ特ニ腦下垂體表皮性葉原基ニ對スル前腸及ビ脊索ノ關係, 神經葉ノ發生, 前葉, 間葉及ビ突起部ノ形成竝ニ夫等相互ノ位置的

關係及ビ腦下垂體ノ廻轉現象等ニ就テ仔細ニ觀察シ之ヲ囊ニ發表セシ兩棲類ニ於ケル研究成績ト比較考究シ幸ニ所期スル結果ヲ得タルヲ以テ此處ニ發表セントス.

第2章 材料及ビ研究方法

本研究ニ使用セシ胎兒ハ著者自ラ蒐集セシモノニシテ胎兒ハ何レモ交尾後一定日時ヲ經過セシモノナリ. 大小約50箇ノ胎兒ハ採取後直チニ Zenker 氏液ニテ固定シ所定ノ方法ヲ經テ Paraffin ニ包埋シ, 幼若ナル大多數ノ胎兒ハ 10 μ , 發育セル大ナル胎兒及ビ初生兒ハ脫灰ヲ經テ 20 μ ノ矢狀斷及ビ橫斷連續切片トナシ, 染色ハ Borax-Karmin ノ Stückfärbung 或ハ Eosin-Hämatoxylin ノ重複染色ヲ施セリ. スクシテ製作シタル多クノ標本ノ内適當ナルモノニ就キ精細ナル組織的檢査ヲ行フト共ニ Edlinger ノ Zeichenapparat ニヨリテ 100 倍或ハ 150 倍ニ擴大シ之ヲ 1.0mm 或ハ 1.5mm ノ蠟板ニ複寫シテ蠟板複製模型ヲ作製シ以テ正確ナル立體的觀察ニ資セリ.

第3章 各胎兒及ビ初生兒ニ於ケル

腦下垂體ノ觀察

第1階梯. 胎兒番號 Nr. 111. 9日10時間胎

兒. 項腎徑 1.2mm. Nr. 109. 9日10時間

胎兒. 項腎徑 1.2mm

Nr. 111 ノ胎兒ニ就テ觀察スルニ視原基ハ原始眼胞ノ時期ニシテ聽原基ハ菱腦尾部ノ左右側ニ於テ聽窩ヲ形成ス. 心原基ハ心房及ビ心室ノ區別稍々判然トシ心内膜發生ス. 腦部ヲ見ルニ前腦ハ漸ク終腦ト間腦ヲ分化シ, 間腦腹壁尾部ハ輕度ニ膨出シテ幼若ナル漏斗 (Fig. 1. I.) ヲ形成ス. 咽頭膜 (Fig. 1. Rm.) ノ背側端ハ咽頭腔ニ向ツテ突出セルモ腹側端ハ退化セルヲ以テ前腸 (Fig. 1. Vd.)

ハ口陷 (Fig. 1. Mb.) ト交通シ、前腸背壁前端ハ背方ニ向ツテ淺ク陷凹ス是レ即チ Scessel 氏囊 (以下 S. 氏囊トス) (Fig. 1. ST.) ニシテ Scessel (1877) ガ創メテ鶏胎ニ於テ觀察セシモノニ相當ス。該 S. 氏囊ハ圓形核ヲ有セル散子形内胚葉細胞ヨリ成ルモ、口陷背壁ハ短橢圓形核ヲ有セル圓柱狀外胚葉細胞ニヨリテ構成セラレ、咽頭膜ハ内外兩胚葉組織ノ移行スル處ニアリテ兩者ノ境界ヲナス。口陷背壁ハ1層ヨリ成リ間隙ヲ隔テテ終腦及ビ間腦ノ腹壁ト平行シ咽頭膜ニ移行スル部分ノ直前ハ漏斗

ニ向ヒ輕度ニ陷凹シテ所謂 Rathke 氏囊 (以下 R. 氏囊トス) ヲ形成セントスル兆ヲ示ス。脊索 (Fig. 1. Ch.d.) ハ散子形細胞ヨリ成リ前腸背壁ニ沿ヒテ桿狀ヲ呈シ其ノ前端ハ S. 氏囊ト結合ス。

Nr. 109 ノ胎兒ニ就テ觀察スルニ一般發育狀態ハ Nr. 111 ノ胎兒ニ酷似ス。咽頭膜ノ背側端及ビ腹側端ハ尙ホ存在スルモ其ノ中間部ハ退化セルヲ以テ前腸ハ口陷ト交通ス。咽頭膜直前ノ口陷背壁ハ Nr. 111 ノ胎兒ヨリモ稍々深ク陷凹シテ R. 氏囊ヲ形成セントスル兆ヲ示ス。

Fig. 1.

第2階梯。胎兒番號 Nr. 88, 10日胎兒。項腎徑 20mm. Nr. 89, 10日胎兒。項腎徑 2.0mm

Nr. 88 ノ胎兒ニ就テ觀察スルニ視原基ハ未ダ原始眼胞ノ時期ナルモ聽原基ハ發育シテ聽胞ト成ル。心臟ハ擴大シ心室筋層ハ稍々肥厚ス。腦部ヲ見ルニ終腦及ビ間腦ハ前時期ヨリモ發育シ兩者ノ境界タル Sulcus telo-diencephalicus ハ明瞭ナルモ間腦ノ漏斗 (Fig. 2. I.) ハ發育尙ホ幼稚ニシテ輕度ニ膨出セルニ過ギズ。口陷背壁尾端部ハ短圓柱表皮細胞ヨリ成リ漏斗ニ向ツテ略ボ直角狀ニ陷

入シ其ノ前壁ハ漏斗及ビ間腦腹壁ニ密接セルモ後壁ハ Mesenchymzellen ヲ隔テテ菱腦腹壁 (Fig. 2. Rc.) 頭方部ト相對ス是レ即チ R. 氏囊 (Fig. 2. RT.) ニシテ腦下垂體表皮性葉原基ノ初發ナリ。前時期胎兒ニ於テ見タリシ前腸前端ノ S. 氏囊ト口陷背壁ノ境界ヲナセル咽頭膜ハ本時期胎兒ニ於テハ退化セルヲ以テ S. 氏囊 (Fig. 2. ST.) ト口陷背壁トノ境界ハ一見不明瞭ナル如ク思惟サレルモ R. 氏囊ノ後壁ガ S. 氏囊ノ前壁ニ移行セル處ハ咽頭腔ニ向ツテ弧狀ニ突出ス是レ即チ前時期ニ於テ見タ

リシ咽頭膜背側端ノ口陷背壁ト結合セシ處ニ一致セルヲ以テ R. 氏囊ハ咽頭膜直前ノ口陷背壁即チ口陷背壁尾端部ヨリ發生スルハ明白ニシテ外胚葉組織ヨリ成ル. S. 氏囊ハ R. 氏囊ノ後方ニアリテ骰子形内胚集細胞ヨリ成リ淺ク背方ニ陷凹シ R. 氏囊ニ對シ密接ナル關係ヲ有セズ. 脊索(Fig. 2. Ch.d.) 前端ハ S. 氏囊ト結合セルモ R. 氏囊ノ遙後方ニアリテ同囊トハ何等關係ヲ有セズ.

Nr. 89 ノ胎兒ニ於テ觀察スルニ口陷背壁尾端部ハ Nr. 88 ノ胎兒ニ於ケル如ク間腦漏斗ニ向ツテ略ボ直角狀ニ陷凹シ以テ R. 氏囊ヲ形成ス. S. 氏囊ハ R. 氏囊ノ後方ニアリテ R. 氏囊ニ對シテ密接ナ

ル關係ナク, 脊索前端ハ S. 氏囊ト結合セルモ R. 氏囊ノ遙後方ニアリテ同囊ニ對シ何等關係ヲ有セザルハ Nr. 88 ノ胎兒ト同様ナリ. 脊索前端ガ S. 氏囊ト結合セル事ニ關シテハ Keibel (1889), St. Remy (1885) 及ビ Schwind (1928) 氏等モ記載セル處ニシテ氏等ノ觀察ニヨレバ脊索前端ハ細胞索トナリテ S. 氏囊ト結合シ, Keibel ハ該細胞索ヲ特ニ 'Chordaknopl' ト云ヒ又 St. Remy ハ脊索ノ 'branch descendante' ト稱セリ. 著者ノ「マウス」ニ於ケル脊索ハ直接 S. 氏囊ト結合シ, 細胞索ニヨリテ S. 氏囊ト結合セル像ハ之ヲ見ズ.

Fig. 2.

第3階梯. 胎兒番號 Nr. 92. 10日18時間胎兒. 項臀徑 3.0mm. Nr. 91. 10日18時間胎兒. 項臀徑 3.0mm

Nr. 92 ノ胎兒ニ就テ觀察スルニ頭部腹側ノ外胚葉ハ肥厚シテ1對ノ嗅板ヲ形成ス. 原始眼胞ハ發育シテ眼盃トナリ, コノ前方ニ於ケル外胚葉ハ肥

厚シテ水晶體板ヲ形成ス. 心房及ビ心室ハ發育シテ左右ノ室及ビ房ヲ分化シ, 心室筋層ハ幼若ナル心乳頭筋ヲ形成ス. 前腸頭方部ハ左右ノ氣管枝原基ヲ分化シ腹部大動脈ノ左右側ニ於ケル腹膜内側ニ初メテ原腎發生ス. 腦部ヲ見ルニ終腦ノ兩側壁ハ膨出シテ大腦半球原基ヲ形成シ, 間腦ノ漏斗

(Fig. 3. I.) ハ前期胎兒ノソレヨリモ一層腹尾方ニ膨出ス。腦下垂體原基ヲ觀察スルニ R. 氏囊 (Fig. 3. RT.) ハ橢圓形核ヲ有セル短圓柱細胞ヨリ成リ前期ヨリモ發育シテ壁肥厚スルト同時ニ漏斗ニ向ツテ一層深ク陷入シ、其ノ前壁ハ間隙ヲ距テ漏斗及ビ間腦腹壁 (Fig. 3. Dc.) ト相對シ、後壁ハ Mesenchymzellen ヲ隔テテ菱腦 (Fig. 3. Rc.) ノ腹壁頭方部ト相對シ、後壁後端ノ S. 氏囊 (Fig. 3. ST.) ノ前壁ニ移行スル處ハ咽頭腔ニ向ツテ弧狀ニ突出ス。S. 氏囊ハ R. 氏囊ノ後方ニアリテ極メテ淺ク背方ニ陷凹シ R. 氏囊ニ對シテ密接ナル關係ナク、脊索 (Fig. 3. Ch.d.) ノ前端ハ S. 氏囊ノ直背ニ終リ該囊ト結合セルモ R. 氏囊ニ對シテハ何等關係ナシ。

Nr. 91 ノ胎兒ニ就テ觀察スルニ R. 氏囊ノ發育狀態ハ Nr. 92 ノ胎兒ニ於ケルモノト同様ナリ。S.

氏囊ハ Nr. 92 ノ胎兒ニ於ケルモノヨリモ稍々深ク背方ニ陷凹シ、脊索前端ハ該囊ト結合セルモ、脊索及ビ S. 氏囊ガ R. 氏囊ニ對シテ密接ナル關係ヲ有セザルハ Nr. 92 ノ胎兒ニ於ケル所見ト同様ナリ。Miller (1916) ハ豚胎兒ニ於テ脊索前端ニヨリテ牽引サレタル S. 氏囊ノ内胚葉組織ガ R. 氏囊ニ融合セルヲ見、又 Parker (1917) ハ有袋類ニ於テ極メテ深ク陷入シ且 R. 氏囊ノ直後ニ位置セル S. 氏囊ハ R. 氏囊ノ後壁ト融合セルヲ觀察セシモ、著者ノ本動物ニ於ケル S. 氏囊ハ極メテ淺ク且其ノ位置ハ R. 氏囊ノ遙後方ニアリ S. 氏囊ガ直接 R. 氏囊ニ接觸又ハ融合セルガ如キ像ハ全ク之ヲ呈セズ、又脊索前端ハ S. 氏囊ト結合セルモ S. 氏囊ノ組織ガ脊索ニヨリ牽引サレテ R. 氏囊ニ融合セルガ如キ像ハ全ク之ヲ認ムル能ハズ。

Fig. 3.

第4階梯. 胎兒番號 Nr. 96. 11 日胎兒. 項腎
徑 4.0mm

前時期胎兒ニ於テ發生セシ左右1對ノ嗅板ハ本
時期胎兒ニ於テハ前方ニ陥入シテ嗅窩ヲ形成ス.
眼盃ノ内腔ハ眼莖腔室ヲ介シテ間腦ノ第3腦室ト
交通シ, 水晶體板ハ肥厚シテ水晶體囊ヲ形成セン
トス. 心室及ビ心房ハ一層擴大シ心室乳頭筋ハ發
育ス. 間腦ノ漏斗 (Fig. 4. A. I.) ハ著シク腹尾
方ニ膨出ス. 腦下垂體表皮性葉原基タル R. 氏囊
(Fig. 4. A. RT.) ハ橢圓形核ヲ有セル圓柱細胞ヨ
リ成リ前時期ヨリモ著シク背方ニ向ツテ陥入スル
ト同時ニ左右側ニ伸展シ, 其ノ前壁ハ漏斗及ビ間
腦腹壁 (Fig. 4. A. Dc.) ニ接セルモ後壁ハ Mesen-
chymzellen ヲ隔テテ菱腦腹壁 (Fig. 4. A. Re.) 頭
方部ト相對ス. S. 氏囊 (Fig. 4. A. ST.) ハ散子形
内胚葉細胞ヨリ成リ R. 氏囊ノ遙後方ニアリテ淺
ク背方ニ陷凹シ, R. 氏囊ニ對シテ密接ナル關係ヲ
有セズ. 従前胎兒ニ於ケル脊索前端ハ S. 氏囊ノ

直背ニアリテ該囊ト結合セシガ本時期胎兒ノ脊索
(Fig. 4. A. Ch.d.) ハ S. 氏囊ノ位置ヨリモ前方ニ
向ツテ伸展ス然レドモ其ノ前端ハ R. 氏囊ノ後方
相當隔タリタル處ニアリテ Mesenchym ノ中ニ
遊離シテ終リ R. 氏囊ニ對シテハ密接ナル關係ナ
シ.

模型ニ就テ R. 氏囊ヲ觀察スルニ Fig. 4. B.) ノ
後面觀ニ示ス如ク R. 氏囊 (Fig. 4. B. RT.) ハ前
後ニ稍々扁平ニシテ左右徑ニ長キ囊狀ヲ呈シ, 其
ノ前壁大部分ハ漏斗 (Fig. 4. B. I.) ニ密接シ, 後
壁基根ノ口蓋表皮 (Fig. 4. B. Me.) ト連結セル處
ハ前方ニ向ツテ收縮シテ將來 Hypophysenstielヲ
形成セントスルヲ暗示ス. 腹面觀ニ於テハ R. 氏囊
ハ口腔ト交通セル内腔ヲ有ス. S. 氏囊 (Fig. 4. B.
ST.) ハ前腸背壁前端部ノ皺襞ニ過ギズ. 脊索 (Fig.
4. B. Ch.d.) ハ桿狀ヲ呈シ其ノ前端ハ R. 氏囊ノ後
方ニアリテ S. 氏囊ト結合セルモ R. 氏囊ニ對シテ
ハ密接ナル關係ナシ.

Fig. 4. A.

Fig. 4. B.

第5階梯. 胎兒番號 Nr. 99. 12日胎兒. 頂腎
徑6.0mm

聽胞ハ發育シテ其ノ内側ニ内淋巴管ヲ分化シ、
視原基ヲ見ルニ水晶體囊ハ尙ホ内腔ヲ有スルモ眼
莖ノ細胞ハ増殖シテ腔室ハ將ニ消失セントス。前
時期胎兒ニ於テ見タリシ嗅窩ハ本時期ニ於テ嗅囊
ヲ形成ス。肝臟ハ左右兩葉ニ分レ原始肝細胞柱ハ
發育シテ網狀ヲ呈シ、原腎小管ハ一層其ノ數ヲ
増加ス。腦部ヲ見ルニ大腦半球ハ發育シ Corpus
striatum ハ堤狀ニ肥厚シテ Lamina terminalisニ
接近シ以テ Foramen Monroi ヲ形成シ、後腦腹壁
尾方部ハ著シク肥厚スルト同時ニ前方ニ向ヒ膨出
シテ Brückenbeuge (Fig. 5. A. Bb., Fig. 5. B. Bb.)
ヲ形成シ、間腦腹壁頭方部ハ第3腦室ニ向ツテ堤
狀ニ肥厚シテ Chiasma opticum (Fig. 5. A. Cop.)
ヲ形成ス。間腦ノ漏斗尾端ハ本時期ニ於テ後下方
ニ突出シテ突起狀ヲ呈スコレ即チ腦下垂體神經葉
(Fig. 5. A. P.n.) ノ初發ニシテ第3腦室ト交通
セル狹隘ナル内腔ヲ有シ、組織ハ内腔ニ面セル
Ependymzellen トコノ周圍ニ於ケル神經組織ヨ
リ成ル。次ニ R. 氏囊及ビ其ノ周圍組織ヲ見ルニ
R. 氏囊ノ矢狀軸ハ咽頭背壁或ハ口蓋ニ對シテ垂
直ニシテ咽頭背壁及ビ口蓋ノ直背ニハ將來 Knor-
pelige Anlage des Sphenoids ト成ルベキ Mesen-

chymzellen ガ稠密ニ増殖セルヲ以テコノ壓迫ニ
ヨリテ R. 氏囊ハ背方ニ舉上セラレ該囊ノ上端ハ
神經葉ガ漏斗壁ト交ハリテ成セル約 40°ノ隅角ニ
接シ、又 R. 氏囊基根ノ口蓋表皮 (Fig. 5. A. Me.)
ト連結セル部分ハ周圍ヨリ同ジク Mesenchym ノ
壓迫ヲ蒙リ著シク收縮シテ實質性ノ短小ナル
Hypophysenstiel (Fig. 5. A. Hs.) ヲ形成ス。從
ツテ R. 氏囊ノ内腔ハ口腔ヨリ全ク遮斷サレテ
Hypophysenhöhle (Fig. 5. A. Hh.) ト成ル。斯
ノ如ク Hypophysenstiel ニヨリテ口蓋ト連結セル
R. 氏囊ノ壁ハ著シク發育シテ前葉、間葉及ビ突
起部 (Pars tuberalis) ノ原基タル Pars lateralis
(od. Lobulus lateralis) ヲ分化ス。今之等ノ形成
サレル部位及ビ組織ニ就テ觀察スルニ前葉 (Fig.
5. A. Pant.) ハ R. 氏囊ノ前壁ニヨリテ形成サレ
稍々緻密ニ排列セル散子形細胞ヨリ成リ、壁ハ比
較的肥厚シ内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ境界トシテ
間葉ノ内壁ト相對シ、該 Höhle ノ背腹兩端ニ於テ
間葉ト結合ス。間葉 (Fig. 5. A. Pant.) ハ R. 氏囊
ノ後壁ニヨリテ形成サレ緻密ニ排列セル短圓柱細
胞ヨリ成リ、壁ハ前葉ノ壁ヨリモ比較的菲薄ニシ
テ外壁一部ハ神經葉ニ接シ、内壁ハ Hypophysen-
höhle ヲ距テテ前葉内壁ト相對ス。突起部ノ原基
タル Pars lateralis (Fig. 5. B. P.L.) ハ R. 氏囊前壁
下方左右部ノ肥厚トシテ發生シ 1 對ヲナス。脊索
(Fig. 5. A. Ch.d.) ハ Mesenchym ニ圍繞サレ其ノ
前端ハ間葉外壁ト相對シ、S. 氏囊 (Fig. 5. A. ST.)
ハ Hypophysenstiel ノ後方ニ於テ淺ク背方ニ陷
凹シ其ノ壁ハ寧ロ菲薄トナリテ將ニ退化セントシ
腦下垂體ニ對シテ密接ナル關係ヲ有セズ。

模型ニ就テ觀察スルニ Fig. 5. D. ノ後面觀及
ビ Fig. 5. C. ノ側面觀ニ示ス如ク腦下垂體ハ一般
ニ前後ニ稍々扁平ニシテ腦下垂體矢狀軸ハ口
蓋 (Fig. 5. C. Me.) ニ對シテ垂直ニシテ、神經葉
(Fig. 5. D, 5. C. P.n.) ハ左右徑ヨリモ上下徑(後

Fig. 5. A.

Fig. 5. B.

Fig. 5. D.

Fig. 5. C.

期ノ頭尾徑) 稍々長ク前後ニ稍々扁平ニシテ舌狀ヲ呈シ間葉ノ外壁正中中部ト接ス。間葉 (Fig. 5. D, 5. C. P.int.) ハ其ノ外壁平坦ニシテ橢圓盤狀ヲ呈シ其ノ周圍ハ前葉ト結合シ、内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ距テテ前葉内壁ト相對スルハ既ニ切片觀察ニ於テ記述セシガ如シ。前葉 (Fig. 5. D, 5. C. P. ant.) ハ間葉ノ前方ニアリテ間葉周圍ト結合シ外壁正中上方部ハ漏斗 (Fig. 5. C. I.) ニ密接シ、正中下方部ハ Hypophysenstiel (Fig. 5. D, 5. C. Hs.) ト結合ス。突起部ノ原基タル Pars lateralis (Fig. 5. D, 5. C. P.l.) ハ Hypophysenstiel ノ兩側ニアリテ堤狀ヲ呈シ前葉正中線ノ兩側下方部ト結合シ、間腦 (Fig. 5. C. De.) 腹壁ト相對ス。脊索 (Fig. 5. D, 5. C. Ch.d.) ハ桿狀ヲ呈シ其ノ前端ハ間葉ト相對シ、S. 氏囊 (Fig. 5. C. ST.) ハ Hypophysenstiel ノ後方ニアリテ淺ク背方ニ膨出シ腦下垂體ニ對シテ密接ナル關係ヲ有セズ。

第6階梯 胎兒番號 Nr. 103. 15日胎兒。項
腎徑 8.5mm

眼莖ハ其ノ腔室全ク消失シテ實質性トナリ、水晶體前壁ハ水晶體上皮ヲ形成シ、後壁ハ水晶體纖維ヲ形成ス。腦部ヲ見ルニ側腦室ニハ脈絡叢發生シ、間腦腹壁ノ Chiasma opticum (Fig. 6. A. C.op.)

ハ著シク肥厚シ第3腦室ニ向ツテ堤狀ニ隆起シ、後腦ノ Brückenbeuge (Fig. 6. A. Bb.) ハ前方ニ突出シテ間腦腹壁ニ著シク接近ス。前時期ニ於ケル腦下垂體ハ Hypophysenstiel ニヨリテ口蓋表皮ト連結セシガ本時期ニ於テハ咽頭背壁及ピロ蓋ノ直背ニ於ケル Mesenchym ハ進化シテ Knorpelige Anlage des Sphenoids (Fig. 6. A. k.S.) ト成リコノ壓迫ニヨリテ Hypophysenstiel (Fig. 6. A. Hs.) ノ口蓋表皮ト結合セル處ハ退化セルヲ以テ腦下垂體ハ口蓋トノ連絡ヲ絶チテ獨立スルニ至リ、又腦下垂體表皮性葉ハ該軟骨及ビ漏斗ニヨリテ同時ニ背方及ビ後方ニ壓迫サレテ後背方ニ廻轉ス即チ前時期腦下垂體ノ矢狀軸ハ口蓋或ハ前腸背壁ニ對シテ垂直ナリシガ本時期ニ於テハ腦下垂體矢狀軸ノ延長線ト前腸背壁ノ交ハル前側角ハ約 45°ヲ呈ス即チ腦下垂體表皮性葉ハ其ノ上端ノ神經葉ノ基根ニ接スル處ヲ中心ニ約 45°後背側廻轉ヲナセリ。次ギニ腦下垂體各部分ニ就テ觀察スルニ神經葉 (Fig. 6. A. P.n.) ハ第3腦室ト交通セル內腔ヲ有シ漏斗壁ト結合セル處ハ稍々狹窄シテ頸部ヲ形成セントシ、神經葉ト漏斗ノ交ハル前側角ハ前時期ニ於テハ約 10°ヲ呈セシガ本時期ニ於テハ略ボ直角トナル即チ神經葉ハ本時期ニ於テ表皮性葉ノ廻轉ニ伴

ヒテ 90° ヨリ 40° ヲ減セル角度即チ 50° ノ後背側廻轉ヲナセリ。間葉 (Fig. 6. A. P.int.) ヲ見ルニ其ノ壁ハ前葉ノソレヨリモ著シク菲薄ニシテ緻密ニ排列セル圓柱細胞ヨリ成リ、外壁一部ハ神經葉ニ接シ、内壁ハ常ニ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ前葉内壁ト相對ス。前葉 (Fig. 6. A. P.ant.) ハ稍々緻密ニ排列セル散子形細胞ヨリ成リ該細胞ハ多數ノ小細胞塊ヲ形成セントスル傾向ヲ示ス。斯カル組織ヨリ成レル前葉ノ壁ハ間葉ノソレヨリモ著シク肥厚シテ Pars lateralis ト結合シ、内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對シ、該 Höhle ノ背腹兩端ニ於テ間葉ト結合ス。Hypophysenstiel (Fig. 6. A. Hs.) ハ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ口蓋表皮ヨリ分離シ其ノ先端ハ該軟骨ノ窟孔ノ中ニ遊離シテ終ル。

模型ニ就テ觀察スルニ神經葉 (Fig. 6. B, 6. C.

P.n.) ハ前時期ヨリモ左右徑ヲ増シテ短橢圓形ヲ呈シ、間葉ノ外壁正中部位ト密接ス。間葉 (Fig. 6. B, 6. C. P.int.) モ左右徑ヲ増シ外壁ハ殆ド平坦ニシテ形狀ハ橢圓盤狀ヲ呈シ神經葉ノ腹側ニ位置シテソレニ密接シ、周圍ハ前葉ト結合シ、内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ前葉内壁ト相對スルハ切片觀察ニ於テ既述セシガ如シ。前葉 (Fig. 6. B, 6. C. P.ant.) ハ間葉ノ前側ニ位置スルヲ以テ後面觀或ハ側面觀ニテハ間葉ト結合セル周圍ノ領域ノミ見ラルルモ間葉ヨリモ長キ左右徑ヲ有シ腦下垂體中最大體積ヲ有シ、Pars lateralis 及ビ Hypophysenstiel (Fig. 6. B, 6. C. Hs.) ト結合ス。Pars lateralis (Fig. 6. C. P.l.) ハ Hypophysenstiel ヲ中ニ挟ミテ 1 對ヲナシ常ニ前葉ト結合シ前時期ヨリモ一層前方ニ伸展シテ間腦腹壁 (Fig. 6. C. De.) ニ接近ス。

Fig. 6. A.

Fig. 6. B.

Fig. 6. C.

第7階梯. 胎兒番號 Nr. 105. 16 日胎兒. 頂臂
徑 12.0mm

眼蓋ハ發育シ其ノ内層ハ網膜ノ基礎ヲ形成シ、
外層ハ網膜色素層ニ進化シ、網膜ヨリ分化セル外
胚葉組織ハ Mesenchym ト共ニ硝子體ノ原基ヲ形
成シ、眼莖ハ本時期ニ於テ視神經ニ進化ス。腦部
ヲ見ルニ大脳半球頭方腹壁ハ Rhinencephalon ヲ
分化シ、後腦腹壁ノ Brückenbeuge (Fig. 7. A. Bb.)
ハ著シク前方ニ突出シ、此正中線ニ沿ヒテ Arteria
basilaris (Fig. 7. A. Ar.b.) 走行ス。咽頭背壁直背
ニ於テ knorpelige Anlage des Sphenoids (Fig.
7. A. k.S.) ハ發育シテ一層肥厚セル前時期ニ於
テ見タリシ Hypophysenstiel ノ通過セシ窓孔ハ
尙ホ遺殘ス。腦下垂體ヲ見ルニ前時期ニ於テハ腦
下垂體表皮性葉矢狀軸ノ延長線ト前腸背壁ト交ハ
レル前側角ハ約 45° ヲ呈セシガ本時期ニ於ケル表
皮性葉ノ矢狀軸ハ前腸或ハ咽頭背壁ニ對シテ殆ド
水平トナル即チ腦下垂體表皮性葉ハ本時期ニ於テ
更ニ約 45° ノ後背側廻轉ヲナセルヲ識ル。從ツテ
第5階梯ニ於テ見タリシ腦下垂體ノ前壁及ビ後壁
(Fig. 5. A. 參照) ハ本時期ニ於テハ夫々腹側及ビ
背側ニ轉向ス。即チ第5階梯ヨリ本階梯ヲ通ジ腦
下垂體表皮性葉ハ約 90° ノ後背側廻轉ヲナセルヲ
識ル。斯ノ如ク腦下垂體ハ廻轉スルモ其ノ成因ニ

關シテハ未ダ先學ノ記載ヲ見ザルヲ以テ今之ニ就
テ考察センニ由來腦下垂體ハ (1) 前背方ノ間腦漏
斗 (2) 腹方ノ knorpelige Anlage des Sphenoids
及ビ (3) 後背方ノ後腦ノ Brückenbeuge ヲ成レ
ル3 角形領域内ニ介在セルヲ以テ今 (1), (2) 及ビ
(3) ヲ夫々3 角形ノ1 邊トセバ (3) ハ腦下垂體ト
稍々隔タルヲ以テ腦下垂體ニ壓迫ヲ及ボスコト尠
キモ (1) ハ後方ニ向ツテ腦下垂體ヲ壓迫シ之ト同
時ニ (2) ハ背方ニ向ツテ壓迫スル故ニ腦下垂體ハ
(3) ニ向フ廻轉即チ後背側廻轉ヲナスモノトス。
次ギニ腦下垂體各部分ニ就テ觀察スルニ神經葉
(Fig. 7. A. P.n.) ハ狹隘ナル内腔ヲ有シ、内腔ニ
面シテ排列セル Ependymzellen ハ漸次退化シテ
其ノ數ヲ減ズルモ之ニ反シ結締組織纖維ハ著シク増
加ス。斯ル組織ヨリ成レル神經葉ノ漏斗結合セ
ル處ハ狹窄シテ頸部ヲ形成セルヲ以テ正中矢狀斷
面ハ卵圓形ヲ呈シ、神經葉ト漏斗ト交ハル前側角
ハ前期時ニ於テハ直角ヲ呈セシガ本時期ニ於ケル
神經葉ハ表皮性葉ノ廻轉ニ伴ヒテ一層後背側ニ廻
轉セルヲ以テ漏斗壁ト交ハル前側角ハ約 130° ヲ
呈ス。間葉 (Fig. 7. A. P.int.) ハ其ノ壁寧ロ菲薄
トナリ、短圓柱細胞ヨリ成リ血管ハ缺如ス。前葉
(Fig. 7. A. P.ant.) ハ Hypophysenhöhle ニ面シ
テ緻密ニ排列セル梭子形細胞ヨリ成レル菲薄ナル

層トコノ外方ニ於テ同ジク散子形細胞ヨリ成レル
 諸多ノ索狀或放射狀細胞塊ト該細胞塊間ヲ走行セ
 ル毛細血管ニヨリテ構成セラレ、斯カル組織ヨリ
 成レル前葉ノ壁ハ間葉ノソレヨリモ厚ク内壁ハ
 Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對シ、
 外壁ハ結締織ヲ介シテ knorpelige Anlage des
 Sphenoids ニ接シ、前及ビ前々階梯ニ於テ前葉ト
 結合セシ Hypophysenstiel ハ本時期ニ於テ全ク
 退化ス。Pars lateralis ハ前及ビ前々時期ニ於テ
 ハ Hypophysenstiel ノ兩側ニアリシガ本時期ニ
 於テハ Hypophysenstiel ガ退化セルヲ以テ Pars
 lateralis ハ正中線ニ向フテ發育シテ互ニ融合シ且
 漏斗壁ニ沿ヒ前方ニ伸展シ間腦ノ (Chiasma opti-
 cum (Fig. 7. A. C.op.) ノ直後ニ達シテ腦下垂體
 突起部ノ nasales Horn (Fig. 7. A. n.H.) ヲ形成
 ス。該 nasales Horn ノ基根ト間葉ノ間ニハ陷入
 セル間隙アリヲ結締織ヲ以テ充タサル、是レ即チ
 'oberne Dell' (Fig. 7. A. o.D.) ニシテ Mihalko-
 vics (1874) ノ鶏胎ニ於テ發見セシモノニ相當シ間

葉ト nasales Horn ノ境界ヲ成ス。

模型ニ就テ觀察スルニ神經葉 (Fig. 7. B, 7. C.
 P.n.) ハ前時期ヨリモ稍々左右徑ヲ増シ背腹ニ扁
 平ナル橢圓形ヲ呈シ漏斗 (Fig. 7. C. I.) 腔室ト交
 通セル内腔ヲ有シ、間葉ノ背側ニ於テ間葉ノ外壁
 正中部ト密接ス。間葉 (Fig. 7. B, 7. C. P.int.) ハ
 神經葉ト前葉ノ中間ニアリテ前時期ヨリモ一層左
 右徑ヲ増シテ扁平ナル橢圓形ヲ呈シ、周圍ハ前葉
 ト結合シ、外壁正中部ハ神經葉及ビ漏斗壁ニ接シ、
 'oberne Dell' (Fig. 7. C. o.D.) ニヨリテ突起部
 ノ nasales Horn ト境シ、内壁ハ Hypophysenhöhle
 (Fig. 7. C. IIh.) ヲ隔テテ前葉内壁ト相對ス。前葉
 (Fig. 7. B, 7. C. P.ant.) ハ常ニ間葉ノ腹側ニア
 リテ間葉周圍ト結合シ、前時期ヨリモ一層左右徑
 ヲ増シ、壁ハ間葉ノソレヨリモ著シク肥厚シ腦下
 垂體中最大體積ヲ有ス。突起部ノ nasales Horn
 (Fig. 7. C. n.H.) ハ前葉ノ正中頭方部ト結合シ、漏
 斗壁ニ密接シテ頭方ニ伸展シ其ノ頭端ハ Chiasma
 opticum (Fig. 7. C. C.op.) ノ直後ニ達ス。

Fig. 7. A.

Fig. 7. B.

第8階梯. 胎兒番號 Nr. 122. 18 日胎兒. 頂
腎徑 17.0 mm

間腦ノ Chiasma opticum (Fig. 8. A. C. op.) ハ一層肥厚シ. 漏斗 (Fig. 8. A. I.) ハ其ノ壁一層菲薄ト成ルト同時ニ腹尾方ニ膨出シ. 前及ビ前々階梯ニ於テ見タリシ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ窟孔ハ本時期ニ於テハ全ク閉鎖ス. 腦下垂體ハ (1) 前背方ノ漏斗 (2) 腹方ノ knorpelige Anlage des Sphenoids (Fig. 8. A. k.S.) 及ビ (3) 後背方ノ後腦ノ Brückenbeuge ヨリ成レル 3 角形領域内ニアリテ腦下垂體矢狀軸ハ既ニ咽頭背壁或ハ knorpelige Anlage des Sphenoids ニ平行トナリテ漏斗ヨリノ壓迫ヲ回避セル位置ヲトリ全ク廻轉ヲ終リ爾後腦下垂體矢狀軸ハ常ニ knorpeligen Anlage des Sphenoids ニ平行ナリ. 然ルニ爾後該 Korpel ノ肥厚スルニヨル壓迫ノミハ蒙ムルヲ以テ腦下垂體ハ漸次背腹ニ扁平トナリ. Hypophysenhöhle モ背腹徑ヲ短縮ス. 腦下垂體各部分ニ就テ觀察スルニ神經葉 (Fig. 8. A. P.n.) ハ神經組織. 結締組織. Ependymzellen 及ビ毛細血管ヨリ成ル. 斯カル組織ヨリ成レル神經葉ノ頸部ハ前時期

ヨリモ一層狹窄シ. 内腔ハ大部分閉鎖シテ頸部ニノミ眼局ス. 間葉 (Fig. 8. A. P.int.) ヲ見ルニ從來ノモノハ圓柱細胞ヨリ成リシガ本時期ニ於テハソレガ進化シテ成レル Hämatoxilin 嗜好ノ骰子形細胞ニヨリテ構成セラレ血管ハ缺如ス. 前葉 (Fig. 8. A. P.ant.) ハ一般ニ Eosin 嗜好及ビ Hämatoxilin 嗜好ノ骰子形細胞ヨリ成リ. 斯ノ如キ細胞ノ Hypophysenhöhle ニ面セルモノハ極メテ緻密ニ排列シテ菲薄ナル層ヲ成スモ此外方ニ於ケル細胞ハ多數ノ放射狀或ハ索狀細胞塊ヲ形成シ. 該細胞塊ハ本時期ニ於テ菲薄ナル結締組織ニテ被覆サレルニ至リ. 該細胞塊間ノ間隙内ニ於ケル毛細血管ハ一層増加ス. 斯クノ如キ組織ヨリ成レル前葉ノ壁ハ間葉ノソレヨリ厚キモ knorpeligen Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ前時期ヨリモ寧ろ菲薄トナリ. 内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對シ. 外壁ハ結締組織ヲ介シテ knorpelige Anlage des Sphenoids ニ接ス. 突起部ノ nasales Horn (Fig. 8. A. n.H.) ハ常ニ前葉ト結合シテ漏斗壁ニ密接シ前時期ヨリ著シク前方ニ伸展シテ Chiasma opticum (Fig. 8. A. C.op.)

Fig. 8. A.

Fig. 8. B.

ニ達ス。

模型ニ就テ觀察スルニ Fig. 8. B. ノ背面觀, Fig. 8. C. ノ腹面觀及ビ Fig. 8. D. ノ正中矢狀斷面ニ示ス如ク神經葉 (Fig. 8. B, 8. D. P.n.) ハ前時期ヨリ發育セルモ前葉及ビ間葉ニ比スレバ體積ヲ増スコト少ク形狀ハ前時期ノ如ク背腹ニ稍々扁平ナル橢圓形ヲ呈シ, 常ニ間葉ノ背側ニアリテ間葉ノ外壁正中部位ト密接ス。間葉 (Fig. 8. B, Fig. 8. D. P.int.) ハ常ニ神經葉ト前葉ノ中間ニ位置シ, 前時期ヨリモ著シク左右徑ヲ増シ扁平ナル紡錘形ヲ呈シ, 周圍ハ前葉ト結合シ, 外壁正中部位ハ神經葉及ビ漏斗 (Fig. 8. D.I.) ニ接シ, 内壁ハ Hypophysenhöhle (Fig. 8. D. Hh.) ヲ隔テテ前葉内壁ト相對ス。前葉 (Fig. 8. B, 8. C, 8. D. P.ant.) モ又著シク左右徑ヲ増シ背面觀ニテハ間葉ト結合セル周圍ノ領域ノミ見ラルルモ腹面觀ニテハ平坦ナル紡錘形ヲ呈シ腦下垂體中最大ナル體積ヲ有シ正中頭方部ハ nasales Horn ト結合ス。突起部ノ nasales Horn (Fig. 8. C, 8. D. n.H.) ハ常ニ前葉ノ正中頭方部ト結合シ漏斗壁ニ接シテ前時期ヨリモ著シク前方ニ伸展シテ Chiasma opticum (Fig. 8. D. C.op.) ニ達シ, 形狀ハ4邊板狀ヲ呈ス。

第9階梯. 胎兒番號 Nr. 112. 20日胎兒. 頂腎徑 21.0 mm

knorpelige Anlage des Sphenoids ハ前時期ヨリモ發育シテ一層肥厚セルモ土耳其鞍ハ未ダ形成サレルニ至ラズ。腦下垂體ヲ見ルニ其ノ矢狀軸ハ前及ビ前々階梯ノ如ク knorpelige Anlage des Sphenoids ニ平行シ, 該 Knorpel ノ肥厚スルニ因ル壓迫ノ爲ニ腦下垂體ハ前時期ヨリモ稍々背腹ニ扁平トナル。腦下垂體各部分ニ就テ觀察スルニ神經葉ハ前時期ノ如ク神經組織, 結締織, Ependymzellen 及ビ毛細血管ヨリ成リ, 前時期ヨリモ一層尾方ニ伸展シ, 頸部ニハ尙ホ狹隘ナル内腔ヲ有ス。

間葉ハ極メテ緻密ニ排列セル Hämatoxylin 嗜好ノ骰子形細胞ヨリ成リ血管ハ同ジク缺如ス。斯カル組織ヨリ成レル間葉ノ壁ハ前時期ヨリモ稍々菲薄トナル。

前葉ハ前時期ノ如ク Hypophysenhöhle ニ面シテ緻密ニ排列セル Eosin 嗜好及ビ Hämatoxylin 嗜好ノ骰子形細胞ヨリ成レル層ト, コノ外方ニ於ケル同様ノ骰子形細胞ヨリ成レル多數ノ放射狀或ハ索狀細胞塊ト, 該細胞塊間ヲ走行セル毛細血管ヨリ成ル。斯カル組織ヨリ成レル前葉ノ壁ハ間葉ノソレニ比スレバ厚キモ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ前時期ヨリモ寧ろ菲薄トナリ, 内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對シ, 外壁ハ結締織ヲ介シテ knorpelige Anlage des Sphenoids ニ接ス。突起部ノ nasales Horn ハ Hämatoxylin 嗜好ノ骰子形細胞ト少數ノ毛細血管ニヨリテ構成セラレ, 漏斗壁ニ接シテ前方ニ伸展シ Chiasma opticum ニ達セルハ前時期ト同様ナルモ, nasales Horn 基根正中線ノ左右部ヲ構成セル細胞ハ本時期ニ於テ後背方ニ向ツテ増殖シテ神經葉頸部背壁正中線ノ左右側ニ至リ背方ヨリ神經葉頸部背壁ヲ被覆セントスル傾向ヲ示ス是レ即チ突起部ノ caudales Horn ニシテ Tilney (1914) ガ創メテ猫胎兒ニ於テ發見セシモノニ相當シ次ノ模型觀察ニ於テ一層明瞭ニ認メ得。

模型ニ就テ觀察スルニ Fig. 9. ノ背面觀ニ示ス如ク神經葉 (Fig. 9. P.n.) ハ前及ビ前々時期ヨリモ頭尾徑ヲ増シテ背腹ニ稍々扁平ナル舌狀ヲ呈シ, 頸部ニハ漏斗腔室ト交通セル内腔ヲ有シ, 常ニ間葉ノ背側ニアリテ間葉ノ外壁正中部位ト密接ス。間葉 (Fig. 9. P.int.) ハ前時期ト殆ド等シキ左右徑ヲ有シ, 形狀ハ前時期ノ如ク扁平ナル紡錘形ヲ呈シ, 周圍ハ常ニ前葉ト結合シ, 外壁正中部位ハ神經葉及ビ漏斗ノ一部ニ接ス (Fig. 8. D. 參照)。前葉 (Fig. 9. P.ant.) モ又前時期ト殆ド等シキ左右徑ヲ

有シ、背面觀ニテハ間葉ト結合セル周圍ノ領域ノミ表ハルルモ腹面觀ニテハ平坦ナル紡錘形ヲ呈シ (Fig. 8. C. 参照), 内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對スルハ切片觀察ニ於テ既述セシガ如シ。突起部ノ nasales Horn (Fig. 9. n.H.) ハ前葉ト結合シ漏斗ニ接シテ1邊板狀ヲ呈スルハ前時期ト同様ナリ。caudales Horn (Fig. 9. C.H.)

ハ切片觀察ニ於テ既述セシ如ク nasales Horn 基根左右部ノ後背方ヘノ伸展ニヨリテ形成セラレ1對ヲナシ左右ヨリ神經葉ノ頸部背壁ヲ被覆セントシ、次ノ初生兒ニ於テハ左右ノモノ正中線ニ向ヒ伸展シテ互ニ融合シ nasales Horn ノ基根部ト共ニ神經葉頸部ヲ全ク圍繞スルニ至ル。

Fig. 9.

第10階梯. Nr. 114. 生後1日ノ初生兒, 頂
腎徑 23.0 mm

初生兒ニ於ケル腦下垂體矢狀軸ハ發育セル胎兒ニ於ケルソレノ如ク knorpelige Anlage des Sphenoidsニ平行ニシテ, 神經葉 (Fig. 10. A. P.n.) ハ發育セル胎兒ニ於ケル如ク神經組織, 結締組織, Ependymzellen 及ビ毛細血管ヨリ成リ, 頸部ニハ尙内腔存スルモ, 前時期ヨリ一層尾方ニ向ツテ發育シテ後腦ノ Brückenbeuge (Fig. 10. A. Bb.)

ニ接近ス。間葉 (Fig. 10. A. P.int.) ハ發育セル胎兒ニ於ケル如ク Hämatoxylin 嗜好ノ散子形細胞ヨリ成リ血管ハ同ジク缺如セルモ, 斯カル組織ヨリ成レル間葉ノ壁ハ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ一層菲薄ナル。前葉 (Fig. 10. A. P.ant.) モ又發育セル胎兒ニ於ケル如ク Hypophysenhöhle ニ面シテ緻密ニ排列セル Eosin 嗜好及ビ Hämatoxylin 嗜好ノ散子形細胞ヨリ成レル菲薄ナル層ト, コノ外方ニ於ケル同様

ノ細胞ヨリ成ル多數ノ細胞塊ト、該細胞塊間ヲ走行セル毛細血管ニヨリ構成セラル。斯カル組織ヨリ成レル前葉ノ壁ハ間葉ノソレニ比スレバ遙ニ厚キモ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ヲ蒙ムリテ胎兒期ヨリモ一層菲薄トナリ、内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對シ、外壁ハ結締織ヲ介シテ knorpelige Anlage des Sphenoids ニ接ス。突起部ノ nasales Horn (Fig. 10. A. n.H.) ハ Hämatoxylin 嗜好ノ骰子形細胞ト少數ノ毛細血管ヨリ成リ、常ニ前葉ト結合シ漏斗壁ニ接シテ Chiasma opticum (Fig. 10. A. C.op.) ニ達セルハ發育セル胎兒ニ於ケルモ同様ナルモ漏斗壁及ビ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ヲ蒙ムリテ著シク菲薄トナル。前時期胎兒ニ於テ形成サレシ左右1對ノ caudales Horn ハ本初生兒ニ於テハ正中線ニ向ヒ發育シテ互ニ融合ス (Fig. 10. A. C.H. 参照)。

初生兒ニ於ケル腦下垂體ヲ模型ニ就テ觀察スルニ Fig. 10. B. ノ背面觀ニ示ス如ク神經葉 (Fig. 10. B. P.n.) ハ稍々頭尾徑及ビ左右徑ヲ増セル外ハ前時期胎兒ニ於ケルモノト相違セルコトナク頸部ニ

ハ筒ホ内腔ヲ有シ、形狀ハ背腹ニ扁平ナル舌狀ヲ呈シ、間葉ノ背側ニアリテ間葉ノ外壁正中部ト密接ス。間葉 (Fig. 10. B. P.int.) モ稍々頭尾徑及ビ左右徑ヲ増セル外ハ前時期胎兒ニ於ケルモノト相違セルコトナク形狀ハ扁平ナル橢圓形ヲ呈シ、常ニ神經葉ト前葉ノ中間ニ位シ、周圍ハ前葉ト結合シ、外壁正中部ハ神經葉ニ接ス。前葉 (Fig. 10. B. P.ant.) モ又頭尾徑及ビ左右徑ヲ増加セル外ハ前時期胎兒ニ於ケルモノト相違セルコトナク背面觀ニテハ間葉ト結合セル周圍ノ領域ノミ表ハルルモ腹面觀ニテハ平坦ナル紡錘形ヲ呈シ、内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對スルハ切片觀察ニ於テ既述セシガ如シ。突起部ノ nasales Horn (Fig. 10. B. n.H.) ハ常ニ前葉ノ正中頭方部ト結合シ且漏斗壁ニ密接シ、發育セル胎兒ニ於テハ4邊板狀ヲ呈セシモ初生兒ニ於テハ圓盤狀ヲ呈ス。caudales Horn (Fig. 10. B. C.H.) ハ正中線ニ向ヒ發育シテ互ニ融合シ nasales Horn ノ基根部ト共ニ神經葉頸部ヲ圍繞スルニ至ル。斯クノ如ク caudales Horn ガ融合シテ nasales Horn ノ基根部ト共ニ神經葉ノ頸部ヲ圍繞スル事實ニ關シテハ

Fig. 10. A.

Tilney (1914) ノ猫及ビ Atwell (1918) ノ家兎ニ於ケル所見ト一致ス。但シ前者ハ 70.0 mm ノ胎兒ニ於テ、後者ハ交尾後 28 日ノ胎兒ニ於テ caudales Horn ノ融合スルヲ見タルモ著者ノ觀察セシ本哺乳動物ノ caudales Horn ハ初生兒ニ於テ融合セルハ相違セル處ナリ。

第 4 章 總括及ビ考察

前章ニ於ケル「マウス」ノ各胎兒及ビ初生兒ニ於ケル腦下垂體ノ發生及ビ發育狀態ニ關スル所見ヲ總括シ之ヲ先人ノ業績及ビ著者ノ彙ニ發表セシ有尾及ビ無尾兩棲類腦下垂體ノ發生ニ關スル成績ト比較考察セントス。

- 第 1 節 腦下垂體表皮性葉原基ノ發生
- 第 2 節 神經葉ノ發生及ビ其ノ發育狀態
- 第 3 節 間葉ノ形成及ビ其ノ發育狀態
- 第 4 節 前葉ノ形成及ビ其ノ發育狀態
- 第 5 節 突起部ノ形成及ビ其ノ發育狀態
- 第 6 節 腦下垂體ノ廻轉
- 第 7 節 Hypophysenhöhle

第 1 節 腦下垂體表皮性葉原基ノ發生

本哺乳動物ノ腦下垂體表皮性葉原基ハ極メテ初期ノ胎兒(第 2 階梯)ニ於ケル口陷背壁尾端部ノ背方ヘ膨出セル淺キ囊(即チ R. 氏囊)トシテ發生ス。

Parker (1917) ハ有袋類ニ於テ又 Atwell (1918) ハ家兎ニ於テ咽頭膜ノ完全ニ存在スル胎兒ノ咽頭膜直前ニ於ケル口陷背壁ヨリ R. 氏囊ノ發生セルヲ觀察セシモ、著者ノ本動物ニ於テハ咽頭膜ノ退化セル直後ノ時期ニ於テ R. 氏囊ノ發生セルヲ見タリシヲ以テ R. 氏囊ノ發生部位ト前腸殊ニ S. 氏囊トノ境界ハ一見不明瞭ノ如ク思惟サレルモ R. 氏囊ガ S. 氏囊ニ移行スル部分換言セバ R. 氏囊ト

前腸ノ S. 氏囊ノ境界ニ一致スル部分ハ咽頭腔ニ向ツテ弧狀ニ突出ス。是レ即チ第 1 階梯ニ於テ見タリシ咽頭膜背側端ノ連結セシ處ニ相當セルヲ以テ R. 氏囊ハ咽頭膜直前ニ於ケル口陷背壁即チ口陷背壁尾端部ヨリ發生スルハ明白ナリ。斯クシテ發生セシ R. 氏囊ハ漸次背方ニ向ツテ深サヲ増スモ寧ロ左右徑ヲ増シ間腦ノ漏斗ト口蓋ノ間ニ於テ横囊狀ヲ呈シ其ノ內腔ハ口腔ト交通セルモ、第 5 階梯胎兒ニ至レバ咽頭背壁及ビ口蓋ノ直背ニ knorpelige Anlage des Sphenoids ト成ルベキ Mesenchymzellen ガ稠密ニ増殖スルニ至レルヲ以テコノ壓迫ニヨリテ R. 氏囊ハ背方ニ舉上セラレ、又該囊ノ口蓋表皮ト連結セル部分モ周圍ヨリ Mesenchymzellen ノ壓迫ヲ蒙リ狹窄シテ短小ナル實質性ノ Hypophysenstiel ト成ル從ツテ口腔ト交通セル R. 氏囊ノ內腔ハ全ク遮斷サレテ Hypophysenhöhle ト成リ、R. 氏囊ハ Hypophysenstiel ニヨリテ口蓋表皮ト連結ス。斯クノ如ク Hypophysenstiel ニヨリテ口蓋ト連結セル時期ノ R. 氏囊ハ著シク左右徑ヲ増シ且該囊ノ壁ハ前葉、間葉及ビ突起部ノ原基タル Pars lateralis (od. Lobulus lateralis) ヲ形成ス。次デ咽頭背壁及ビ口蓋ノ直背ニ於ケル Mesenchym ガ發育シテ knorpelige Anlage des Sphenoids ヲ形成スルニ至レバ該 Knorpel ノ壓迫ノタメニ Hypophysenstiel ハ退化シ從ツテ腦下垂體ハ口蓋トノ連絡ヲ絶チテ獨立スルニ至ル。腦下垂體ガ R. 氏囊ノ時期ヨリ漸次發育シテ左右徑ヲ増スハ元來腦下垂體ハ (1) 前背方ノ間腦ノ漏斗 (2) 後背方ノ後腦ノ Brückenbenge 及ビ (3) 下方ノ knorpelige Anlage des Sphenoids ト成ルベキ Mesenchym 或ハソレノ進化セル knorpelige Anlage des Sphenoids ヲヨリ成レル 3 角形領域ニ介在セルヲ以テ夫等ノ組織ハ腦下垂體ノ前背方、後背方及ビ下方ヘノ發育ヲ抑制スルモ、左右側ニハ發育ヲ抑制スベキ組織

ナキヲ以テナリ。次ギニ口陷背壁尾端ヨリ發生セル R. 氏囊ニ前腸或ハ脊索組織ガ干與シテ腦下垂體表皮性葉原基ヲ形成スルモノナリヤ否ヤニ關シテ先人ノ業績ヲ見ルニ Nusbaum (1896) ハ犬ニ於テ又 Parker (1917) ハ有袋類殊ニ *Phascolumys* 及ビ *Phascolarctos* ニ於テ前腸ノ S. 氏囊ガ直接 R. 氏囊ノ後壁ニ融合セルヲ觀察シ、又 Miller (1916) ハ豚胎兒ニ於テ S. 氏囊ノ細胞ガ脊索前端ノ媒介ニヨリテ二次的ニ R. 氏囊ニ混入セルヲ見腦下垂體表皮性葉原基ハ R. 氏囊ニ S. 氏囊ノ内胚葉組織ガ干與シテ形成サレルモノナルヲ記載セリ。一方 Bonnet (1901) ハ犬ニ於テ又 Woerdeman (1913) ハ豚胎兒ニ於テ脊索ガ R. 氏囊後壁ニ融合セルヲ見腦下垂體表皮性葉原基ハ R. 氏囊ニ脊索組織ガ參與シテ形成サレルモノナルコトヲ力説セリ。之ニ對シ Atwell (1918) ハ家兎ニ於テ S. 氏囊ハ R. 氏囊ニ對シテ密接ナル關係ナク、脊索前端ハ R. 氏囊後壁ニ密接セル場合アルモ組織の融合セルニ非ラザルヲ認メ腦下垂體表皮性葉原基ハ全ク外胚葉組織ニヨリテ形成サレルモノナルコトヲ強調セリ。著者ノ觀察ニヨレバ本哺乳動物ノ S. 氏囊ハ有袋類、豚及ビ犬ノソレヨリモ極メテ淺クシテ前腸背壁前部ノ寧ろ皺襞ニ過ギズ且其ノ位置ハ R. 氏囊ノ後方相當隔ダリタル處ニアリテ R. 氏囊ニ對シテ全ク關係ナク、脊索前端ハ多クノ場合 S. 氏囊ト結合セルモ脊索ノ媒介ニヨリテ S. 氏囊ノ細胞ガ R. 氏囊ニ混入スト云ヘル Miller 氏ノ所見ハ之ヲ認ムル能ハズ。又脊索前端ハ何レノ胎兒ニ於テモ R. 氏囊ノ後方ニ終リ、該囊ニ對シテ密接ナル關係ヲ有スルモノハ全ク之ヲ見ザリキ。

即チ腦下垂體表皮性葉原基ハ全ク R. 氏囊ノ外胚葉組織ニヨリテ形成サレ Atwell ノ所見ト一致セル結果ヲ得、本問題ノ究明ニ對シ本哺乳動物ハ極メテ好個ノ材料ナリト信ズ。

次ギニ本動物ノ腦下垂體表皮性葉原基ノ發生狀態ヲ著者ノ眞ニ發表セシ兩棲類ノソレト比較スルニ本動物ノ腦下垂體表皮性葉原基ハ既述セシ如ク口陷背壁尾端部ノ背側方ニ膨出セル囊トシテ發生シ、其ノ内腔ハ初期ニ於テハ口腔ト交通シ、兩棲類ノソレハ口陷背壁内層ノ質實ナル肥厚トシテ發生シ全ク内腔ヲ有セザルハ相違スル處ナルモ、腦下垂體表皮性葉原基ハ前腸及ビ脊索ト密接ナル關係ナク全ク外胚葉組織ヨリ成レルハ同様ナリ。

第2節 神經葉ノ發生及ビ其ノ發育狀態

神經葉ノ發生ハ表皮性葉原基ノ發生ヨリモ暫ク後期ニ於テス。

即チ表皮性葉原基タル R. 氏囊ガ發育シテ前葉、間葉及ビ突起部ノ原基タル *Pars lateralis* (od. *Lobulus lateralis*) ヲ分化セル時期ノ胎兒(第5階梯)ニ於テ神經葉ハ間腦ノ漏斗ヨリ發生シ後下方ニ突出シテ舌狀ヲ呈シ、漏斗腔室ト交通セル内腔ヲ有シ、間葉ノ背側ニ位置シテ間葉ノ外壁正中部位ニ密接ス。斯クシテ發生セシ神經葉ハ發育スルニ從ツテ體積ヲ増スモ其ノ増加率ハ前葉及ビ間葉ニ比スレバ遙ニ僅少ニシテ形狀ハ背腹ニ稍々扁平ナル橢圓形或ハ舌狀ヲ呈シ、後期胎兒ニ於テハ神經葉基根ノ漏斗ト結合セル部分ハ狹窄シテ頸部ヲ形成シ、内腔ハ漸次閉鎖シテ後期胎兒及ビ初生兒ニ於テハ頸部ニノミ遺殘ス。該内腔ノ閉鎖ハ Grönberg (1901) ノ針鼠 (*Erinaceus europaeus*) ニ於ケル如ク神經葉ノ尾端ヨリ始マリテ頸部ニ及ブラ認ム。神經葉ノ組織ハ發生當初ニ於テハ漏斗壁ノソレニ酷似シ主トシテ *Ependymzellen* ヲ成レルモ發育階梯進ミ神經葉ノ内腔ガ尾端ヨリ閉鎖シテ頸部ニ及ブニ從ツテ *Ependymzellen* ハ漸次退化シ之ニ反シテ結締組織纖維ハ漸次増加シ、後期胎

兒及ビ初生兒ニ於ケル神經葉ハ神經組織、結締組織、少數ノ Ependymzellen 及ビ毛細血管ヨリ成ル。

今本哺乳動物ノ神經葉ヲ著者ノ囊ニ發表セシ兩棲類ノソレト比較スルニ神經葉ハ漏斗ヨリ發生シ間葉ノ背側ニ位置スルハ同様ナルモ、本哺乳動物ノ神經葉ハ間葉ニ接觸シ胎兒期及ビ初生兒ニ於テハ内腔ヲ有シ、兩棲類ノ神經葉ハ間葉ト組織の結合シ全ク内腔ヲ有セザルハ相違セル處ナリ。

第3節 間葉ノ形成及ビ其ノ發育狀態

間葉ハ神經葉ノ發生セル時期ノ胎兒(第5階梯)ニ於テ R. 氏囊ノ後壁ニヨリテ形成サレ組織上圓柱表皮細胞ヨリ成リ形狀ハ背腹ニ扁平ナル短橢圓形ヲ呈ス。

爾後發育シテ後期胎兒ニ至レバ Hämatocylin 嗜好ノ散子形細胞ヨリ成リ、著シク左右徑ヲ増加スルモ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ肥厚スルニヨル壓迫ヲ蒙リテ一層菲薄トナリ後期胎兒及ビ初生兒ニ於テハ長橢圓形或ハ扁平ナル紡錘形ヲ呈シ、初期ヨリ初生兒ヲ通ジ常ニ神經葉ト前葉ノ中間ニ位置シ、周圍ハ前葉ト結合シ、外壁正中部ハ神經葉及ビ漏斗ニ接シ、内壁ハ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ前葉内壁ト相對ス。間葉ノ血管ノ有無ニ關シテハ Atwell (1918) 及ビ Schwind (1928) 氏等ハ血管ハ缺如スト云ヒ、著者ノ本動物ニ於ケル觀察ニ於テモ又之ヲ認メズ。

今本哺乳動物ニ於ケル間葉ノ形成サレル部位及ビ間葉ト前葉ノ相互關係ヲ兩棲類ニ於ケルソレト比較スルニ本哺乳動物ノ間葉ハ既述セシ如ク R. 氏囊ノ後壁ニヨリテ形成サレ前葉ト組織の結合セルモ、兩棲類ノ間葉ハ實質

ナル腦下垂體表皮性葉原基ノ尾背方部ニヨリテ形成サレ前葉ト接觸セルニ過ギザルハ注目ニ價ス。

第4節 前葉ノ形成及ビ其ノ發育狀態

前葉ハ間葉ノ形成ト時期ヲ同ジクシテ第5階梯胎兒ノ R. 氏囊ノ前壁ニヨリテ形成セラ

ル。組織ハ不規則ニ排列セル散子形細胞ヨリ成リ、形狀ハ前後ニ稍々扁平ナル短橢圓形ヲ呈スルモ、第8階梯ニ至レバ一層發育シ Hypophysenhöhle ニ面セル好酸性及ビ好鹽基性ノ散子形細胞ヨリ成レル菲薄ナル層ト、コノ外方ニ於ケル同様ノ散子形細胞ヨリ成レル多數ノ細胞塊ト、該細胞塊間ヲ走行セル毛細血管ヨリ成リ、形態ハ一層左右徑ヲ増加シ腹面觀ニ於テ平坦ナル紡錘形ヲ呈シ、後期胎兒及ビ初生兒ニ於テモ同様ノ組織ヨリ成リ、knorpelige Anlage des Sphenoids ノ肥厚スルニヨル壓迫ノタメニ前葉ハ一層背腹ニ扁平トナルモ左右側ニハ發育ヲ抑制スベキ組織ナキヲ以テ著シク左右徑ヲ増加シ腹面觀ニテハ平坦ナル紡錘形ヲ呈シ、腦下垂體中最大體積ヲ有シ、常ニ間葉ノ腹側ニ位置シテ間葉周圍ト結合シ、又初期ニ於テハ突起部ノ原基タル Pars lateralis ト結合セルモ後期胎兒及ビ初生兒ニ於テハ Pars lateralis ノ進化セル突起部ノ nasales Horn ト結合シ、内壁ハ常ニ Hypophysenhöhle ヲ隔テテ間葉内壁ト相對ス。

今本哺乳動物ニ於ケル前葉ノ形成サレル部位ヲ兩棲類ニ於ケルソレト比較スルニ本動物ノ前葉ハ既述セシ如ク R. 氏囊ノ前壁ニヨリテ形成サレルモ兩棲類ノソレハ實質ナル腦下垂體表皮性葉原基ノ中央大部分ニヨリテ形成サル。

第5節 腦下垂體突起部ノ形成及ビ

其ノ發育狀態

腦下垂體突起部ノ原基タル Pars lateralis ハ前葉及ビ間葉ト時期ヲ同ジクシテ第5階梯胎兒ニ於ケル R. 氏囊前壁下方ノ左右部ヨリ質實ナル堤狀肥厚トシテ發生シ Hypophysenstiel ヲ挾ミテ1對ヲ成ス。

次ギノ第6階梯胎兒ニ於テハ稍々肥厚シ且前方ニ伸展シテ漏斗壁ニ接近セル外ハ著變ヲ呈セザルモ、第7階梯胎兒ニ於テハ Hypophysenstiel ガ全ク退化セルヲ以テ左右ノ Pars tuberalis ハ正中線ニ向ヒ發育シテ互ニ癒合シ且漏斗壁ニ沿ヒ前方ニ伸長シテ突起部ノ nasales Horn ヲ形成ス。次デ第8階梯胎兒ニ至レバ nasales Horn ハ漏斗壁ニ沿ヒ一層前方ニ伸長シテ間腦ノ Chiasma opticum ニ達シ、漏斗及ビ knorpelige Anlage des Sphenoids ニヨリ背腹ニ壓迫サレテ著シク菲薄トナリ腹面觀ニ於テ4邊板狀ヲ呈シ、次デ第10階梯ノ初生兒ニ至レバ nasales Horn ハ漏斗ニ接シテ圓盤狀ヲ呈シ其ノ前端ハ發育セル胎兒ニ於ケル如ク Chiasma opticum ニ達セルモ、左右ノ caudales Horn ハ正中線ニ向ヒ發育シテ互ニ癒合シ nasales Horn ノ基根部ト共ニ神經葉ノ頸部ヲ圍繞ス。而シテ nasales Horn ハ發生當初ヨリ初生兒ヲ通ジ常ニ前葉ノ頭方正中部ト結合ス。Atwell (1918) ハ家兎ニ於テ突起部ノ原基タル Pars lateralis ハ前葉或ハ間葉ヲ未ダ形成セザル時期ノ R. 氏囊ヨリ發生セルヲ觀察セシモ、著者ノ本動物ニ於ケル Pars lateralis ハ前葉及ビ間葉ト時期ヲ同ジクシテ R. 氏囊ヨリ發生シ、又 Atwell ノ家兎及ビ Tilney (1914) ノ猫ニ於テノ觀察ニヨレバ左右ノ caudales Horn ハ夫々交尾後28日ノ胎兒及ビ70.0 mm.ノ胎兒ニ於テ癒合セルモ、著者ノ本動物ニ於テハ生後1日ノ初生兒ニ於テ癒合ス。

今本哺乳動物ニ於ケル Pars lateralis ノ發生部位及ビ突起部ト前葉ノ相互關係等ヲ兩棲類ニ於ケルソレト比較スルニ本哺乳動物ノ Pars lateralis ハ R. 氏囊前壁下方ノ左右部ヨリ發生スルモ兩棲類ノソレハ前葉頭方ノ左右部ヨリ發生ス。本哺乳動物及ビ有尾兩棲類殊ニ蟾蜍ノ突起部ハ常ニ前葉ト結合セルモ、無尾兩棲類殊ニ青蛙ノ突起部ハ初期ニ於テハ前葉ト結合セルモ變態期ニ於テ前葉ヨリ分離シ成體ニ於テモ全ク前葉ト連絡セズ。本哺乳動物ノ突起部ハ nasales Horn 及ビ caudales Horn トシテ區別サレルモ一體ナルニ對シ有尾及ビ無尾兩棲類ノ突起部ハ常ニ1對ヲ成セルハ注目ニ價ス。

第6節 腦下垂體ノ廻轉

本哺乳動物腦下垂體表皮性葉ハ神經葉ト共ニ發育途上ニ於テ廻轉ス。

即チ第5階梯ニ於テハ表皮性葉ノ矢狀軸ハ前腸背壁或ハ口蓋ニ對シテ垂直ナルモ、第6階梯ニ於テハ表皮性葉ノ矢狀軸延長線ト前腸背壁或ハ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ交ハル前側角ハ約 15° ヲ呈ス即チ表皮性葉ハ本時期ニ於テ約 45° ノ後背側廻轉ヲナシ、次デ第7階梯ニ至レバ更ニ 45° 後背側廻轉シテ表皮性葉矢狀軸ハ knorpelige Anlage des Sphenoids ニ平行トナル。神經葉ノ廻轉ニ就テ總括スルニ第5階梯ノ發生當初ニ於ケル神經葉ト漏斗ノ交ハル前側角ハ約 40° ヲ呈スルモ、第6階梯ニ至レバ神經葉ト漏斗ノ交ハル前側角ハ約直角ヲ呈ス即チ神經葉ハ本時期ニ於テ $90^\circ - 40^\circ$ 即チ約 50° ノ後背側廻轉ヲナシ、次デ第7階梯ニ至レバ神經葉ト漏斗ノ交ハル前側角ハ約 130° ヲ呈ス即チ神經葉ハ本時期ニ於テ $130^\circ - 90^\circ$ 即チ約 40° ノ後背側廻轉ヲナセリ。腦下垂體矢

狀軸ガ1度 knorpelige Anlage des Sphenoids = 平行スルニ至レバ爾後腦下垂體ハ次ニ記述セントスル周圍組織ノ壓迫ヲ蒙ルコト尠キヲ以テ廻轉ヲ終リ、結局表皮性葉ハ $45^\circ + 45^\circ$ 即チ約 90° ノ後背側廻轉ヲナス、神經葉モ $50^\circ + 40^\circ$ 即チ約 90° ノ後背側廻轉ヲナス。斯クノ如ク腦下垂體ハ廻轉シ腦下垂體ノ形態及ビ周圍組織トノ相互位置ノ關係ニ尠カラザル變化ヲ來タスモノナルモ廻轉及ビ其ノ成因ニ關シテハ未ダ先學ノ適確ナル記載ヲ見ザルヲ以テ此處ニ後背側廻轉ノ成因ニ就テ考察センニ由來腦下垂體ハ (1) 前背方ノ間腦ノ漏斗、(2) 腹方ノ knorpelige Anlage des Sphenoids 及ビ (3) 後背方ノ後腦ノ Brückenbeuge ヨリ成レル3角形領域内ニ介在セルヲ以テ今 (1)、(2) 及ビ (3) ヲ夫々3角形ノ1邊トセバ (3) ハ腦下垂體ト稍々隔タルヲ以テ腦下垂體ニ壓迫ヲ及ボスコト尠キモ (1) ハ後方ニ向ツテ腦下垂體ヲ壓迫シ之ト同時ニ (2) ハ背方ニ向ツテ壓迫スル故ニ腦下垂體ハ神經葉ノ基根 (後期ノ頸部) 及ビ之ニ接スル表皮性葉ノ部分ヲ中心トシテ (3) ニ向ヘル廻轉即チ後背側廻轉ヲナス。

之ヲ要スルニ腦下垂體ノ後背側廻轉ヲナスハ漏斗ノ後方ニ及ボス壓迫ニ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ背方ニ及ボス壓迫ノ相加ハレル機械的作用ニ基因スルモノト信ズ。兩棲類腦下垂體ハ全ク廻轉ヲナサザルモ前葉ハ間葉ニ接觸セルニ過ギザルヲ以テ間腦漏斗ノ壓迫ニヨリ發育途上ニ於テ尾方ニ移動シ本哺乳動物腦下垂體ノ廻轉ニ髣髴タル處アリ。

第7節 Hypophysenhöhle

Hypophysenhöhle ハ R. 氏囊ノ内腔ヨリ由來ス。

即チ腦下垂體表皮性葉ガ其ノ原基タル R. 氏囊ノ時期ニアリテハ R. 氏囊ノ内腔ハ廣潤ニシテ口腔ト交通セルモ稍々後期ニ至レバ咽頭背壁及ビ口腔ノ直背ニ knorpelige Anlage des Sphenoids ト成ルベキ Mesenchymzellen ガ稠密ニ増殖スルニ至レルヲ以テソレノ壓迫ニヨリテ口腔蓋表皮ト連結セル R. 氏囊ノ基根ノ部分ハ收縮シテ實質性ノ短小ナル Hypophysenstiel ヲ形成シ、從ツテ R. 氏囊ノ内腔ハ口腔ヨリ全ク遮斷サレテ Hypophysenhöhle ト成ル。而シテ該 Höhle ノ周圍ハ R. 氏囊ノ前壁及ビ後壁ヨリ由來セル前葉及ビ間葉ニヨリテ圍繞セラレルヲ以テ Hypophysenhöhle ハ前葉ト間葉ノ内側ニ於ケル境界ヲナス。斯クシテ形成サレタル Hypophysenhöhle ハ前葉及ビ間葉ノ發育ニ伴ツテ漸次左右徑ヲ増スモ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ背腹徑ヲ短縮シテ狹隘トナル。

第5章 結 論

曩ニ發表セ：有尾及ビ無尾兩棲類腦下垂體發生ニ關スル成績ト比較シ、哺乳類殊ニ「マウス」ノ腦下垂體ノ發生ニ關シ次ギノ主ナル結論得タリ。

1) 本哺乳動物ノ腦下垂體表皮性葉原基ハ口腔背壁尾端部ノ背方ニ膨出セル淺キ囊 (即チ Rathke 氏囊) トシテ發生シ全ク外胚葉組織ヨリ成リ、前腸或ハ脊索ハ該原基形成ニ參與セズ。

兩棲類腦下垂體表皮性葉原基ハ口腔背壁内層ノ實質ナル肥厚トシテ發生シ全ク内腔ヲ有セザルハ相違セル處ナルモ、該原基ハ前腸或ハ脊索ト關係ナク全ク外胚葉組織ヨリ成レルハ同様ナリ。

2) 本哺乳動物ノ腦下垂體ハ3箇ノ表皮

性葉ト1箇ノ神經葉ヨリ成リ、表皮性葉ハ Rathke 氏囊ニヨリテ形成サレ前葉、間葉及ビ突起部ノ3部分ヨリ成ル。

3) 本哺乳動物ノ前葉ハ Rathke 氏囊ノ前壁ニヨリテ形成サレ發育スルニ從ツテ左右徑ヲ増スモ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ背腹ニ扁平トナリ初生兒ニアリテハ腹面觀ニ於テ平坦ナル紡錘形ヲ呈シ、常ニ間葉ノ腹側ニ位置シ、Hypophysenhöhle ヲ境界トシテ間葉周圍ト結合シ、又突起部ノ nasales Horn ト結合ス。

兩棲類ノ前葉ハ實質ナル腦下垂體表皮性葉原基ノ中央大部分ニヨリテ形成サレ、間葉ト結合セズシテ單ニ接觸ス。

4) 本哺乳動物ノ間葉ハ Rathke 氏囊ノ後壁ニヨリテ形成サレ發育スルニ從ツテ左右徑ヲ増スモ knorpelige Anlage des Sphenoids ノ壓迫ニヨリテ背腹ニ扁平トナリ初生兒ニアリテハ背面觀ニ於テ扁平ナル橢圓形ヲ呈シ、常ニ神經葉ト前葉ノ中間ニ位置シ、神經葉及ビ漏斗ニ接シ且 Hypophysenhöhle ヲ境界トシテ周圍ハ前葉ト結合ス。

兩棲類ノ間葉ハ腦下垂體表皮性葉原基ノ尾背方部分ニヨリテ形成サレ神經葉ト結合セルモ前葉ト單ニ接觸ス。

5) 本哺乳動物ノ突起部ハ nasales Horn 及ビ caudales Horn ヨリ成リ、nasales Horn ハ Rathke 氏囊前壁下方ノ左右部ヨリ發生セル Pars lateralis ニヨリテ形成セラレ、常ニ前葉ト結合シ間腦ノ漏斗壁ニ接シテ漸次前方ニ伸展シテ終ニ Chiasma opticum ニ達シ、初生兒ニ於テハ圓盤狀ヲ呈ス。caudales Horn ハ nasales Horn ノ基根ノ左右部ヨリ分化シ

漸次後方ニ向ツテ伸展スルト共ニ正中線ニ向ツテ發育シテ左右ノモノ癒合シ nasales Horn ノ基根部ト共ニ神經葉ノ頸部ヲ圍繞ス。兩棲類ノ突起部ハ前葉頭方ノ左右部ヨリ發生セル Pars lateralis ニヨリテ形成サレ、有尾兩棲類蝶鰓ノ突起部ハ常ニ前葉ト結合セルモ無尾兩棲類青蛙ノ突起部ハ初期ニ於テハ前葉ト結合セルモ變態期ニ於テ前葉ヨリ全ク分離ス。

本哺乳類ノ突起部ハ nasales Horn 及ビ caudales Horn トシテ區別サレルモ互ニ連結シテ一體ヲ成セルニ對シ有尾及ビ無尾兩棲類ノ突起部ハ常ニ左右1對ヲ成セルハ注目ニ價ス。

6) 本哺乳類ノ神經葉ハ Rathke 氏囊が發生シテヨリ暫ク後期ニ於テ間腦ノ漏斗ヨリ發生シ初期ニ於テハ主トシテ Ependymzellen ヨリ成ルモ、後期胎兒及ビ初生兒ニ於テハ Ependymzellen、神經組織、結締組織及ビ多數ノ毛細血管ヨリ成リ、初期胎兒ヨリ初生兒ヲ通ジ漏斗腔室ト交通セル管狀ノ内腔ヲ有シ、形狀ハ背腹ニ扁平ナル舌狀ヲ呈シ、常ニ間葉ノ背側ニ位置シテ間葉ノ外壁正中部ニ密接ス。

兩棲類ノ神經葉ハ間腦漏斗ヨリ發生シ間葉ノ背側ニ位置スルハ哺乳類ト同様ナルモ全ク内腔ヲ有セザルコト及ビ間葉ニ接スルコトナクツレト癒合セルコトハ哺乳類ト相違セル處ナリ。

7) Hypophysenhöhle ハ最初口腔ト交通セル Rathke 氏囊ノ内腔ヨリ由來シ、初生兒ニ於テハ左右徑長ク背腹徑短カキ狹隘ナル内腔ニシテ常ニ前葉ト間葉ノ内側ニ於ケル境界ヲナス。

兩棲類腦下垂體ハ Hypophysenhöhle ナ有セズ。

8) 本哺乳動物ノ腦下垂體ハ發育途上ニ於テ約90度ノ後背側廻轉ヲナス。斯ノ如ク廻轉スルハ間腦漏斗ノ後方ニ及ボス壓迫ト knorpelige Anlage des Sphenoids ノ背方ニ及ボス壓迫ノ相加ハレル機械的作用ニ基因スルモノト信ズ。

兩棲類腦下垂體ハ廻轉セザルモ前葉ハ單ニ間葉ニ接觸セルヲ以テ間腦漏斗ノ壓迫ニヨリ發育途上ニ於テ尾方ニ向ツテ移動シ哺乳類腦下垂體ノ廻轉ニ髣髴タリ。

終リニ臨ミ恩師數波教授ノ御指導ト御校閲ノ勞ヲ深謝ス。

文 獻

- 1) Atwell, W. J., Amer. Jour. of Anat., Vol. 24, 1918.
- 2) Bonnet, Anat. Heft, Bd. 16, 1901.
- 3) Grönberg, Zoolog. Jahrb., Vol. 15, 1901.
- 4) Haller, B., Anat. Anz., Bd. 37, 1910.
- 5) Haller, B. und O. Mori, Zeit. f. Anat. u. Ent., Bd. 76, 1925.
- 6) Joseph L. Schwind, Amer. Jour. of Anat., Vol. 41, 1928.
- 7) Kraushaar, R., Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 41, 1889.
- 8) Lothringer, S., Arch. f. mikr. Anat., Bd. 28, 1886.
- 9) Mihailovics, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 11, 1875.
- 10) Miller, M. M., Anat. Rec., Vol. 10, 1916.
- 11) Nusbaum, J., Anat. Anz., Bd. 12, 1896.
- 12) Otto Mori, 東京醫學會雜誌, 第40卷, 大正15年.
- 13) Parker, Katherine M., Jour. Anat., Vol. 51, 1917.
- 14) Salzer, H., Archiv f. mikr. Anat., Bd. 51, 1898.
- 15) Stendell, W., Arch. f. mikr. Anat., Bd. 82, 1913.
- 16) Stendell, W., Oppelsche Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Wirbeltiere, VIII, 1914.
- 17) Tüney, Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Bd. 30, 1914.
- 18) Trautmann, A., Arch. f. mikr. Anat., Bd. 74, 1909.
- 19) Vanderburgh, C. M., Anat. Rec., Vol. 12, 1917.
- 20) Woerdeman, M. W., Archiv f. mikr. Anat., Bd. 86, 1915.
- 21) Woerdeman, M. W., Anat. Anz., Bd. 43, 1913.
- 22) 河内, 岡醫雜, 第47年, 第10號, 1935.

挿圖説明

- Fig. 1. (第1階梯) Nr. 111. 胎兒咽頭部ノ正中矢狀斷. Ca 190 倍
- Fig. 2. (第2階梯) Nr. 88. 胎兒咽頭部ノ正中矢狀斷. Ca 100 倍
- Fig. 3. (第3階梯) Nr. 92. 胎兒咽頭部ノ正中矢狀斷. Ca 10 倍
- Fig. 4. A. (第4階梯) Nr. 96. 胎兒咽頭部ノ正中矢狀斷. Ca 110 倍
- Fig. 4. B. (同上) R. 氏囊模型ノ後面觀(100/1) Ca 2/3 縮小寫載
- Fig. 5. A. (第5階梯) 腦下垂體ノ正中矢狀斷. Ca 190 倍
- Fig. 5. B. (同上) 腦下垂體表皮性葉原基側方部ノ矢狀斷. Ca 110 倍
- Fig. 5. C. (同上) 腦下垂體模型ノ右側面觀(150/1) Ca 1/2 縮小寫載
- Fig. 5. D. (同上) 腦下垂體模型ノ後面觀(150/1) Ca 1/2 縮小寫載
- Fig. 6. A. (第6階梯) 腦下垂體ノ正中矢狀斷. Ca 110 倍
- Fig. 6. B. (同上) 腦下垂體模型ノ後面觀(150/1) Ca 1/2 縮小寫載
- Fig. 6. C. (同上) 腦下垂體模型ノ右側面觀(150/1) Ca 1/2 縮小寫載

Fig. 7. A. (第7階梯) 脳下垂體ノ正中矢狀斷.

Ca 110 倍

Fig. 7. B. (同上) 脳下垂體模型ノ背面觀

(150/1) Ca 1/2 縮小寫載

Fig. 7. C. (同上) 脳下垂體模型ノ正中矢狀

斷 (150/1) Ca 1/2 縮小寫載

Fig. 8. A. (第8階梯) 脳下垂體ノ正中矢狀斷.

Ca 110 倍

Fig. 8. B. (同上) 脳下垂體模型ノ背面觀

(100/1) Ca 1/2 縮小寫載

Fig. 8. C. (同上) 脳下垂體模型ノ腹面觀

(100/1) Ca 1/2 縮小寫載

Fig. 8. D. (同上) 脳下垂體模型ノ正中矢狀

斷 (100/1) Ca 1/2 縮小寫載

Fig. 9. (第9階梯) 脳下垂體模型ノ背面觀

(100/1) Ca 2/5 縮小寫載

Fig. 10. B. (第10階梯) 脳下垂體模型ノ背面觀

(100/1) Ca 2/5 縮小寫載

Fig. 10. A. (第10階梯) 脳下垂體ノ正中矢狀斷.

Ca 105 倍

Verzeichnis der Abkürzungen.

Ar.b. = Arteria basilaris. Bl. = Brücken-
benge. Ch.d. = Chorda dorsalis. c.H. =
caudales Horn der Pars tuberalis. C.op. =
Chisma opticum. De. = Diencephalon.
Hh. = Hypophysenhöhle. Hs. = Hypophysen-
stiel. I. = Infundibulum. k.S. = knorpelige.
Anlage des Sphenoids. Mb. = Mundbucht.
Me. = Munddachepithel. n.H. = nasales Horn
der Pars tuberalis. o.D. = oberer Dell
P. = Pars anterior. P.int. = Pars intermedia.
P.l. = Pars lateralis. P.n. = Pars neuralis.
Re. = Rhombencephalon Rm. = Rachenmem-
bran. RT. = Rathkesche Tasche. ST. =
Seesselsche Tasche. Te. = Telencephalon.
Vd. = Vorderdarm.