88.

612.816.7

Schnecke / 筋神経標本 / Chronaxieニ及ボス
2—3 藥物ノ作用

岡山醫科大學生理學教室 (主任生沼教授)

研究生 醫學士 藤 澤 秀 圃

[昭和 13 年 1 月 21 日受稿]

*Aus dem Physiologischen Institut der Medizinischen Fakultät Okayama.
(Vorstand: Prof. Dr. S. Oinuma)*

Chronaximetrische Studien über die Wirkung einiger Medikamente
auf das Schneckenerv-muskelpräparat.

Von

Dr. H. Hudizawa.

Eingegangen am 21. Januar 1938.

Verfasser machte einige chronaximetrische Untersuchung über die Wirkung von Strychnin (0,1%), Yohimbin (0,1%), Atropin (1,0%) und Guanidin (0,1%) auf das Schneckenerv-muskelpräparat und kam zum folgenden Schluss;

1) Bei der Strychninvergiftung verändert die Erregbarkeit des Nerven immer im Sinne einer Verkürzung der Chronaxie, während die Chronaxie des Muskels unverändert bleibt oder oft verkürzt.

2) Bei der Yohimbinvergiftung ergibt die direkte Reizung oft eine verlängerte Chronaxie, während die Chronaxie des Nerven immer nicht verändert.

3) Bei der Atropinvergiftung verändert die Erregbarkeit im alle Fälle der direkte und der indirekte Reizung immer im Sinne eine Verlängerung der Chronaxie.

4) Bei der Guanidinvergiftung ergibt die indirekte Reizung oft eine verkürzte Chronaxie, während die Erregbarkeit im Falle der direkten Reizung unverändert bleibt gegenüber dem Normalzustand. (Autoreferat)

目 次

- 第1章 緒 言
- 第2章 實驗裝置及ビ實驗方法
- 第3章 實驗成績
 - 第1項 Strychninノ作用
 - 第2項 Yohimbinノ作用
 - 第3項 Atropinノ作用
 - 第4項 Guanidinノ作用
- 第4章 總括及ビ考按
- 第5章 結 論
 - 主要文獻

第1章 緒 言

1906年 Lapicque氏ハ創メテ蛙ノ筋神経標本ニ就テ筋及ビ神経ノ Chronaxie ハ一致スル、所謂 Isochronismusヲ唱へ、且 Curareノ作用ニヨリテ神経ノ Chronaxie ハ其ノ正常値ヲ變ゼザルモ筋肉ノ夫ハ大ナル、所謂 Heterochronismus ナル現象ヲ起スコトヲ指摘シテ以來、諸種藥物ノ筋神経ノ Chronaxieニ及ボス作用ニ就テ研究セラレタルヲ見ル。Lapicque L. et M., C. Veil, F. Bremer et P. Rylant, 香取氏等ハ主シテ蛙ノ筋神経標本ノ Chronaxieニ及ボス Strychnin, Atropin, Yohimbinノ作用ニ就テ報告セルヲ見ル。

Lapicqueハ Chronaxie測定ニ際シ、刺激ニ用キル電導子ノ距離ガ1cmヨリ近キ時ハ、Chronaxieノ値ハ小ニ過ギ、(—)極導子ノ直径0.5mmヲ過グル時ハ、大ニ過グル値ヲ與フル事ヲ注意シ、從來ノ研究成績ニ一致ヲ缺クモノアルハ、導子ノ同一ナラザルニアルコトヲ示シ、更ニ近時蝸牛ヲ用キル時ハ、導子ノ距離及ビ大サノ影響ヲ受ケルコト甚ダ少ク、

常ニ一定ノ値ヲ與へ、神経ト筋肉トノ Isochronismusヲ立證スル好材料ナリト云ヘリ。此處ニ於テ余モ亦本邦産ノ蝸牛ニ就キ、Lapicque¹⁰⁾ノ實驗ヲ追試セリ。

第2章 實驗裝置及ビ實驗方法

Lapicque氏ハ筋神経ヲ刺激スルニ當リテ、無限大ノ刺激時間ヲ用キタル際ニ神経ヲ興奮セシムルニ必要ナル最小ノ刺激ノ強サヲ Rheobaseト名付ケ、此 Rheobaseノ倍量ノ刺激ヲ用キタル際ニ興奮ヲ起スニ要スル最小ノ刺激時間ヲ Chronaxieト名付ケタリ。

余ハ蝸牛ノ足縁ノ筋肉及ビ其ノ神経ノ Chronaxieヲ測定シ、且 Strychnin, Atropin, Yohimbin, Guanidinノ筋神経ノ Chronaxieニ及ボス作用ヲ實驗スルニ際シテ、其ノ裝置最モ簡單ニシテ且正確ナル Lapicque氏ノ Kondensator-Methodeヲ採用シ、且一定ノ時間間隔ヲ置キテ反覆スル連續刺激ヲ與フル Cylindre à cames de Lapicqueヲ併用セリ。

其ノ實驗裝置ハ第1圖ヲ以テ、其ノ概要ヲ示セリ。

即チ任意強度ノ電流ヲ送出シ得ル電流加減器 (Reduktor V)ノ受電部ヲ蓄電池 (AKK)ニ連結シ、他方送電部ヲ Pohl'sche Wippeノ中央交叉連絡線ヲ除キタルモノヲ介シテ2箇ノ Kondensator即チ其ノ1ツ K_1 ハ2 μ . F.ノ電氣容量ヲ有シ、他ノ K_2 ハ0.001ヨリ0.11 μ . F.ニ到ル異リタル電氣容量ニ任意加減シ得ル構造ヲ有スル Kondensatorト連結シ、Pohl'sche Wippeノ騎子ノ位置ヲ變ズルコトニヨリテ任意ニ何レカ一方ノ Kondensatorト交通シ得ル様ニス。

Cylindre à cames de Lapicque : Aハ金屬製ノ圓筒ニシテ表面ニ同一ノ間隔ヲ置キテ個數ノ數

第 1 圖

列ノ突起ヲ有シ、Bハ圓筒上ニ其ノ先端ヲ接セル電氣「コンタクト」ヲ有スル木製ノ桿ニシテ關節Cニヨリテ自由ニ上下ニ移動シ得、今圓筒ヲ電動機ニヨリテ矢ノ方向ニ廻轉(1秒間ニ約1回)セシムレバ、B桿ハ圓筒上ヲ滑リテ圓筒上ノ突起ノ數ダケ上下ニ移動ス、此際B桿ガ下リテD極ニ接シC極D極ヲ連結スレバ、電流加減器Vニヨリテ調節セラレ蓄電池(AKK)ノ電氣ヲ Kondensator K₁ 又ハ K₂ニ充タシ、桿ガ上リテC極E極ヲ連結スレバ Kondensatorノ電氣ヲ刺激電導子ニヨリテ筋神經標本ニ向ヒテ放電シ之ニ刺激ヲ與フ、斯ノ如クニシテ(突起ノ數)×(單位時間ニ於ケル廻轉數)ノ刺激ヲ單位時間ニ與ヘ得ルナリ、

次ニ筋神經固有ノ電氣抵抗ノ變化ニヨリテ其ノ實驗成績ニ動搖ヲ來スコトヲ避クルタメ、Kondensatorノ電流ヲ Lapicqueノ「シヤント抵

抗」(V.W.)ヲ經テ電導子ニ導キ、豫メ手術シ置キタル蝸牛ノ筋神經標本ヲ刺激セリ。

實驗方法

實驗ヲ行フニ際シ余ハ6月末ヨリ7月ノ梅雨頃及ビ9月初旬ノ成ルベク雨天爽涼ノ日ヲ選ビテ實驗セリ、成ルベク大ナル蝸牛ヲ選ビ殼ヲ除去シテ之ヲ腹位ニ固定シ、頭ヨリ下方ニ皮膚ヲ縱ニ切開シテ足縁ニ到ル神經ヲ露出セシム、而シテ手術後少ナクトモ20分以上其ノ儘放置シテ然ル後實驗ニ供セリ。

最初 Cylindre à cames de Lapicqueヲ每秒約4回ノ反覆刺激ヲ筋神經ニ與フル様ニ廻轉速度ヲ調節シ置キ、先ヅ電氣容量2μ.F.ノKondensator K₁ト連結セル狀態ニ於テ、電流加減器ニテ電壓ヲ順次増加シツツ被檢體ノ縮ヲ起シ得ル最低ノ

電壓ヲ定メテ之ヲ Rheobase トス、次ニ刺戟ノ強サヲ Rheobase ノ倍量トナシ、Kondensator ノ連結ヲ K_2 ニ切換ヘ、電縮ヲ起シ得ル最小ノ $\mu.F.$ ヲ求メテ之ニヨリテ Chronaxie ヲ知り得ルナリ。Vorschalt widerstand トシテハ 7000「オーム」ノ抵抗ヲ直列ニ加ヘ、並列ノ抵抗ハ之ヲ除キタリ。尙ホ神経ト筋肉トハ抵抗ヲ異ニスベキヲ以テ、之ヲ考慮セザルベカラザル如キモ、Chronaxie 測定ニ當リ、神経或ハ筋肉ヲ Ringer 液ニテ潤ス爲メニ小ナル抵抗ヲ並列ニ入レタル如キ關係ヲナスガ

爲メカ、實際ニハ斯クノ如クシテ測定シタル $\mu.F.$ ノ値ヲ神経ノ場合ニモ筋肉ノ場合ニモ $1\mu.F.=10$ トシテ換算シテ差支ナシ。別表ニ示ス如ク、小坂講師ガ「發條レオトーム」ヲ用キテ念ノ爲メ實測セル成績ト比較セバ、之ヲ首肯スルヲ得ベシ。小坂講師ハ成績ノ正確ヲ期センガ爲メ、「發條レオトーム」〔Bernstein ノ Differential Rheotom ヲ 1 回ノ刺戟ヲ與ヘ得ル様ニ改造シ、發條ニテ速カニ 1 廻轉ヲナス車輪ノ突起ニヨリ 2 ツノ「コンタクト」ヲ蹴返ス様ニシ、1 ツノ「コンタクト」ガ蹴

第 2 圖 「發條レオトーム」

第 2「コンタクト」

第 1「コンタクト」

返サレ次第 2 ノ「コンタクト」ガ蹴返サル迄刺戟電流ガ標本ヲ流ルル様ニシ、又 2 ツノ「コンタクト」ノ距離ハ變化シ得。此距離 10 ノ目盛(角度ニテ $3'6''$ ニ相當ス)ニテ 3σ ニ相當ス。「ノニユス」ニテ $1/10$ 迄讀取ルコトヲ得ル故 0.3σ 迄測定シ得」ヲ用キテ、冬期(11 月)ノ「ひとすじまい」ニ就キ、正常標本及ビ「ストリヒニン」ヲ神経ニモミ作用セシメタル標本ニ就キ、單一刺戟ヲ用キテ Chronaxie ヲ測定シタ。其ノ成績ハ次表ノ如シ。

次表ノ成績ニ依テ見レバ、「ストリヒニン」ノ作用ニ依テ神経ハ其ノ Chronaxie ヲ短縮スル。實

驗ノ際ニ「ストリヒニン」ヲ作用セシムルニハ、綿ニ藥液ヲ浸シ神経ノ上ニ載セタル故ニ、筋肉ノ方ヘモ浸出シテ幾分其ノ作用ヲ及ボシタルモノノ如ク、筋肉ノ Chronaxie モ短縮シタリ。而シテ神経ト筋肉トノ Chronaxie ハ、前者 2.1σ ニ對シテ後者 3σ 或ハ前者 3.0σ ニ對シテ後者 1.8σ 位ノ差ニテハ、尙ホ神経ヨリ筋肉ニ興奮ノ傳達スルヲ認メ、夫レ以上ノ差ニテハ筋肉ハ直接刺戟ニ反應スルモ、間接刺戟ニハ反應セザルニ至レリ。即チ「ストリヒニン」ニ依テ Chronaxie ノ短縮スルヲ認ムトルト同時ニ Lapicque ノ Isochronismus ヲ或ル Spielraum ヲ以テ認メザルベカラズ。

A 表

實及 驗日 番附	氣 溫 (°C)	測定時ニ於ケル 標本ノ状態	筋肉ノ Rheobase 及ビ Chronaxie		神経ノ Rheobase 及ビ Chronaxie		備 考
			Rheobase (Volts)	Chronaxie (σ)	Rheobase (Volts)	Chronaxie (σ)	
I 13/X	19°	正 常 時	1.5	12.0	3.5	13.5	
		0.1%「ストリヒニン」 作用後 15'—27'	2.0	4.5	9→漸次 上昇	測定不能	筋肉…15'後 神経…20'— 27'後
I 13/X	20°	正 常 時	1.5	4.5	2.0	4.5	
		0.01%「ストリヒニン」 作用後 6'	2.5	5.7	0.5	測定不能	
II 13/X	20°	正 常 時	3.0	4.5	0.5	4.5	
		0.01%「ストリヒニン」 作用後 3'	3.0	3.0	0.5	2.1	
		0.01%「ストリヒニン」 作用後 7'	3.0	1.8	0.5	3.0	

第3章 實驗成績

第1項 「ストリヒニン」ノ作用

先ヅ「ストリヒニン」ヲ作用セシメザル標本ニ就キ、神経ヲ經テノ間接刺激及ビ筋肉ノ直接刺激ニ於テ Rheobase 及ビ Chronaxie ヲ測定メ、次ニ「ストリヒニン」ヲ一定時作用セシメタル後再ビ Rheobase 及ビ Chronaxie ヲ測定シ、神経ヨリノ Chronaxie ガ筋肉ノ Chronaxie ヨリモ遙カニ小ナル時ニ尙ホ神経ヨリノ衝動ガ筋肉ニ傳ハルヤ否ヤヲ檢シタリ。

余ハ Strychninum nitricum ($C_{12}H_{22}N_2OHNO_3$) ヲ 0.1% ノ割合ニ Ringer 氏液ニ溶解シタルモノヲ使用シ、蝸牛ノ神経及ビ筋肉ノ Chronaxie ニ及

ボス作用ヲ檢セリ。

先ヅ「ストリヒニン」ヲ綿ニ浸シテ、露出セル筋神経ニ同時ニ作用セシメ、第1表ニ示ス如ク神経ノ Chronaxie ハ各例トモ短縮スルニ反シ、筋肉ノ Chronaxie ハ其ノ正常値ヲ變ゼザルカ、又ハ Chronaxie ヲ減ズルモ神経ノ夫レニ比シテ程度程度ナリ。次ニ神経ヲ細キ硝子管ニ入レ、藥物ノ外部組織ニ洩レザル様ニシテ神経ニノミ「ストリヒニン」ヲ作用セシムルニ、第2表ニ示ス如ク常ニ其ノ Chronaxie ヲ短縮セシム。次ニ神経ヲ細キ硝子管ニ入レテ 0.6% Ringer ノ液ヲ充シ、筋肉ニノミ綿ニ含マセタル「ストリヒニン」ヲ作用セシムルニ第3表ニ示ス如ク Chronaxie ハ其ノ正常値ヲ變ゼザルカ又ハ短縮ス。

第 1 表

Strychnin

(但シ 1 μ . F. ハ 10 σ = 相當ス)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸潤時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 29/VI	26	Ringer	0.40	0.44	Ringer	4.8	0.42
		5	0.32	0.16			
		10	0.38	0.17	15	2.8	0.27
		Ringer			Ringer		
		30	0.40	0.30			
		40	0.35	0.37	45	4.5	0.38
II 4/VII	26	Ringer	0.4	0.38	Ringer	5.4	0.40
		5	0.2	0.20	10	4.0	0.35
		20	1.0	0.18	25	4.0	0.30
		Ringer			Ringer		
		45	1.2	0.40	50	5.2	0.37
III 4/VII	27	Ringer	0.3	0.18	Ringer	4.8	0.12
		10	0.6	0.08	5	4.8	0.12
					25	4.7	0.13
		Ringer			Ringer		
		45	0.7	0.14	40	5.9	0.15
IV 4/VII	27	Ringer	1.0	0.30	Ringer	3.5	0.32
		5	0.7	0.18	10	2.2	0.22
		Ringer			Ringer		
		50	0.6	0.35	60	7.8	0.25
V 6/VII	23	Ringer	0.7	0.35	Ringer	3.5	0.34
		5	1.4	0.20	10	3.8	0.23
		20	1.5	0.18	25	4.0	0.19
		Ringer			Ringer		
		35	2.5	0.20	40	4.0	0.24
		60	4.5	0.34	55	4.2	0.38
VI 11/VII	27.5	Ringer	0.3	0.16	Ringer	4.0	0.17
		15	0.4	0.10	10	3.5	0.19
		Ringer			Ringer		
		35	0.4	0.20	40	8.0	0.24

第 2 表

Strychnin (1 μ , F. = 10 σ)							
番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 11/VII	28	Ringer	0.6	0.20	Ringer	2.9	0.21
		15	0.6	0.15	10	3.0	0.20
		Ringer					
		50	0.8	0.20			
II 19/VII	25	Ringer	0.3	0.18	Ringer	3.7	0.20
		15	0.4	0.09	10	4.0	0.20
		Ringer					
		30	0.5	0.18	35	3.6	0.21
III 22/VII	29	Ringer	0.4	0.16	Ringer	3.5	0.17
		15	0.9	0.10	10	4.6	0.18
		Ringer					
		40	0.5	0.16	30	7.0	0.18

第 3 表

Strychnin (1 μ , F. = 10 σ)							
番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸潤時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 11/VII	28.5	Ringer	0.9	0.34	Ringer	2.3	0.32
					15	8.8	0.14
		40	0.9	0.30	Ringer 40	5.2	0.25
II 19/VII	25.5	Ringer	0.3	0.19	Ringer	2.6	0.20
		20	0.8	0.20	15	7.0	0.10
		40	1.8	0.19	Ringer 45	6.5	0.19
III 23/VII	30	Ringer	0.2	0.10	Ringer	2.1	0.10
		18	0.4	0.10	15	7.2	0.10
		55	0.4	0.10	Ringer 60	6.5	0.10

第2項 Yohimbin ノ作用

Yohimbin ハ少量ヲ温血動物ニ注射スル時ハ身體外表面殊ニ陰部ノ血管ヲ擴張セシメ、又腰髓ニアル勃起中樞ニ選擇的ニ作用シテ其ノ興奮性ヲ増加セシムト言フ。

余ハ Yohimbinum hydrochloricum ($C_{22}H_{38}N_2O_3 \cdot HCl$) ノ 0.1% 液 (Ringer) ヲ用ヒテ蝸牛ノ神経ニ作用セシメタルニ、第4表ニ示ス如ク神経ノ Chronaxie ハ作用前ト何等變化ヲ認メズ。次ニ筋肉ニ作用セシメタルニ第5表ニ示ス如ク Chronaxie ハ屢々延長スルヲ認メタリ。

第 4 表

Yohimbin

(1 μ . F. = 10 σ)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 3/K	25	Ringer	0.6	0.10	Ringer	2.5	0.12
		20	3.1	0.10	25	2.7	0.12
		Ringer					
		35	1.9	0.10	40	2.9	0.13
II 3/K	25.5	Ringer	0.3	0.10	Ringer	3.0	0.13
		30	1.9	0.10	25	2.8	0.17
		Ringer					
		45	1.1	0.11	40	3.0	0.16
III 4/K	25	Ringer	0.2	0.20	Ringer	2.5	0.20
		20	0.9	0.20	15	2.2	0.20
		25	0.7	0.19			
		Ringer			40	4.6	0.21
IV 5/K	25	Ringer	0.4	0.19	Ringer	3.0	0.20
		15	0.4	0.17	10	3.0	0.20
		35	2.0	0.20	30	3.0	0.20
V 5/K	25.5	Ringer	0.5	0.19	Ringer	2.9	0.19
		15	0.5	0.20	10	2.8	0.18
		Ringer					
		25	0.9	0.20	30	3.0	0.20

第 5 表

Yohimbin

(1 μ F. = 10 σ)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		作用時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 4/K	24.5	Ringer	0.5	0.10	Ringer	1.7	0.11
		30	0.4	0.10	25	3.0	0.12
		40	0.6	0.09	Ringer 45	2.8	0.11
II 4/K	25	Ringer	0.8	0.10	Ringer	3.0	0.12
		25	0.8	0.10	20	4.8	0.19
		45	0.8	0.13	Ringer 40	4.0	0.14
III 4/K	25	Ringer	0.2	0.20	Ringer	2.7	0.20
		20	0.6	0.20	15	3.5	0.30
		30	0.9	0.20	Ringer 40	3.5	0.20
III 5/K	24	Ringer	0.4	0.20	Ringer	3.0	0.20
		15	0.7	0.19	10	3.5	0.29
		25	0.7	0.19	Ringer 30	3.7	0.20
V 6/K	26	Ringer	0.3	0.18	Ringer	4.6	0.19
			0.7	0.19	20	4.0	0.20
		35	0.4	0.19	30	5.1	0.20
VI 6/K	26	Ringer	0.4	0.10	Ringer	2.3	0.09
					10	2.7	0.10
		25	0.3	0.10	23	2.6	0.10

第3項 Atropin ノ作用

余ハ Atropinum sulfuricum($C_{17}H_{23}NO_3$) $\cdot$ $2H_2$
 $SO_4 + H_2O$ ノ 1% 液 (Ringer) ヲ蝸牛ノ筋神經同
 時ニ作用センメタルニ、第 6 表ニ示セル如ク筋神

經共ニ其ノ Chronaxie ヲ延長セシム。又筋肉、
 神經ノ各々ニ單獨ニ作用セシムル時モ、第 7 表
 (神經)、第 8 表 (筋肉) ニ示セル如ク各々其ノ
 Chronaxie ヲ常ニ延長セシム。

第 6 表

Atropin

(1 μ . F. = 10 σ)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 29/VI	26	Ringer	0.8	0.28	Ringer	4.5	0.38
		5	0.7	0.37			
		10	1.2	0.50			
		15	2.0	0.60	15	7.0	0.50
		Ringer			Ringer		
		30	1.7	0.30	35	3.5	0.29
II 8/VI	28	Ringer	0.5	0.20	Ringer	5.0	0.20
		5	0.7	0.18			
		10	1.0	0.39	15	4.0	0.30
		Ringer			Ringer		
		30	1.5	0.28	35	4.7	0.18
		45	1.0	0.20			
III 8/VI	28	Ringer	0.2	0.18	Ringer	2.6	0.21
		10	0.2	0.27	15	2.0	0.23
		Ringer			Ringer		
		45	0.4	0.19	50	4.0	0.18
IV 18/VI	27.5	Ringer	0.3	0.09	Ringer	3.4	0.09
		5	0.4	0.17	10	5.0	0.24
		Ringer			Ringer		
		25	0.4	0.10	35	7.5	0.10
V 1/IX	22.5	Ringer	0.6	0.10	Ringer	1.8	0.10
		15	2.3	0.19	10	4.4	0.21
		Ringer			Ringer		
		35	0.8	0.10	40	2.0	0.10

第 7 表

Atropin

(1 μ . F. = 10 σ)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 18/VI	28	Ringer	0.3	0.18	Ringer	2.2	0.18
		15	1.0	0.30	10	4.8	0.18
		Ringer					
		25	1.6	0.20	25	3.0	0.15

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 30/VII	29	Ringer	0.3	0.10	Ringer	3.8	0.11
		10	0.9	0.14	5	4.0	0.10
		Ringer 25	1.0	0.10	30	5.2	0.10
II 31/VII	24	Ringer	0.7	0.18	Ringer	2.3	0.20
		10	1.6	0.37	15	3.9	0.20
		Ringer 30	2.0	0.19	35	5.0	0.19
III 31/VII	24	Ringer	0.3	0.10	Ringer	2.7	0.12
		10	1.7	0.17	8	2.5	0.13
		Ringer 25	1.3	0.12	30	3.0	0.11

第 8 表

Atropin

(1 μ . F.=10 σ)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 18/VII	30	Ringer	0.6	0.10	Ringer,	5.0	0.11
		15	0.3	0.18	5	7.5	0.25
		30	0.9	0.08	Ringer 35	9.0	0.14
I 31/VII	25.5	Ringer	0.4	0.18	Ringer	1.0	0.19
		10	0.6	0.17	5	4.1	0.29
		30	0.5	0.17	Ringer 35	3.0	0.20
I 31/VII	26	Ringer	0.6	0.19	Ringer	2.8	0.20
		15	0.7	0.19	10	4.2	0.38
		30	0.9	0.19	Ringer 35	3.0	0.20
III 5/X	25.5	Ringer	0.4	0.20	Ringer	2.5	0.19
		15	0.6	0.20	10	4.0	0.38
		30	0.7	0.20	Ringer 35	3.2	0.20

第4項 Guanidin ノ作用

一般ニ Guanidin ハ運動神経ノ末梢ヲ興奮セシムルト言ハル。余ハ Guanidinum hydrochloricum ノ 0.05% 及ビ 0.1% 液 (Ringer) ヲ用キテ蝸牛ノ神経ニ作用セシメタル成績ハ第9表ニ示スガ如シ、即チ 0.2% Guanidin 液ヲ神経ニ作用セシムル時ハ5分後ニ於テ既ニ Chronaxie ノ測定不

能トナリシニヨリ、0.1% Guanidin 液ヲ作用セシメタルニ神経ノ Chronaxie ハ屢々短縮セルヲ認ム。更ニ 0.05% Guanidin 液ヲ用ヒタルニ神経ノ Chronaxie ハ不變ナル結果ヲ得タリ。

次ニ 0.1% Guanidin 液ヲ筋肉ニ作用セシムルニ、第10表ニ示ス如ク筋肉ノ Chronaxie ハ常ニ正常値ヲ維持スルヲ認ム。

第 9 表

Guanidin

(1 μ . F. = 10 σ)

番 號	氣 溫 (°C)	%	神 經			筋 肉		
			浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I	26	0.1	Ringer	0.4	0.20	Ringer	2.9	0.20
			15	1.4	0.12	20	3.0	0.20
			Ringer 35	測定不能		30	3.2	0.19
II	27	0.1	Ringer	0.3	0.18	Ringer	3.0	0.20
			10	0.8	0.10	15	3.2	0.18
			Ringer 30	} 測定不能		25	3.0	0.19
			50					
III	27	0.1	Ringer	0.5	0.10	Ringer	3.8	0.10
			10	0.4	0.09	10	2.9	0.10
			Ringer 35	1.1	0.10	30	3.0	0.10
IV	27	0.1	Ringer	0.3	0.10	Ringer	2.8	0.10
			10	1.2	0.10	8	3.0	0.10
			Ringer 25	測定不能		20	3.0	0.11
V	29	0.05	Ringer	0.5	0.10	Ringer	2.5	0.11
			10	2.0	0.10	10	3.0	0.11
			Ringer 20	1.5	0.10	25	2.6	0.10
VI	26	0.05	Ringer	0.4	0.10	Ringer	3.2	0.10
			10	0.4	0.09	10	2.0	0.10
			Ringer 25	0.6	0.10	30	3.8	0.10

第 10 表

Guanidin

(1 μ . F. = 10 σ)

番 號 月 日	氣 溫 (°C)	神 經			筋 肉		
		浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)	浸漬時間 (分)	Rheobase (Volt)	Chronaxie (μ . F.)
I 11/K	26	Ringer	0.4	0.13	Ringer	1.9	0.10
					10	2.8	0.10
		25	0.3	0.10	20	2.9	0.10
II 11/K	25	Ringer	0.3	0.10	Ringer	1.7	0.11
					10	3.0	0.10
		20	0.6	0.10	15	2.9	0.10
III 12/K	25	Ringer	0.4	0.10	Ringer	2.9	0.10
					10	4.0	0.10
		15	0.6	0.09	20	3.8	0.10

第4章 總括及ビ考按

前述ノ實驗成績ヲ總括通覽スルニ、蝸牛ノ筋神經ノ Chronaxie ニ及ボス藥物ノ作用ハ蛙其ノ他ノ筋神經ノ夫トハ些カ其ノ趣ヲ異ニセルモノアリ。

Lapicque, L. et M. 氏 (1913) ハ蛙ノ筋神經標本ヲ 0.1—0.2% 「ストリヒニン」液ニ浸ス時、筋肉ノ Chronaxie ハ不變ナルモ神經ノ Chronaxie ハ短縮シタリト述べ、F. Bremer et P. Rylant 氏 (1925) ハ龜、蛙、とかげノ坐骨神經ニ「ストリヒニン」ヲ作用セシムル時ハ其ノ Chronaxie ハ 4/5—1/4 ニ減少スルト述べタリ。最近 (1935) Lapicque 氏夫妻ハ蝸牛ノ筋神經標本ニ 0.1% 「ストリヒニン」ヲ作用セシムル時ハ、神經ノ Chronaxie ハ常ニ短縮シ、筋肉ノ Chronaxie ハ屢々短縮スルト記載セリ。余ノ「ストリヒニン」ノ實驗成績ヲ見ルニ Lapicque 氏ノ成績ニ一致シ、神經ノ Chronaxie ハ常ニ短縮シ、筋肉ノ Chronaxie

ハ正常値ヲ維持スルカ又ハ屢々短縮スルヲ認メタリ。

次ニ 0.1% Yohimbin 液ヲ以テセル實驗成績ヲ見ルニ、神經ノ Chronaxie ハ常ニ不變ナルモ筋肉ノ Chronaxie ハ屢々延長スルヲ認ム。教室ノ先輩香取氏 (1934) ハ金線蛙ノ筋神經標本ニ Yohimbinum hydrochloricum ノ 0.005%, 0.01% 及ビ 0.05% 液 (Ringer) ヲ作用セシメタルニ、筋肉神經ノ Chronaxie ハ變化セザリキト述べタリ。蛙ト蝸牛ノ相違スルコトニヨリテ Yohimbin ノ筋肉ノ Chronaxie ニ對スル作用ヲ異ニスルモノカ。

次ニ「アトロピン」ノ作用ヲ見ルニ、Lapicque, M. et C. Veil 氏 (1919) ハ龜、蛙ノ坐骨神經腓腸筋標本ニ「アトロピン」ヲ作用セシメ又ハ「アトロピン」ヲ注射シタルニ、筋肉ノ Chronaxie ハ延長シ神經ノ Chronaxie ハ不變ナリト述べタリ。蝸牛ニ於ケル余ノ成績ヲ見ルニ筋肉ノミナラズ神經モ共ニ Chronaxie

ノ著明ニ延長セルヲ見ル。

次ニ Guanidinum hydrochloricum ノ作用ヲ見ルニ溶液ノ濃度 0.2% ナル時ハ神經ニ作用サスコト 5 分ニシテ其ノ刺戟ニ對スル反應ヲ失ハシムルガ如ク、0.1% 溶液ハ筋肉ノ Chronaxie ハ變化セシメザルモ、神經ノ夫ハ屢々短縮スルヲ見ル。0.05% Yohimbin 液 (Ringer) ニ於テハ神經ノ Chronaxie ハ不變ナル成績ヲ得タリ。而シテ神經ト筋肉トノ Chronaxie ノ差一定ノ範圍ヲ越ユルトキハ此處ニ興奮ノ中絶ヲ來スコトハ小坂氏ノ實驗竝ニ余ノ實驗第 1 表ノ 3 例、第 3 表ノ 1 例、第 6 表ノ 1 例ハ神經ト筋肉トノ Chronaxie ガ異ルニ至リタル爲メ興奮傳導ノ中絶ヲ來シタルモノト見ルヲ得ベク、第 8 表ノ Atropin ヲ筋肉ニ作用セシメタル成績ハ Spielraum ノ可ナリ大ナルコトヲ示スモノナリ。

第 5 章 結 論

1) 蝸牛ノ足緣ノ筋肉及ビ其ノ神經ニ及ボス 2—3 藥物ノ局所作用ニ就テ、余ハ Lapicque 氏ノ Kondensator-Methode ヲ採用シ且 Cylindre à cames de Lapicque ヲ併用シテ實驗ヲ試ミタリ。

2) Strychnum nitricum ノ 0.1% 液 (Ringer) ニヨリテハ、神經ノ Chronaxie ハ常ニ短縮シ、筋肉ノ Chronaxie ハ其ノ正常値ヲ變ゼザルカ又ハ屢々短縮スルヲ認ム。

3) Yohimbinum hydrochloricum ノ 0.1% 液 (Ringer) ニヨリテハ、神經ノ Chronaxie ハ常ニ不變ナルモ、筋肉ノ Chronaxie ハ屢々延長スルヲ認ム。

4) Atropinum sulfuricum ノ 1% 液 (Ringer) ヲ作用セシムルニ、神經及ビ筋肉ノ兩者共ニ常ニ其ノ Chronaxie ヲ延長スルヲ見ル。

5) Guanidinum hydrachloricum ノ 0.1% 液 (Ringer) ヲ作用セシムルニ、神經ノ Chronaxie ハ屢々短縮セラルルニ反シ、筋肉ノ Chronaxie ハ作用前ノ Chronaxie ト何等相違ヲ認メ得ザリキ。

6) 或ル範圍ノ Spielraum ヲ以テ Lapicque ノ Isochronismus ヲ認ム。

欄筆スルニ臨ミ御懇篤ナル御指導ト御校閲ノ勞ヲ賜リタル恩師生沼教授竝ニ種々御援助ヲ添ウセル小坂講師ニ謹デ感謝ノ意ヲ表ス。

主 要 文 獻

- 1) Lapicque, L. et M., C. R. Soc. Biol., Paris, T. 60, P. 898, 991, 1906.
- 2) Lapicque, L. et M., C. R. Soc. Biol., Paris, T. 74, P. 1012, 1913.
- 3) Lapicque, M. et C. Veil, C. R. Soc. Biol., Paris, T. 82, P. 153, 1919.
- 4) F. Bremer et P. Rylant, C. R. Soc. Biol., Paris, T. 92, P. 1329, 1925.
- 5) Lapicque, L., L'Excitabilité en fonction du temps, Paris, 1926.
- 6) C. L. Evans, Recent Advances in Physiology, P. 280, 1930.
- 7) H. Quicke & J. Stein, Ergebnisse der Physiologie, Jg. 34, S. 907, 1932.
- 8) M. Katori, Okayama-Igakkai-Zasshi, Jg. 46, Nr. 4, S. 863, 1934.
- 9) Lapicque, L., J. of Physiol., Vol. 81, P. 113, 1934.
- 10) Lapicque, L. et M., C. R. Soc. Biol., Paris, T. 119, P. 128, 1935.