脳 の 室 素 代 謝

第 10 編

トランキライザーの大黒鼠脳髄アンモニア並びに アミノ酸に及ぼす影響について

岡山大学医学部神経精神医学教室（主任：奥村二吉教授）

藤 田 昭 次

〔昭和33年2月21日受稿〕

緒 言

私は第8編において実験的衝撃の大黒鼠脳髄アミノ酸に及ぼす影響を、第9編において興奮剤と鎮静剤投与時のアンモニアとアミノ酸の変動を測定し、興奮剤投与で脳髄遊離アンモニア増加、グルタミン酸減少、グルタミン減少を認め、鎮静剤投与では脳髄遊離アンモニアの減少、アスパラギン酸増加、グルタミン増加を認め、それぞれを興奮と鎮静の脳生化学的症候群と呼ぶことを提唱した。

今回は精神医学において重要な地位を占めて来た、いわゆるトランキライザーの中、メプロバメートとレセルピンについて実験を行つたので報告する。

メプロバメートは1950年 Ludwig and Piech³⁷⁾によつて合成され、その薬理作用としては、視床に選択的に作用し、精神安静をもたらす事、中枢性の介在ノイロン回路の伝達を遮断して筋肉の緊張を緩解する事、痙攣防禦効果、睡眠延長効果等があげられている。

又、レセルピンは1952年、Müller, Schlittler等³⁸⁾³⁹⁾により、印度蛇木 (*Ranwolfia serpentina* Benth) のアルカロイド中から抽出された単一アルカロイド剤で、その薬理作用としては鎮静作用、降血圧作用、心搏緩徐作用等があげられている。共に精神科の日常臨床に不可欠の薬物である。

実 験 方 法

実験動物は小麦、野菜で飼育した100~200gの成熟大黒鼠を用いた。

1) 脳髄摘出固定：大黒鼠を締結固定、開頭して脳髄を露呈せしめ、生体のまま摘出、直ちにドライ

アイス・アセトン冷剤中にて凍結固定して秤量した。

2) アンモニア量及びアミノ酸量の測定は、前編に記載した通りであるから省略する。

実 験 成 績

1) メプロバメート投与群：大黒鼠に1g/kgのメプロバメート（第一製薬：アトラキソン）をゾンデ及び注射器を用いて経口投与した。投与後1~2時間で大黒鼠はアタキシーを来し、一方にぐるぐる廻つたり、ころころと転げたりするようになるが、更に時間が経つと抵抗は著明に減退し、呼吸やや不整となるものも出て来るようになる。この状態において実験に供し、得た結果を第1表に示す。アンモニ

第1表 メプロバメート投与群 (mg%)

例数	アンモニア	グルタミン酸	グルタミン	γ-アミノ酪酸	アスパラギン酸
1	0.30	157.4	93.8	23.7	41.7
2	0.40	152.8	103.9	21.7	31.3
3	0.23	123.8	128.6	38.7	46.9
4	0.31	126.4	112.5	27.6	31.3
5	0.23	192.4	123.2	34.5	47.4
6	0.29	135.9	—	32.3	42.6
7	0.23	110.8	125.0	32.3	17.0
8	0.24	184.5	140.6	34.5	34.1
平均	0.28	148.0	118.2	30.7	36.5
対照	0.62	158.4	95.5	35.2	30.8

量は最高0.40mg%、最低0.23mg%で8例平均は0.28mg%となり、対照値に比し著明に減少していた。グルタミン酸は最高184.5mg%、最低110.8mg%、8例平均では148.0mg%となり、対

照値に比し減少していた。グルタミンは最高 140.6 mg%, 最低 93.8 mg%, 7 例平均で 118.2 mg% と増加を示した。γ-アミノ酪酸は最高 38.7 mg%, 最低 21.7 mg%, 8 例平均で 30.7 mg% と減少していた。アスパラギン酸は最高 47.4 mg%, 最低 17.0 mg%, 8 例平均は 36.5 mg% と増加を示した。要するに、この群ではアンモニアと、グルタミン酸及び γ-アミノ酪酸のいわゆるグルタミン酸系とが減少し、グルタミンとアスパラギン酸とが増加していた。

2) メプロバメート連日投与群・大黒鼠 kg 当り 350~400 mg の割合に上記メプロバメートを混入した小麦粉の団子を与え、全部食べ終るまで、他の飼料を与えず、完全に摂取したのを確かめつつ、これを 8~10 日間続けた。大黒鼠はメプロバメート投与後、しばらくは興奮性が低下し、おとなしくなっているが、その後は刺激性が正常に生じて来る。

栄養、食欲は可良で、むしろ肥っていた。すなわち、症状としては特記すべき程の変化は見られず、取り扱い易くなった程度であつた。この状態で実験に供したのであるが、その結果は第 2 表に示した。

第 2 表 メプロバメート連日投与群 (mg%)

例数	アンモニア	グルタミン酸	グルタミン	γ-アミノ酪酸	アスパラギン酸
1	0.77	126.4	84.2	52.8	16.7
2	0.78	117.9	62.5	18.5	46.9
3	0.67	153.8	71.2	23.6	14.3
4	0.83	115.6	56.7	19.1	16.3
6	0.84	129.9	118.8	33.2	30.6
6	0.83	115.2	91.7	28.1	36.1
7	0.82	110.7	95.8	33.2	32.5
平均	0.79	127.1	83.0	29.8	27.6
対照	0.62	158.4	95.5	35.2	30.8

アンモニアは最高 0.84 mg%, 最低 0.67 mg%, 7 例平均で 0.79 mg% と対照群に比して増加を示していた。グルタミン酸は最高 153.8 mg%, 最低 110.7 mg%, 7 例平均では 127.1 mg% と著明に減少していた。グルタミンは最高 118.8 mg%, 最低 56.7 mg%, 7 例平均は 83.0 mg% と減少していた。γ-アミノ酪酸は最高 52.8 mg%, 最低 18.5 mg%, 7 例平均で 29.8 mg% と減少していた。アスパラギン酸は最高 46.9 mg%, 最低 14.3 mg%, 7 例平均は 27.6 mg% と、これ又、減少していた。すなわち、この群ではアンモニアは増加を示したが、グル

タミン酸、グルタミン、γ-アミノ酪酸、アスパラギン酸はすべて減少を示した。

3) レセルピン注射群：大黒鼠に 0.4 mg/kg のレセルピン（鳥居製剤：トリセルピン、エーザイ・レセルピン）を皮下注射し、40~60 分後の睡眠状態において実験に供した。第 3 表にその結果を示す。

第 3 表 レセルピン注射群 (mg%)

例数	アンモニア	グルタミン酸	グルタミン	γ-アミノ酪酸
1	0.22	86.9	75.0	30.4
2	0.13	107.0	98.5	26.4
3	0.16	121.0	101.7	18.6
4	0.14	135.0	134.1	19.3
5	0.21	118.9	88.6	32.0
6	0.20	123.1	76.7	18.3
7	0.17	107.1	101.3	36.3
平均	0.18	114.1	96.6	25.9
対照	0.62	158.4	95.5	35.2

アンモニアは最高 0.22 mg%, 最低 0.13 mg%, 7 例の平均は 0.18 mg% で、対照群に比し著明な減少を見た。グルタミン酸は最高 135.0 mg%, 最低 86.9 mg%, 7 例の平均は 114.1 mg% と著明に減少していた。グルタミンは最高 134.1 mg%, 最低 76.7 mg%, 7 例の平均は 96.6 mg% で変りなく、γ-アミノ酪酸は最高 36.3 mg%, 最低 18.6 mg%, 7 例の平均は 25.9 mg% とこれ又、減少していた。要するに、この群ではグルタミンを除きすべてに減少が見られた。

4) レセルピン連日注射群：大黒鼠に 0.025 mg/kg のレセルピン（鳥居製剤：トリセルピン）を連日注射し、10~12 回に及び実験に供した。大黒鼠は栄養状態不良となり、元氣なく、沈黙と言うよりも衰弱と言うべき状態となり、被刺激性も減退していた。実験結果は第 4 表に見られる如く、アンモニアは最高 0.40 mg%, 最低 0.26 mg%, 7 例の平均では 0.33 mg% となり、対照群に対し、減少を見た。グルタミン酸は最高 167.9 mg%, 最低 127.1 mg%, 7 例の平均は 153.0 mg% と変りなかつた。グルタミンは最高 123.3 mg%, 最低 76.9 mg%, 7 例の平均は 93.6 mg% と変りなかつた。γ-アミノ酪酸は最高 43.4 mg%, 最低 23.1 mg%, 7 例の平均は 33.2 mg% とこれ亦、変りなかつた。アスパラギン酸は最高 71.3 mg%, 最低 18.6 mg%, 7 例の平均は 41.8 mg% で増加を示していた。この群ではア

第4表 レセルビン連日注射群 (mg%)

例数	アンモニア	グルタミン酸	グルタミン	γ -アミノ酪酸	アスパラギン酸
1	0.31	128.9	79.1	28.0	48.8
2	0.33	155.3	76.8	23.1	22.5
3	0.34	162.5	92.6	37.7	71.3
4	0.26	127.1	100.5	32.2	39.7
5	0.40	167.9	77.3	30.7	61.3
6	0.34	164.7	123.3	43.4	18.6
7	0.35	164.7	105.3	42.2	30.3
平均	0.33	153.0	93.6	33.2	41.8
対照	0.62	158.4	95.5	35.2	30.8

ンモニアの減少と、アスパラギン酸の増加が特異であつた。

尚、この間の消息を明らかにするために分布図に示せば、アンモニアは第1図、アミノ酸は第2～第5図の如くであつた。

第1図 アンモニア分布 (○平均値)

第2図 グルタミン酸分布 (○平均値)

考 案

前述のデータについて考案して見るに、先づ、メプロバメート急性投与群ではアンモニア減少、ア

第3図 グルタミン分布 (○平均値)

第4図 γ -アミノ酪酸分布 (○平均値)

第5図 アスパラギン酸分布 (○平均値)

スパラギン酸増加、グルタミン増加であつて、前編に述べたイソミタール鎮静時に見られた鎮静時の脳生化学的症候群とよく一致した所見である。レセルビン急性投与群ではアスパラギン酸を測らなかつたので、この点不明であるが、アンモニアは減少しているがグルタミンの増加はない。グルタミン酸は相当に減少している。前編に報じたイソミタールや

前記のメプロバメートの成績ではアンモニアは減少したが、グルタミン酸は正常であり、次にグルタミン、アスパラギン酸が増えて合成傾向の増加が推測されたが、レセルビンではすべての機転が抑えられている感じである。鎮静時の脳生化学像の一つとして、すべての化学反応が抑えられる場合もあるのであろう。

次に、メプロバメート連日投与の場合であるが、アンモニアの増加と、グルタミン酸、グルタミン、 γ -アミノ酪酸、アスパラギン酸の減少が見られた。すなわち、慢性に投与すると、急性投与時とアンモニアの増減が逆になり、むしろ刺激剤投与時、或いは電気衝撃痙攣後の所見に近いものとなるのである。大黒鼠のこの状態で何故にアンモニアが高値なのか、この点不明と言うはかない。

次に、レセルビン連日注射群であるが、これは矢張り、アンモニア減少、アスパラギン酸の増加と言う鎮静時の脳生化学的症候群であるが、前記の如く、大黒鼠は鎮静を通り越して衰弱の状態であつたこととよく一致する。アスパラギン酸が何故増えるのかと言う点に関しては、今後の研究に俟ちたいと思う。

かくの如く、同じトランキライザーと総称される薬剤でも、それぞれ、脳髄アンモニア並びにアミノ酸に対しては違つた効果を示すようであり、この事が臨床効果の相異と何んらかの関係を有するのかと

も思われ、興味深く感ぜられた。

以上、私は脳髄遊離アンモニア、遊離アミノ酸の量的関係を見て来たのであるが、今後は更に、酵素学的に相互の推移を研究したいと考えている。

総 括

トランキライザーとしてメプロバメート及びレセルビンの1回投与及び連日投与を行つた大黒鼠の脳髄アンモニアをConway微量拡散分析法で、又、アミノ酸量をペーパークロマトグラフィー法で測定し、次の結果を得た。

- 1) メプロバメート投与ではアンモニア量、グルタミン酸、 γ -アミノ酪酸は減少し、グルタミンとアスパラギン酸は増加した。
- 2) メプロバメート連日投与ではアンモニアが増加し、グルタミン酸、グルタミン、 γ -アミノ酪酸、アスパラギン酸は減少した。
- 3) レセルビン注射ではアンモニアは著減し、グルタミン酸、 γ -アミノ酪酸は減少した。
- 4) レセルビン連日注射ではアンモニアが減少し、アスパラギン酸は増加した。

稿を終るにあたり、御指導、御校閲を賜りました奥村教授に謹んで感謝の意を捧げると共に終始御熱心な御援助を賜つた河井講師に心から謝意を呈します。

参 考 文 献

- 1) Krebs, H. A. et al.: Biochem. Z. 44, 159, 1949.
- 2) Krebs, H. A.: Biochem. J. 29, 1951, 1935.
- 3) Weil-Malherbe, H.: Biochem. J. 30, 665, 1936.
- 4) Weil-Malherbe, H.: Biochem. J. 32, 2257, 1938.
- 5) Weil-Malherbe, H.: Biochem. Soc. Symp. 8, 16, 1952.
- 6) Weil-Malherbe, H.: Biochem. J. 61, 210, 1955.
- 7) Roberts, E. and Frankel, S.: J. biol. Chem. 187, 55, 1950.
- 8) Roberts, E. and Frankel, S.: J. biol. Chem. 188, 789, 1951.
- 9) Awapara, J. et al.: J. biol. Chem. 187, 35, 1950.
- 10) Wingo, W. J. and Awapara, J.: J. biol. Chem. 187, 267, 1950.
- 11) Dawson, R. M. C.: Nature. 164, 1949.
- 12) 桑田 クロマトグラフィー, 昭27.
- 13) 佐竹 クロマトグラフィー, 昭27.
- 14) 化学の領域 クロマトグラフィー特集, 5.
- 15) Gerok, W.: Hoppe-Seyler's Z. Sch. f. Phys. Chem. 299, 112, 1955.
- 16) 河井: 岡医雑, 69, 10, 昭32.
- 17) Waelsch, H.: Adv. in Protein Chem. VI, 301, 1951.
- 18) Tallan, H. H. et al.: J. biol. Chem. 211, 297, 1954.
- 19) Richter, D. and Dawson, R. M. C.: J. biol. Chem. 176, 1199, 1948.

- 20) Cravioto et al.: *Proc. Soc. exp. Biol. d. Med.* **79**, 856, 1951.
- 21) Vladimirova: 神経系の生化学 (松本淳治訳) **45**, 1957.
- 22) 河田: 岡医雑, 投稿中, 昭33.
- 23) Winterstein, H.: *Naturwissenschaft*, **21**, 22, 1933.
- 24) 塚田, 高垣: 科学, **23**, 12, 629, 1953.
- 25) 塚田: 生化学, **25**, 1, 39, 昭28.
- 26) 塚田: 生体の化学, **5**, 3, 107, 1953.
- 27) 塚田: 酵素化学シンポジウム, **10**, 165, 1954.
- 28) 高垣, 平野, 杉本, 塚田: 酵素化学シンポジウム, **11**, 1, 1955.
- 29) Tukata and Takagaki: *Nature*. **173**, 1138, 1954.
- 30) 田代: *Am. J. Physiol.* **60**, 519, 1922.
- 31) Bülew, M. and Hohmes, E. G.: *Bioch. Z.* **245**, 459, 1932.
- 32) Haber, C. L. Saidel, *Feder. Proc.* **7**, 47, 1948.
- 33) Conway, E. J.: 微量拡散分析法及び誤差論 (石坂音吉訳)
- 34) Conway, E. J.: *Biochem. J.* **29**, 2221, 1935.
- 35) Conway, E. J.: *Biochem. J.* **29**, 2758, 1935.
- 36) Conway, E. J.: *Biochem. J.* **33**, 457, 1935.
- 37) Ludwig, B. J. and Piedh, E. C.: *J. Am. Chem. Soc.* **73**, 5779, 1951.
- 38) Müller, Schlittler, Bein: *Experimentia*, **8**, 338, 1952.
- 39) Bein: *Experimentia*, **9**, 107, 1953.

Nitrogen Metabolism of the Brain

Part 10

Influences of Tranquilizers on Ammonia and Amino Acids in the Rat Brain

By

Shoji Fujita

Department of Neuro-Psychiatry Okayama University Medical School
(Director: Prof. Nikichi Okumura)

In the case of meprobamate application and reserpine injection as tranquilizing treatment, the content of ammonia in the brain was determined by Conwy's micro-diffusion method while that of amino acid by paper chromatography; and the following results were obtained:

1) After meprobamate application per os (1g. per dose), the contents of ammonia, glutamic acid and γ -amino-butylic acid decreased, while those of glutamine and aspartic acid increased.

2) In the group given meprobamate for successive days (350 mg-400 mg/kg), the content of ammonia increased, whereas those of glutamic acid, glutamine, γ -amino-butylic acid and aspartic acid less markedly.

3) In the case of reserpine injection (0.4 mg./kg), ammonia decreased markedly and glutamic acid and γ -amino-butylic acid less markedly.

4) In the group receiving reserpine injections for successive days (0.025 mg/kg/day), the content of ammonia showed a decrease, while that of aspartic acid an increase.