大理石骨病の1例

岡山大学医学部放射線医学教室

山本道夫・平木祥夫・玉井豊理・
高木寿生・江原一彦・田辺正忠

弘仁会共立病院（愛媛県）

奥 田 浩 三

〔昭和48年12月28日受稿〕

岡山大学医学部放射線医学教室・山本道夫・平木祥夫・玉井豊理・高木寿生・江原一彦・田辺正忠・奥田浩三

I はじめに

全身骨系統に極めて高度の特徴ある硬化像を示す大理石骨病は1904年 Albers-Schönberg がはじめて“marble bones”と名づけて報告し、その後1926年 Karshner によって osteopetrosis と呼ばれた¹⁾ わが国でも1914年藤木の報告にはじまり、すでに150余例の報告がある^{2,3,4,5)}

本症は別名が多く、Albers-Schönberg's disease, osteopetrosis, marble bones をはじめ osteosclerosis fragilis generalisata, osteosclerosis congenita diffusa, Marmorknochenkrankheit, chalk bones, ivory bones, 大理石骨病(症), 大理石様骨硬化症などとも呼ばれている。

X線像は全身骨陰影の均一濃厚な骨硬化像が特徴的であるが、われわれは最近X線像上典型的な高度な骨硬化像を示す本症例に遭遇した。

II 症例

〔症例〕 11歳，男，小学生。

主訴：右下腿部疼痛，歩行障害。

昭和47年11月夕方川端でつまづき石の角で右下腿部を打撲した。その後疼痛が強くなり歩行障害を訴え来院した。

全身所見：身長123cm，体重28kgと体格は標準より短小，栄養はやや不良，顔貌は正常，可視粘膜に貧血はない。頭部，顔面，体幹四肢に著しい変形は認められず，知能も普通である。神経症状，視力障害，歯牙發育障害はいずれも認められない。胸部理学的所見正常。肝，脾を触知しない。上肢，左下肢の

運動障害はない。

局所所見：右下腿の疼痛性運動障害があり，両端部が太くなって軽度の変形が認められた。

既往歴：幼稚園頃まではとくに病気したこともなく正常のようであったという。8歳頃運動中に遊具より落ちて左橈骨骨折，9歳の時軽い交通事故の際に転倒し，右下腿痛を訴え某医院を受診，右胫骨腓骨遠位部骨折と診断されギブス治療を受けた。今回の右胫骨腓骨近位部骨折の後更に左橈骨骨折を起こし，現在までに合計4回の骨折を繰り返しているが，そのほか特記すべき疾患にかかったことはない。

家族歴：父40歳，母37歳，同胞は男4名，患者は第2子である。両親，兄弟ともども健在で，いまだX線検査などの機会を得ていないが骨折した既往はないという。血族結婚はない。

臨床検査成績：血液一般諸検査では軽度の貧血と血沈の亢進がみられる程度で特に異常はない。その他の血液生化学的検査でも著変を認めない。(表1)

表 1

赤血球数	418 × 10 ⁴	血清総蛋白	7.0g/dl
血色素量	85%	蛋白分画	
血小板数	14.2 × 10 ⁴	アルブミン	56.9%
血液凝固能	正常	α ₁ グロブリン	3.9%
白血球数	8900	α ₂ グロブリン	10.0%
分類		β グロブリン	13.1%
好中球		γ グロブリン	16.1%
桿	4	A/G	1.3
分葉	56	アルカリフォスファターゼ	1.50単位
好酸球	1	血清磷	3.8mg/dl
好塩基球	2	血清カルシウム	4.3mg/dl
単球	6	血沈 1時間値	10mm
リンパ球	31	2時間値	32mm

Ⅲ 全身の骨X線像並びに考察

頭部のX線像で頭蓋冠は全般に肥厚硬化し、板間層がはっきりしない。頭蓋底の硬化像は更に著しく、トルコ鞍の後床突起は棍棒状に肥厚している。乳様洞、副鼻腔などの含気骨は含気量に乏しく、また歯牙が不整である。(図1, 2)

頸椎、胸椎、腰椎X線像では椎体のみでなく椎弓、横突起、棘突起のすべてに硬化像が高度にみられ、とくに椎体は上縁と下縁に著しく、典型的な“sandwich vertebrae” appearance (いわゆるサンドウィッチ模様) を呈している。(図3, 4, 5, 6)

肋骨、肩甲骨、鎖骨などにも著しい均一濃厚な硬化像を示し模様はない。(図3)

骨盤は全体に高度の硬化像を示し、とくに仙腸関節部、股関節部は著明である。腸骨翼の硬化は均一ではなく、腸骨後に平行で年輪様の同心円状縞模様がみられ、これまた典型的な“bone within a bone” appearance を示し極めて特徴的である。(図6, 9) 上腕骨は近位部が棍棒状に肥厚し、中央部以下遠位ではやや硬化所見が軽度となっている。前腕部では橈骨、尺骨とも軽度の硬化像と変形彎曲が認められ、遠位1/3あたりより遠位骨幹端にかけて骨端線と平行に走る帯状の縞模様がみられ、これらの所見は左右対称的であった。手根骨、中手骨、手指骨などにも硬化所見が認められる。(図8)

大腿骨は均一濃厚な硬化像が著明で、骨梁は不明、無構造で骨髓腔は消失しているが遠位端に近く横走する平行濃厚帯がみられ、わずかではあるが縦走する縞模様もみえる。脛骨、腓骨とも硬化しているが、中央部では比較的軽度で骨構造、骨髓腔もみることが出来る。また脛骨、腓骨は共に両骨端部に近く骨折像を認め、変形している。(図7)

上腕骨近位部と同様に、大腿骨遠位部、脛骨近位部にも骨幹端の棍棒状変化が特徴的で、いわゆるErlenmeyer-flask 変形を示している。(図7, 8)

足根骨はほぼ均等に高度の硬化像を示しているが、中足骨では骨端部に硬化が目立ち、“bone within a bone” appearance も認める。(図10)

本症は未成熟海綿骨の成熟障害により招来された全身骨格の大理石様硬化をみる原因不明の稀な疾患であり、成熟海綿骨が形成されないため、類骨組織に石灰化が生じ、厚く緻密な骨塊を形成してくる⁹⁾ したがって見かけに反して骨折し易く、われわれの報告例もわずかな外力によって横骨折を惹起し偶然

に見つかったものである。

本症には明らかな病型はないが、McPeak は臨床経過から悪性型と良性型の2型に大別しており⁷⁾ 悪性(小児)型は一般に重症で、多くは死産するが、生産しても数ヵ月で死亡する。軽症のものでは中等度の貧血、発育障害、二次性徴の遅延、歯牙発育障害などがあり、生存率は低い。良性(成人)型では発症は遅く、多くは長管骨の骨折で気付くが全く無症状のこともある⁸⁾。本例は身体の発育がやや不良で、8歳頃より比較的小さな外傷によって骨折を繰り返しているほか軽度の貧血と歯牙の不整がみられる程度で良性型と思われる。

本症の主要症状は全身の骨にあらわれる大理石様骨硬化であり、最初の報告者 Albers-Schönberg によれば、その特異なX線像として1) 骨皮質拡大し骨髓の消失を来し、広汎性濃影を呈して大理石の如く見える。2) 四肢骨、肋骨等に平行に走る濃影帯の存在、3) 頭蓋骨の肥厚、4) 骨折傾向等の骨変化をあげている⁹⁾。三木によると露出不足の写真のごとく見えると表現し、骨の形や大きさには変化がなく、全身骨格系統の骨質が充実し、硬化するという特徴がある。脊椎骨の硬化は椎体をはじめ椎弓、横突起、棘突起のすべてに及び、椎体では椎間板に接する上下面に著しいためいわゆるサンドウィッチ様の模様を呈するが、Lottらは“sandwich vertebrae” appearance と骨の中にそれとはX線濃度の異なる骨がみられる所見をいう“bone within a bone” appearance に特に注目し、良性型の大理石骨病の特徴像としている¹⁾。Hinkel らによると成人良性型の本症の診断は次のようなX線像あるいは臨床所見に基いてなされるとしている¹⁰⁾。1) 本症はほとんど全身骨格系統に及ぶ。2) トルコ鞍の後床突起、脊椎、骨盤、上腕骨近位、大腿骨の両骨端に著しい。3) 極めて左右対称的である。4) 骨盤、肋骨、骨端、手根骨、足根骨にしばしば“bone within a bone” appearance が認められる。5) 骨幹端に骨端線と平行に走る帯状の縞模様や逆に垂直に走る縞模様がよくみられる。6) 椎体はいわゆる“sandwich vertebrae” appearance を示すことがある。7) 本症は幼児期に発症することが多い。8) 家族性、特に兄弟姉妹に認められることがある。9) 貧血は中等度に存するかみられない。10) 血清および酸性フォスファターゼ、血中のカルシウムや磷は一般に正常値である。11) 肝脾腫は普通認められない。12) 易骨折性がある。13) 周期的か永続的の緩解をみるこ

がある。14) 経過は臨床的に良性である。本例では遺伝的關係は証明されていないが、Hinkel らの骨X線像あるいは臨床所見の特徴とよく一致している。

X線像上本症と鑑別すべき疾患としては広汎性骨硬化像を示す疾患群であり、全身型硬化性癌転移、燐・鉛・蒼鉛中毒、弗素沈着症、骨髓硬化症、Paget病、汎発性過骨症、進行性骨幹形成異常症などがある。しかし、他疾患では大理石骨病の典型的骨X線像を呈するものではなく、特に成人では、概ね鑑別診断は困難でないとされている。¹¹⁾

一般に本症の criteria として以下のような所見が見られるものとされている。

1) 海綿質が緻密質に置換され、広汎な骨濃影を呈し、大理石のごとく見えること。

2) 手足の小管状骨を含めて長管状骨幹部に平行する濃陰影帯を認めること。

3) 頭蓋骨の肥厚。

4) 容易に病的骨折を起こしやすいこと。

今回のわれわれの報告例でも上述の項目に一致し、その特徴的な骨X線像から大理石骨病と考えたものである。

IV 結 語

X線像上全身骨系統に極めて高度の特徴ある硬化像を来した良性型の大理石骨病の1例を報告し、その典型的X線像を中心に若干の考察を加えた。

(論文の要旨および本症例は第41回日本医学放射線学会中四国部会で報告した。)

文 献

- 1) KARSHNER, R. G. : Am. J. Roentgenol., **16** : 405, 1926.
- 2) 藤森達朗, 小原惟道, 真田宣明, 山内裕雄 : 臨牀放射線, **18** : 125, 1973.
- 3) 山際裕史, 下村武也, 臼井雅彦, 岸本利洋 : 整形外科, **19** : 323, 1968.
- 4) 添田勝教, 宗像富士夫 : 整形外科, **14** : 103, 1963.
- 5) 武智秀夫, 安藤博 : 外科治療, **8** : 231, 1963.
- 6) 西岡清春 : 全身性疾患と骨 : 38, 医学書院, 東京, 1971.
- 7) McPEAK, C. N. : Am. J. Roentgenol., **36** : 816, 1936.
- 8) LOTT, G. and KLEIN, E. : Am. J. Roentgenol., **94** : 616, 1965.
- 9) 田中肇 : 小児科診療, **18** : 250, 1955.
- 10) HINKEL, C. L. and BEILER, D. D. : Am. J. Roentgenol., **74** : 46, 1955.
- 11) HINKEL, C. L. : Clin. Orthop., **9** : 85, 1957.

Osteopetrosis**A case presentation****By**

**Michio YAMAMOTO, Yoshio HIRAKI, Toyosato
TAMAI, Hisao TAKAGI, Kazuhiko EHARA, Masatada TANABE**

Department of Radiation Medicine
Okayama University Medical School, Okayama
(Director : Prof. Michio Yamamoto)
Kozo OKUDA
Kyoritsu Hospital, Ehime

ABSTRACT

Osteopetrosis (Albers-Schönberg' s disease, marble bones) is a rare disease characterized by generalized increased density of the skeleton.

A case showing typical roentgenological findings of the disease is presented and following a brief review of the literature, the roentgenographic characteristics are discussed.

山本道夫他6名論文附図

図1

図2

図3

図4

山 本 道 夫 他 6 名 論 文 附 図

図 5

図 6

図 7

図 8

山本道夫他6名論文附図

図9

図10