ヒトおよび諸種哺乳動物唾液腺の組織学的, 組織化学的ならびに電子顕微鏡的研究

V. ハムスター耳下腺の電子顕微鏡的研究

峯 田 天 雄
みね だ たか お

愛知学院大学歯学部 第1解剖学教室 (指導 今井倭武教授)*

[受付: 昭和46年11月9日]

緒 言

唾液腺の形態学的研究は光学顕微鏡的, 電子顕微鏡的および組織化学的に多くの研究がなされている。電子顕微鏡的研究としてはラット¹⁻²³⁾, マウス^{1,6,9,12,18,19,21,24-28)}, ウサギ^{19,29-32)}, イヌ^{7,33-41)}, ネコ^{19,42-45)}, ヒト⁴⁶⁻⁵⁸⁾などがおもな研究対象とされ, その他ウシ^{19,21,59,60)}, ヒツジ^{19,21,61,62)}, オポッサム^{18,19,63)}等がある。

ハムスターについては SHACKLEFORD・WILBORN¹⁸⁾ が簡単な記載をしているのみで, 詳細な研究はほかにはない。それゆえその構造の詳細を明らかにするとともに, 細胞の機能すなわち終末部, 峽部および線条部におけるそれぞれの細胞の分泌物の生産, 排出などについて形態学的に観察した。

材料および方法

材料には飽食状態のハムスター (golden hamster) 雄成体 (体重 120~130 g) 7 匹を使用しクロロホルム麻酔を行ない, 直ちに臓器を剔出して, Millionig のオスミウム酸固定液に入れ, 4°C 冷蔵庫中で Penetron II 型 (三慶科学研究所製) で回転させながら 2 時間固定した。エタノール脱水後 QY₁ を介して LUFT⁶⁴⁾ または COUTER⁶⁵⁾ の方法によりエポン包埋した。ブロックは Porter-Blum I 型

ultramicrotome で薄切し, OHKURA・TAKASHIO⁶⁶⁾ による酢酸ウラニウム染色と, VENABLE・COGGESHALL⁶⁷⁾ による鉛染色との二重染色を行ない, JEM T₂ 型電子顕微鏡で検鏡, 撮影した。一方, 対照の光学顕微鏡用切片をつくり, 山元⁶⁸⁾ による toluidin blue 染色および PAS 染色を行ない検鏡した。

所 見

I 光顕の所見

他の諸種ホニュウ動物の耳下腺と同様にハムスター耳下腺では終末部, 峽部, 線条部, 導管の各部が区別される。この動物の特徴として, 峽部細胞が他の動物のものより大きく, 細胞の分泌機能が旺盛で, 終末部との接触部では終末細胞間に介在して腺腔を囲む像もみられ, 一見して 2 種の細胞からなるイエウサギ顎下腺を思わせる。

エポン切片の PAS 染色では終末細胞の細胞質が弱陽性を示し, 分泌顆粒の周辺部は比較的強い陽性を示し, さらに内部は弱陽性であるが, その陽性度は細胞質より弱い。顆粒のうちには周辺部が強い PAS 陽性を呈する半月または三日月状を呈するものおよび顆粒中心部が強く, その周辺が弱い反応を呈するものがある。

峽部細胞は分泌顆粒が強陽性に染まり, 終末細胞のそれらより一般に反応が強い。なお本細胞に

Histological, histochemical and electron microscopic studies on the salivary glands in man and many kinds of animals. V. Electron microscopic investigations on the parotid gland in the hamster

T. MINEDA (Department of Anatomy, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University, Nagoya)

* 名古屋市千種区末盛通り 2 の 11 (〒464)

Jap. J. Oral Biol. 14(1) : 59-100, 1972.

現われる crystalloid も顆粒と同様に強い陽性を呈する。

線条部は反応が陰性である。

toluidin blue 染色でも終末細胞、峽部細胞はPAS染色と同様の反応を示す。

線条部は境界膜と核だけが淡く染まる程度である。

II 電顕的所見

A 終末部細胞

終末部には3種の細胞が区別される。一つは腺細胞(終末細胞)で終末部のほとんどを占める。他の一つは終末部基底明調細胞と考えられるもので、終末部の基底に位置し細胞体は明るい。このような細胞は峽部細胞の基底にも一部みられた。残りの一つは筋上皮細胞(籠細胞)である。なおこの種のものは峽部ではより多く存在して、管を取り巻くような状態で配列しているが、その詳細についてはCで述べる。

1. 終末細胞(腺細胞)

終末細胞の形態はピラミッド状を呈し、大きさは長径平均 15.5μ 程度である。核は細胞中央部より基底に偏在し、楕円形で、その長径は細胞の長軸に対して直角である。核の輪郭は凹凸を示す(図1)。核膜には一切片で十数個の膜孔がみられる。核膜内膜には電子密度の高い異質染色質(ヘテロクロマチン)が集積し密着しているが、膜孔部にはこのようなものは認めれない。核中心部は比較的明るい真正染色質によって形成せられ、この間に異質染色質の島状をなすものおよび interchromatin granule の集合体が散在しているのがみられる。核小体はときどき認められるが、その電子密度は細胞により異なる。

さらに核内構造物として、WEBER・FROMMES (1963)⁶⁹⁾が報告した nuclear body は1個の核内に1個とは限らず、1~3個を有するものがある。大きさは 0.35μ 程度の小さいものから 1.00μ 以上のものまでがみられる。それらの形態は大きく分けて3種の型に分類される。Type Iは真正染色質より電子密度の低い細線維または構造のはっきりしない物質が球状を呈する型である(図3)。Type IIは細線維が環状をなして中央に空所

を有する型である(図4)。Type IIIはType IIの中央に異質染色質よりも電子密度の高いオスミウム酸好性顆粒を有するものである(図5)。Type Iに属するものは 0.40μ 前後の大きさで最も小さい形態であり、出現頻度が最も高い。もしこのようなものが1個の核に1~3個存在する場合には、それらがすべてType IまたはType IIだけのこともあり、さらに3種のものが混在することもある。Type IIといっても種々の形態が認められる。たとえば個々の細線維を識別することはできないが、おそらくはその幾本かの集まったものが環状をなすもの、1本の細線維が数回環状に取り巻くのが明らかなもの、取り巻いた細線の一端が中央に出て、さらにコイル状をなし、それが環状を呈するものなどがそれである(図6)。一方大きさにも変異があり、Type Iよりわずかに大きいものから 1.00μ 以上のものまでがみられる。Type IIの出現頻度はType Iの約半分ぐらいであるが、Type IIIが十数例しかみられなかったのに比べれば高い。Type IIIの中央部にみられる顆粒は、大きいものはグリコーゲン顆粒と同じ程度のものから、interchromatin granule または異質染色質を構成する粒子と同じ程度のものまでがみられる。

その他の核内封入体として lipid を有するものが1例だけ認められた。

細胞質では粗面小胞体がよく発達し、細胞周辺部には層板状に囊状のものが配列し、細胞中心部、すなわち核上部から腺腔側にはゴルジ装置、多くの分泌顆粒が散在する。それらの間には少量の囊状をなすもの、あるいは管状または液胞状の粗面小胞体が介在する。そのほか遊離のリボゾームおよびポリゾームも認められる。

糸粒体には楕円形ないしは円形を呈するものが多く、cristae はよく発達しており、細胞質全体に散在する。糸粒体基質は比較的明るく、dense mitochondrial granule は認められない。

ゴルジ装置はよく発達し、核上部に数個みられ、しばしばゴルジ野をなすのがみられる。ゴルジ囊は3ないし4層をなし、長く伸びて弧を描く。ゴルジ野を呈するものでは一般にゴルジ装置

の外方(凸側, forming immature face)に空胞がみられるが、その空胞同志が癒合して 亜鈴型を示すと思われる形態が認められる。ゴルジ嚢は内方(凹側, mature face)のものほど扁平である。空胞のさらに外方には粗面小胞体があるが、それらが空胞状を呈する場合がしばしば認められる。それらのうちにはゴルジ装置に面する側にリボゾームを有しないもの、あるいはリボゾームを全くもたない空胞が混在するのがみられるが、これは上記の粗面小胞体がリボゾームを失ったものと考えられ、直接ゴルジ空胞に移行するように見受けられる。これらの空胞状小胞体の外方には層板構造をなす嚢状の粗面小胞体が存在する。一方、ゴルジ装置内方には電子密度のやや高いゴルジ小胞が多数みられ、分泌顆粒のまわりに集まっている像も認められた。またそれらがゴルジ嚢の端に集まり、ゴルジ嚢に融合し、またはゴルジ嚢から分離するかに見える像も認められ、さらにゴルジ装置外方の空胞の間に少数見られる場合がある。一般にいわれているようにゴルジ装置と分泌顆粒との関係が認められる。ゴルジ嚢の内方の一端がふくれているもの、ゴルジ嚢が分泌顆粒を包むかのように取り巻き顆粒を中心にして同心円状の配列をするもの等がみられるが、これらはゴルジ装置における分泌顆粒形成の過程を思わせる。

分泌顆粒の形態(図1, 2)は種々であるが、大多数のものでは内容は電子密度が低く細く短い線維状の物質と、これより電子密度の高い粒状物質との2成分からなる。粒状物と線維状物とはそれぞれ顆粒の一部に集積する傾向がみられるが、両物質の少ない顆粒では、両物質が顆粒内全体に散在し、顆粒は最も明るい。次いで上記2成分を多く有する顆粒で粒状物の集まる量によって顆粒内に比較的電子密度の高い部分と低い部分とが現われることがある。また線維状物もその集まる状態によって粒状物の場合と同じような形態を示すことがある。さらにそれらの電子密度の高い部分に、それより一層電子密度の高い塊状物を含むものがある。この塊状物は輪郭がはっきりせず、その外郭は上述の電子密度の比較的高い部分との境界はかならずしも明確ではない。一般に塊状物を有す

る顆粒は多くはなく、明るい顆粒の間に点在する程度であるが、細胞によってはこの種の顆粒を多く有するものがある。分泌顆粒では限界膜がはっきりと顆粒の全周を取り巻いているものが多いが、このほかに限界膜が部分的に明らかなもの、さらにはほとんどこれを認めがたいもの等がある。ゴルジ装置の近くには、ゴルジ小胞が数個並んで一つの顆粒に融合する像も認められた。

分泌顆粒はおのおのが離れているのが普通であるが、しばしば癒合する顆粒が見られる。顆粒の大きさは 0.5μ 以下から 2.0μ 程度以上まで種々であるが、成熟顆粒は 2μ 前後と思われるので、成熟するには融合も見られるし、さらに分泌塊となったものも認められる。

終末細胞の分泌顆粒の腺腔への放出像はあまりよくみられないが一般には細胞頂部が陥凹し、すでに分泌顆粒の形を失った顆粒成分の放出を思われる像が見られる。1例であるが分泌顆粒の一部が腺腔に突出し、アポクリン分泌様突起を示す像が見られた。

細胞質にはときどき液胞が見られるが、これは明らかに限界膜を有し、内部は明るく、分泌顆粒の明るいものよりもさらに電子密度が低い。それらの液胞のほかに比較的電子密度の高い小胞状物を有するものがある。液胞には細胞小器官が密接することがなく、細胞基質が被膜状をなして小器官と隔てている。また液胞に分泌顆粒および電子密度のより低い細胞質が突出して液胞と融合し、さらにその中に放出されるような形態が認められる(図7)。

ライソゾームがしばしば認められる。これらの構造物は細胞全体に分布しているが、多くは核上部に見られる。なお一般にdense bodyと称されているものはゴルジ装置付近に集中する傾向がある。dense bodyとしての形態にも非常に多くの種類が認められる(図8)。球状、こん棒状、マユ状、亜鈴状がその例で、ほかに若干それらの変形もみられる。それらは内部の電子密度の高い成分を含むもの程、限界膜の著明なのが特徴である。なお限界膜と電子密度の高い成分との間には、わずかに低い電子密度を示す部分がある。dense

body は比較的小型で、出現頻度が高い。これらの dense body 以外のライソゾームはその電子密度が小型の dense body 程高くなく、出現頻度は低く、形態もさまざまである。

SOTELO PORTER (1959)⁷⁰⁾ が初めて記載した multivesicular body も見られ、その内部構造の一部が電子密度を増して dense body になっていくと思われる像また dense body が multivesicular body 様形態をなしたと思われる像も認められる(図8)。さらに cytolysosome 様構造物として、そのうちに粗面小胞体を含むもの、あるいは単に細胞基質状のものを含むものもある。そのほか不規則なラメラ状物を含み、周囲に電子密度の高い物質を有する型もある。

dense body はゴルジ装置付近によく見られるのであるが、同装置から直接形成されるという明らかな像は得られない。

細胞質には以上のようなもののほかに、ときどき1ないし数個の脂肪滴がおもに細胞基底部の層板構造をなした囊状の粗面小胞体間に見られる。

中心子または中心小体が、ゴルジ野内またはゴルジ装置に接近して、あるいは細胞頂部にもしばしば見られる。中心子は双心子として互いに直角をなすもの、あるいは一つだけのものも見られる。中心子の横断されたものは明らかに9対の微細小管からなるのが認められ、中心子の出現頻度はかなり高い。

細胞頂部および側部には、後述する接着装置としてのデスモゾームと関係するトノフィラメント(または cytoplasmic filament) と称されている細線維または線維束が縦横に走っているのが見られる。この細線維に由来すると思われる細線維束に横紋構造を有するものが1例認められた(図9)。その横紋構造は本細胞では電子密度が高く明瞭で、12 m μ 程度の幅をもった横紋と、その横紋と横紋との間にさらに細い2~3本の横紋を有し、それらは大体において等間隔のように見受けられる。この太い横紋の周期は約800~900 Å である。

終末細胞間にはしばしば明瞭な細胞間分泌細管が認められ、これには細胞の長径の $\frac{2}{3}$ 程度までは入り込むものがある。このような細管が終末細胞

内には入り込んで細胞内分泌細管のような観を呈する場合がある。腺腔の広さおよび細胞間分泌細管の太さは小で1 μ 前後である。この細胞は腺腔および細胞間分泌細管内に多数の絨毛様突起を出しており、そのために腺腔内および細管内は複雑になっている。絨毛様突起は長さ約0.5 μ 、幅約0.1 μ 程である。その内部には細線維と思われるものが認められた。

腺腔および細管内には分泌顆粒成分と同様のものが見られるが、電子密度はそれより低く液胞のものと同じ程度である。

細胞間の接着装置としては、腺腔側には junctional complex が見られ、それより深部にはところどころ嵌合があるが、その発達は著明ではない。細胞間隙はほとんど見られず、したがってヒト⁴⁷⁾、マウス²⁵⁾、およびイヌ³⁹⁾で見られている、間隙内における絨毛様突起は認められない。ただし無髄神経終末のはいり込む像はときどき見られる(図10)。

細胞基底面で、細胞間の接着部位に近い小部分に、絨毛突起様の基底陥入があるほかは大部分は平滑であるが、その一部分に基底陥入の形成された数例を見ている。細胞基底は明るく無構造な介在層を介して基底膜に接する。この基底膜は断裂することなく連続する。この基底膜および介在層内に無髄神経終末のはいり込み、しばしば細胞基底に接する。また筋上皮細胞が腺細胞に接しているのがときどき見られる。

2. 終末部基底明調細胞

この細胞は終末細胞間の基底に位置するもので、小さく球状のものから終末細胞の形態をなす大きなもので、種々の段階の大きさのものが見られる。この種の細胞の小形のものは細胞質がとぼしく、細胞小器官もごくわずかで、球状の糸粒体が2~3個、少量の遊離のリボゾームおよび小胞を有する。また dense body がときどき認められる。本細胞は細胞体が大きくなるに従って終末細胞間に深く進入し、粗面小胞体、ゴルジ装置が出現する。さらに大きなものでは粗面小胞体の囊がふくれて、空胞状を呈し、その量も増す(図11, 12)。遊離リボゾームとともにポリゾームも見ら

れるようになる。より発達したものでは粗面小胞体が囊が縮小、扁平化して層板構造を有する(図13)。ゴルジ装置も発達し、分泌顆粒の形成が見られる。顆粒は終末細胞におけるように明るく、電子密度の低い内容を有する。細胞質の電子密度も終末細胞のものと同じ程度に近づく。細胞の核は小型細胞では終末細胞の半分程度の大きさで、形も球形、楕円形など種々であるが、層板構造をなす粗面小胞体を有する細胞では、細胞体が終末細胞と同様の大きさであり、核も細胞基底側に偏在するようになる。核には核小体は認められないが、核内封入体として nuclear body を有する例が見られた。またこの細胞の分裂像を思わせるものが1例得られた。分裂様式は無糸分裂であり、細胞体および核が垂鈴形をなし、分裂途上の像であると思われる。このような形の核の一半を含む一方の細胞質には小胞、リボゾーム、dense body が、他方には小胞、リボゾーム、ライソゾームおよび粗面小胞体の囊状を呈するものが見られた。これらの基底明調細胞は明らかな接着装置を示さないが、ときに隣接細胞との間に嵌合様の構造を示すだけで、あたかも遊離細胞のような観を呈する。

3. 終末部粘液細胞

著者は1個体で粘液細胞の出現を認めた(図14, 15)。細胞体は終末細胞より大きくときに2核性のものがある。外形はふくらんだピラミッド形を呈し、核は扁平な長楕円形または不規則形を示して細胞基底部に偏在する。細胞基底部には囊状の粗面小胞体があり、層板構造、管状あるいは液胞状を呈する。核上部には分泌顆粒、著明なゴルジ装置が分布し、その間に管状の粗面小胞体、遊離のリボゾームおよびポリゾームが見られる。粗面小胞体内部には比較的電子密度が高い物質が満たされている。この像は他の細胞の粗面小胞体と明かに異なる。

糸粒体は比較的小形で、電子密度が高く、細胞全体に分布する。

ゴルジ装置はよく発達し、ゴルジ野をなすものが見られる。ゴルジ囊は数層みられ、終末細胞、峽部細胞におけるよりも長く伸びて大きい。ゴル

ジ囊は外方のものほど、囊内の電子密度が高く、終末細胞や峽部細胞で見られるゴルジ空胞は見られない。内方に見られるゴルジ小胞はやはり比較的電子密度の高い内容をもっているが、この細胞では外方に多く見られる。なお内方のものは終末細胞とは違って、むしろ少し大きい傾向を示す。

分泌顆粒は 3.6μ 以上に達するものもあるが、平均 2.6μ で終末細胞のものより大きく、顆粒内容は一様に電子密度が低い。この顆粒は限界膜を有し、おのおの独立しているが、ときどき融合様の形態を示すものがある。この分泌顆粒とゴルジ装置との関係は明らかで、形成途上の像が本装置に認められる。

ライソゾームとして dense body が存在するが、終末細胞、峽部細胞、線条部明調細胞に比較して少ない。その他、脂肪滴、中心小体も見られた。

この細胞群は腺腔を形成し、頂部には絨毛様突起を有する。細胞間分泌細管は形成されないが、細胞頂部がくぼんで絨毛様突起を有する腔を形成しているのが見られる。

細胞間の接着は頂部では junctional complex を示し、それより深部では直線的な接着面を示すが、ところどころに嵌合およびデスモゾームが見られる。細胞基底面には接着面で見られる嵌合様の形態をなす細胞膜の陥入がところどころに見られ、膜が陥入したその頂部から鎖状に並んだ小胞が見られる。これは接着面の嵌合部でも同様に認められる。基底面には細胞膜の外側に介在層を介して基底膜が見られ、さらにこの基底膜が峽部細胞の基底膜と連続する像が認められた。筋上皮細胞、神経終末が分布する像は認められなかった。この細胞には本来の峽部細胞との間にデスモゾーム、嵌合などの接着装置が認められるので、耳下腺細胞の一員であることがわかる(図15)。なお本来の終末細胞(漿液性細胞)と混在することなく、本細胞だけで終末部を形成する。

B 峽部

峽部は発達がよく、長い。峽部の細胞は峽部細胞、基底明調細胞、筋上皮細胞の3種に区別することができる。筋上皮細胞についてはCで述べる。

1. 峽部細胞

峽部細胞は他の動物の唾液腺峽部細胞よりも分泌顆粒の形成が盛んで、分泌活性が高い。細胞は立方形、ピラミッド形あるいは扁平な直方体形を呈し、終末細胞より小さい。なお終末部に隣接するものはやや大きく、線条部に近いものが小さい傾向を示す。さらに終末部に峽部細胞の混在する像はさほど珍しくない(図16)。

核は楕円形ないし長楕円形を示し、その表面が凹凸がはげしく、細胞基底に偏在するが、その外形の不規則であることが特徴である。核の内部構造は終末細胞と同様で、核内封入体としてのnuclear bodyのごときも著明である。nuclear bodyの出現頻度は高く、Type I, II, III(図3, 4, 5)の各型が見られる。

細胞質は多数の特異的な分泌顆粒とリボゾームを含有し、そのためには細胞の電子密度は高く、終末細胞より暗くなる(図16, 17, 19, 20)。リボゾームは遊離のものが多く、ポリゾームをなすものもよく認められる。粗面小胞体では、空胞状または管状を呈するものは分泌顆粒間および核上部に多く見られるが、嚢状のものが層板構造をなし、よく発達したものが細胞基底部分に見られる。

糸粒体は球状、楕円状を呈して細胞全体に散在するが、核附近により多く認められる。ゴルジ装置は発達がよく、数個のものによってゴルジ野の形成されているのが見られる。またゴルジ野の形成されない細胞では、核上部に二、三個のゴルジ装置が細胞頂部に対し弧を描いて位置するのが見られる。ゴルジ装置を構成するゴルジ嚢、ゴルジ空胞、ゴルジ小胞の分布は終末細胞におけると同様である。ゴルジ空胞と空胞状粗面小胞体とが混在するのが見られ、後者から前者に移行するような像もしばしば認められる。終末細胞と同様にゴルジ嚢の一端がふくらんでいる像がしばしば見られるがこれは分泌顆粒形成を示すものと考えられる。

分泌顆粒は大きさ約 1μ で多くは限界膜に囲まれた球状をなすが、中には多角形のものも見られる。その内容は顆粒全体が明るく、終末細胞の顆粒の一型を思わせるもの、それよりやや電子密度が高く均質なもの、やや暗調な内容のなかに非常

に電子密度の高い大小の塊状物を含むもの、さらに顆粒全体が電子密度の高い均質なものからなるもの、このようなものが1ないし数本の亀裂によって2ないし数個の小部分に分けられるもの、中央部が明るく周辺部が暗い環状(数カ所に亀裂が見られる)を呈するもの、類結晶を含むものなど、種々のものが一つの細胞内に認められる(図18, 19)。大きな塊状物または類結晶を含む、ほぼ球状の顆粒はその外形に変化を来とし、多角形を呈する。類結晶が含まれる場合には、結晶が顆粒の周辺に位置するために、顆粒のその部分の縁が平坦となって、全体の形が半球状を呈する(図20)。特殊な例として分泌顆粒の大きさ($1/8\mu$)と形態ならびにその電子密度が、後述する線条部明調細胞のものとよく似る顆粒を有する細胞を見ている(図21)。

細胞基質には明らかに類結晶が存在するが、これは棒状で、顆粒内の塊状物と同程度に電子密度が高い。類結晶は棒状の先端に明確な面角を示す(面角は模型図2で示すような角度を呈する)。また内部構造は電子密度が高いために明らかでない。2例の複合結晶が見られたが、1例は両結晶とも同じ電子密度を有する「ト」の字形を示し(図18)、他は針状の電子密度の高い長短2本よりなり、長いものにはその両側に、短いほうには長いものに接する側に、それぞれ電子密度のやや低い部分が認められる(図19)。

一方、分泌顆粒の放出過程における一つの段階と思わせる像がしばしば認められるが、細胞の深部から管腔側に向かって次のような移行が認められる。すなわち分泌顆粒の中央に電子密度の高い塊状物を有し、その周囲に線維状のものが取り巻く像、顆粒中に線維状物のみを有するもの、分泌顆粒の変形としてできたと思われる液胞状のものの中に線維状物を有するもの、液胞状のものとの融合する像などがそれである。後2者は細胞頂部に多く見られる。すなわち以上のように形成された線維状物が管腔に放出される(図22)。換言すると分泌顆粒そのものが放出されるのではなく、上記の過程を経るので、管腔内がそのような線維状物で満たされている像が見られる。なおこの線維状物は

ゴルジ装置の囊内に見られることがあるが、このことは分泌顆粒が該囊によって形成されることを証明する一つの証拠と考えられるであろう。

液胞状のものはおもに細胞頂部に見られるが、終末細胞におけるものと同様に、その周囲にはリボゾームなどの細胞小器官が見られず、細胞基質そのものによって取り巻かれる。上述の液胞状のものは顆粒に由来するが、そのほかにこれとは別種の液胞が存在する。それは内容が明るく線維状物を含まない形態のもので、ゴルジ囊に由来するのか、他の細胞質に由来するのかは不明である。またこの種の比較的大きい液胞内には、終末細胞で認められたと同様に明るい分泌顆粒が突入するような像および液胞同志が相接する像が見られる。

細胞質には上記のもののほかに終末細胞と同様に種々な形態のライソゾームが認められる。dense body として終末細胞で述べた型はもちろん、その他の形態も見られる。multivesicular body でもその形成がゴルジ装置と密接な関係を有する像が認められる。ある細胞ではゴルジ装置の最内層に相当するゴルジ囊がC字状をなして、そのうちにゴルジ小胞を抱擁する状態を示すのが見られ、このときのゴルジ囊内には電子密度の比較的高い物質を有する(図23, 24)。

大きなライソゾームでその内容が複雑な構造を呈するものがあるが、終末細胞で見られたような類結晶を含むものは認められなかった。細胞頂部表面には絨毛様突起を有するが、あまり著明でなく、その認められないものもある。またそれが存在する場合には腔内の分泌物に圧迫されるためか、細胞表面に平行になっている。

隣接細胞間には細胞間分泌細管は形成されない。細胞間の接着は終末細胞と同様に腺腔側に junctional complex を有し、これより深層では嵌合が見られ、さらにデスモゾームが管腔よりとときどき発達しているのが見られる。基底面は終末細胞と同様に滑らかであり、筋上皮細胞は終末部よりも多い。峽部細胞が筋上皮細胞と接する面および峽部細胞間の嵌合部には小胞が多く認められ、これらは鎖状にならび、あるいは pinocytotic vesicle を思わせるような状態をなす。

細胞には無髄神経終末の分布が見られるが、終末細胞におけるように多くはない。基底膜は終末細胞におけるものと連続して峽部細胞をおおう。

2. 峽部基底明調細胞

この細胞は終末部基底明調細胞の小さな球状のものと類似し、峽部細胞間の基底に位置する。細胞質にとぼしく、細胞小器官として、糸粒体、遊離リボゾーム、小胞を少量ずつ含むにすぎない。終末部においては種々の大きさの該細胞が認められたが、峽部では3例にすぎないけれどもすべて小さな球状をなすもののみである。

C 筋上皮細胞(籠細胞)

筋上皮細胞は峽部細胞、終末細胞の細胞基底に存在するが、峽部において比較的多い。細胞質は核の位置する部位に多く、細胞は全体として紡錘形をなす。この細胞1個が数個の峽部細胞または終末細胞に接している。細胞核は一般に長楕円形で、nuclear body を有するものもあり、その場合 Type I, II である。細胞小器官は核周辺に分布し、遊離リボゾーム、ポリゾームが見られるが、粗面小胞体の発達は悪く、ときどき見られる程度である。

糸粒体は他の細胞におけるより小型で、円形、楕円形をなす。ゴルジ装置はよく発達し、典型的な像を呈する。その他、液胞、ライソゾーム、multivesicular body、中心小体を有するものが見られた。これらの細胞小器官の外方には筋細糸が細胞膜に沿って分散する。ところどころに電子密度の高い部分が見られるが、これは平滑筋線維における黒斑に相当するものであろう。細胞外方は基底膜でおおわれ、内方は終末細胞、峽部細胞の基底細胞膜に接着する。筋細糸の分布は2種に分けることができる。すなわち細胞基底部だけに分布するものと基底部および内方部の両部に分布するものがある。細胞膜直下には小胞が多数配列するのが見られる。それらの小胞は $0.08 \sim 0.10 \mu$ の大きさを示し、きわめて低い電子密度を有する。また小胞が細胞膜と連続する像がしばしば認められ、pinocytotic vesicle 状を示す。さらにこれらの小胞間に液胞が見られ、これもまた細胞膜と連続するのが認められる。小胞の分布は細胞基

底側に多く、内方側にはわずかで、認められないものもあるが、細胞によっては基底側にも全く存在しない場合もある。筋上皮細胞と峽部細胞との接着がデスモゾームによって行なわれている像が認められたが、一般にはそのような接着装置は多くは見られなかった。

D 峽部と線条部との接続部

この部位の細胞は終末細胞に隣接する部分の細胞に比較して小型であり、細胞質の電子密度が低い(図25)。内部構造は種々な形態を示すが、全体的に粗面小胞体およびゴルジ装置は典型的な形態を示さない。この種の細胞は次のような各種の型に分けることができる。1) 細胞質が少なく粗面小胞体、遊離のリボゾームをわずかに有し、糸粒体は比較的多いが、分泌顆粒を含有しないもの、2) 分泌顆粒を有し、ゴルジ装置が見られるもの(図25)。2) の型の細胞はさらに二つに分けられる。その一つは峽部細胞本来の比較的に明い分泌顆粒とそれよりやや小さく電子密度がきわめて高く、大きな dense body を思わせる顆粒とをもつもので、明い顆粒の方が多い。ただしこの2種の顆粒は同一成分なのであるが、その量の違いで電子密度を異にするので、この意味から同種の顆粒と考えることができる。これらの顆粒には放出末期の像と考えられる線維状物を含有するものおよびそれらが融合したと思われる像がしばしば見られるが、このようなものは峽部細胞の分泌顆粒におけると同一物なのである。他の1種は上述の2種の顆粒とともに後述の線条部明調細胞頂部に見られ、小胞状の分泌顆粒に相当するものを含む細胞である。この種の細胞では峽部細胞における顆粒の量は少なく、ゴルジ装置には扁平なゴルジ囊が見られず、ふくらんだ空胞状を呈する。以上によってこの細胞は2系統の分泌顆粒を形成する能力を有するのではないかと想像される。3) この細胞は遊離のリボゾームまたはポリゾームを多量に有し、細胞質の電子密度が非常に高い。峽部細胞型の明暗2種の分泌顆粒を少量含有する。4) この細胞は基底陥入、糸粒体の特異な分布を示し、線条部明調細胞の形態を呈する。ゴルジ装置はゴルジ囊が層板構造をなし、空胞状粗面小胞体から

出芽によって小胞が形成される像が見られる。この空胞状の粗面小胞体はときにはゴルジ空胞に隣接し、直接ゴルジ空胞に移行するように見受けられるような像を呈することがある。以上4種の細胞ではいずれもその頂部に絨毛様突起が見られるが、著明ではない。細胞間の接着は管腔側には junctional complex を有し、それより深部に嵌合とデスモゾームがところどころで見られる。細胞核には nuclear body の Type I を有するものが見られる。細胞基底には基底膜が見られるが、筋上皮細胞、神経終末の分布は明らかでない。

E 線条部

線条部は明調細胞、暗調細胞および基底明調細胞の3種からなる。

1. 明調細胞

円柱形を呈し、細胞質が明るく、基底陥入を示す(図26)。核は細胞中央より頂部側に位置し、終末細胞の核より明い。核膜に集積する異質染色質には電子密度の高いものと低いものとが観察される。この細胞の核にも nuclear body が認められ、Type I, II が区別される。細胞質は明るく、遊離のリボゾーム、ポリゾームが細胞質全体に分散している。粗面小胞体の発達は悪く、わずかに小さな空胞状のものがあるのみである。核上部にはゴルジ装置、球形の糸粒体、小さな液胞がある。ゴルジ装置は2ないし3個見られるが、典型的なものまで発達せず、ゴルジ小胞、ゴルジ空胞は認められるが、ゴルジ囊が層をなす形態はとらない。このようなゴルジ装置の構造も明調細胞の特徴といえる。核上部細胞質ではトノフィラメントが細胞小器官の間を縦横に走る。このトノフィラメントの線維束でも終末細胞で記載したと同じような横紋を有する像が1例観察された(図27)。太い横紋の周期は $800 \sim 900 \text{ \AA}$ で明らかであるが、その間の細い横紋は終末細胞におけるように明らかでない。その他、ライソゾーム、dense body、中心小体、multivesicular body などがしばしば認められる。

細胞頂部付近には 0.1 ないし 0.2μ 位の大きさで、中等度の電子密度を有する分泌顆粒または小胞(以下分泌顆粒とする)が集中している像が観

察される。この分泌顆粒は、細胞間の接着装置に由来する細線維束(これは intermediate junction に連なり、管腔面に並行して配列する)あるいはアポクリン分泌様突起(または bleb 様突起)の有無などに関連してその分布状態を異にする。すなわち突起、細線維束のないものでは顆粒は管腔面直下に配列するが(図28)、このような顆粒を全く欠く細胞も見られる(図29)。突起が形成されているものでは突起の基部に見られ、1例においてはこの基部の顆粒間に細線維束の一部が見られた(図27)。細線維束が管腔面に平行して現われたものでは顆粒がその下に見られ(図29)、細線維束の切れ目を通して頂部に出ているものもある(図30)。細胞頂部には長さ0.75~1.00 μ 位、幅150 m μ 位の絨毛様突起を有するが、このものはアポクリン分泌様突起および細線維束を有するものでは見られない。ただし突起を有しない細胞でも、絨毛様突起の発達しないものがあり、これも顆粒と同様に、突起および細線維束の有無に関係するような像を呈する。さらに突起および細線維束を欠く細胞で、絨毛様突起は認められるが、分泌顆粒の分布が見られるものと、見られないものとが観察される。このような所見から分泌顆粒の分布、分泌突起、絨毛様突起および細線維束はそれぞれ密接な関係を有し、細胞機能によって、その形態、分布、量等に変化を来すものと想像される。

基底陥入は核に達する程に深くはいり込んでいる。陥入した細胞膜にはさまれる細胞質(FC)には多くの円形、楕円形の糸粒体が平行にならび、特異な像を呈する。その大きさは大小種々で、cristae はよく発達するが、糸粒体内顆粒は認められない。(FC)には糸粒体のほかに、dense body、リボゾーム、ポリゾーム、小さな空胞状の粗面小胞体、小胞、細線維(トノフィラメント)などが見られる。細線維は核付近では横に走るが、(FC)では縦走する。この縦走する細線維は(FC)のすべてには入り込むのではなく、細線維の見られない部分があり、この線維の分布が(FC)の明暗を示すように思われる。一般に隣接細胞の基底陥入は互いにかみ合うものであるが、その相接する細胞

膜間にはところどころにデスモゾームの形成されているのが認められる(図31)。陥入した細胞膜の一部から小胞が鎖状をなして形成されている像が見られる(図32)。

光顕像ではがれたように見える部分は電顕像では一見して明るい大小さまざまな液胞状のものが集合したように見えるけれども、その内部にはリボゾーム、糸粒体などがまばらに散在し、細胞膜をたどるとこれらのものは細胞質そのものと連続していることが確かめられる(図33)。

細胞間の接着は大部分が明調細胞間にあるが、管腔側には junctional complex があり、それより深層では嵌合があり、ときどきデスモゾームの発達している像が認められる。intermediate junction にはすでに記した細線維束が付着するが、細線維束はデスモゾームに付着するトノフィラメントより細く、かつ密集する。またこの細線維束は増減することがあり、トノフィラメントより明瞭に観察される。

細胞基底部の細胞膜の外側には介在層を介して基底膜がある。またこの細胞膜には神経終末の分布および筋上皮細胞の接着は認められない。

2. 暗調細胞

この種の細胞は明調細胞間に散在する程度で、はるかに少ない(図26)。その電子密度は明調細胞よりかなり高く、全体として暗調をおびる。核は細胞基底側に偏在し、楕円形ないし円形、不規則形などで、nuclear body も認められる。

核上部の細胞質は明調細胞と同様であるが、細胞頂部には電子密度の低い小胞が集中しており、明調細胞における電子密度の比較的高い顆粒は認められない。

細胞基底は明調細胞と明らかに違って、細胞がだんだん細くなり、基底膜にまで達せず、基底陥入を形成しない。

暗調細胞と隣接細胞との結合は管腔側では junctional complex が形成され、intermediate junction には明調細胞における同様に、細線維束の付着する像が見られる。それより基底側ではときどきデスモゾームがあり、さらに暗調細胞の細胞質の一部がところどころ長い突起を作って隣

接する明調細胞に突入しているが、細胞基底部分では突起の発達が特に著明である(図34)。暗調細胞同志間にはそのような嵌合は認められない。

1例であるが暗調細胞で典型的なゴルジ装置を有し、粗面小胞体が発達して層板構造を示し、細胞頂部には峽部細胞の分泌顆粒を思わせるものがあり、さらに細胞底部が基底膜に達するものが見られた(図35)。

3. 基底明調細胞

この細胞は1例に遭遇しただけであるが(図31)、それは明調細胞の基底部分細胞間で、暗調細胞の基底細胞膜と接する位置に存在するものである。細胞は卵形で核はやや小さく、その一部に深い陥入が認められる。細胞質は少なく、発達の悪い粗面小胞体、遊離のリボゾーム、ポリゾーム、糸粒体、小胞、中心小体および細線維などが認められるが、その細胞小器官の発達状態から推測して、未分化な細胞と思われる。基底明調細胞は隣接する暗調細胞とは指状突起による嵌合およびデスモゾームによる接着、また明調細胞とは指状突起による深い嵌合を行なっている。この細胞はその位置からすれば終末部および峽部における基底明調細胞に類似するが、細胞質の電子密度がやや高く、隣接細胞との接着が著明である点でそれらと異なる。

F 神経終末の分布

小葉間結合組織内にはしばしば無髄神経線維の横断、縦断あるいは神経終末の横断と思われる像が見られる。その神経線維の内部構造は神経細線維が神経線維の走向に平行に分布し、糸粒体、dense body、液胞、小胞および少量の遊離リボゾームなどを有する。小胞は神経終末に近づくに従い多くなり、神経細線維の量は少なくなる。また無髄神経にはシュワン氏細胞を伴うものも見られ、神経線維はこの細胞に接着する。神経線維および終末は介在層を介して基底膜におおわれる。以上の神経終末断面の構造として2種のものが見られる。一つは(V_1) 500~560 Åの比較的電子密度の高い小胞を多く含み、しかもその小胞は密に集合して結晶様の配列を示しているが、他の一つ(V_2)はその内容は電子密度が低い1000 Åまたは

1500 Å程度の小胞と630 Å程度で上記(V_1)の小胞よりやや電子密度の低い小胞とが散在し、そのほか糸粒体と少量の神経細線維とを有する終末である。腺細胞には神経終末がしばしば接着する像が認められる。大部分のものは終末細胞の基底細胞膜に接着するが、峽部細胞に接着する像は1例得ただけであり、線条部ではそのような像を認められなかった。終末部では細胞間にはいり込んでいるものが数例認められた。終末細胞基底に分布するものは、その部分の細胞膜に接し、細胞間におけるものは両細胞膜間に位置する。これらの神経終末と終末細胞の両形質膜には特別な構造を形成しないで接着しているが、その間には約200 Åほどの間隙がある。神経終末内にはその内容の電子密度がやや高い300~500 Åほどの小胞と800~1000 Åおよび1200~1500 Åほどの内容の明るい小胞、糸粒体が散在するが、小胞の特別な集合形態は認められない。1例において無髄神経線維束が1個のシュワン氏細胞を伴って終末細胞に接近しているのが見られた(図36)。その際1本の神経線維の断面の一端が、シュワン氏細胞と終末細胞とに接着している像が見られた。これらの神経線維においてもその終末には前述の2型(V_1 および V_2)が認められる。終末細胞に接着する線維は、糸粒体と比較的多い神経細線維とを有し、小胞は接着面の一部に数個集中するだけで、明らかに神経終末よりは神経線維に近い形態を示す。またこれらの神経線維は終末細胞をおおう基底膜に連続した膜によりおおわれている。終末細胞には以上のような神経終末のほかに、神経線維が分布する場合があると推測される。一方、動脈の外膜に存在する神経線維の終末には、他と異なる小胞を有する(図37)。すなわち神経終末は多くは500~600 Åの小胞を有し、それらのうちにその内部に電子密度の高い芯状物質を有するものがある。さらに1200 Å位の大型の小胞、糸粒体、神経細線維などが見られる。

G 小葉間結合組織内の血管

小葉間結合組織内には前記の神経のほかに多くの血管が分布し、小動脈、細動脈、毛細血管を区別することができたが、細静脈と毛細血管との区

別は明らかにすることは困難であった。細動脈は5~6個の内皮細胞からなり、周囲細胞の一部分の断面が数個外方に存在する。内皮細胞と周囲細胞との間に基底膜が存在し、その両側には電子密度の低い介在層が認められる。また周囲細胞が存在しない部分では、周囲細胞の外側に密着する厚い基底膜と同様の膜が内皮細胞外方に存在する。この膜は内皮細胞と周囲細胞との基底膜が癒合して形成されたもの(EP)と考えられ、このような場所では(EP)はさらにその外側にある神経線維の基底膜とも癒合する傾向を示す。なお両細胞の基底膜には断絶の像が見られない。内皮細胞にも少量の粗面小胞体と遊離のリボゾーム、糸粒体、液胞、dense granuleとともに著明な小胞を有する。この小胞と細胞基底側、管腔側の細胞膜との間には密接な関係が認められ、pinocytotic vesicleと考えられる。隣接する両細胞間には閉鎖堤が形成され、その近くには境界褶襞(marginal fold)が見られるが、これに似た突起は細胞中央部付近でもしばしば認められる。内皮細胞は細胞質を比較的多く含み、細孔を有しない。

毛細血管には内皮細胞が2ないし数個見られる。内皮細胞の外側には周囲細胞の断面が現われる場合と現われない場合とがあり、本細胞が少ないことを示している。内皮細胞と基底膜との間には無構造な介在層が見られ、膜は断絶しない。内皮細胞の基底膜が周囲細胞の基底膜と癒合し(P)、周囲細胞付近で2層に分かれる像は、毛細血管の場合でも細動脈と同じである。なお(P)は(EP)に比べるとはるかに薄い。内皮細胞の細胞質は上述のものと同様であるが、ゴルジ装置を有するものが見られ、全体に小器官はより少量である。細胞は長く薄く伸び、ところどころに細孔を有し、ここに薄膜(diaphragm)が架橋しているのも明らかである。小葉間結合組織内には以上のような血管および神経のほかに、線維細胞、肥満細胞、コラーゲン線維などが分布する。

総括および論議

A 終末細胞

1. 終末細胞小器官の概観

諸種ホニュウ動物耳下腺の超微細構造についての電子顕微鏡的研究はすでに多くの先人によって行なわれているが、著者の対象としたハムスターの耳下腺に関してはSHACKLEFORD・WILBORN(1968)¹⁸⁾がマウス、ラット、リスおよびdesert rat(2種)とともに本動物を使用しているのを見るだけで、その記載は簡単である。かれらによるとハムスターの終末細胞はよく発達した粗面小胞体、核上部に位する不連続なゴルジ系、細胞間分泌細管を有し、核は楕円形または円形で基底に位置すると述べている。著者の所見も大体それに一致するが、発達した粗面小胞体は位置が限定される傾向を有し基底部では層板構造をなすが、核上部では小胞状のものが顆粒間に見られる。層板構造は細胞基底部の細胞膜または隣接細胞側の細胞膜に平行して配列し、粗面小胞体の末端はゴルジ装置またはゴルジ野近くで終る。しかし途中に分泌顆粒、糸粒体が存在する場合には、そこで中断される。かれらは注目していないが、粗面小胞体に付着しているリボゾームのほかに、遊離のリボゾーム、ポリゾームが細胞全体に分布する。しかし数個のゴルジ装置が円形をなして配列するゴルジ野および細胞頂部の近くではそのような遊離のリボゾームおよびポリゾームは少ない。

2. 分泌顆粒の形態

KURTZ(1964)⁵⁸⁾はラットの耳下腺終末細胞において2種の細胞を区別した。一つは広がった粗面小胞体と均質な分泌顆粒およびしばしばそれらが融合して大きな不規則な塊になったようなものを含み、細胞基質は電子密度が高いのが特徴である。他は細胞基質の電子密度が低く、分泌顆粒が互いに分離していて融合しない型である。ハムスターではこのような細胞型の区別は明らかでないが、基底部の粗面小胞体が著明な層板構造を示すもの、層板構造をなす粗面小胞体の量が比較的に少ないもの、多数の分泌顆粒を含むもの、少数しか含まないもの、ゴルジ装置がゴルジ野をなすもの、あるいは単に数個のものがまばらに分布するものというように、細胞小器官にいろいろな発達段階が認められる。しかしこのようなものは細胞機能の相違によるものであって、本質的な相違で

はないと考えられる。

SCOTT PEASE(1959)⁴⁾はラットの耳下腺終末細胞で低く電子密度を有する物質な顆粒と、比較的電子密度の高い物質からなる顆粒およびこれらの両者の移行型とを区別している。また同氏らは電子密度の低い顆粒はその細胞の分泌機能が低い時期のものであり、電子密度の高い顆粒は分泌機能の低い時期の細胞におけるものであって、常に細胞頂部に分布するとしている。RUTBERG(1961)²⁵⁾はマウスの耳下腺終末細胞の分泌顆粒を 1) 電子密度が低く均質な顆粒, 2) 顆粒の外周部がわずかに電子密度が高く、内部が低い顆粒, 3) 内部に電子密度の高い塊状物を有する顆粒の3種を区別している。KURTZ(1964)¹²⁾はラットにおいて、RUTBERGの第I, II型に相当するものを記載しているが、第III型については言及していない。WILBORN・SCHNEYER(1970)²²⁾はラットにおいて、電子密度の高いもの、低いものおよび周縁部の電子密度が高く、中心部が低いものを記載しているが、上述のRUTBERGの分類に一致するものとそうでないものとがある。以上のように齧歯類ではほぼ同様の形態を示すが、ハムスターでもRUTBERGの示す三つの型に分類される(図1, 2)。ただし第II型とされるものでは比較的電子密度の高い部分が、ラットおよびマウスでは周縁部に環状をなして見られるのに対し、ハムスターでは顆粒の一端に集まる傾向を示し、環状を呈しない(図2)。齧歯類以外の動物では、MAKITA *et al.*⁷⁾がウマの耳下腺終末部の分泌顆粒は電子密度が高く均質であるがときに中等度の電子密度を示す半月状部が、高い部分に接して見られるとしている。またSHACKLEFORD・WILBORNはウシの耳下腺で電子密度中等度の顆粒と高い顆粒とを区別している。著者はイヌおよびネコの耳下腺では、一般に中央に電子密度の高い輪郭の明瞭な大きい球状の芯を有し、その周囲は電子密度が低く明るい顆粒を見ている。またヤクザルの耳下腺はイヌおよびネコとほぼ同様で、芯状物質の輪郭が明瞭である点では一致するが、その大きさの小さい点では異なっていることを認めている(未発表)。

このように分泌顆粒の形態について見ると、ハ

ムスターと他の齧歯類とは大体似た形態を示すが、齧歯類以外のものとは相違することがわかる。

3. 分泌顆粒とゴルジ装置との関係

分泌顆粒形成については多くの研究がなされているが、唾液腺に関しては単に少数の先人が分泌顆粒とゴルジ装置との関連性を認めているにすぎず、顆粒の形成される過程をつまびらかにしていない。著者がハムスターで観察したところによれば、分泌顆粒第Iおよび第II型では明らかにゴルジ囊の一端と顆粒限界膜とが連なっている像が認められること、および第III型の顆粒もゴルジ装置付近またはゴルジ囊に接している像がしばしば認められることなどから、顆粒はゴルジ装置において形成されると考えられる。なお細胞機能すなわち粗面小胞体におけるリボゾームの合成機能およびゴルジ装置の機能の差異などによって、顆粒の形態的な違いを生ずるのではないかと考える。分泌顆粒の形成について黒住ら(1963)⁷²⁾は次のように述べている。すなわち粗面小胞体より出芽した滑面小胞体はゴルジ小胞に転じ、ついで多くの場合にゴルジ層板を形成する扁平囊に接着してこれに開口する。このようにして粗面小胞体からゴルジ装置に移送された分泌物質はゴルジ膜の機能によって濃縮され、さらに新たに分泌物を添加されて電子密度を増し、扁平囊の末端にたまりこれがちぎれて分泌顆粒となるか(下垂体の場合)あるいは扁平囊が全体として不整形にひろがりゴルジ空胞の形をとったのち、さらに分泌物質によって充実されて完成された分泌顆粒に変わる(脾外分泌腺の場合)という。しかるにハムスターにおけるゴルジ装置を観察すると、その外方(凸側)にはゴルジ空胞、内方(凹側)には多くのゴルジ小胞が分布し、その間に数層のゴルジ囊が位置する関係にある。粗面小胞体の最も近くにゴルジ空胞が位置し、この空胞に空胞状の粗面小胞体およびゴルジ装置に面する側にリボゾームを欠く粗面小胞体の混在しているものが認められる。さらに詳しく調べると空胞状の粗面小胞体がリボゾームを失ないゴルジ空胞化し、これがいくつか融合してついには一つの大きな囊に変わり、これがさらに扁平化する像が追及できる。

HAM(1969)⁷³⁾はゴルジ装置の外側に粗面小胞体由来の小胞が集まってゴルジ嚢を形成するとし、また黒住らは小胞がゴルジ嚢に接着するとしているが、このような所見は著者は観察しなかった。なお著者は粗面小胞体より出芽により小胞が形成される像を見ることができなかった。次にハムスター終末細胞のゴルジ嚢は各層が同一電子密度を示すものではなく、外方から内方に漸次密度が高くなるもので、BEAM *et al.* (1968)⁷⁴⁾も *coelenterate medusa* の胃上皮細胞で同様な像を示している。しかるに著者がハムスターの耳下腺で認めた粘液細胞および Ham の腸上皮細胞で示すものは、その関係がまったく逆になっている。このような違いは細胞の種類の違いまたは機能の違いによるものなのかもしれない。次に著者は終末細胞のゴルジ装置の内方に多数の小胞を認めたが、BEAM *et al.* (1968) も *styla* の卵巣の test cell と *coelenterate medusa* の胃上皮細胞のゴルジ装置内方に小胞を図示している。前者ではその部位における嚢の細断によって小胞の形成されることを示し、後者は嚢から小胞が膨出しているような像を示している。著者はハムスターに関する限り、この部位における小胞は、ゴルジ嚢の形成にあたる要素とするよりは、むしろ嚢から分離された要素であると考ええる。これは形成直後と思われる分泌顆粒中に膜成分の含有せられているものを認めているが、これは小胞由来のものとしか考えられないし、さらに分泌顆粒をいくつかの小胞が取り囲む像が見られることなどから推測される。以上のように小胞はゴルジ装置内方に多く存在し、ゴルジ嚢より形成されると推測されるが、ゴルジ装置の外方および側方にも見られることから、粗面小胞体より由来するものがあるということとは否定できない。

4. ライソゾーム

ライソゾームの形態は多種多様で名称もきわめて多く、小川ら(1970)⁷⁵⁾はライソゾームおよび類似小体34種を記載している。ハムスターではそのうち *dense body* がめだち、数も多く、その形態としては小球状、マユ状、オタマジャクシ状、壺鈴状、環状およびそれらの移行型が認められる。

dense body 以外の形態をとるものとしては、それらよりやや大型で不規則な形態を示し、内部にラメラ状構造物を有するものがある。さらに大きいもので内容が比較的電子密度が均質なものがある。また複雑な構造を示すものがあり、1例ではあるが粗面小胞体を取り囲んだものも認められた。*multivesicular body* もときどき見られるが、このものの形成過程は峽部細胞において追及できた。

これらライソゾームの形態形成に関しては NOVIKOFF らの GERL による形成説があるが、著者の所見では明らかでない。DE DUVE・WATTIAUX(1965)⁷⁶⁾によるとライソゾームの機能を *heterophagy*, *autophagy* の2種に分けているが、唾液腺では *phagocytosis* は認められないし、ライソゾームの形態からも *autophagy* 系のものと推測される。

5. 細胞間の結合

終末細胞間にはしばしば細胞間分泌細管が形成されているが、終末細胞と峽部細胞との間にもこのような像が認められる。細胞間の接着装置としては腺腔側に FARQUHAR・PALARDE(1963)⁷⁷⁾の *junctional complex* が、それより深部には嵌合が形成される。RUTBERG(1961)²⁵⁾はマウスの耳下腺終末細胞間に、TANDLER(1962)⁴⁷⁾はヒトの顎下腺漿液細胞に、吉村・入江(1961)³⁹⁾はイヌの顎下腺粘液細胞間に細胞間隙があるとしているが、ハムスターにおいてはそのような像は認められない。ただし未発表であるが著者はネコの耳下腺には著明な間隙があるのを観察している。

細胞基底の膜陥入はハムスターで SHACKLEFORD・WILBORN(1968)¹⁸⁾が指摘しているように、著者もほとんどこれを認めない。しかしときどき筋上皮細胞の接着面と終末細胞基底の隣接部に嵌合または基底陥入とおもわれるような像が認められる程度であるが、イヌおよびヒトの顎下腺では著明な基底陥入により、絨毛様突起のような形態を示すとされている。

6. 液胞

液胞は、その出現頻度は低い。その内容は電子密度が低く、周囲には比較的電子密度の高い細胞

質が被膜状をなして、細胞小器官が直接接するのを妨げるような関係を示している。しかしときに分泌顆粒および電子密度の低い細胞質の一部が液胞内に突入するような形態も認められる(図7)。液胞の形成については COVELL(1928)⁷⁸⁾, HIRSCH(1931)⁷⁹⁾, RISE(1935)⁸⁰⁾の光顕的研究がある。かれらは膵細胞を pilocarpine による刺激下で観察し、COVELL は zymogen 顆粒の液化によるとし、RIES と HIRSCH とは zymogen 顆粒の coalescence によって形成されるとしている。さらに HIRSCH は zymogen 顆粒の solution と細胞の水分吸収による water vacuole との2種の液胞を区別している。電顕的には PALADE(1959)⁸¹⁾が膵細胞における液胞は zymogen 顆粒の coalescence によって形成されるとし、PARKS(1962)⁹⁾はマウスおよびラットの耳下腺終末細胞では、ある小液胞は分泌顆粒の膨化によるものであり、ある液胞は分泌顆粒からでなく、膜性構造に由来することを観察し、この点に関する限りでは光顕的研究の結果を支持している。しかし電顕的には分泌顆粒および液胞がそのままの状態で放出されたとした先人達の所見には同意しがたく、分泌は両方ともに内容物のみが放出されるのであると PARKS は述べている。

PARKS はまた24時間の絶食後に摂食させ30分経たぬものおよび pilocarpine 注射15分後の耳下腺終末細胞を観察して、液胞に次の3型があることを示している。すなわち(1)分泌顆粒起源のもの、(2)不規則な形態を示し、ゴルジ嚢または同じような構造物の膨化と思われるもの、(3)電子密度の低い細胞質の隆起が液胞内にふくれ出るのである。著者は PARKS の(2)とするものの由来を追及できる所見を得ていないが、同氏の(3)とするものにさらに分泌顆粒がはいり込むような像(図7)を得ているので、液胞の形成には分泌顆粒の関与もあるであろうと考えられる。

次に液胞周囲における細胞質の被膜様の細胞質部については PARKS も記載しているが、このような構造は液胞が細胞頂部に分布するものほど明瞭である。しかし液胞内に分泌顆粒あるいは細胞質の一部が突入するような像を示すものでは明ら

かでない。このようなことから、この被膜様構造物は液胞が細胞頂部に移動するに従って形成されるもので、なんらかの意義があると推測される。

一般に成書によれば生理学的には水分の放出はおもに峽部細胞で行なわれるとしている(河村)⁸²⁾が、液胞の内容は電子密度が低く、水分を多く含むものと考えられるので、終末部からも水分の放出がなされるものと思われる。

7. 絨毛様突起(microvilli)内の細線維

絨毛様突起に細線維がはいって支持の働きをすることは、小腸上皮細胞において一般によく知られている。その他ウシの肝毛細胆管上皮にも細線維があることが報告されている(WOOD 1961)⁸³⁾。唾液腺においても SHACKLEFORD・WILBORN(1969)⁵⁹⁾がウシの耳下腺の終末細胞とオポッサムの顎下腺の終末細胞の絨毛様突起にこのようなものを認めている。このうちオポッサムにおける細線維は一端がデスモゾームにはいるとしているが、これは小腸上皮細胞のものが terminal web を形成する細線維で、一端が intermediate junction に接すとされているのと異なる。著者の場合にはやや不確かではあるが突起の内部に細線維らしきものが認められた。

B 峽部細胞

峽部細胞は他の動物の唾液腺におけると同様に、終末細胞に比較して小型であるが、ハムスターの耳下腺のものでは細胞小器官の発達終末細胞とほぼ同様に著明である。分泌顆粒の含有量が多く、分泌機能が旺盛である。

1. 分泌顆粒の形態

形態は3種に分類できる。すなわちその内容の電子密度が低く均質なもの、著しく高いものとが区別され、その中間型として電子密度の低い内容物中に密度の高い塊状物を含有するものがある。中間型とするものは固定処理による人工産物のように見えるが、分泌顆粒が細胞外に放出され、または類結晶化する過程が追及できるので、細胞の機能による濃縮現象ではないかと考えられる。SHACKLEFORD・WILBORN(1968)¹⁸⁾はハムスターで、終末細胞の顆粒より高い電子密度の顆粒を記

載している。

PARKS(1962)⁹⁾によればラットにおける顆粒も電子密度が高いものと低いものと2種が認められ、それらは均質であるようにいわれている。なお同氏はラットでは終末細胞の分泌顆粒は不均質な内容を示すが、峽部のものは均質であるとしている。しかしハムスターのものは中間型のものが不均質で、ラットの所見とは一致しない。光顕切片でのPAS反応およびtoluidine blue染色による染色性は、峽部細胞の顆粒のほうが終末細胞の顆粒より強い反応を示し、電子密度と染色に対する反応とが一致する。このようなことは終末細胞の顆粒でも同様である。すなわち終末細胞の顆粒第I・II型のものは比較的電子密度が低く、染色性も弱い。第III型のものは顆粒中心部に電子密度の高い部分を有するが、一方PAS反応およびtoluidine blue染色で中心が強陽性の反応を示す顆粒像がしばしば認められるので、このようなものは第III型のものに一致するものと推測される。

顆粒の放出過程は終末細胞のものと異なり、さらに腺腔および管腔に放出された放出物の形態から見て、その内容物も異なるものと考えられる。SHACKLEFORD・WILBORN(1968)¹⁸⁾はこれらについては記載していない。光顕的所見として市川(1961)⁸⁴⁾はハムスターの耳下腺介在部の項で、核上部とくに遊離縁にそって、瀰漫性にPAS強陽性を示す均質無構造の部分が認められるが、遊離縁でこれらが放出されると考えられるような積極的な意味のある所見は認められないとしている。分泌顆粒の形成について見ると、ゴルジ装置の形態および発達も終末細胞と同様であり、同じ形式で形成されるものと考えられる。

分泌顆粒は3種とも常にその内容が線維状化する像を呈するが、これと同様のものがときどきゴルジ装置内方の囊内に含有されているのが認められることがある。これによって分泌顆粒は3種ともゴルジ装置由来であることが明らかである。

2. ライソゾーム

その1形態である multivesicular body については SOTELO・PORTER(1959)⁷⁰⁾が初めて報告し、その後これらの由来についてはゴルジ装置由来の

The Forming Process of Multivesicular Bodies

模型図 1 multivesicular body の形成過程ならびに dense body の分化

Aはゴルジ囊がゴルジ小胞をとり囲み形成されるもので、数字はその過程を示す。

Bは dense body の分化(1→2→3→4→5)を示し、4の長く伸びた亜鈴状の dense body がゴルジ小胞を内部にとり囲んで5aのような multivesicular body の形態をなすことを示す。

もの (BRUNI・PORTER 1965)⁸⁵⁾、細胞膜由来で phagocytotic vesicle を含むもの (ROSENBLUTH・WISSIG 1964)⁸⁶⁾、あるいは核膜由来のもの (KILANSKI・JASINSKI 1970)⁸⁷⁾などが報告されている。著者の所見では明らかにゴルジ装置由来のものであり、その形成過程と思われる所見が得られた。その過程は模型図1で示すようにゴルジ装置内方の最内層のゴルジ囊の一端の屈曲が増してC字形をなし、その内にゴルジ小胞を入れる(図23, 24)。このゴルジ囊の両端が癒着することによって、multivesicular body の形成が完了するものと考えられる。この multivesicular body の形成に関与するゴルジ囊は、他のゴルジ囊とは少し離れた部位を占め、電子密度の高い内容を満す。一方 dense body のいろいろな形態の移行的所見が認められ

るが、模型図1のようにして形態的分化が起こるものと推測される。それらのうちには環状のdense bodyの内部に小胞を有し、multivesicular bodyと同様の形態を示すものが見られる(図7)が、これはmultivesicular bodyの1種で明らかにdense body由来のものと考えられる。しかしこのようなものの形成される過程をたどって見ると、まずdense bodyが比較的ゴルジ装置の近くに分布することが観察されるが、そのうち垂鈴状をなしたdense bodyの両端が癒着、融合すれば上述のような形態のものができる。このようにmultivesicular bodyの膜成分の由来はゴルジ嚢によるものと、垂鈴状のdense bodyによるものとの2系統のものが存在し、内部の小胞はゴルジ小胞由来のものであると考える。

3. 終末細胞の補充

SICHER (1966)⁸⁸⁾は峽部が分泌細胞を含むときはいつでも、その部分と終末部との間の移行は漸進的で、峽部の終末部に近い部分は、基底が好塩性で、頂部に分泌顆粒を有する小型の終末細胞に類似した細胞よりなり、遠位部(線条部に近い峽部)は分泌性のない細胞によってできていると記載している。またPROVENZA (1964)⁸⁹⁾は、峽部細胞の原形質が少ないことは細胞の未分化な状態を示すもので、多くの研究者はこの細胞は破壊されたり、傷ついたりした終末細胞の補充源であるとの見解をもっていると述べている。このように終末細胞の補充については、峽部細胞の分化の程度が低く、これが分化して終末細胞になるという説が一般に受け入れられている。しかるにハムスターの耳下腺峽部細胞は分泌機能ならびに細胞小器官の発達程度から見て、終末細胞と同等かまたはそれ以上の機能を営んでいる像を示し、これが未分化細胞であるとは考えることができない。なお著者は峽部細胞が終末細胞に分化すると思われる像を観察することができなかったが、峽部と終末部との移行部には終末細胞に混じって峽部細胞の存在する像を見ることは珍しくない。

次にSICHERが記載しているように、峽部の遠位部においては無顆粒細胞の存在が認められるが、その出現数はごく少ない。この無顆粒細胞は

明らかに分泌機能を有する近位部の細胞に比較して小型で、細胞質も少なく、細胞小器官の量がわずかである。また線条部に続く遠位部にある峽部細胞のなかには、線条部細胞と同様な小型の分泌顆粒を有するものが見られることから、終末細胞への分化よりもむしろ線条部細胞への分化が想像される。

著者はラットの耳下腺では終末細胞がときどき2核を有する例に遭遇している(未発表)。KURTZ (1964)¹²⁾も同材料で同じ所見を図示しているので、この場合本細胞の無糸分裂による補充の可能性が考えられる。しかしハムスターではこのようなものは見られなかった。しかるにハムスター終末部における基底明調細胞では、1例ではあるが核および細胞体の無糸分裂様像が見られた。なおFERNER・GANSLER (1961)⁹⁰⁾は線条部基底明調細胞の無糸分裂様形態について述べ、この細胞が線条部細胞の補充源の一つになると考えている。一方この種の細胞から終末細胞に分化していくのではないかと考えられる移行像を追及できた(図11, 12, 13)ので、この細胞を終末細胞の補充源の一つと考えることは可能ではないかと思われる。

C 線条部細胞

線条部細胞には基底膜陥入を有する明調細胞と細胞質の電子密度の高い暗調細胞および基底明調細胞の3種が区別される。

線条部の大部分は明調細胞によって構成され、暗調細胞はときどきそれらの細胞間に介在するのが見られる。基底細胞はごく少数と思われ、著者は1例その存在を認めたのみである。WILBORN・SHACKLEFORD (1969)⁶³⁾がオポッサムの顎下腺線条部および導管部で暗調細胞、明調細胞および基底細胞I、IIを区別している。またかれら⁵⁹⁾はウシの耳下腺線条部で明調細胞と暗調細胞とが区別されるとしている。TAMARIN・SREEBNEY (1965)¹³⁾はラットの顎下腺導管部で暗調細胞、基底細胞が区別されるとしている。著者のハムスターの耳下腺における所見では、WILBORN・SHACKLEFORDの示す明調細胞、暗調細胞および基底細胞II型のものとほぼ一致する。かれらは上記の各種細胞間には間隙を有し、その間隙に絨毛様突起を出す像

を観察しているが、ハムスターにおいては終末細胞、峽部細胞および線条部細胞とも著明な細胞間隙を示さなかった。

1. 明調細胞

明調細胞では核上部にゴルジ装置、細胞頂部に小胞状の分泌顆粒が認められるが、峽部細胞および終末細胞におけるように、ゴルジ装置から分泌顆粒が形成されるような像を認めることができなかった。また RUTBERG (1961)²⁵⁾ はマウスで、SCOTT・PEASE (1959)⁴⁾ はラットで、いずれもその線条部細胞のゴルジ装置は分泌顆粒形成に関与しないと述べている。ゴルジ装置の形態も終末細胞、峽部細胞のものと異なり、扁平なゴルジ囊が層板構造をなすような像は認められず、内腔がふくらんだ空胞状のものが数個集まっている形態を呈する。ゴルジ装置の数も少なく、ゴルジ野の形成は見られない。以上のように線条部明調細胞に見られる分泌顆粒の形成由来に関しては明らかでなく、今後の研究に期待される。なお分泌顆粒と zonula adhaerens (intermediate junction) に一端が付着する線維束およびアポクリン分泌様分泌との関係については後述する。

2. ライソゾーム

ライソゾームがしばしば分布するのが見られるが、大部分は終末細胞および峽部細胞におけると同様の類似小体、すなわち dense body であり、比較的大きい形態のものが観察される。TAMARIN・SERRBNY (1965)¹³⁾ は dense body または composite body の出現は、蛋白質吸収および細胞内消化の機能を有することを示すものであるという STRAUS (1964)⁹¹⁾ の説を記述している。

3. 基底陥入

細胞基底部分には RHODIN (1954)⁹²⁾ が初めてマウス腎尿細管の細胞で示したような、著明な基底細胞膜陥入が見られ、他の諸種のホニュウ動物唾液腺で報告されているものと変わらない。隣接するこの種の細胞の側面にデスモゾームが見れ、さらに基底細胞膜陥入によって区画された細胞質部分に明暗両部が認められる (図31)。

RHODIN (1954)⁹²⁾, 1959⁹³⁾ は基底細胞膜の陥入は隣接細胞の突起の指状嵌合であると述べている

が、著者の上記の像はこれに一致するもので、明暗部は隣接細胞突起の一部が混在した像であると解される。このような形態は他の多くの先人の研究成果にも一致する。陥入膜間には糸粒体が豊富に存在し、陥入膜と糸粒体が密接な関係を有することを印象づける。糸粒体の形態は、TANDLER (1963)⁴⁸⁾ によればヒトの顎下腺線条部では桿状であるとしているが、ハムスターでは球状のものが多く、桿状のものは比較的少なくておもに基底膜に接する層に存在する。

基底陥入膜の一端に連鎖状にならぶ小胞がときどき見られる (図32)。この連鎖状小胞は TANDLER (1963)⁴⁸⁾ も観察し、PAPPAS・SMELSER (1958)⁹⁴⁾ が網膜細胞で観察したものと同一であるとしている。小胞は陥入膜の崩壊によるともいわれ (PAPPAS・SMELSER 1958)、出芽法により形成される (TANDLER 1963) という説もある。著者の像も Tandler と同様であるが、それが上記二つの様式のうちのどの方法によって由来するのか明らかでない。

次に細胞基底部分に数個の大きな液胞状のものが出現することがある。このようなものには糸粒体は見られず、電子密度が低く、一見したところでは何か細胞外の構造物のように見えるが、詳しく観察するとこれらのものの現われる領域は明らかに細胞膜に包まれ、少数ながらも遊離のリボゾームが散在している。なお細胞膜は他の細胞と同様の介在層を介して基底膜に接するが、この液胞状物の形成は隣接する細胞数個に同時に現われるものでハムスターだけでなく、ツバイの耳下腺と顎下腺とでもときに見られる。

PEASE (1956)⁹⁵⁾ は基底陥入に関して、これはイオン、水分の運搬にあずかるものであろうと推測し、TANDLER (1963)⁴⁸⁾ もこれに同意して、連鎖状小胞の出現は膜活性を意味するものであろうとしている。著者も上記の像および連鎖状小胞の出現は膜機能の所産と考える。

このような明調細胞の基底細胞膜の機能に対して、一方細胞頂部でも分泌顆粒、アポクリン分泌様形態が認められるので、明らかにこの細胞は分泌機能を有すると考えられる。しかしこの細胞は

山元の述べるような形態において吸収細胞様の形態を有するといえる。山元(1970)⁹⁶⁾は遊離表面の絨毛様突起, 細胞側面の嵌合, 細胞基底の細胞膜の陥入, 絨毛様突起直下の小胞, dense body, 遊離縁直下の中心子, 基底細胞膜と糸粒体の特異な分布などをあげて吸収細胞の特徴としているが, 線条部明調細胞にこのような特徴のおおのおおを認めることができる。また TAMARIN・SREEBNY (1965)¹³⁾はラットの顎下腺線条部で細胞頂部に小胞と細胞膜とが連続して pinocytotic activity のあることを支持する像を記載している。また緒方(1939)⁹⁷⁾は線条部における parotin の再吸収性を実験的に証明して(光顕的に), 吸収説をたてている。さらにこれに関して電顕的にも関(1959⁹⁾, 1960³⁸⁾, 1961⁷⁾), 滝沢ら(1957)⁹⁸⁾, 野口(1968)³²⁾等の研究があり, 吸収機能のあることを考えている。著者の所見では細胞頂部に小胞は認められるが, TAMARIN・SREEBNY のような pinocytotic vesicle を直接見ることはできなかった。しかし上述した細胞の諸形態から推測して何か吸収機能をもっているのではないかと推測されるけれども明らかな像を認めることはできなかった。

4. 暗調細胞

暗調細胞は耳下腺においてはウシにのみその報告があるが, オポッサムの顎下腺のものと形態がよく似ている。暗調細胞は一般に人工産物によるものであろうという考えがある(ICHIKAWA, 1967)⁹⁹⁾が, 著者の得たものは特殊な形態をもっていることから, 単なる人工産物によるものではなく, 明調細胞と区別されるべきものと考ええる。この暗調細胞は明調細胞と同じく zonula adhaerens に付着する線維束をもっていると同時に, 峽部細胞のものとよく似た分泌顆粒を有することがある(図35)。以上のことからこの細胞は峽部細胞が明調細胞へ分化する途中の形態の細胞であるか, あるいは両種細胞の性状を兼ね備えた細胞のようである。

5. 基底明調細胞

PARKS (1961)⁶⁾によればマウスの耳下腺の峽部と終末部の基底膜と上皮細胞との間には明調細胞があるが, このものは終末部では分泌細胞でな

く, 神経でも, 筋細胞でもなく, 筋上皮細胞, 峽部細胞または終末細胞へ移行する細胞であろうという。PROVENZA (1964)⁸⁹⁾は峽部には籠細胞, 基底細胞が見えろとし, WILBORN・SHACKLEFORD (1969)⁶³⁾はオポッサムの顎下腺の線条部および導管部で2種の基底細胞を区別している。

このように諸氏によって基底細胞または明調細胞と称せられるものは終末部, 峽部, 線条部および導管部の各部位に存在することが報告されているが, それらに共通する点は未分化な形態を示すことである。なお基底細胞または明調細胞といわれるものは同一物と考えられるので, 著者はこれを基底明調細胞とした。著者は終末部の基底明調細胞に FERNER・GANSLER と同じような分裂像と思われるものを認めたが, さらにこれらの細胞の細胞質が少量であることから未分化なものと考ええる。このようなものにしだいに粗面小胞体が出現, 増大し, 糸粒体も増加し, ゴルジ装置が出現することなどに伴って細胞体が大きくなり, 終末細胞基底部に位置していたものが細胞間に深くはいり込み, 細胞頂部を腺腔に近づけるというような細胞分化の過程が追及できた。

以上の事実に基づいてこの細胞を終末細胞の補充細胞に相当するものではないかと考える。また峽部および線条部に認められたものは, その分化過程を追及することはできなかったが終末部におけるものと同様な意義を有するものと推測する。

D 耳下腺終末部粘液細胞

この細胞は終末細胞(漿液細胞)とは混在せず, この種の細胞のみからなる終末部を形成して, 耳下腺峽部に連なり, 峽部細胞とはデスモゾーム, 嵌合などによって接することが認められた(図15)。この細胞は(図14, 15)終末細胞より大きく, 分泌顆粒は電子密度の低い均質な内容を有し, 平均2.6 μ 程度で大きい。また粗面小胞体の内腔が広がり, うちに比較的電子密度の高い物質を含むこと, さらにゴルジ装置のゴルジ嚢内の電子密度が内方よりも外方のものが高く, 終末細胞および峽部細胞におけるものと反対であるなどの特徴がある。なおこの種の細胞の細胞は耳下腺では常在性のものではなく, 電顕的には1個体にだけ見られたが,

光顕的には他の個体についても見つかったもので、それほどまれなものでもないようである。

この粘液細胞(MC₁)の形態を舌下腺の粘液細胞(MC₂)のそれと比較して見ると、その粗面小胞体が扁平で、囊内の電子密度が低い点ではむしろ耳下腺終末細胞と峽部細胞とにおけるものに似ている。また(MC₂)ではゴルジ野を形成する像はあまり認められないが、(MC₁)ではしばしば見られる。さらに糸粒体は(MC₁)では(MC₂)よりもかなり小さいなど以上の三つの特徴から(MC₁)は舌下腺のものと明らかに相違する。一方、(MC₁)細胞はあらゆる点で眼窩外涙腺(側頭筋上にある純粘液腺, exorbital lacrimal gl.)細胞に似ており眼窩外涙腺の細胞が混在したかのような感じをいだかせる。

漿液性終末部に粘液細胞の出現することに関しては、市川(1961)⁸⁴⁾が齧歯類の顎下腺の光顕的研究に際して、ハムスターにこの種の細胞の出現することを報告しているが、これは大舌腺終末細胞と一致した特徴を有し、また顎下腺終末細胞とは endocomplex を形成しないことなどから、発生途上に大舌下腺原基の迷入混在したものであろうとしている。加藤(1957)¹⁰⁰⁾はイヌの耳下腺において粘液終末部が常在性であるかのような記載をしている。著者ら(1969)¹⁰¹⁾はネコ、ハムスター、モルモットの耳下腺において、この種のものの出現することを報告したが、イヌでは必ずしも常在性とは限らないもののようで、十数例の観察ではそのようなものに遭遇していない。またこの種の細胞は mucicarmine, PAS に強陽性を示し、強酸に対する反応も陽性に現われる。さらに著者はネコ耳下腺終末部粘液細胞を電顕的に観察しているが、これらの細胞はすべて市川が報告したとおり、終末細胞とは endocomplex を形成していない。このものの由来については、耳下腺の場合市川の考え方では説明できない。またハムスターの場合、眼窩外涙腺とこの粘液細胞との類似性がきわめて高く、その迷入を思わせるが、ネコ、モルモットでは眼窩外涙腺に相当するものがないにもかかわらず、耳下腺にかなり多くの漿液性終末部が出現することは、以上の考えでは説明できない。

E 筋上皮細胞

筋上皮細胞の分布はハムスターの耳下腺では終末部と峽部とにのみ見られ、他の部分には存在しない。TAMARIN(1966)¹⁴⁾はラットの顎下腺に存在する筋上皮細胞についての詳細な報告をしているが、その分布は峽部、終末部で見られ、他の部分では見られないとしている。さらにこの細胞は終末部の12%を、峽部の40%を、また小葉の実質細胞の9%を占めていているとしている。PARKS(1961)⁶⁾は Wister 系ラットの耳下腺では、終末部と峽部とに筋上皮細胞が存在するとしている。しかし SCOTT・PEASE(1959)⁴⁾はラットの舌下腺および顎下腺の終末部においてはこの細胞の分布が見られるが、耳下腺終末部には存在しないとしている。

筋上皮細胞の機能として、収縮によって腺細胞を圧迫する作用が考えられているが、この作用について吉村ら(1961)³⁹⁾はイヌの顎下腺で pilocarpine 注射後、粘液細胞間の間隙が増大し、筋上皮細胞が収縮することを示している。著者の所見では分泌途上の細胞に接する筋上皮細胞および細胞間隙などの変化は、他の細胞との比較において認められなかったし、同様に藤田ら(1964)⁴¹⁾もイヌ顎下腺で副交感神経刺激時の細胞でも変化が認められなかったとしており、直接分泌物排出に関与するか否か、著者の所見では明らかでない。

F 峽部細胞における類結晶(crystalloid)

唾液腺における類結晶の出現については次のような報告がある。1) SCOTT・PEASE(1964)¹⁰⁾がラットの耳下腺終末細胞において、2) TANDLER(1965)⁵⁰⁾がヒトの顎下腺線条部管腔内において、3) LUZZATTO *et al.* (1968)¹⁷⁾がラットの顎下腺終末細胞において、4) HARD(1970)²⁰⁾がラットのエブネル氏腺細胞において報告している。HARDのは腺細胞の dense body 内に結晶様構造を認めての記載であり、これはイヌの脾細胞において WATARI *et al.* (1968)¹⁰²⁾が、ライソゾームによって形成されたとして示した類結晶と同じような形成様式によるものと思われる。著者も終末細胞のライソゾーム中に、WATARI *et al.* の示した種々の類結晶の一つに似たものを認めた。TAN-

The crystalloid forming process of the substance
in the secretory granules in the intercalated duct cell

模型図 2 峽部細胞における分泌顆粒内容の類結化の過程。

1. の A・B は分泌顆粒の 2 型を示す。2. は顆粒内容の濃縮。3. は濃縮されたものの内に類結晶の核ができることを示す。4. は類結晶の成長を示し、 $a \rightarrow b \rightarrow c$ の順に顆粒成分が減少し類結晶が大きくなる。5. は類結晶の種々の形態を示し、数字は面角を示す。

DLER の類結晶は管腔内のものであって一般に細胞内においての報告であるのと比べて趣きを異にする。なおその類結晶は dentine のアパタイト結晶に類似するとしている。LUZZATTO *et al.* のものは明らかに分泌顆粒内成分が結晶化したものであるが、その形態は著者のもの異なることが確かである。SCOTT・PEASE の終末細胞内で認められた類結晶と、著者の峽部で認めたものとは形態的に類似する。SCOTT・PEASE は分泌機能を実験的に高めたときの細胞変化を研究した際にこの類結晶を認め、その形態を dense rod と表現したが、それらは層板構造をなして配列する粗面小胞体間に存在する像を示している。しかしそのような類結晶に発達するまでの過程の像は示されていない。著者は類結晶の形成過程を追及するに足りるいろいろの像を得ることができたので以下これについて詳述する。

模型図 2 に示すように形成過程を 4 段階に分け

た。類結晶は明らかに分泌顆粒に由来するもので、その顆粒内容物の結晶化といえることができる。第 1 段階：分泌顆粒には電子密度が高いもの (B) と低いもの (A) との 2 種を区別しているが、両者ではこの段階で内容物が濃縮化され、顆粒の外形も少し変化するものもある。第 2, 3 段階：(A) 顆粒の一端に濃縮し結晶化された物質の一部が存在するものが現われる。このような状態のものが完成された類結晶となるための結晶成長の核になるものと推測される。第 1 段階として示した顆粒の多くは、電子密度の高い (B) 顆粒が濃縮化されてできたものであり、このような電子密度の高い顆粒は結晶化されにくいようである。第 4 段階：核となった結晶の成長過程を示すもので、 $a \rightarrow b \rightarrow c$ の順に結晶が成長する。結晶成長には顆粒内成分が関与し、成長が進むにつれてそれは減少し、それとともに顆粒の囊が小さくなる。顆粒の限界膜は、 $a \rightarrow b \rightarrow c$ の過程で示すように結晶化が進み、結晶化してない成分が減少するに従い、消失するように見られるが、結晶面に密着しているものと推測される。

SCOTT・PEASE は類結晶の形成には蛋白質を産生する粗面小胞体が関係するとし、Palade がモルモットの膵細胞では zymogen 顆粒形成がすでに粗面小胞体内で行なわれるとしている知見に基づいて、かれらの見ている囊状粗面小胞体の間に出現する類結晶も、それと同様に小胞体内で形成されると考え、分泌顆粒の変形体様のものとみなし、さらにこれは lipoprotein であると記載している。しかし著者の得た類結晶は、ゴルジ装置を経由して形成された分泌顆粒内に現われるものであり、PAS 染色に対して強い陽性を示すことから、明らかに多糖類成分を含む glycoprotein と考えられ、SCOTT・PEASE のものとは形成様式も成分も異なるものである。唾液腺以外のものについて報告されている類結晶の由来については多くの可能性が示されている。すなわち FAWCETT (1966)¹⁰³⁾ によれば類結晶は細胞のあらゆる成分中に出現するもので、たとえば核、糸粒体、粗面小胞体ゴルジ装置および分泌顆粒中に封入されて、あるいは細胞基質内に遊離して認められ、こ

の成分は一般に蛋白質性であるとしている。

類結晶の機能的意義について, HAMILTON *et al.* (1966)¹⁰⁴⁾ はサンショウウオの肝細胞形質内の類結晶が季節的に消長することを認め, 食物の少ない季節に対する栄養分の貯蔵と考えている。また柴田 (1967)¹⁰⁵⁾ もマウス 脾細胞形質内の類結晶については栄養分貯蔵の一つの型としている。著者の見た類結晶は前述のとおり, 顆粒そのものが類結晶化したもので, このようなものは1個の細胞内に1ないし数個見られる場合がある。その出現の意義については断言できないが, 排出機能の低下によって顆粒成分の濃縮が起こり, そのような形態の出現をきたすのではあるまいか。すなわち類結晶は貯蔵的なものではなく, (A), (B) 顆粒と同じように, 比較的短時間で崩壊して細胞外に放出されるであろう。

G 分泌顆粒の放出

1. 終末細胞

分泌顆粒には, 全体が明るいもの, 周辺部の一部にやや電子密度の高い部分を有するもの, 顆粒中心部に電子密度の高い部分を有するもの等があり, それらの関係は別種のものではなく, 内容的に移行型が見られ, 同一系統のものである。これらの顆粒中, 全体が明るい内容からなる顆粒間にはしばしば融合が認められるので, 分泌顆粒の内容物は比較的流動性に富むと考えられる。下垂体細胞において分泌顆粒が細胞外へ放出された後も球状形態を保っている像が示されており (黒住 1968)¹⁰⁶⁾, 細胞外への放出直後ではまだ顆粒はゲル状をなして形がくずれないものと考えられる。このような形態はヒト顎下腺漿液性細胞の分泌顆粒においても認められている (SATO *et al.* 1966)⁵²⁾。すなわちこの分泌顆粒は一般に中央に電子密度の高い輪郭のはっきりした球状の芯 (core) を有し, 周囲は比較的明るい物質からなる卵形の顆粒であり, 分泌顆粒は黒住のIV型 (emiocytosis)¹⁰⁷⁾ で放出されるが, 腺腔および細胞間分泌細管内に球状の芯の部分がそのまま認められる。この形態は著者もヒトの顎下腺で認めている。またツパイの顎下腺漿液細胞の顆粒もヒトの顎下腺のそれと同様に芯を有し, その芯の部分が腺腔および細

胞間分泌細管に認められた (峯田1970)¹⁰⁸⁾。ハムスターの耳下腺ではこのような形態のものが腺腔などには認められないし, また齧歯類のものでそのような形態のものが腺腔および分泌細管には認められていない。それゆえ顆粒の内容物は上記のものとは異なる性状のものと考えられる。

分泌顆粒はいわゆる黒住の放出機序の分類におけるIV型 (emiocytosis)¹⁰⁷⁾ に属するものと考えられるが, ときに細胞膜に接した後, 細胞膜が腺腔に向って突出していく像が見られ, これは一見して microapocrine (黒住のIII型)¹⁰⁷⁾ を思わせる。分泌顆粒の放出に先だって, しばしば腺腔近くの顆粒が液胞の内腔に突入する像が見られ, 液胞に顆粒内容物が融合するものと思われる。この液胞も黒住のIV型によって放出される。

このように終末細胞では液胞と分泌顆粒の二つの分泌が見られ, 顆粒成分は2系統の放出法を有する。すなわち顆粒自身の放出と液胞を介しての放出とである。

2. 峽部細胞

峽部細胞の分泌顆粒の放出様式は emiocytosis (黒住のIV型)¹⁰⁷⁾ に一致するが, 放出物そのものの点で異なる。すなわち下垂体, 脾細胞では分泌顆粒の形成初期または成熟した形のものが, そのままの状態を有しながら放出されるが, しかしこの峽部細胞の場合では, 分泌顆粒が細胞頂部に移動するまでに, 顆粒形態およびその内容物が変化して線維状物を含む液胞状になる点が著しく趣きを異にしている。その放出過程は模型図3に示すとおりである。分泌顆粒にはAに示すように均質な比較的低い電子密度を有するもの(a), 電子密度の非常に高い塊状物によって満されているもの(b)およびそのような成分の比較的少ないもの(c)の3型を示しているが, これらはおのおの顆粒内容物が水分を吸収し, 融解またはゾル化することにより, Bで示すような部分的線維化を生じる段階が見られる。なお顆粒が水分を吸収することの可能性は, 顆粒限界膜がゴルジ装置由来のものであり, ゴルジ装置は一般に水分調節にあずかるという知見のあることから理解し得る。このように線維状化した内容を有する顆粒は球状から

The excretory process of the secretory granules in the intercalated duct cell

模型図 3 峽部細胞における分泌顆粒の放出過程。
Aのa, b, cは分泌顆粒の形態を示す。BはAにおける分泌顆粒の内容が部分的に線維状化する段階を示すもので矢印はその過程を示す。Cは分泌顆粒が液胞状となり、それらが互いに癒着、融合し大きくなることを示す。Dは放出像を示す。fR: 遊離のリボゾーム, rR: 粗面小胞体, Mit: 糸粒体。

その形が変じ、著しいものは液胞状となる。この液胞のまわりには PARKS (1962)⁹⁾ が認めたように、粗面小胞体、遊離のリボゾームなどの細胞小器官が密接せず、細胞質の薄層によって被覆されたような状態を呈する。このようなものは細胞頂部においてさらに著明に見られる。次の段階としてCではこれらの液胞状をなす顆粒が互いに接して融合し、大きくなる傾向を示す。さらにDに示すように細胞頂部の細胞膜に接し、emiocytosisに従って管腔に放出される。

以上のようにA→B→C→Dの過程をとって放出されるのであるが、このような経過を示す分泌様式は特異なものではないと思われる。

3. 線条部明調細胞

線条部明調細胞には第3章 E-1 で述べたような各種の形態が認められたが、小胞状の顆粒の分泌機序として明らかな管腔への放出像は見られず、(1)この顆粒の出現、増加、減少と、(2)細胞頂部の bleb または ballooning 化および(3) intermediate junction に付着する細線維束の3者の

間に密接な関係が認められた。小胞状顆粒については RUTBERG²⁵⁾ はマウスで、分泌顆粒というよりは吸収を明示するものであろうとし、さらに放出像および管腔内に分泌顆粒が見られないことから、放出前に崩壊されるのではないかともいっている。bleb 様突起の出現については PARKS⁹⁾, TAMARIN・SREEBNY¹³⁾, SHACKLEFORD・WILBORN⁵⁹⁾, KURTZ¹²⁾ も線条部細胞でこれを認め、PARKS⁹⁾ は bleb が細胞から分離して唾液の一部になると述べている。このようなことから小胞状顆粒は放出前に崩壊し、bleb 様突起形成に参加し、アポクリン分泌様機序により放出されるのではないかと推測される。

この仮説により、種々の形態を示す細胞を細胞の機能およびアポクリン分泌様活動における一時期のものであるとすると、模型図4のような secretory cycle が考えられる。この図により著者はハムスターの耳下腺線条部細胞の細胞機能を説

The secretory cycle in the striated duct cell

模型図 4 線条部明調細胞の分泌周期の形態

Aが静止期のもので一周期として、A→B→C→D→E→I→Aの過程をとるが、細胞の機能によっては、A→B→C→D→E→F→G→H→C→D→E→Aという過程をとる。Ga: ゴルジ装置, m: 糸粒体, if: 基底陥入, zo: zonula occludens, za: zonula adhaerens, ma: macula adhaerens, sg: 分泌顆粒, sz: 細線維束 (separating zone), mv: 絨毛様突起, Ap: アポクリン分泌様突起。

明すると、それぞれの実像もこの図とほぼ一致する結果となる。A細胞は細胞分泌機能の静止期に相当し、細胞頂部に整然と絨毛様突起を有することが特徴である。分泌活動が始まると小胞状の顆粒が細胞頂部に集積してくる。それらの顆粒の崩壊、融解することにより徐々に絨毛様突起の消失とアポクリン分泌様突起の形成増大が見られる(B→C→D)(図26, 27, 28)。

D細胞(図27)において、アポクリン分泌様突起がより増大すると、その基部に intermediate junction (za)に付着する細線維が伸び、これと同時に分泌顆粒間に細線維束の新生が行われる。この細線維束について KURTZ (1964)¹²⁾ は band-like structure と記載し、TAKANO(1969)⁶¹⁾ は反すう動物の唾液腺において發育可良であることを認め、separating zone という名称を与えている。また黒住ら(1961)¹⁰⁹⁾ はイエウサギの顎下器官の細胞におけるアポクリン分泌の像を認め、この場合もまた突起の基部に現われる電子密度の高い部分に demarcation zone という名称を与えている。しかし顎下器官におけるものは唾液腺の細線維束のように著明ではないようであり、著者は以後 separating zone という名称を採用する。

E細胞は分泌突起が離する像であるが、この時期のものは separating zone が細胞頂部を連続して横切り、最も著明な像を呈する時期である。その後細胞の分泌機能が低下すれば I細胞(図26)の時期となり、separating zone は中央部付近から消失し、細胞頂部には絨毛様突起の形成が始まる。しかし分泌顆粒は出現しない。さらに Separating zone の消失が進み絨毛様突起が形成されて、A細胞のような形態になり、静止期となる。

一方、E細胞における分泌物の離出が行われた後、分泌機能が旺盛なものはF細胞(図30)のように separating zone 直下に分泌顆粒が集積する。separating zone が離断され消失していくに従い、分泌顆粒は細胞頂部に移動し、G細胞(図29, 30)の様相を呈する。

H細胞ではすでに separating zone が消失し、わずかに intermediate junction の部分にだけその存在が認められ、分泌顆粒は細胞頂部に集積す

る。このような過程を経てきた細胞頂部には絨毛様突起は形成されない。次いでC細胞→D細胞→E細胞のような順序で形態の変化が行なわれていく。分泌機能の旺盛な細胞も終局的には静止期A細胞になるのであるが、その静止期にはいるためには必ずEからIを経ることが必要である。

線条部明調細胞は以上のような分泌周期を示すが、これを要約すると、1分泌周期としてA細胞からB→C→D→E→I→A細胞という経路をとるが、分泌機能が旺盛な場合では、A細胞→B→C→D→E→F→G→H→C→D→E→という過程をとる。

分泌周期と関連して発達、衰退を示す separating zone に関しては高野(1969)⁶¹⁾ のウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジにおける報告、KURTZ(1964)¹²⁾ のラットにおける band-like structure の記載があり、RUTBERG (1961)²⁵⁾ はマウス耳下腺の線条部で形成可良な separating zone に相当する像を掲載している。また著者¹⁰⁸⁾ の観察したツパイ顎下腺線条部細胞においても separating zone が見られ、少なくともマウス、ラットの耳下腺とツパイの顎下腺のものでは、ハムスターの耳下腺線条部で見られる分泌周期と同様な傾向が認められる。以上のようなアポクリン分泌様分泌、または細胞質の突起(bleb, ballooning)の出現や離断については、標本作製上の人工産物の可能性を重視し、このような細胞においてはあり得ないと考える傾向があるが、唾液腺の線条部細胞においては多くの研究者が bleb, ballooning 様突起を認め、他の峽部、終末部の細胞においてはその報告例がない。このようなことは細胞の形態または細胞の性質による差異によるものかも知れないが、明らかでなく、その究明は今後の研究によらねばならない。

H 終末細胞および線条部細胞における横紋を有する細線維束。

横紋を有する細線維束は終末細胞(図9)および線条部明調細胞(図27)において各1例を得たのみであるが、このものは電子密度の高いはっきりとした横紋構造を有し、それらの間隔は等しく800~900 Åである。線条部におけるものでは明らかでないが、終末細胞におけるものでは、それらの横

紋構造の間にさらに1~3本のより細い横線が認められる。このような構造はコラーゲン線維を思わせるが、コラーゲン線維の横紋は640 Å 間隔とされており、著者の得た同線維の像からも600~700 Å という結果が得られており、前述の2例のものに比べると横紋の間隔が小さい。

また線毛が尿細管、甲状腺、膵島β細胞ならびに腺細胞、下垂体細胞、線維芽細胞および筋細胞で認められており(武田1965)¹⁰⁰⁾、このものの根小毛も横紋を有することが知られている。しかしこれは400~600 Å の間隔とされており(橋本1968)¹⁰⁰⁾、著者の得たものよりはより小さい。このようなことから著者の細線維束はコラーゲン線維および線毛の根小毛とは明らかに異なるものである。

この細線維束は細胞のトノフィラメントまたはその集束が散在する中に存在し、それと同種のものと考えられる。しかし著者の知るかぎりではこのトノフィラメントが横紋を有する線維束を形成するという報告を見ない。BRODY(1960)¹¹¹⁾がトノフィラメントの線維間に線維間物質が現われる像を斑点状構造(speckled pattern)と称しているが、それとは明らかに異なるようである。

I nuclear body

核内構造物または核内封入体としての nuclear body は De THE *et al.* (1960)¹¹²⁾によって初めて発見された。次いで HINGLARI *et al.* (1961)¹¹³⁾の報告があり、WEBER *et al.* (1963)⁶⁹⁾がウシの種々の実質細胞および精巢間細胞において発見し、nuclear body という名称を与えた。それ以後この種の形態のものにはしばしばこの名称が使用されている。そのほかの核内封入体としては、山田(1965)¹¹⁴⁾が、グリコーゲン、類結晶、脂質顆粒、ヘモグロビン等を記載しており、ビールス封入体(GRANBOULAN *et al.*)¹¹⁵⁾なども知られている。唾液腺における封入体の報告は少ないようで、著者の知る限りでは次の2編があるだけである。すなわち TANDLER *et al.* (1969)⁵⁷⁾がヒトの口唇腺終末細胞で、SHACKLEFORD・WILBORN (1969)⁶⁰⁾がウシの顎下腺で報告しているだけである。TANDLER *et al.* は32例の biopsy のうち16

例に封入体を認めた。大きさは約1.0 μほどで、単層の膜に囲まれた球形であり、その染色性はエオジン好性で、それらのうちあるものは Nile blue sulfate 陽性、PAS 陽性であるが、Feulgen 反応は陰性であるとしている。SHACKLEFORD・WILBORN はかれらが得たものを nuclear body であるとしている。

nuclear body が発見され、命名されて以後、WEBER *et al.* (1963)⁶⁹⁾はウシの副腎細胞において、KRISHAN *et al.* (1964)¹¹⁶⁾はヒトおよびハムスターの tumor を有する状態の胸腺、脾臓、リンパ節などにおいて、ISHII・MORI(1969)¹¹⁷⁾は正常マウスのリンパ節において、BOUTEILLI *et al.* (1967)¹¹⁸⁾はヒトの grija tumor, encephalitis, bronchial tumor のもの、ハムスター頬嚢の carcinoma など種々の病的細胞において、POPOFF *et al.* (1968)¹¹⁹⁾はハムスターの脳において、それぞれ報告している。

BOUTEILLI *et al.* は nuclear body を5種類に分け、POPOFF *et al.* および ISHII・MORI は3種類に分類している。BOUTEILLI *et al.*, POPOFF *et al.*, ISHII・MORI は大きさと形とを組合せて分類している。著者も3種類の Type に分類することができたが、このものの由来、機能的意義などについてはほとんど明らかでないので、単にその形態的なものを分類の基準とした。Type I は細線維物質またはその構成要素の形状のはっきりしない物質が球状を示すもの(図3)、Type II は細線維が環状を呈し、その中心部に特別な物質を認め得ないもの(図4)、Type III は Type II の中心に電子密度の高い顆粒状物質を有するものである(図5)。

大きさは Type I が最も小さく、Type III が最も大きい傾向を有するが、Type II, III では種々の大きさのものがある。これらの nuclear body の出現頻度はきわめて高く、全例において見られ、なかでも Type I が最も多い。Type III はきわめて少なく、数個の細胞で見られたのみである。この所見は ISHII・MORI, BOUTEILLI *et al.* の報告と一致する。また TANDLER *et al.* (1967)⁵⁷⁾は核内封入体として最も一般的なものは nuclear

body であるとしているが、唾液腺では著者の知るかぎりでは、SHOCKLEFORD・WILBORN の報告があるのみである。しかし著者の検索した資料ではハムスターを初め諸動物（ニホンザル・ツバメ、ラット、イエウサギ、アブラコウモリなど）の唾液腺の諸種の細胞においてもこのものは広く存在するものと思われる（未発表）。

この構造物についての意義および機能については今までのところでは明らかでないが、その出現を認めた報告では、病的あるいは正常状態の動物、正常とみなされた組織、病的あるいは正常細胞においてなど種々である。

nuclear body の組織化学的研究が光顕的になされているが、このものはDNAを含まず(FROELICH *et al.* 1965)¹²⁰⁾、PAS 弱陽性、Feulgen 反応陰性(WEBER *et al.* 1965)¹²⁷⁾であるなどの報告がある。また ISHII・MORI は Type III の中心部に存在する電子密度の高い顆粒は、酢酸ウラニウムに強く染まり、クエン酸鉛で明るく染まることから、それらの染色性と核構成成分の染色性との比較により、核の顆粒成分または interchromatic granule によく似ており、クロマチンとは異なるとしている。

著者も電子染色の点では同氏らと同じ所見を得たが、さらに顆粒の大きさ、形からすると CARAMIA *et al.* (1967)¹²¹⁾ がヒトの肝細胞核で示した glycogen body の glycogen 顆粒を思わせるものをも認めた。nuclear body の線維性成分に関しては、KRISHAN *et al.* が DNase, RNase では消化されないが、trypsin 処理で消化されることを認め、蛋白質からなることを報告している。著者の場合は唾液腺細胞の nuclear body であるが、その線維成分も同氏らの所見と一致するものではないかと考える。以上のことから nuclear body の Type I は蛋白質からなり、Type II は蛋白質性の線維成分と核成分としての顆粒成分または interchromatic granule からなり、Type III は蛋白質性の線維成分と核内顆粒成分または interchromatic granule および glycogen 様物質などから構成されているものと推測されるが、正確なことは今後の研究にまたなければならない。

J 神経終末

腺細胞と神経終末との関係については、光学顕微鏡的に古くから諸種の動物の唾液腺について多くの研究がなされているが、電顕的には(I型)神経終末が腺細胞に200~250 Åの間隙をおいて直接接するものと、(II型)基底膜外に終って腺細胞に直接接しない(間隔0.1 μ以上)のものとの報告されている。(I型)については次のような報告がある。SCOTT・PEASE(1959)⁴⁾はラットの耳下腺と舌下腺とでは神経終末が直接細胞に接するが、顎下腺では認められなかったとしている。入江(1960)³⁷⁾もイヌの顎下腺粘液細胞間に異質の原形質部分が介在するが、これは神経線維の末端であろうと述べている。RUTBERG(1961)²⁵⁾はマウスの耳下腺において、KURTZ(1964)¹²⁾はラットの耳下腺、顎下腺および舌下腺のうち耳下腺だけで、SHACKLEFORD・WILBORN(1968)¹⁸⁾はハムスターおよび antelope-squirrel の耳下腺で、TANDLER(1965)⁵⁰⁾はヒトの顎下腺で、WILBORN・SHACKLEFORD(1969)⁶³⁾はオポッサムの顎下腺の粘液細胞間だけで、TANDLER・ROSS(1969)⁵⁸⁾はヒトの口唇腺で、それぞれ(I型)の神経終末について観察している。さらに HARD(1970)²⁰⁾はラットのエブネル氏腺で2個の終末細胞と筋上皮細胞とに同時に接する神経終末と導管上皮細胞に接する像とを認めたと報告している。加賀山(1970)¹²²⁾はサルの顎下腺粘液細胞と筋上皮細胞とに接する像を認め、また彼⁴⁵⁾はネコの顎下腺でも同様に粘液細胞と筋上皮細胞とにのみ直接接する像を報告している。

一方、PARKS(1961)⁶⁾はラット、マウスの耳下腺で、藤田ら(1964)⁴¹⁾はイヌ顎下腺で、GARRETT(1966)⁴⁴⁾はネコの大唾液腺で、TAMARIN *et al.* (1964)⁴¹⁾はイヌの顎下腺で、GARRETT(1967)⁵³⁾はヒトの耳下腺および顎下腺において、それぞれ(II型)は認められるが(I型)は認められないと報告している。

以上のことから大多数の唾液腺実質細胞に神経終末の直接接するのが認められるようであるが、しかしその出現頻度は高いものではないようである。また終末細胞、筋上皮細胞への接着がおもで、峽部と線条部との細胞への接着はほとんど報告例

がない。さらに顎下腺では粘液細胞への接着は認められているが、漿液細胞への接着例は報告がなく注目に値する。著者のハムスターの耳下腺では比較的多くの神経終末が終末細胞に接着する像が認められる。Kurtz は小葉間結合組織の神経線維は常に血管に伴うと述べているが、著者の所見も同じようである。また藤田らによれば、SCOTT・PEASE および入江は腺細胞または筋上皮細胞と神経終末との間のシナプス構造は見いだしていないと記しているが、著者の所見も上述したRUTBERG, KURTZ, SHACKLEFORD・SCHNEYER, TANDLER, TANDLER・ROSS, WILBORN・SHACKLEFORD, HARD など諸種動物における例と同様で、腺細胞と神経終末との間にはシナプスとしての特別な構造を有しないものと推測される。峽部細胞への接着はごく少なく、1例を得たのみである。

神経支配に関して藤田らはイヌの顎下腺の腺細胞は直接シナプスによる神経支配を受けるのではなく、神経終末から出された物質が組織液に入り、hormonal に血管壁および腺細胞を刺激すると考えられるとしている。ハムスターの耳下腺終末細胞では、直接支配を受ける細胞が比較的多く存在するといえることができる。峽部細胞、線条部細胞では直接支配は考えられず藤田らの説による可能性が推測される。

唾液腺に交感神経および副交感神経が分布することは周知のとおりである。神経終末に現われるシナプス小胞は種々の形態をなすものが知られており、その中には扁平囊状のものと電子密度の高い芯を有する cored vesicle と呼ばれる形のものがある。前者は抑制シナプスに特有であり、後者はカテコールアミンを含むアドレナリン作動性線維の終末に多いとしている(浜1968)¹⁰⁶⁾。RICHARDSON (1964)¹²³⁾ はウサギの虹彩の研究によって、筋に分布する神経をアドレナリン作動性神経とコリン作動性神経とに分類した。

これらの所見によれば著者の得た終末細胞基底および細胞間における神経終末の例はほとんどコリン作動性のものであるが、TANDLER・ROSS だけがヒト口唇腺の腺細胞に RICHARDSON のいう2種の型の神経終末が直接接するのを認めている。

なお加賀山と GARRETT は小葉間結合組織内に分布するこの2種の型の神経終末を認めている。著者は小葉間結合組織内の動脈の外膜における神経終末に、電子密度の高い芯を有する cored vesicle の存在を認めた(図37)。これは RICHARDSON の示すアドレナリン作動性神経と一致する像なので、交感神経由来の神経終末と考える。このようにハムスター耳下腺には交感神経および副交感神経の分布することが、それぞれの終末の形態からも確認することができた。さらにこの2種の神経の分布は HEIDENHAIN (1878) の二重神経支配説に一致し、また STORMONT (1928) は交感神経は粘液細胞に、副交感神経は漿液細胞に興奮を伝導するとしているが、ハムスターの所見はこれにも一致する。しかし顎下腺では前述のように粘液細胞に副交感神経の分布することが報告されているので、これについてはさらに今後の研究にまたなければならない。

K 血管

小葉間結合組織内には多くの血管が分布し小動脈、細動脈および毛細血管を区別することができるが、細静脈と毛細血管との区別を明らかにすることは困難であった。TAKADA (1969)¹²⁴⁾ はマウスの顎下腺において直径15~40 μ の管腔を有するものを細静脈として、その内皮細胞も毛細血管のものと同じく細孔を有すると述べている。著者の観察でも15 μ 位の管腔を有する血管で、その内皮細胞に細孔を有するものが認められたが、毛細血管か細静脈かは明らかでない。40 μ 位の太さの血管は観察しなかったが、20 μ 位の太さのもので、細孔を有しないものが認められたことからすると、40 μ 位のものでは細孔を有しないのではないかと推測され、マウスの顎下腺のものと異なるように考えられる。さらに毛細血管については BENNETT *et al.* (1959)¹²⁵⁾ が基底膜、細孔および周囲細胞の出現形態によって分類しているが、ハムスターの耳下腺に分布するものは、そのうち小腸などに分布する形式のものと一致すると考えられる。

結 論

ハムスター(golden hamster)の耳下腺の微細構

造について電子顕微鏡的研究を行なった結果次の知見を得た。

1) ハムスターの耳下腺は終末部、峽部、線条部と小葉間結合組織とからなる。実質細胞としては終末細胞、終末部基底明調細胞、峽部細胞、峽部基底明調細胞、線条部明調細胞、線条部暗調細胞、線条部基底明調細胞および筋上皮細胞の8種の細胞が区別される。

2) 終末部の分泌顆粒は形態的に3種に区別される。しかしそれらはそれぞれ移行的であり、電子密度は一般に低い。

3) 峽部細胞の分泌顆粒も形態的には3種に区別されるが、それぞれ終末細胞のものとは異なり、電子密度が一般に高い。

4) 線条部明調細胞の分泌顆粒は小胞状で、内容は均一であり、電子密度がやや高い。

5) 分泌顆粒の形成に関しては、終末細胞、峽部細胞においてはゴルジ装置によって形成される像が追及できたが、線条部明調細胞では明らかでない。

6) 終末細胞、峽部細胞のゴルジ装置はゴルジ小胞、ゴルジ空胞および扁平なゴルジ囊からなり、しばしばゴルジ野を形成するが、線条部明調細胞のものはゴルジ囊がふくらみ、大きな空胞状を呈する。

7) 終末細胞、峽部細胞の分泌機構は emiocytosis (黒住のIV型)に属するが、峽部細胞の分泌顆粒は特異な融解によって細線維状化した後放出される。

8) 線条部明調細胞では絨毛様突起、分泌顆粒、特異な細線維束とアポクリン分泌様突起との間に密接な関連性があることが観察され、それらの消長と分泌サイクルとの関係が示唆された。

9) 峽部細胞の分泌顆粒の内容物が類結晶化する過程が追及できた。

10) 終末部基底明調細胞で種々の細胞小器官の発達段階のものが見られ終末細胞への分化すると思われる過程が追及できた。

11) 耳下腺内に粘液性終末部の混在する例に遭遇した。その細胞は耳下腺の前上方で側頭筋上に存在する眼窩外涙腺 (exorbital lacrimal gl.) の細

胞にきわめてよく似ており、舌下腺の粘液細胞とは明らかに異なる。

12) 終末細胞と線条部明調細胞とに含まれるトノフィラメントが、著明な横紋構造を示すのがおのおの1例ずつ認められた。

13) 実質細胞の核に nuclear body がしばしば認められ、それらは3型に区別することができた。

14) ライソゾームである dense body が実質細胞にしばしば認められ、終末細胞、峽部細胞、線条部明調細胞に多く出現する。それらはゴルジ装置由来と思われ、それらの種の形態の分化が追及できた。

15) ライソゾームの multivesicular body が多くの実質細胞が多くの実質細胞で認められるが、それらはゴルジ囊とゴルジ小胞とによるものと、亜鈴状に変形した dense body とゴルジ小胞とによって形成される二つの型があることが追及できた。

16) 神経終末が終末細胞間あるいは終末細胞基底に直接接する像がしばしば認められた。これらはコリン作動性終末であって、アドレナリン作動性終末は動脈外膜にのみ存在が見られた。

17) 神経終末が終末細胞に接する場合、両者の間に特別な構造を形成しない。

18) 筋上皮細胞は峽部および終末部にだけ存在し、線条部では認められない。

19) 峽部と線条部の移行部において、峽部細胞が線条部明調細胞の小胞状の顆粒を有するものが見られ、一方線条部において、暗調細胞が峽部細胞に類似の細胞形態を示すものが見られた。

稿を終るに臨み、御指導と御校閲を賜りました今井倭武教授ならびに御支援をいただきました芝田大三助教授はじめ教室の各位、電顕室の伊藤良吉君に深謝の意を表します。あわせて日本大学歯学部解剖学教室、加藤信一教授に種々の教示を賜りましたことを深く感謝いたします。

文 献

- 1) JUNQUIRA, L. C. & HIRSCH, G. C.: Cell secretion; a study of pancreas and salivary glands. *Intern. Rev. Cytol.*, 5: 323-364, 1956.
- 2) JACOBY, J. & SIRLIN, J. L.: An electron

- microscopic study of the rat submaxillary gland during its postnatal salivary gland cells. I. The nucleus of bradysia mycorumfrey (sciaridase) with special reference to the nucleolus. *J. Cell Biol.*, 17 : 153-164, 1963.
- 3) 関正利 : ラットにおける唾液腺線条部の電子顕微鏡的研究. 唾液腺シンポジウム, 1 : 49, 1959.
 - 4) SCOTT, B. L. & PEASE, D. C. : Electron microscopy of the salivary and lacrimal glands of the rat. *Am. J. Anat.*, 104 : 115-161, 1959.
 - 5) LEESON, C. R. & BOOTH, W. G. : Histological histochemical and electron microscopical observations on the post-natal development of major sublingual gland of the rat. *J. Dental Res.*, 40 : 838-845, 1961.
 - 6) PARKS, H. F. : On the fine structure of the parotid gland of mouse and rat. *Am. J. Anat.*, 108 : 303-329, 1961.
 - 7) 関正利 : 耳下腺の線条部の超微形態. 唾液腺シンポジウム, 3 : 30-31, 1961.
 - 8) 藤田訓也 : 顎下腺の電子顕微鏡的観察. 唾液腺シンポジウム, 4 : 23-24, 1962.
 - 9) PARKS, H. F. : Morphological study of the extrusion of secretory materials by the parotid glands of mouse and rat. *J. Ultrastruct. Res.*, 6 : 449-465, 1962.
 - 10) SCOTT, B. L. & PEASE, D. C. : Electron microscopy of induced changes in the salivary gland of rat. *International series of monographs on oral biology 3. salivary glands and their secretions* (edited by Sreebny & Meyer), 13-44, Pergamon Press. Oxford. London. Edinburgh. New York. Paris. Frankfurt. 1964.
 - 11) 藤田訓也 : ラット舌下腺の電子顕微鏡的研究. 日本口腔科学会誌, 12 : 228-229, 1963.
 - 12) KURTZ, S. M. : The salivary glands. *Electron microscopic anatomy*. (edited by Kurtz), 97-122, Academic Press. New York. London. 1964.
 - 13) TAMARIN, A. & SREEBNY, L. M. : The rat submaxillary gland. A correlative study by light and electron microscopy. *J. Morph.*, 117, 295-352, 1965.
 - 14) TAMARIN, A. : Myoepithelium of the rat submaxillary gland. *J. Ultrastruct. Res.*, 16, 320-338, 1966.
 - 15) 藤田訓也 : ラット舌下腺のいわゆる zymogen granules の電子顕微鏡的, 細胞化学的研究. 日組録, 28 : 165-183, 1967.
 - 16) BOGART, B. I. : The fine structural localization of alkaline and acid phosphatase activity in the rat submandibular gland. *J. Histochem. Cytochem.*, 16, 572-581, 1968.
 - 17) LUZZATTO, A. C., PROVICHIANI, G. & ROSATI, G. : Rat submaxillary gland. an electron microscope study of the secretory granules of the acinus. *J. Ultrastruct. Res.*, 22 : 185-194, 1968.
 - 18) SHACKLEFORD, J. M. & WILBORN, W. H. : Structural and functional aspects of rodent salivary glands including two desert species. *Am. J. Anat.*, 115 : 279-308, 1968.
 - 19) SHACKLEFORD, J. M. & WILBORN, W. H. : Structural and histochemical diversity in mammalian salivary glands. *Ala. J. Med. Sci.*, 5 : 180-203, 1968.
 - 20) HARD, A. R. : The fine structure of von Ebner's gland of the rat. *J. Cell. Biol.*, 44 : 340-353, 1970.
 - 21) 高野邦雄 : 耳下腺終末部の微細構造. 解剖誌会, 45 : 22, 1970.
 - 22) WILBORN, W. H. & SCHNEYER, C. A. : Ultrastructural changes of rat parotid glands induced by a diet of liquid metrecal. *Z. Zellforsch.*, 103 : 1-11, 1970.
 - 23) 立花民子 : 顎下腺顆粒管形成に関する研究. 歯科学報, 71 : 252-265, 1971.
 - 24) 覚道要蔵 : マウス顎下腺分泌細胞の分泌顆粒形成過程に関する電子顕微鏡的研究. 阪市大誌, 9 : 5125-5132, 1960.
 - 25) RUTBERG, U. : Ultrastructure and secretory mechanism of the parotid gland. *Acta. Odont. Scandi.* 19(suppl 30) : 1-115, 1961.
 - 26) PARKS, H. F. : Unusual formations of ergastoplasm in parotid acinous cells of mice. *J. Cell Biol.*, 14 : 221-234, 1962.
 - 27) CARAMIA, F. : Ultrastructure of mouse submaxillary gland. I. Sexual differences. *J. Ultrastruct. Res.*, 16 : 505-523, 1966.
 - 28) CARAMIA, F. : Ultrastructure of mouse submaxillary gland II. Effect of castration in male. *J. Ultrastruct. Res.*, 16 : 524-536, 1966.
 - 29) 種村百代 : 成熟家兎耳下腺の諸機能相における電子顕微鏡的観察. 解剖誌, 34 : 54, 1959.
 - 30) 種村百代 : 耳下腺組織の電子顕微鏡的研究. I. 耳下腺組織摂食後 3 ~ 4 時間時, 金沢大医解剖学教室業績集, 58 : 1-12, 1959.
 - 31) 種村百代 : 耳下腺組織の電子顕微鏡的研究. II. 耳下腺組織の実験的研究. 金沢大医解剖学教室業績集, 58 : 13-30, 1959.
 - 32) 野口 勉 : 耳下腺上皮の吸収機構に関する電子顕微鏡的研究. 鹿児島大医誌, 19 : 691-710, 1968.
 - 33) 小野江為則, 橋本正淑, 梅谷恵子, 大塚礼子 : 耳下腺上皮細胞の微細構造について. 電子顕微鏡, 5 : 111-115, 1957.

- 34) 浜田 駿 : 顎下腺細胞の電子顕微鏡的研究. 日本口腔科学会誌, 8 : 346, 1959.
- 35) 浜田 駿 : 顎下腺(犬)の電子顕微鏡的研究. 阪大歯誌, 4 : 906-926, 1959.
- 36) 浜田 駿 : 犬顎下腺の電子顕微鏡的研究. 唾液腺シンポジウム, 1 : 50, 1959.
- 37) 入江正昭 : 正常及び pilocarpine 投与イヌにおける顎下腺の電子顕微鏡的研究. 唾液腺シンポジウム, 2 : 76, 1960.
- 38) 関 正利 : 唾液腺の電子顕微鏡的研究, 犬の耳下腺における実験的研究. 唾液腺シンポジウム, 2 : 32-34, 1960.
- 39) 吉村不二夫, 入江正昭 : pilocarpine 投与イヌの顎下腺の電子顕微鏡的研究. 唾液腺シンポジウム, 3 : 31-32, 1961.
- 40) 吉村寿人 : 唾液腺の水分塩分泌機構. 細胞化学シンポジウム, 13 : 329, 1963.
- 41) 藤田尚男, 中上和義, 今井雄介, 山本豊 : 犬顎下腺の電子顕微鏡的研究. (1) 静止時および副交感線維短時間刺激時の終末部の微細構造. 解剖誌, 39 : 269-293, 1964.
- 42) 藤田訓也 : 猫顎下腺の電子顕微鏡的観察. 日本口腔科学会誌, 12 : 228, 1963.
- 43) FUJITA, K. : Electron microscopic and histochemical studies on submandibular glands of the cat. *J. Osaka Univ. Dent School*, 4 : 83-99, 1964.
- 44) GARRETT, J. R. : The innervation of salivary gland. *J. Roy. Microsc. Soc.*, 85 : 135-162, 1966.
- 45) 加賀山学 : ネコ顎下腺終末部の自律神経支配について. 解剖誌, 45 : II 8, 1970.
- 46) TAKAHASHI, N. : Electron microscopic studies on the ectodermal secretory glands in man. II. The fine structure of the myoepithelium in the human mammary and salivary glands. *Bull. Tokyo Med. Dent. Univ.*, 5 : 177-192, 1958.
- 47) TANDLER, B. : Ultrastructure of the human submaxillary gland. I. Architecture and histological relationships of the secretory cells. *Am. J. Anat.*, 111 : 287-307, 1962.
- 48) TANDLER, B. : Ultrastructure of the human submaxillary gland. II. The base of striated duct cells. *J. Ultrastruct. Res.* 9 : 67-75, 1963.
- 49) NAKAMURA, F. : An electron microscopic observation of the human submaxillary gland. *J. Electron Microscopy.*, 14 : 140, 1965.
- 50) TANDLER, B. : Electron microscopical observations on early sialoliths in a human submaxillary gland. *Arch. Oral Biol.*, 10 : 509-522, 1965.
- 51) NAKAMURA, F., TAKENAKA, B. & HAMA, H. : Electron microscopic observation of the human fetus submaxillary glands. *J. Electron Microscopy.*, 15 : 55, 1966.
- 52) SATO, M., NOGUCHI, T. & YOKOYAMA, M. : On the secretory granules of the serous cell in the human submandibular gland. *J. Electron Microscopy.*, 15 : 1-14, 1966.
- 53) GARRETT, J. R. : The innervation of normal human submandibular and parotid salivary glands. *Arch. Oral Biol.*, 12 : 1417-1436, 1967.
- 54) GOODMAN, A. D. & STERN, I. B. : The embryologic and functional development of the labial salivary glands of man. *Proc. 45th Gen. Meeting. Int. Assoc. Dental Res.*, 102, 1967.
- 55) TANDLER, B. : Fine structure of acinar secretory granules in the human submaxillary gland. *Anat. Rec. (abstract)*, 160 : 438, 1968.
- 56) TANDLER, B., DENNING, C. R., MANDLE, I. D. & KUTSCHER, A. H. : Ultrastructure of human labial glands. I. Acinar secretory cells. *J. Morph.*, 127 : 383-408, 1969.
- 57) TANDLER, B., DENNING, C. R., MANDEL, I. D. & KUTSCHER, A. H. : Ultrastructure of human labial glands. II. Intranuclear inclusions in the acinar secretory cells. *Z. Zellforsch.*, 94 : 555-564, 1969.
- 58) TANDLER, B. & ROSS, L. L. : Observations of nerve terminals in human labial salivary glands. *J. Cell Biol.*, 42 : 339-343, 1969.
- 59) SHACKLEFORD, J. M. & WILBORN, W. H. : Ultrastructure of bovine parotid glands. *J. Morph.*, 27 : 453-474, 1969.
- 60) SHACKLEFORD, J. M. & WILBORN, W. H. : Ultrastructural aspects of calf submandibular glands. *Am. J. Anat.*, 127 : 259-280, 1969.
- 61) TAKANO, K. : An electron microscopic study on the striated duct of some mammalian parotid gland. *J. Electron Microscopy. (会)*, 18 : 206-207, 1969.
- 62) 高野邦雄 : ヒツジ耳下腺の微細構造. 解剖誌(会), 44 : 120-121, 1969.
- 63) WILBORN, W. H. & SHACKLEFORD, J. M. : The cytology of submandibular glands of the opossum. *J. Morph.*, 128 : 1-34, 1969.
- 64) LUFT, J. H. : Improvements in epoxy resin embedding methods. *J. Biophys. Biochem. Cytol.*, 9 : 409-414, 1961.
- 65) COUTER, H. D. : Rapid and improved methods for embedding biological tissues in epon 812 and araldite 502. *J. Ultrastruct. Res.*, 20 : 346-355, 1967.
- 66) OHKURA, T. & TAKASHIO, M. : Beiträge

- zur Verbesserung der Elektronenfarbung mit den aus nichtwässrigen Flüssigkeiten hergestellten Uranylacetatlösungen. 日組録, 27 : 49-56, 1966.
- 67) VENABLE, J. H. & COGGESHALL, R. : A simplified lead citrate stain for use in electron microscopy. *J. Cell Biol.*, 25 : 407-408, 1964.
- 68) 山元寅男 : Toluidin blue による epoxy resin 包埋切片の光学顕微鏡用染色法について. 解剖誌, 38 : 124-128, 1963.
- 69) WEBER, A. F. & FROMMES, S. P. : Nuclear bodies ; their prevalence, location and ultrastructure in the calf. *Science*, 141 : 912-913, 1963.
- 70) SOTELO, J. R. & PORTER, K.R. : An electron microscope study of the rat ovum. *J. Biophys. Biochem. Cytol.*, 5 : 327-342, 1959.
- 71) MAKITA, T., KIWAKI, S. & SHIBANAI, D. : The histological study of the salivary glands of the domestic animals. I. The fine structure of the acinar cells of the horse parotid gland. *Bull. Fac. Agr. Yamaguchi Univ.*, 19 : 984-1014, 1967.
- 72) 黒住一昌, 小林靖夫 : 分泌とゴルジ装置. 細胞化学シンポジウム, 13 : 309-328, 1963.
- 73) HAM, A. W. : *Histology*, 6th ed. 140-143, Lippincott J. B. Co., Philadelphia. Toronto. 1969.
- 74) BEAMS, H. W. & KESSEL, R. G. : The Golgi apparatus. *Intern. Rev. Cytol.*, 23 : 209-276, 1968.
- 75) 小川和朗, 斉藤多久馬, 馬屋原宏 : ライソゾームの微細構造—最近の問題点. 細胞, 2(4) : 2-13, 1970.
- 76) DE DUVE, C. & WATTIAUX, R. : Functions of lysosomes. *Ann. Rev. Physiol.*, 28 : 435-492, 1966.
- 77) FARQUHAR, M & PALADE, G. E. : Junctional complex in various epithelia. *J. Cell Biol.*, 17 : 375-412, 1963.
- 78) COVELL, W. P. : *microscopic study of pancreatic secretion in living animal*. *Anat. Rec.*, 40 : 213-221, 1928. 9) による
- 79) HIRSCH, G. C. : *Theory of fields of restitution with special reference to phenomena of secretion*. *Biol. Revs. Cambridge Phil. Soc.* 6 : 88-131, 1931. 9) による
- 80) RIES, E. : *Zur Hisophysiologie des Mäusepankreas nach lebendbeobachtung, Vitalfärbeg und stufenuntersuchung* *Z. Zellforsch. u. mikroskop. Anat.*, 22 : 523-585, 1935. 9) による
- 81) PALADE, G. E. : *Subcellular Particles*, 64, American Physiological Society, Wachington. D. C., 1959. 9) による
- 82) 河村洋二郎 : 唾液分泌機序, 歯学生理学 (市川, 河村, 橋原編), 166-171, 医歯薬出版, 東京, 1967.
- 83) WOOD, R.L. : Some structural features of the bile canaliculus in calf liver. *Anat. Record*, 140 : 207-215, 1961.
- 84) 市川 操 : 齧齒類唾液腺の組織学的研究 II. 解剖誌, 36 : 206-221, 1961.
- 85) BRUNI, C. & PORTER K. R. : The fine structuae of the parenchymal cell of the normal rat liver. *Am. J. Pathol.*, 46 : 691-755, 1965.
- 86) ROSENBLUTH, J. & WISSING, S. L. : The distribution of exogenous ferritin in toad spinal ganglia and the mechanism of its uptake by neurons. *J. Cell Biol.*, 23 : 307-325, 1964.
- 87) KILARSKI, W. & JASINSKI, A. : The formation of multivesicular bodies from the nuclear envelope. *J. Cell Biol.*, 45 : 205-211, 1970.
- 88) SICHER, H. : *Orbans oral histology and embryology*, 6th ed., 273-274, C. V. Mosby Co., Saint Louis. 1966.
- 89) PROVENZA, D. V. : *Oral. histology, inheritance and development*. 430, Lippincott Co., Philadelphia Montoriol. 1964.
- 90) FERNER, H. & GANSLER, H. : Elektronenmikroskopische Untersuchungen an der glandula Submandibularis und Parotid des Menschen. *Z. Zellforsch.*, 55 : 148-178, 1961.
- 91) STRAUS, W. : Occurrence of phagosomes and phago-lysosomes in different segments of the nephron in relation to the reabsorption, transport, digestion, and extrusion of intervenously injected horseradish peroxidase. *J. Cell Biol.*, 21 : 295-308, 1964.
- 92) RHODIN, J. : Correlation of ultrastructural organization and function in normal and experimental changed proximal convoluted tubule cells of the normal kidney. Thesis Kalolinka Instutet. Stokholm. 1954. 48) による
- 93) RHODIN, J. : *Anatomy of Kidney tubules*. *Intern. Rev. Cytol.*, 7 : 485-584, 1958.
- 94) PAPPAS, G. D. & SMELSER, G. K. : *Am. J. Ophthalmol.*, 46 : 229, 1958. 48) による
- 95) PEASE, D. C. : *Infolded basal plasma membrane found in epithelia noted for their water transport*. *J. Biophys. Biochem. Cytol.*, 2(Suppl) : 203, 1956. 48) による
- 96) 山元寅男 : 吸収細胞, 細胞学大系 (小川, 小田, 黒住, 杉野編), 107-140, 朝倉書店, 東京, 1971.
- 97) 緒方知三郎 : 唾液腺条紋部の構造並びにその機能について. 東京医事新誌, 3161, 2861, 1939.

- 98) 滝沢延次郎, 橋爪藤光 : 唾液腺 (特に耳下腺における) 線条部の微細構造について. 日病会誌, 46 : 370, 1957.
- 99) ISHIKAWA, A. : A note on the dark cells of the exocrine pancreas. 日組録, 28 : 78-88, 1967.
- 100) 加藤喜太郎 : 家畜比較解剖図説上, 1版, 194, 養賢堂, 東京, 1957.
- 101) 今井倭武, 芝田大三, 峯田天雄, 須賀康夫, 小野内徹治 : 猫唾液腺の組織学的並びに組織化学的研究. 解剖誌(会), 45(付) : 1-5, 1970.
- 102) WATARI, N. & BABA, N. : Several findings on the fine structural alternations of the exocrine pancreas after the administration of some chemicals. *J. Electron Microscopy*, 17 : 327-341, 1968.
- 103) FAWCETT, D. W. : *An atlas of fine structure. the cell*, Sanders W. P. Philadelphia, London. 1966.
- 104) HAMITON, D., FAWCETT, D. W. & CHRISTENSEN, A. K. : A study of hepatic cell fine structure in the salamander, *Batraheoseps attenuatus*. I. the structure of the crystalloid inclusion. *Z. Zellforsch.*, 70 : 347-363, 1966.
- 105) 柴田 治 : マウスの膵臓腺房細胞内の類結晶の起源とその微細構造. 信州医誌, 16 : 1039-1052, 1967.
- 106) 山田英智, 内菌耕二, 渡辺陽之輔編集 : 電子顕微鏡による細胞組織図譜, 第1, 3, 4, 5巻, 医学書院, 東京, 大阪, 1968.
- 107) KUROSUMI, K. : Electron microscopic analysis of the secretory mechanism. *Intern. Rev. Cytol.*, 11 : 1-124, 1961.
- 108) 峯田天雄 : ツパイ顎下腺の電子顕微鏡的研究. 歯基礎誌(会), 12 : 275-276, 1970.
- 109) KUROSUMI, K., YAMAGISHI, M. & SEKINE, M. : Mitochondrial deformation and apocrine secretory mechanism in the rabbit submandibular organ as revealed by electron microscopy. *Z. Zellforsch.*, 55 : 297-312, 1961.
- 110) 武田 進 : 細胞分裂, 細胞学(妹尾, 高木編), 442, 朝倉書店, 東京, 1965.
- 111) BRODY, I. : The ultrastructure of the tonofibrils in the keratinization process of normal human skin. *J. Ultrastruct. Res.*, 4 : 264-297, 1960.
- 112) DE THE, G., RIVIERE, M. & BERNHARD, W. : Examen au microscope électronique de la tumeur VX₂ du lapin domestique dérivée du papillome de Shope. *Bull. Cancer*, 47 : 569-584, 1960. 118) による
- 113) HINGLARIS-GUILAUD, N., MORICARD, R. & BERNARD, W. : Ultrastructure des cancers pavimenteux invasifs du utérin chez la femme. *Bull. Cancer*, 48 : 283-316, 1961. 118) による
- 114) 山田英智 : 細胞の構造と機能, 現代生物学 I, 126, 岩波書店, 東京, 1965.
- 115) GRANBOULAN, N., TOURNIER, P., WICKER, R. & BERNHARD, W. : An electron microscope study of the development of SV 40 virus. *J. Cell Biol.*, 17 : 423-441.
- 116) KRISHAN, A., UZMAN, B.G. & HEDLEY-WHITE, E. T. : Nuclear bodies, a component of cell nuclei in hamster tissues and human tumors. *J. Ultrastruct. Res.*, 19 : 563-572, 1967.
- 117) ISHII, Y. & MORI, M. : Ultrastructural development of nuclear bodies in lymphocytic cells of normal mouse lymphnodes. *J. Electron Microscopy*, 18 : 128-135, 1969.
- 118) BOUTEILLI, M., KALIFATE, S. R. & DELARVE, J. : Ultrastructural variations of nuclear bodies in human diseases. *J. Ultrastruct. Res.*, 19 : 474-486, 1967.
- 119) POPOFF, N. & STEWART, S. : The fine structure of nuclear inclusion in the brain of experimental golden hamsters. *J. Ultrastruct. Res.*, 23 : 347-361, 1968.
- 120) FROELICH, J. S. & LAPHAM, L. W. : Tissue culture studies of gliomas. I. intranuclear inclusions in glial cells. *Am. J. Pathol.*, 47 : 147-158, 1965.
- 121) CARAMIA, F., GHERGE, G. F. & MENGHINI, G. : A glycogen body in liver nuclei. *J. Ultrastruct. Res.*, 19 : 573-585, 1967.
- 122) 加賀山学 : サル顎下腺終末部の自律神経支配に関する電子顕微鏡的研究. 解剖誌(会), 45 : 24, 1970.
- 123) RICHARDSON, K. C. : The fine structure of the albino rabbit iris with special reference to the identification of adrenergic and cholinergic nerves and nerve endings in its intrinsic muscles. *Am. J. Anat.*, 114 : 173-205, 1964.
- 124) TAKADA, M. : Fenestrated venules of the large salivary glands. *Anat. Rec.*, 166 : 605-610, 1969.
- 125) BENNETT, H. S., LUFT, J. H. & HAMPTON, J. C. : Morphological classifications of vertebrate blood capillaries. *Am. J. Physiol.*, 196 : 381-390, 1959.

付 図 の 説 明

図の中の記号は次のものを示す。

M: 糸粒体, G: ゴルジ装置, ER: 粗面小胞体, g: 分泌顆粒, c: 中心小体, v: 液胞, cp: 細胞質, d: dense body, L: 管腔, Sy: 神経終末, if: 基底陥入, zo: zonula occludens, za: zonula adhaerens (intermediate junction) ma: macula adhaerens(desmosome), id: 嵌合, sz: 細線維束 (separating zone) mf: marginal fold. SM: 平滑筋, Nf: 神経線維

- 図 1 終末細胞: 細胞基底に粗面小胞体が層板状を呈し, 核上部にはゴルジ装置, 明るい分泌顆粒(g₁)が多く存在する。それらの間には粗面小胞体, 遊離リボゾーム, 糸粒体が見られる。5600×1.2
- 図 2 終末細胞: 分泌顆粒の電子密度が高い芯を有する型(g₃), ややそれより電子密度の低い物質を有する型が(g₂)見られる。4000×1.2
- 図 3 nuclear body: 3個が同時に存在する Type Iのもの(峽部細胞)。
- 図 4 nuclear body: Type IIのものが同時に3個存在するもの(峽部細胞)。3100×2.5
- 図 5 nuclear body: Type IIIのものを示す(峽部細胞)。4000×2.5
- 図 6 nuclear body: 終末細胞において見られた Type IIのもので, 環状をなした線維束の一部が内部にはいり, さらにコイル状(矢印)を呈しながら環状をなす複雑な型のものを示す。4000×2.5
- 図 7 液胞: 終末細胞の液胞に分泌顆粒が突入するようなもの, また細胞質の一部が突入するような像を示す。3100×2.5
- 図 8 dense body: 一つの終末細胞に種々の形態の dense body が見られ, 矢印のような環状の dense body が内部に小胞を有する, multivesicular body 様の形態をなすものがある。4000×1.2
- 図 9 終末細胞で見られた横紋を有する細線維束を示す。4000×3
- 図 10 終末細胞間に進入した神経終末: 内容の均質なシナプス小胞と糸粒体があり, 副交感神経由来のもの。5600×2.5
- 図 11 終末部基底明調細胞: 図11, 12, 13は終末部基底明調細胞の発達を示す。比較的少ない細胞質内には大きな液胞状の粗面小胞体, 遊離のリボゾーム, 球状の糸粒体を認める。4000×1.5
- 図 12 終末部基底明調細胞: 図11より細胞体が大きく, 液胞状の粗面小胞体が小さくなり, 一方その増加が著しい。ゴルジ装置の形成が認められる。4000×1.5
- 図 13 終末基底明調細胞: ほぼ終末細胞と同様な形態をなし, 分泌顆粒の形成が見られる。4000×1.5
- 図 14 粘液細胞: 終末部に見られた粘液細胞である。分泌顆粒は電子密度が低く大きい。粗面小胞体は小さい液胞状をなし, 内部に比較的電子密度の高い物質を有する。また糸粒体は終末細胞のものより小さい。細胞基底には基底陥入(矢印)がある。4000×1.2
- 図 15 粘液細胞: ゴルジ装置の外方(凸側)のゴルジ嚢内の電子密度が内方のもより高い。矢印は耳下腺の峽部細胞(Ic)と接着し, 明らかにデスモゾームが形成されている。4000×1.2
- 図 16 終末部と峽部との移行部: 終末細胞(Ac)が大きく, 電子密度が低く, 峽部細胞(Ic)は小さくて, 電子密度が高い。移行部では峽部細胞間に介在するものがあることを示す。2100×1.2
- 図 17 峽部細胞: 分泌顆粒の電子密度の高いもの, 低いものが区別される。粗面小胞体が基底に層板状を呈す。ゴルジ装置の外方(凸側)にゴルジ空胞が存在し, ゴルジ嚢の近くのものとは融合して大きくなる。ゴルジ嚢の電子密度が外方から内方になるに従い高くなる。5600×1.2
- 図 18 類結晶: 峽部細胞における「ト」の字形をなす類結晶を示す。核内には nuclear body の Type I のものが存在する。8000×1.2
- 図 19 類結晶: 峽部細胞の粗面小胞体間に類結晶が見られる。分泌顆粒の内容が亀裂状をなすものが見られる。8000×1.2
- 図 20 類結晶形成途上の分泌顆粒を示す。これらの顆粒は模型図2の3および4の段階のものに相当する。

3100×2

- 図 21 峽部細胞：峽部と線条部との移行部に近い細胞であり，細胞頂部には小胞状の顆粒の集積が認められる(矢印)。隣接細胞内には峽部細胞の一般的顆粒が存在し，その内には線維状化したものが見られる。4000×1.2
- 図 22 峽部細胞：分泌顆粒の内容物が線維状化し管腔に放出される像を示す。各顆粒内容物の線維状化する途中の種々の形態が認められる。3100×2
- 図 23 multivesicular body の形成：模型図1のA-1に相当し，ゴルジ囊内層のものが屈曲し，そのそばにあるゴルジ小胞を取り囲むような状態を示す(峽部細胞)。
- 図 24 multivesicular body の形成：図23のものよりさらに屈曲しC字形をなす。模型図1のA-2相当する(峽部細胞)。
- 図 25 峽部と線条部との移行部：基底陥入と多くの糸粒体とを有する線条部明調細胞があり，その他のものは峽部細胞で，2型が区別される。その一つは分泌顆粒を多く含む細胞で，分泌顆粒は電子密度の低い型のものを有する。また線維状化した顆粒内容を有し，峽部細胞としての特徴を有するものがある。他の一つは分泌顆粒を多く含まない細胞で，分泌顆粒として線条部明調細胞の小胞状顆粒に類似のものを有する(矢印)。2100×1.2
- 図 26 線条部：明調細胞(L₁, L₂)，暗調細胞(D)，明調細胞は基底陥入を有し，暗調細胞は細胞基底が基底膜にまで達しない。明調細胞(L₁)は小胞状の顆粒を有するものと，有しないもの(L₂)とが見られる。(L₁)は模型図4の(B)細胞に，(L₂)は(I)細胞に相当する。2100×1.2
- 図 27 線条部明調細胞と暗調細胞：(L₁)細胞の顆粒とアポクリン分泌様突起(AP)との境界には細線維束の断片(矢印)が見られる。また下方に横紋を有する細線維束を有する(矢印)。(L₁)細胞は模型図4の(D)細胞に，(L₂), (L₃)は(C)細胞に相当する。D：暗調細胞。4000×2
- 図 28 線条部明調細胞：絨毛様突起を有し，その直下に小胞状顆粒を有する。左上方の頂部には絨毛様突起が消失し，顆粒がはいり込んでいる。この細胞は模型図4の(B)細胞に相当する。3100×2
- 図 29 線条部明調細胞：(L₁)細胞の顆粒が細線維束の断片より上方にまだ移動しない状態のもの。(L₁)は模型図4の(G)細胞，(L₂)は(A)細胞に相当する。3100×1.5
- 図 30 線条部明調細胞：(L₁)細胞は発達した細線維束が zonula adhaerens (za) に付着している。(L₂)細胞の細線維束も長く伸びているが，消失する過程のもので，顆粒の数個が細線維束下より頂部に移動しつつある状態を示す。(L₁)細胞は模型図4の(F)細胞，(L₂)細胞は(G)細胞に相当する。10000×1.2
- 図 31 線条部明調細胞と基底明調細胞：基底明調細胞(B)の上方には暗調細胞があり，その核内に nuclear body の Type I のものがある。基底明調細胞には中心小体，糸粒体，粗面小胞体などが少量見られる。この細胞の両側には明調細胞が接し，陥入膜にデスモゾーム(矢印)が見られ，一部の細胞質は隣接細胞のものであることが示される。4000×1.2
- 図 32 線条部明調細胞：基底陥入膜の一部が小胞化し，連鎖状に配列する(矢印)。4000×3
- 図 33 線条部明調細胞：細胞基底部に液胞状の構造が見られることがあり，その内部にはポリゾーム，小胞などが少量認められる。上方には一般に見られる陥入膜と糸粒体との配列が見られる。4000×1.2
- 図 34 線条部暗調細胞：細胞全体の電子密度が高い。管腔側隣接面には junctional complex が見られ，zonula adhaerens には細線維束が付着する(矢印)。右下方には指状突起を出して隣接する明調細胞と嵌合によって接着する。4000×1.2
- 図 35 線条部暗調細胞：粗面小胞体，ゴルジ装置はよく発達し，分泌顆粒は大きく，電子密度の高いもの，やや低いものが見られ，峽部細胞によく似る。3100×2
- 図 36 神経線維の終末細胞への接着と毛細血管：シュワン氏細胞(Sw)に神経線維(Nf)と神経終末が接し，それらの線維が終末細胞(Ac)に直接接する。終末細胞を取り囲む基底膜は神経線維のものに連続する(矢印)。神経終末のシナプス小胞が類結晶様に密に配列するものがある(上方)。毛細血管の内皮細胞

胞には pinocytotic vesicles が見られ、細孔(矢印)がある。また内皮細胞間接着部に marginal fold が見られる。内皮細胞の外側には周囲細胞の一部が存在し、その外方に連続した基底膜がある。4000×1.2

- 図 37 小動脈の外膜に存在する神経終末：下方には中膜をなす平滑筋，上方にはコラーゲン線維が見られ，中央の神経終末の内部には有芯のシナプス小胞，糸粒体，神経細線維が見られる。これらの神経終末は交感神経由来のものである。10000×1.2