マグネシウム欠乏に関する実験的研究

——飼料中のマグネシウム, カルシウム,
燐の増減による影響——

須 田 信 明

東北大学歯学部第1口腔外科学教室 (指導: 林 進武教授)

[受付: 昭和56年12月19日]

Experimental studies on magnesium deficiency

—The influence of magnesium, calcium and phosphorus doses in food—

Nobuaki Suda

*First Department of Oral Surgery, School of Dentistry, Tohoku University,
4-1 Seiryochō, Sendai 980*

(Director: Prof. Susumu Hayashi)

[Accepted for publication: December 19, 1981]

Key words: magnesium deficiency / vital stain / pathology

Abstract: Pathological changes in the dentin and some organs of magnesium deficient rabbits and rats were studied by increasing and reducing the calcium doses in food through the use of hard tissue vital stain.

The influence of increasing and decreasing doses of calcium and phosphorus to the magnesium deficient food was also investigated by the same method.

The results are summarized as follows:

1) In high calcium group the dentin hypo-calcification of incisors appears to be more rapid than in the low calcium group both in rats and rabbits. The tendency is evidenced more rapidly in rats than in rabbits.

2) With the additional doses of calcium and phosphorus, the magnesium deficient symptoms appear in the phosphorus deficient group but not in the high phosphorus group. However, incisal dentin hypo-calcification appears more rapidly in the high phosphorus group than in the phosphorus deficient group and also more rapid in the high calcium group than in the low calcium group.

緒 言

マグネシウム (以下 Mg と略す) は生体内に存在する陽イオンのうち細胞外陽イオンとしては少ないが、細胞内陽イオンとしてはカリウム (以下 K と略す) について多く、正常成人 (体重約70kg)

の体内全量は20~28g¹⁾といわれている。その約60%は骨内に存在し、骨に含まれる無機質の約0.5~0.7%をしめているが、大部分は皮質中に含有されている²⁾。臨床上 Mg 代謝異常は Mg 単独でみられることは極めて少ないが、水分および電解質の代謝異常を惹起する多くの状態に伴って出現する。実験的には多くの研究が行われ、主症状とし

て紅斑，充血を伴う血管拡張，チアノーゼ，神経および筋肉系統の被刺激性亢進，痙攣発作，皮膚の栄養障害，耳朶血腫，歯肉充血と出血などがあらわれ，病理組織学的には小血管の炎症性壊死性変化，心筋の線維化，腎糸球体，尿細管の変性と石灰沈着，中枢神経系の変化，心弁膜や大動脈の脂質沈着，石灰沈着，心筋内と冠動脈や末梢動脈の石灰沈着などが認められる³⁾。口腔領域におよぼす Mg 欠乏の影響に関しても種々の報告がある。歯周組織におよぼす影響として歯槽骨の吸収，形成不全などが，歯牙におよぼす影響として象牙質の石灰化不全が多く報告されている⁴⁾。しかし，これらの報告の大部分はラットを用いての報告であり，家兎の口腔についての研究はみられない。

カルシウム（以下 Ca と略す）は 2 価の陽イオンで，生体内のあらゆる組織および体液中に含まれている。生体内の血中 Ca を正常に保持出来ない場合には骨より Ca が動員されるので，骨形成不全，骨石灰化不全，骨軟化症，骨粗鬆症などを招来することが知られており，形成中の歯牙や歯槽骨においても，形成不全，石灰化不全を生ずると報告されている⁵⁻⁹⁾。一方実験的に Mg 欠乏症状は飼料中の Ca 量が多い程著明になり，さらに Mg を含有している飼料で飼育した場合でも，飼料 100g 中 50mg 迄の Mg 含有量では，同時に含まれる Ca 量によっては Mg 欠乏症を起すと報告され，逆に Ca 量が少ない程，Mg 欠乏症状の出現が遅くなると報告されている¹⁰⁾。しかし歯の象牙質における石灰化不全の出現時期と Mg, Ca 増減との関連については不明の点が多い。

磷（以下 P と略す）は胃腸管からゆるやかに吸収される。体内ではゆるやかに酸化され，吸収には Ca の共存が必要であり，また K が存在すると吸収がよくなると報告されている¹¹⁾。成人では経口投与したリン酸塩の $\frac{2}{3}$ が吸収され，そのほとんどは尿中へ排出される。体内では血漿，細胞外液，細胞膜，細胞液，膠原線維，骨に分布する。細胞外液では大部分は無機塩，ごく少量がエステル化した有機物として存在し，第二リン酸ソーダ/第一リン酸ソーダ = 4 : 1 で，pH 7.4 を保っていると報告されている¹²⁾。一方 Mg 欠乏症状への P の影響についての検索は O'dell¹³⁾，Forbes¹⁴⁾，

Morris¹⁵⁾，Hamuro¹⁶⁾等の報告があるが，なお究明されるべき点が多い。以上述べた如く，Mg 欠乏に関する実験的研究は，ラットを用いたものが多く，家兎を用いての研究，とくに口腔領域におよぼす影響についての報告は見当らず，また Mg 欠乏と Ca 投与量との相関関係がおよぼす影響については不明の点が多い。よって著者はまず家兎の Mg 欠乏が，従来報告されているラットの Mg 欠乏状態と特異的な差異があるか否かを検討し，ついでラット及び家兎の Mg 欠乏状態に対する飼料中の Ca 増減による影響を生体染色による切歯象牙質をはじめ主として口腔組織を病理組織学的に観察した。ついで Mg 欠乏と Ca, P 両者の投与量の増減との相関に關しての不明の点は，ラットを用いて，特に生体染色による切歯象牙質の石灰化について観察したので報告する。

〔実験 I〕

マグネシウム欠乏飼料中のカルシウム増減による影響

1. 実験方法

実験動物：家兎は約 2 kg の雄家兎 92 匹を使用し，実験飼育前数日間，オリエンタル RC-5 固型飼料および水道水を与え飼育した。ラットは実験飼育前数日間，オリエンタル固型飼料および水道水を与え飼育したウィスター系雄ラット，体重 120 g 前後 40 匹を使用した。

実験飼料：家兎の Mg 欠乏合成飼料は Woolly¹⁷⁾ の diet No. 1436 および太田¹⁸⁾ の合成飼料に若干の変更を加えた。Table 1 に示す如き対照合成飼料から酸化マグネシウム（以下 MgO と略す）と硫酸マグネシウム（以下 MgSO_4 と略す）を除いた I 群と，Mg は小麦粉に 0.035%，NaCl に 0.005%，パルプには $\text{CaO} + \text{MgO}$ の形で 0.045% 含有されているので I 群の合成飼料からさらに小麦澱粉と乾燥木材パルプをサッカローズに変えた II 群の 2 種類の低 Mg 合成飼料を使用した。飼料中 Mg, Ca の増減に関しては上記 2 群飼料に必要な応じ， MgO ， MgSO_4 ，炭酸カルシウム（以下 CaCO_3 ），リン酸カルシウム（以下 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ）の形で添加した。すなわち，実験群の 0Mg-1Ca，0Mg-0Ca，0Mg-2Ca の 3 群は Mg-Ca 欠乏合成飼料に CaCO_3 ， $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ をそれぞれ 15g，14g の標準添加，

Table 1 The compound feed (1 kg)

Rabbit

casein	252 (g)	CaCO ₃	15 (g)	thiamin	5 (mg)
saccharose	200	K ₂ HPO ₄	9	riboflavin	5
wheat starch	230	Na ₂ HPO ₂ · 12H ₂ O	7.3	pyridoxine	15
dry pulp	100	Ca ₃ (PO ₄) ₂	14	pantothenic acid	300
corn oil	100	NaCl	8.8	nicotinic acid	40
KCH ₃ COO	25	MgSO ₄ · 7H ₂ O	3	vitamin B ₁₂	0.05
MgO	5	C ₆ H ₄ O ₇ Fe	0.4	biotin	0.1
choline	2	MnSO ₄ · 4H ₂ O	0.42	menadionum	2
C ₆ H ₁₂ O ₆	1	KI	0.04	cod-liver oil	26.9 (g)
		ZnCl ₂	0.02	α-tocopherol	0.1
		CuSO ₄ · 5H ₂ O	0.02		

I group: Feed are compound of items excepting MgO and MgSO₄ · 7H₂O.II group: Feed are compound of items excepting MgO and MgSO₄ · 7 H₂O, adding saccharose instead of wheat starch and dry pulp.

Table 2 The compound feed of magnesium-calcium deficiency

Rat

base feed (g/100g feed)		* salt (g)		** vitamin (mg/100g feed)	
saccharose	74.3mg	NaCl	292.5	thiamin	0.4
casein	15.0	K ₂ HPO ₄	816.6	riboflavin	0.8
glycine	3.0	FeSO ₄	56.6	pyridoxine	0.4
corn oil	4.0	KI	1.7	vitamin B ₂	0.005
cod-liver oil	1.0	MnSO ₄	9.3	biotin	0.2
choline	0.3	ZnCl ₂	0.55	menadionum	0.1
*salt	2.4	CoCl ₂	0.05	nicotinic acid	4.0
**vitamin	7.825	CuSO ₄	1.0	folic acid	0.1
				pantothenic acid calcium	2.0

Ca 無添加, Ca 2 倍添加したものである。対照は MgO 5g, MgSO₄ 3g, CaCO₃ 15g, Ca₃(PO₄)₂ 14g の標準量を加えた。飲料水は蒸留水を用いた。ラットの基礎合成飼料は内藤⁴⁾の飼料に変更を加え (Table 2), 必要に応じ MgO, CaCO₃ を添加し, 実験群の 0Mg-1Ca, 0Mg-0Ca, 0Mg-2Ca の3群は Mg-Ca 欠乏基礎合成飼料100g にそれぞれ CaCO₃ 1.6g 添加, 無添加, 3.2g 添加したものである。対照には MgO 100mg, CaCO₃ 1.6g を基礎合成飼料100g に添加した標準飼料を使用した。飲料水は蒸留水を用いた。

飼育方法: 飼料および飲料水は1日量を定めないうで自由に与え飼育した。

観察方法: Mg 欠乏家兎の血清中 Mg 総値の測定は, 心臓穿刺により採血しマグノレッド法にて行った。病理組織学的検索は, 以下の臓器につい

て行った。すなわち屠殺後, 直ちに下顎骨, 膝関節脛骨頭, 顎関節, 歯肉, 舌, 頬粘膜, 咬筋, 腎, 肝, 心, 副腎を切除剔出し, 10%ホルマリン液にて4日間固定し, 硬組織は脱灰を行った。中和後通法に従って水洗, 脱水, パラフィン包埋し, 4~5μ の切片とし, ヘマトキシリン・エオジン重染色を行った。硬組織生体染色¹⁹⁻²⁵⁾は家兎においては耳静脈より1%醋酸鉛 3mg/kg を96時間間隔で継続投与した。全例とも標準対照飼料による飼育中に2回注射を行い, その直後から, 3群に区別した欠乏飼料による飼育に切りかえた。注射回数は6回で, 最後の注射後4日目に屠殺し(欠乏飼料投与20日目), 切歯部を10%ホルマリンにて固定を行い, 水洗後, キップの発生装置で絶えず硫化水素を通じた1%の塩酸溶液の脱灰液を飽和状態にしてから, 液中の硫化水素ガスの出ている

ガラス管の先端より多少液の表面に近い部分において脱灰する。脱灰後24時間水洗し、酸を除去する。その後ゼラチン包埋し、凍結切片とし、象牙質は鍍銀法、ヘマトキシリン染色を行った。ラットにおいては2% EDTA 鉛30mg/kg の腹腔内注射を行い、96時間間隔で継続投与した。全例とも標準対照飼料による飼育中に2回注射を行い、その直後から、3群に区別した欠乏飼料による飼育に切りかえた。注射回数は6回で、最後の注射後4日目に屠殺した（欠乏飼料投与20日目）、切歯の処理方法は家兎の場合と同様である。

2. 実験結果

A. 家兎における Mg 欠乏飼料による影響

肉眼的所見：対照群では飼育期間中、終始体軀の発育も、毛並も良く、被刺激性の異常も認められなかった。実験群ではⅠ群、Ⅱ群とも2週目頃より痙攣、発作、興奮が現われた。又約3週後に、一部の家兎で毛がやや黄色に成り、毛の粗造化が認められた。

体重：対照群では漸次経日的に増加する傾向が認められたが（Fig. 1）、Ⅰ群、Ⅱ群では体重の増加も減少も無く、不変であった。

血清 Mg 検査成績：対照群は各週とも1.9mg/dl で、Ⅰ群、Ⅱ群ではいずれも低い値を示し（Table 3）、欠乏期間の長い程低値の傾向であった。

病理組織学的所見

a. 下顎切歯象牙質所見

Fig. 1 Change of rabbits weight

対照群

各週とも、象牙質の発育線の走行が一定しており、特に異常所見は認められなかった（Photo 1）。

Ⅰ群

5週以後に象牙芽細胞層の扁平化、変性、萎縮及び壊死、幼弱象牙質の形成層等が認められた（Photo 2）。一部の家兎に石灰化不全及び減形成が認められた。

Ⅱ群

4週以後に象牙芽細胞層の扁平化、象牙芽細胞の変性、壊死、消失、幼弱象牙質の形成層が認められた（Photo 3）。又象牙芽細胞の象牙質への封入が認められ、一部の家兎に象牙質の発育線の乱れが認められた。

b. 顎関節頭所見

対照群

特に変化は認められなかった（Photo 4）。

Ⅰ群

1週では予備軟骨層の減少が認められたが、骨梁の変化は認められなかった。

2週～6週目で予備軟骨層の減少、軟骨細胞の変性、萎縮、軟骨細胞の配列不整、骨梁の減少が認められた（Photo 5）。

Ⅱ群

1週では特に変化は認められなかった。

2週～6週目で予備軟骨層の減少、軟骨細胞の変性、萎縮、配列不整、一次骨梁の減少が認められた（Photo 6）。

c. 膝関節脛骨頭所見

対照群

特に変化は認められなかった（Photo 7）。

Ⅰ群

4週で骨梁の軽度な形成不全が認められた。

5週で軟骨細胞が萎縮し、置換された骨梁が少

Table 3 The average of serum magnesium (mg/dl)

Rabbit

	control group	I group	II group
2 weeks after an experiment	1.9	0.53	0.38
4 weeks "	1.9	0.19	0.24
6 weeks "	1.9	0.19	0.15

く、骨芽細胞の萎縮が認められた(Photo 8)。

II 群

4週で骨梁の形成不全が認められた。

5週で軟骨細胞の萎縮、骨梁の量の減少、配列不整が認められた(Photo 9)。

d. 口腔軟組織所見

I 群、II 群とも歯肉、咬筋および頬粘膜に特に対照と異なる変化は認められなかった。舌についてはI 群、II 群とも3週目の筋層内に石灰化物が認められたが、他に対照と異なる変化は認められなかった(Photo 10)。

e. 全身諸臓器所見

腎ではI 群、II 群の5週目頃に尿細管内に石灰沈着物が認められ(Photo 11, 12)、肝では肝細胞の脂肪変性が(Photo 13)、副腎では1例に皮質部の硬塞が、肺では肺泡周囲の円型細胞の浸潤、出血性の気管支炎が認められた(Photo 14, 15)。心臓では特に変化は認められなかった。

小括

肉眼的所見として、I 群、II 群ともに約2週目以後に瘰癧、発作が認められ、約3週以後、一部の家兎に毛の粗造が認められた。またI 群、II 群とも体重は増加も減少も認められず、血清 Mg 総値は低い値を示した。病理組織学的にはI 群、II 群ともに下顎切歯象牙質に象牙芽細胞の扁平化、象牙芽細胞の変性、壊死、消失、幼弱象牙質形成層が又象牙芽細胞の象牙質への封入がみられ、一部の家兎では象牙質の發育線の乱れが認められた。また顎関節では予備軟骨層の減少、軟骨細胞の変性、萎縮、配列不整、一次骨梁の減少が有り、膝関節脛骨頭では軟骨細胞の萎縮、骨梁の量の減少、配列不整等が認められ、これらの所見は経日的に増悪の傾向が認められた。また舌、腎に石灰化物が認められた。しかしI 群(低 Mg 飼料)とII 群(低 Mg 欠乏飼料)の Mg 0.08mg 程度の微量の差異による変化の相異はほとんど認められなかった。以上の家兎における Mg 欠乏による変化は、ラットの場合の諸氏の報告所見と同様であるが、ラットに比べて、変化の出現は遅くかつ軽度であった。

B. マグネシウム欠乏飼料中のカルシウム増減による影響

1) 家兎

肉眼的所見: 対照群では、体軀の發育もかなり良く、毛並も特に異常なく、変化はみられなかった。Mg 欠乏飼料群では、Ca 投与量の多いほど、毛並が黄色化し粗造となり、興奮と瘰癧が認められた。

病理組織学的所見

a. 下顎切歯象牙質所見

対照群

ヘマトキシリンに均一に染色され、鉛線の走行が一定し、特に異常所見は認められなかった(Photo 16)。

0Mg-1Ca 群

欠乏飼料飼育10日頃より、鉛線の走行の乱れが認められた。また象牙質の鉛線の間隔が狭く成った(Photo 17)。

0Mg-0Ca 群

欠乏飼料飼育14日頃より、軽度の石灰化不全、すなわちヘマトキシリンに染らないところが認められた。対照と比較して象牙質の鉛線の間隔は同様であった(Photo 18)。

0Mg-2Ca 群

欠乏飼料飼育10日頃より、鉛沈着線が認められなかった(Photo 19)。

b. 心、肺、肝、腎所見

腎の0Mg-2Ca 群の尿細管に石灰沈着が認められた。他の臓器には対照群、0Mg-1Ca 群、0Mg-0Ca群、0Mg-2Ca 群ともに特に変化は認めなかった。

2) ラット

肉眼的所見: 対照群では、体軀の發育もかなり良く、毛並に特に異常なく、変化はみられなかった。Mg 欠乏状態で、Ca 投与量の多いほど、毛並が黄色化し粗造となり、興奮と瘰癧が認められた。

病理組織学的所見

a. 下顎切歯象牙質所見

対照群

ヘマトキシリンに均一に染色され、鉛線の走行が一定して、特に変化は認められなかった(Photo 20)。

0Mg-1Ca 群

Mg 欠乏飼料飼育6日頃より、石灰化不全すなわちヘマトキシリンで染色されない所見が認められ、鉛線が沈着しない状態を示した(Photo 21)。

0Mg-0Ca 群

Mg 欠乏飼料飼育10日頃より、ヘマトキシリンで染色されない石灰化不全所見が認められるが、鉛線の間隔は等しかった(Photo 22)。

0Mg-2Ca 群

Mg 欠乏飼料飼育3日頃より、ヘマトキシリンで染色されない所見が認められ、鉛線沈着の走行のみだれや消失の状態を示した(Photo 23)。

b. 心, 肺, 肝, 腎所見

0Mg-2Ca 群の腎の尿細管に石灰沈着物が認められた。他の臓器には対照群と同様、特に変化は認められなかった。

小括

飼料中の Mg を欠乏させ Ca 量を増減させて飼育した家兎の肉眼的変化は Ca 投与量が多い程悪い。切歯象牙質の生長過程においても、0Mg-0Ca 群では欠乏飼料飼育14日頃より、軽度の石灰化不全が認められたが、0Mg-1Ca 群、0Mg-2Ca 群では10日頃より、石灰化不全が認められ、0Mg-0Ca 群より石灰化不全の出現時期が早い傾向が認められた。腎では0Mg-2Ca 群の尿細管に石灰沈着物が認められた。

ラットにおいても肉眼的変化ならびに切歯象牙質の生長過程の変化は家兎同様に Ca 投与量の多い程高度であった。すなわち0Mg-0Ca 群で10日頃より石灰化不全が認められ、0Mg-1Ca では6日頃より、0Mg-2Ca 群では3日頃より石灰化不全が認められ、飼料中 Ca の多い程、その出現は早かった。

〔実験Ⅱ〕

マグネシウム欠乏飼料中のカルシウムおよび燐増減による影響

1. 実験方法

実験動物：体重120g 前後のウィスター系雄ラット35匹を使用した。

実験飼料：基礎合成飼料は実験Ⅰのラットの飼料に変更を加え、予め Mg, Ca, P は飼料から除外し、必要に応じ、その都度 MgO, CaCO₃, K₂(PO₄) をそれぞれ基礎合成飼料に添加した。

P 倍量（以下 2P と略す）実験群と P 欠乏（0P）実験群の2群に、各所定の CaCO₃ を添加して飼料とした。すなわち 2P 実験群は 0Mg-2Ca-2P, 0Mg-1Ca-2P, 0Mg-0Ca-2P の3群とし、夫々 100g 基礎合成飼料中に K₂(PO₄) を 3400mg 含有させた Mg 欠乏合成飼料に、CaCO₃ を 3200mg, 1600mg および無添加としたものである。0P 実験群は 0Mg-2Ca-0P, 0Mg-1Ca-0P, 0Mg-0Ca-0P の3群とし 0Mg-0P 基礎合成飼料に CaCO₃ を 3200mg, 1600mg および無添加とした飼料で飼育した。対照群飼料には 0Mg-0Ca-0P 基礎合成飼料100mg に対し CaCO₃ を 1600mg, K₂(PO₄) を 1700mg, MgO 100mg を加えた。飲料水は蒸留水を用いた。

飼育方法：飼料および飲料水は1日量を定めず自由に与えた。

観察方法

切歯：生体染色は EDTA 鉛を体重 1 kg あたり 30mg の腹腔内注射を96時間毎に5回行った。第1回目の注射後より実験飼料を与え、20日間飼育した後屠殺した。同時に4日毎に体重測定を行った。切歯は実験1と同様に鍍銀法を行い、ヘマトキシリン染色をほどこした。

膝関節脛骨頭：脱灰後、中和し、通法に従って水洗、脱水、パラフィン包埋、4～5μ の切片とし、ヘマトキシリン・エオジン重染色を行い、病理組織学的に検索した。

他の臓器はヘマトキシリン・エオジン重染色による病理組織学的な検索を行った。

2. 実験結果

肉眼的所見：4日毎の観察で、対照群では終始特に変化なく、毛並も正常であった。2P 群(0Mg-2Ca-2P 群, 0Mg-1Ca-2P 群, 0Mg-0Ca-2P 群)は対照群とほとんど変らなかった。0P 群(0Mg-2Ca-0P 群, 0Mg-1Ca-0P 群, 0Mg-0Ca-0P 群)では1週以後に、毛並の粗造化が見られ、被刺激性の亢進等が認められた。さらに一部の全身状態の悪いラットでは、手、足に浮腫、痂皮形成が認められた。

体重変化：2P 投与実験では1Ca 群と0Ca 群ともやや増加するが、対照ほど急激な増加は認めなかった。2Ca 群では16日目より体重減少が認め

Fig. 2 Change of rats weight

られた。0P 投与実験では 1Ca 群, 0Ca 群, 2Ca 群とも減少が認められた (Fig. 2)。

病理組織学的所見

a. 切歯象牙質所見

対照群では各群ともに鉛線の走行の乱れや消失等の所見は認められなかった (Photo 24, 28)。

2P 群では

0Mg-2Ca-2P 群: 飼料投与 4 日目頃より石灰化不全, すなわちヘマトキシリンに染色されない所見が認められた (Photo 25)。

0Mg-1Ca-2P 群: 飼料投与 6 日目頃より石灰化不全が認められた (Photo 26)。

0Mg-0Ca-2P 群: 飼料投与 14 日目頃より石灰化不全が認められた (Photo 27)。

0P 群では

0Mg-2Ca-0P 群: 飼料投与 12 日目頃より石灰化不全が認められた (Photo 29)。

0Mg-1Ca-0P 群: 飼料投与 16 日目頃より石灰化不全が認められた (Photo 30)。

0Mg-0Ca-0P 群: 飼料投与 20 日目頃にも石灰

化不全は認められなかった (Photo 31)。

b. 膝関節脛骨頭所見

対照群では特に変化は認められなかった。

実験群では

0Mg-2Ca-2P 群: 軟骨細胞の配列の乱れ, 骨梁の形成不全が軽度認められた (Photo 32)

0Mg-1Ca-2P 群: 骨梁の形成不全が軽度認められた。

0Mg-0Ca-2P 群: 骨梁の形成不全が軽度認められた。

0Mg-2Ca-0P 群 (Photo 33), 0Mg-1Ca-0P 群, 0Mg-0Ca-0P 群では 2P の実験群より, 骨梁の形成不全が著明に認められた。

c. 腎, 肝, 心, 肺所見

腎では, 2P 群はいずれの群も, 尿細管に石灰化物は認められなかった (Photo 34)。0P 群ではいずれの群にも, 石灰化物が多量に認められた (Photo 35)。肝では, 2P 群にはいずれの群にも, 周辺部脂肪変性が認められ, 0P 群では各群ともに, 肝細胞の変性, うっ血が認められた。肺

では、全群で気管支周囲の円型細胞の浸潤が認められた。心臓では特に変化は認められなかった。

小括

実験 I において、ラットでは家兎よりも Mg 欠乏、Mg 欠乏 Ca 増減の影響が鋭敏に現われることが明確になったので、ラットを用いて、急性 Mg 欠乏による Mg 欠乏所見が、飼料中の Ca と P 量によりどのような影響を受けるかを検索した。

肉眼的所見としては、2P 群では著しい変化は認められなかったが、0P 群では全てのラットで、1 週以後に毛並の粗造が、欠乏 2 週以後には体軀の發育不良が認められた。

体重は 2P 群では各群ともに増加はするが、2Ca 群では 16 日目より減少が認められた。0P 群では軽度の減少傾向が認められた。

病理組織学的所見では、切歯象牙質において、2P 群、0P 群ともに Ca 量の多いほど石灰化不全の出現時期が早く、2P 群で 2Ca 4 日、1Ca 6 日、0Ca 14 日であり、0P 群では 2Ca 12 日、1Ca 16 日であったが、0Ca では 20 日においても認められなかった。

膝関節脛骨頭では、2P 群で骨梁の形成不全が軽度に認められ、0P 群では著明であった。

諸臓器では、腎で 0P 群に尿細管内の石灰化物が多量に認められたが、2P 群では認められなかった。肝では 0P 群、2P 群に脂肪変性が、肺では全群に円型細胞の浸潤が認められた。心臓では特に変化は認められなかった。

総括ならびに考察

動物における Mg 欠乏についての実験的研究を最初に行ったのは 1918 年 Osborn²⁶⁾ であり、それによると、ラットの Mg 欠乏飼料の中へ 100 p.p.m. 以上の Mg を含有させるまで、欠乏による影響がみられたと報告している。さらに 1926 年 Leroy²⁷⁾ は 10 p.p.m. の低 Mg 飼料を用いてマウスを飼育したところ、9～13 日間で成長が停止し、一部は 35 日間で死亡したと述べている。Mccollum²⁸⁾ は 1.8 p.p.m. の Mg を含有する飼料を用いて、幼若ラットに皮膚の充血、毛の喪失、頻脈および痙攣等の欠乏症状を起し、多数のラットが 11 日間で死亡

したと述べている。現在までの報告を見ると、実験動物の種類および飼育条件によって異なるが、欠乏症状の第 1 段階は充血、興奮性亢進、血管拡張がみられ、この時期では血中 Mg 濃度は低下するが、興奮性亢進後はわずかに上昇するといわれる。第 2 段階は栄養障害の進行、悪液質および腎障害が著明に認められ、この血中 Mg 濃度の低下は比較的緩慢であるが、最終的には 1 mg/dl 以下に低下する。ラットの成長と欠乏症状との関連については Aikawa²⁾ によれば、幼若ラットよりも成熟ラットの方が症状の現われ方が遅いが、これは多分、成熟ラットの方が Mg の体内蓄積量が多いためと思われると述べている。一方 Mg 欠乏症状あるいは Mg の吸収、排泄に影響を及ぼす因子としては蛋白質^{29,30)}、糖質³¹⁾、種々の無機質、ビタミン³²⁻³⁴⁾ などの栄養素をはじめ、上皮小体ホルモン、副腎皮質ホルモンなどの種々のホルモン³²⁻³⁶⁾、種々の薬物³⁷⁾、あるいは温度などの種々の環境^{38,39)} が挙げられている。このうち無機質については Mg と K⁴⁰⁻⁴²⁾、Na⁴²⁾、F^{40,43,44)}、P⁴¹⁾ をはじめ、Mg と Ca^{45-49,4,10)} 又は Mg と Ca と他の栄養素^{50-52,30,3,53,54)}、特に P^{40,13-15,55)} との報告がみられる。すなわち Day⁴⁶⁾ らは犬を用いて、Mg 欠乏症状は Ca 欠乏により悪化すると報告し、Tufts & Greenberg⁴⁵⁾、Duckworth⁴⁷⁾ らはラットを用いた実験において、高 Ca 食は Mg 欠乏症状を悪化させると述べている。1927 年 Orban⁵⁶⁾ は栄養と歯牙發育の関係について、ラットを用いて各種飼料別に検討した結果、小麦と肝油、Ca、P を組合せた飼料では象牙質の石灰化は非常に良好であったと述べ、無機質を欠乏させた飼料で飼育した場合では、明らかな石灰化不全が認められたと述べている。中久木¹⁰⁾ によると Mg 欠乏飼料 100g 中、CaCO₃ 1600mg では、1 週で石灰化不全帯が出現し、これに対し、低 Ca 群では出現が遅くなる傾向が認められたと述べている。著者は家兎およびラットを用いて Mg 欠乏と Ca との関係を検討し、歯牙をはじめ全身臓器を病理組織学的に検索すると共に硬組織生体染色を用いて象牙質形成について検討した。この様に Mg と Ca 投与量の相互関係の差異による病理組織学的変化—特に歯牙の変化についての報告は未だ見られ

ない。

飼料中 Mg が低濃度かあるいは完全欠乏の場合、体重変化としては成長の停止又は低下がみられるといわれる^{57,58)}。家兎を用いた本実験では欠乏飼料飼育後に増加も減少も無く不変であって、対照では増加傾向が認められ、差異が顕著であった。また毛並の黄色化および粗造化、興奮と痙攣、体軀の發育不良等の報告⁴⁾があるが、本実験でも I ならびに II 群ともに 2 週目頃より痙攣発作、興奮が現われ、さらに 3 週後一部の家兎に毛がやや黄色に成り、粗造が認められた。これらの所見は従来報告されているラットと同様であるが、時期的には遅く出現した。Mg 欠乏時の Mg 血中濃度に関しては数多くの報告があり、一般に低下するといわれている。Tufts⁴⁵⁾は正常の $\frac{1}{3}$ にも低下すると述べている。内藤⁴⁾は血清 Mg 総値は欠乏群にやや低い値がみられたが、欠乏期間の長短による差は明らかでなかったと述べている。しかし家兎による本実験ではマグノレット法を用いて測定したところ、欠乏群に低い値がみられ、欠乏期間の長いほど低い値を示した。

Mg 欠乏による象牙質の石灰化不全については Klein⁵⁹⁾・Watchorn⁶⁰⁾ & Beck, Irving⁶¹⁾ と Gaunt⁶²⁾, Bernich⁵⁷⁾, Trowbridge⁵⁸⁾, Binus⁶³⁾, Gagnon⁶⁴⁾ ならびに最近の報告では内藤⁴⁾, 中久木¹⁰⁾ など多くの報告がある。内藤によると Mg 欠乏飼料でラットを 28 日間飼育したところ、切歯象牙質の石灰化不全は欠乏 1 週からみられ、欠乏 3・4 週では明らかな縞模様状を呈して、歯根部よりも切端部に、唇側よりも舌側において著明で、象牙芽細胞の変性は欠乏 2 週後にみられたが、歯髓の萎縮、血管拡張および結石などの変化は認められなかったと述べている。本実験における、家兎の場合には、一部の家兎に象牙質の發育線の乱れが認められる程度で、内藤⁴⁾のラットの報告の様な縞模様は明らかでなかった。これはラットにくらべ家兎の Mg 体内蓄積量が多いためと思われる。又 Becks⁵⁾はラットで石灰化不全は舌側で、しかも根尖部よりも切端部へむかうほど著明であったと述べているが、本実験において部位による差異は認められなかった。また象牙芽細胞の扁平化、象牙質の変性、壊死が認められたが、ラット

による Watchorn⁶⁰⁾, Becks⁵⁾ と犬による Binus⁶³⁾ の報告にみられたという歯髓の萎縮、血管拡張および結石等の変化は認められなかった。

Mg 欠乏における顎関節頭所見についての報告はほとんどみられないが、家兎による本実験では I, II 群とも、2 週以後に予備軟骨層の減少、軟骨細胞の変性、萎縮、配列不整、一次骨梁の減少が認められた。

膝関節脛骨頭の変化としてはラットでは, Bernick⁵⁷⁾ は Mg 欠乏飼育 19 日後に軟骨増生帯が狭くなって、未熟な軟骨細胞および骨梁の形成不全がみられたと報告している。内藤⁴⁾も欠乏 1 週の軟骨増生帯では軟骨細胞の軽度な配列の乱れがみられたが、骨梁の形成不全は認められず、欠乏 2 週所見では骨梁の軽度な形成不全が認められ、欠乏 3・4 週所見で、軟骨増生帯の幅が狭く成ったと述べている。本実験では I, II 群とも 3 週所見までは特に変化は認められず、欠乏 4 週、5 週で軟骨細胞の萎縮、骨梁の量の減少、配列不整が認められた。

すなわち家兎の方がラットより変化の起る時期は明らかに遅い。

Mg 欠乏ラットの歯肉変化について Klein⁵⁹⁾らは歯肉の腫脹、Becks⁵⁾らは歯肉の萎縮を報告している。しかし本実験では内藤⁴⁾のラットの報告と同様、変化は認められなかった。又咬筋、頬粘膜についても I, II 群とも特に変化は認められなかった。舌の所見については、内藤⁴⁾によるとラットでは特に変化は認められなかったと述べているが、本実験では一部の I, II 群の 3 週目の筋層内に石灰化物が認められた。Mg 欠乏時の全身諸臓器の変化については多数の研究がなされており、Wacher⁶⁵⁾は心、脈管、腎、肝および脳に変化が認められると述べている。本実験では、心筋線維の変性、心筋間の石灰沈着は認められなかったが、腎の変化については、I, II 群とも欠乏 5 週目に尿細管内に石灰化物が見られた。これは中久木¹⁰⁾, 青木⁶⁶⁾, Lowenhaupt⁶⁷⁾, Watchorn⁶⁰⁾ らのラットの所見と同じであるが、時期的には遅く出現した。

肺の変化については、青木⁶⁶⁾は気管支炎を認めたと述べているが、本実験では肺動脈周囲の円型細胞の浸潤が認められた。肝で、Yamane⁶⁸⁾, Sch-

rader⁶⁹⁾、竹下⁷⁰⁾らは Mg 欠乏時に肝細胞の萎縮、変性、脂肪化などを認め、内藤⁴⁾、中久木¹⁰⁾、Lowenhaupt⁶⁷⁾らは特にその様な変化は認めなかったと述べている。家兎による本実験では肝細胞の脂肪変性が認められたが、萎縮は認められなかった。以上を総合すると家兎における Mg 欠乏による変化は、基本的にはラットと同様であるが、その発現時期はやや遅く、またラットほど著明でなかった。これは Mg 体内蓄積量の相異によるものと思われる。

Mg 欠乏と Ca 飼料の増減による変化についてはラット、家兎ともに毛並の粗造化、体軀の發育不良等の Mg 欠乏症状が Ca 含有量の多い程著明に認められ、被刺激性の亢進も高まった。

高 Ca の方が Tufts⁴⁵⁾、Duckworth⁴⁷⁾、Colby²⁹⁾によると血管拡張が、Tufts⁴⁵⁾によると痙攣が、Colby²⁹⁾によると興奮性が高度に認められたと述べている。中久木¹⁰⁾も被刺激性の亢進、肺炎、疥癬などの感染症、さらに手、足の浮腫が認められたと述べている。

切歯の病理組織学的所見では、Bernick⁵⁷⁾は Mg 欠乏ラットを19日間飼育したところ、縞状の幅広い象牙質の石灰化不全および象牙芽細胞の変性が認められたと述べ、又 Trowbridge⁵⁸⁾は Mg 欠乏幼若ラットの14日後所見で、前象牙質および象牙質の石灰化不全が認められたと述べているが、本実験 (0Mg-1Ca) では出現は早期 (6日頃) であり、内藤⁴⁾、中久木¹⁰⁾の報告と一致する。これに Ca の増減が重なると、ラットでは低 Ca 群で象牙質の石灰化不全は10日頃より出現するのに対し、高 Ca 群では3日頃より認められた。しかし、家兎においては象牙質の石灰化不全の出現時期はラットの場合より遅く、低 Ca 群では Mg 欠乏14日頃より、高 Ca 群では10日頃より出現した。これはやはり家兎の Mg 体内蓄積が多いためと思われる。しかし、ラットと同様高 Ca 群の方が出現は早かった。心および肺、肝、腎の病理組織学的所見について、Selye⁷¹⁾は酢酸鉛2回静注により、内臓に石灰沈着症が認められたと述べているが、本実験ではラット、家兎ともに石灰沈着物を認めたが、これは Mg 欠乏高 Ca 群にのみ認められた所見で、中久木¹⁰⁾らの報告と考え合わせ

ると鉛投与によるものではないと思われる。他の臓器にはその様な変化は認められなかった。以上の結果を総合すると、ラット、家兎ともに Mg 欠乏による諸変化は飼料中の Ca 量が多い程早期にかつ著明に出現する。しかし家兎ではラットに比べてそれらの変化はやや遅く出現し、かつ軽度であった。家兎よりも Mg 欠乏および Mg 欠乏 Ca 増減による変化が鋭敏に現われることが明確に成ったので、ラットを用いて Mg 欠乏所見におよぼす Ca, P 投与量の影響を経日的に検索した。Mg 欠乏と Ca と P との関係については犬⁴⁰⁾、モルモット^{13,32)}ラット^{13,14)}およびマウス¹⁶⁾等について、高 Ca 食は高 P 食と共に Mg 欠乏症状を悪化させると報告されている。著者の実験では肉眼的所見において、P の過量摂取では Ca 量の増減に関係なく毛並の異常、眼球突出、眼瞼の充血、興奮および痙攣などの Mg 欠乏症状は認められなかった。逆に P の欠乏では Ca 量の増減に関係なく Mg 欠乏症状が出現した。O'dell¹³⁾は P を過度に摂取すると Mg 欠乏症状を増悪させると述べているが、この様に本実験では全く相反する結果がえられた。体重の変化については Mg 欠乏群で、P の過量摂取では体重は軽度ながら増加するが、P 欠乏では体重は減少し、Ca が多いほど著明であった。これは Forbes¹⁴⁾の体重増加と食事摂取は Mg 供給に関係無く、低 P に Ca を添加することにより制限されたと述べている報告と一致するものである。

象牙質の石灰化不全については種々の報告があるが、Mg 欠乏時の P の象牙質への影響はまだ報告されていない。本実験の病理組織学的所見では下顎切歯象牙質において、Mg 欠乏状態で、飼料中の P の量が多い場合は Ca 欠乏群で14日頃より石灰化不全が認められ、投与 Ca 量増加につれて6日、4日頃と石灰化不全出現時期が早く成る。P 欠乏時の石灰化不全出現時期は、Ca 欠乏群で出現せず、Ca 増加とともに16日、12日頃と早く現われる。すなわち P の量が多い方が P 欠乏より石灰化不全の出現時期が早い、同時に両者とも Ca 量が多い程、さらに出現時期が早い。膝関節脛骨頭については、本実験では Mg 欠乏群の飼料中の P 量の多い場合、骨梁の形成不全は軽度に認

められた。同時に Ca の多いほど、軟骨細胞の配列の乱れが著明になった。一方飼料中の P 量の少ない場合には P 多量の場合よりも骨梁の形成不全が著明に認められた。Mg 欠乏におよぼす飼料中の Ca 量の影響についての全身臓器の病理組織学的報告としては、中久木¹⁰⁾は心、腎、肺に変化が認められたと述べている。又 Hamuro¹⁶⁾によれば KK マウスにおいて低 Mg で、高 P の時に心、腎に高度の石灰化が認められたと述べている。本実験では Mg 欠乏群中の P 欠乏時に腎に石灰化物が認められ、P 多量時には石灰化物が認められず、相反する結果をえた。

肝では一部のラットに脂肪変性が認められ、肺では気管支周囲の円型細胞の浸潤が認められた。Selye⁷⁾の鉛投与により、内臓に石灰化が認められたとの報告があるが、本実験ではこの鉛による影響は無かったと思われる。以上のごとく Mg 欠乏所見は 2P 群より 0P 群に著明に表われたのに、歯牙の石灰化に関しては反対の結果をえたが、その理由については本実験では説明しえなかった。今後検討を要する問題であろう。

結 論

Mg 欠乏飼料及び同飼料中の Ca 量を増減して飼育した家兎及びラットについて、硬組織生体染色による切歯象牙質の変化ならびに諸臓器の病理組織学的変化を検索した(実験Ⅰ)。さらに Mg 欠乏飼料中の Ca 及び P 量の増減による影響について、ラットによる同様の検索を行った(実験Ⅱ)。

I) 家兎においては Mg 欠乏症状の出現はラットの場合より遅く且つ軽度であった。病理組織学

的には切歯象牙質に、象牙芽細胞層の扁平化、変性、幼弱象牙質の形成を認め、顎関節頭では予備軟骨層の減少、軟骨細胞の変性、萎縮を認め、膝関節脛骨頭では骨梁の形成不全、軟骨細胞の萎縮、骨梁の量の減少、配列不正を認めた。Mg 欠乏におよぼす Ca の影響としてはラット及び家兎ともに高 Ca 群では石灰化不全が早く出現し、低 Ca 群では遅くなる傾向が認められた。腎でも Mg 欠乏高 Ca 群に尿細管内に石灰化物が認められた。なお、Mg 欠乏症状ならびにこれらの所見は家兎よりラットに、早期にかつ著明に出現した。

II) Mg 欠乏ラットに及ぼす Ca および P 投与量の影響としては、Mg 欠乏症状は P 欠乏群にみられ、高 P 群では特に認められなかった。また、膝関節脛骨頭の骨梁の形成不全も P 欠乏群において著しく、腎における石灰化物の沈着もみられた。しかし、切歯象牙質の石灰化不全は高 P 群において P 欠乏群よりも早期に出現し、さらに高 Ca 群ほど早期であった。

稿を終るに臨み、終始御指導を賜った林進武教授に心から感謝の意を捧げます。懇切なる御校閲を賜った口腔病理学教室の山本肇教授に謝意を表します。なお、本研究を成就するにあたり種々御指導、御協力をいただいた内藤博博士、青木宏次博士、中久木一乗博士、大浦重光学士、佐藤敏夫学士、豊田正武学士に深謝します。本論文の要旨は昭和44年第14回日本口腔外科学会総会、昭和45年第24回日本口腔科学会総会、昭和46年第25回日本口腔科学会総会、昭和46年第16回日本口腔外科学会総会ならびに昭和47年第26回日本口腔科学会総会にて発表した。

抄録：マグネシウム（以下 Mg）欠乏家兎及びラットで、カルシウム（以下 Ca）量を増減し、硬組織生体染色による切歯象牙質の変化ならびに諸臓器を病理組織学的に検索した。さらに Mg 欠乏ラットで、Ca 及び P（以下 P）量を増減し、同様の検索を行った。

その結果、Mg 欠乏におよぼす Ca の影響としてはラット及び家兎ともに高 Ca 群で、切歯石灰化不全が早く出現し、低 Ca 群では遅くなる傾向が認められた。この所見は家兎よりラットに早期にかつ著明に出現した。

Ca 及び P の影響による Mg 欠乏症状は P 欠乏群にみられ、高 P 群では認められなかった。しかし、切歯象牙質の石灰化不全は高 P 群において P 欠乏群より早期に出現し、さらに高 Ca 群ほど早期であった。

文 献

- 1) 藤田拓男, 大野承二, 尾形悦郎, 佐々木 哲: カルシウム—基礎と臨床, 第1版, 21頁, 49頁, 及び79頁, 医歯薬出版, 東京, 1970.
- 2) AIKAWA, J. K.: The role of magnesium in biologic processes. pp. 1-117, Charles C Thomas. Springfield, Ill., 1963.
- 3) 五島孜郎, 関 博磨: 無機質代謝におよぼす乳糖の影響(第4報), 栄養と食糧, 18: 295, 1965.
- 4) 内藤 博: マグネシウム欠乏に関する実験的研究, 口科誌, 18: 628, 1969.
- 5) BECKS, H. and FURUTA, W. J.: Experimental rickets and calcification of dentin, *Arch. Path.* 12: 358, 1931.
- 6) SCHOUR, I.: Calcium metabolism and teeth *J.A.M.A.* 110: 870, 1938.
- 7) BOELTER, M. D. D. and GREENBERG, D. M.: Severe calcium deficiency in growing rats. *J. Nutr.* 21: 61, 1941.
- 8) WEINMANN, J. P. and SCHOUR, I.: Experimental studies in calcification. II. The effect of a rachitogenic diet on the alveolar bone of the white rat. *Amr. J. Path.*, 21: 833, 1945.
- 9) OLIVER, W. M.: The effect of deficiencies of calcium, vitamin D or calcium and vitamin D and of variations in the source of dietary protein on the supporting tissues of the rat molar. *J. Periodont. Res.* 4: 56, 1969.
- 10) 中久木一乗: マグネシウム欠乏に関する実験的研究—マグネシウム欠乏症状に及ぼす飼料中カルシウムの影響—, 口科誌, 20: 433, 1971.
- 11) HARRISON, H. E. and HARRISON, H. C.: Intestinal transport of phosphate, Action of vitamin D, calcium and potassium, *Am. J. Physiol.* 201: 1007, 1961.
- 12) 熊谷 洋: 臨床薬理学大系, 14巻, 51頁, 中山書店, 東京, 1966.
- 13) O'DELL, B. L., MORRIS, E. R. and REGAN, W. O.: Magnesium requirement of guinea pigs and rats. Effect of calcium and phosphorus and symptoms of magnesium deficiency. *J. Nutr.* 70: 103, 1960.
- 14) FORBES, R. M.: Mineral utilization in the rat. I. Effects of varying dietary rations of calcium, magnesium and phosphorus. *J. Nutr.* 80: 321, 1963.
- 15) MORRIS, E. R. and O'DELL, B. L.: Relationship of excess calcium and phosphorus to magnesium requirement and toxicity in guinea pig, *J. Nutr.* 81: 175, 1963.
- 16) HAMURO, Y., SHINO, A. and SUZUOKI, Z.: Acute induction of soft tissue calcification with transient hyperphosphatemia in the KK mouse by modification in dietary contents of calcium, phosphorus and magnesium. *J. Nutr.*, 100: 404, 1970.
- 17) WOOLEY, J. G.: Growth of three-to-four-week-old rabbits fed purified and stock rations, *J. Nutr.*, 52: 39, 1954.
- 18) 太田敏郎: 循環器系病変と血清の Magnesium および Calcium との相関に関する研究, 福岡医学雑誌, 54: 1208, 1963.
- 19) 岡田正弘, 三村 二: 鉛塩に依る骨及び歯牙組織新生化灰部位生体染色法, 口病誌, 11: 365, 1937.
- 20) 石川梧朗, 秋吉正豊: 口腔病理学(I), 2刷, 170頁, 永末書店, 京都, 1971.
- 21) 布施貞夫, 松田 登: 醋酸鉛による硬組織の生体染色法(I), 歯界展望, 15: 297, 1958.
- 22) 布施貞夫, 松田 登: 醋酸鉛による硬組織の生体染色法(II), 歯界展望, 15: 541, 1958.
- 23) 布施貞夫, 松田 登: 酢酸鉛による硬組織の生体染色法(III), 歯の発育速度の測定, 歯界展望, 15: 649, 1958.
- 24) 布施貞夫, 松田 登: 酢酸鉛による硬組織の生体染色法(IV), 歯の発育速度の測定について, 歯界展望, 15: 863, 1958.
- 25) 小椋秀亮: 鉛塩注射による硬組織の生体染色, 歯界展望, 35: 893, 1970.
- 26) OSBORN, T. B.: The inorganic elements in nutrition, *J. Biol. Chem.*, 34: 131, 1981.
- 27) LEROY, J.: Necessite du magnesium pour la croissance de la souris, *Compt. rend. Soc. de Biol.*, 94: 431, 1926, (Aikawa, J. K.: The role of magnesium in biologic processes a review of recent developments, S. Karger, N. Y., 1956. より引用).
- 28) McCOLLUM, E. V.: Effect on the rat of deprivation of magnesium, *J. Biol. Chem.*, 92: 30, 1931.
- 29) GOLBY, R. W. and FYRE, C. M.: Effect of feeding high levels of protein and calcium in rat on magnesium deficiency syndrome, *Am. J. Physiol.*, 166: 408, 1951.
- 30) 五島孜郎, 関 博磨: ラットの Ca, P 代謝におよぼす食餌性タンパク質および Mg レベルの影響(第1報), 栄養と食糧, 20: 382, 1968.
- 31) FEATHERSTON, W. R. MORRIS, M. L., Jr., and PHILLIPS, P. H.: Influence of lactose and dried skim milk upon the magnesium deficiency syndrome in the dog. I. Growth and biochemical data. *J. Nutr.* 79: 431, 1963.
- 32) HAYNES, B. W., Jr. GRAWFORD, E.S. and DEBAKEY, M. E.: Magnesium metabolism in surgical patients, *Ann. Surg.* 136: 659, 1952.
- 33) BARNES, B. A., KRANC, S. N. and COPE, O.: Magnesium study in relation to hyperparathyroidism. *J. Clin. Endocr.*, 17: 1407, 1957.
- 34) AGNA, J. W. and GOLDSMITH, R. E.: Primary hyperparathyroidism associated with

- hypomagnesemia, *New Engl. J. Med.*, **258** : 222, 1958.
- 35) 篠原頼久 : 手術に伴うマグネシウム代謝の研究, 東京医学雑誌, **68** : 537, 1960.
 - 36) POTTS, J. T. and ROBERTS, B. : Clinical significance of magnesium deficiency and its relation to parathyroid disease, *Amer. J. Med. Sc.*, **235** : 206, 1958.
 - 37) ELKINGTON, J. R. : The role of magnesium in body fluids, *Clin. Chem.*, **3** : 319, 1957.
 - 38) HEGSTED, D. M. VITALE, J. J. and McGRATH, H. : The effect of low temperature and dietary calcium upon magnesium requirement, *J. Nutr.* **58** : 175, 1956.
 - 39) MCALEESE, D. M. and FORBES, R. M. : The requirement of magnesium in the rat as influenced by environmental temperature and dietary calcium, *J. Nutr.* **73** : 94, 1961.
 - 40) BUNCE, G. E. JENKINS, K. J. and PHILLIPS, P. H. : The mineral requirements of the Dog. IV. Effect of certain dietary and physiologic factors upon the magnesium deficiency syndrome. *J. Nutr.* **76** : 23, 1962.
 - 41) HOUSE, W. B. and HOGAN, A. G. : Injury to guinea pigs that follows a high intake of phosphates. The modifying effect of magnesium and potassium. *J. Nutr.*, **55** : 507, 1955.
 - 42) FORBES, R. M. : Effects of magnesium, potassium and sodium nutriture on mineral composition of selected tissues of the albino rat. *J. Nutr.*, **88** : 403, 1966.
 - 43) PYKE, R. E., HOEKSTRA, W. G. and PHILLIPS, P. H. : Effects of fluoride on magnesium deficiency in the guinea pig, *J. Nutr.* **92** : 311, 1967.
 - 44) THOMPSON, D. J., HEINTZ, J. F. and PHILLIPS, P. H. : Effect of magnesium, fluoride and ascorbic acid on metabolism of connective tissue, *J. Nutr.* **84** : 27, 1964.
 - 45) TUFTS, E. V. and GREENBERG, D. M. : Biochemistry of magnesium deficiency, 2, Minimum magnesium requirements for growth, gestation, and lactation, and effect of dietary calcium level thereon, *J. Biol. Chem.*, **122** : 715, 1938.
 - 46) DAY, H. G., KRUSE, H. D. and MCCOLLUM, E. V. : Studies on magnesium deficiency in animals. VII The effects of magnesium deprivation, with a superimposed calcium deficiency, on the animal body, as revealed by symptomatology and blood changes, *J. Biol. Chem.*, **112** : 337, 1935.
 - 47) DUCKWORTH, J. and GODDEN, W. : The lability of skeletal magnesium reserves, the influence of rates of bone growth, *Biochem. J.*, **35** : 816, 1941.
 - 48) ELMSLIE, W. P. and STEENBOCK, H. : Calcium and magnesium relations in the animal, *J. Biol. Chem.* **82** : 611, 1929.
 - 49) VITALE, J. J. HELLERSTEIN, E. E., HEGSTED, D. M., NAKAMUEA, M. and FARBMAN, A. : Studies on the interrelationships between dietary magnesium and calcium in atherogenesis and renal lesions, *Am. J. Clin. Nutr.* **7** : 13, 1959.
 - 50) GOLBY, R. W. and FYRE, C. M. : Effect of feeding various levels of calcium, potassium and magnesium to rats. *Amr. J. Physiol.*, **166** : 209, 1951.
 - 51) GOLBY, R. W., and FYRE, C. M. : Effect of feeding high levels of protein and calcium in rat on magnesium deficiency syndrome, *Am. J. Physiol.*, **166** : 408, 1951.
 - 52) GERSHOFF, S. N. and ANDRUS, S. B. : Dietary magnesium, calcium, and vitamin-B₆ and experimental nephropathies in rat, *J. Nutr.*, **73** : 308, 1961.
 - 53) 田中勇雄 : 弗素, カルシウム, 磷及びマグネシウムのラッテ歯牙硬組織に及ぼす影響に関する実験的研究, 岐阜医紀, **8** : 2076, 1960.
 - 54) 五島孜郎, 関 博磨 : 無機質代謝におよぼす乳糖の影響(第3報), 栄養と食糧 **17** : 233, 1964.
 - 55) HAAG, J. R. and PALMER, L. S. : The effect of variations in the proportions of calcium, magnesium and phosphorous contained in the diet. *J. Biol. Chem.* **76** : 367, 1928.
 - 56) ORBAN, B. : Nutrition and teeth, *J.A.D.A.*, **1619**, 1927.
 - 57) BERNICK, S. and HUNGERFORD, G. F. : Effect of dietary magnesium deficiency on the bone and teeth of rat, *J. Dent. Res.* **44** : 1317, 1965.
 - 58) TROWBRIDGE, H. O. and SELTZEN, J. L. : Formation of dentine and bone matrix in magnesium deficient rat, *J. Periodont. Res.*, **2** : 147, 1967.
 - 59) KLEIN, H., ORENT, E. and MCCOLLUM, E. V. : Effect of magnesium deficiency on teeth and their supporting structure in rats, *Am. J. Physiol.*, **112** : 256, 1935.
 - 60) WATCHORN, E. and MCCANCE, R. A. : Subacute magnesium deficiency in rats, *Biochem. J.*, **31** : 1379, 1937.
 - 61) IRVING, J. T. : The influence of diets low in magnesium upon the histological appearance of the incisor tooth of rat, *J. Physiol.*, **99** : 8, 1940.
 - 62) GAUNT, W. E. and ERVING, J. T. : The influence of dietary calcium and phosphorus upon tooth formation, *J. Physiol.*, **99** : 18, 1940.
 - 63) BINUS, W. : Der experimentelle Magne-

- siummangel beim Hund und seine Auswirkungen auf das Zahnsystem, *Dtsch. Stomat.*, **59** : 211, 1968.
- 64) GAGNON, J. SCHOUR, I. and PATRAS, M. C. : Effect of magnesium deficiency on dentine apposition and eruption in incisor of rat, *Proc. Soc. Exper. Biol. Med.*, **49** : 662, 1942.
- 65) WACHER, W. E. C. and VALLEE, B. L. : Magnesium metabolism, *New Engl. J. Med.*, **28** : 431, 1958.
- 66) 青木宏次：マグネシウム欠乏に関する実験的研究，一下顎骨，胫骨骨欠損部の骨治癒過程について，*口科誌*，**19** : 58, 1970.
- 67) LOWENHAUPT, E. SCHUMAN, G. P. and GREENBERG, D. M. : Basic histologic lesions of magnesium deficiency in rat, *Arch. Path.* **49** : 427, 1950.
- 68) YAMANE, G. M. and SINGER, I. : The effect of subminimal magnesium on the syrian hamster, *J. Dent. Res.*, **32** : 708, 1953.
- 69) SCHRADER, G. A. PRICKETT, C. O. and SALMON, W. D. : Symptomatology and pathology of potassium and magnesium deficiencies in rat, *J. Nutr.*, **14** : 85, 1937.
- 70) 竹下 貫：実験的マグネシウム欠乏病の病理組織学的研究，*京都府立医大雑誌*，**73** : 103, 1964.
- 71) SELYE, H. TUCHWEBER, B. and GABBIANI, G. : Calinosis Induced by Lead Acetate, *J. Pharmacol. and Exper. Therap.* **138** : 131, 1962.

Explanation of plates

- Photo 1 Lower incisal dentin of rabbit (Hematoxylin-Eosin stain). Control. No evident change is seen.
- Photo 2 Lower incisal dentin of rabbit (H-E). I group, 5 weeks. Flattening, atrophy and necrosis of odontoblasts and formation of young pre-dentin are seen.
- Photo 3 Lower incisal dentin of rabbit (H-E). II group, 6 weeks. Flattening, degeneration, necrosis and disappearance of odontoblasts are seen.
- Photo 4 Mandibular joint of rabbit (H-E). Control. No evident change is seen.
- Photo 5 Mandibular joint of rabbit (H-E). I group, 6 weeks. Decreasing of pre-calcification layer cells is seen.
- Photo 6 Mandibular joint of rabbit (H-E). II group, 6 weeks. Decreasing of pre-calcification layer cells, degeneration, atrophy and disorder of cartilage cells are seen.
- Photo 7 Knee joint of rabbit (H-E). Control. No evident changes are seen.
- Photo 8 Knee joint of rabbit (H-E). I group, 5 weeks. Atrophy of cartilage cells and osteoblasts is seen.
- Photo 9 Knee joint of rabbit (H-E). II group, 5 weeks. Atrophy, picnosis and disorder of cartilage cells, decreasing of bone trabeculae are seen.
- Photo 10 Tongue of rabbit (H-E). I group, 3 weeks. Calcifications are seen in the muscle.
- Photo 11 Kidney of rabbit (H-E). II group, 5 weeks. Round cell infiltration in the cortex and calcifications in the uriniferous tubule are seen.
- Photo 12 Kidney of rabbit (Von-Kossa stain). I group, 5 weeks. Calcifications are seen in the uriniferous tubules.
- Photo 13 Liver of rabbit (H-E). II group, 5 weeks. Fatty degeneration of liver cells is seen.
- Photo 14 Lung of rabbit (H-E). II group, 5 weeks. Round cell infiltration is seen in the alveolus.
- Photo 15 Lung of rabbit (H-E). II group, 3 weeks. Slight hemorrhagic bronchitis is seen.
- Photo 16 Lower incisal dentin of rabbit (Hematoxylin-Vital stain). Control. No evident change is seen.
- Photo 17 Lower incisal dentin of rabbit (H-V). 0 Mg-1 Ca group. Hypo-calcification appears after about 10 days.
- Photo 18 Lower incisal dentin of rabbit (H-V). 0 Mg-0 Ca group. Dentin formation is not depressed.
- Photo 19 Lower incisal dentin of rabbit (H-V). 0 Mg-2 Ca group. Hypo-calcification appears after about 10 days.
- Photo 20 Lower incisal dentin of rat (H-V). Control. Evident change is not seen.
- Photo 21 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-1 Ca group. Hypo-calcification appears after about 6 days.
- Photo 22 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-0 Ca group. Hypo-calcification appears after about 10 days.
- Photo 23 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-2 Ca group. Hypo-calcification appears after about 3 days.
- Photo 24 Lower incisal dentin of rat (H-V). Control. Evident changes is not seen.
- Photo 25 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-2 Ca-2 P group. Hypo-calcification appears after about 4 days.
- Photo 26 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-1 Ca-2 P group. Hypo-calcification appears about 6 days.
- Photo 27 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-0 Ca-2 P group. Hypo-calcification appears after about 14 days.
- Photo 28 Lower incisal dentin of rat (H-V). Control. Evident change is not seen.
- Photo 29 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-2 Ca-0 P group. Hypo-calcification appears after about 12 days.
- Photo 30 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-1 Ca-0 P group. Hypo-calcification appears after about 16 days.
- Photo 31 Lower incisal dentin of rat (H-V). 0 Mg-0 Ca-0 P group. Hypo-calcification is not seen even after 20 days.
- Photo 32 Knee joint of rat (H-E). 0 Mg-2 Ca-2 P group. Disorder of cartilage cells and slight disformation of bone trabeculae are seen.
- Photo 33 Knee joint of rat (H-E). 0 Mg-2 Ca-0 P group. Evident disformation of bone trabeculae is seen.
- Photo 34 Kidney of rat (H-E). P-rich group. Calcifications is not seen after 3 weeks.
- Photo 35 Kidney of rat (H-E). P-deficient group. Calcifications is seen in the uriniferous tubules in 3 weeks' rats.