総 説

リグナン類の機能性：特にゴマリグナンを中心に

大澤 俊彦

名古屋大学大学院生命農学研究科

(〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町1)

Functionality of Sesame Lignans

Toshihiko OSAWA

Laboratory of Food and Biodynamics Nagoya University Graduate School of Bioagricultural Sciences
(1 Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 464-8601)

Abstract : Lignans are one of the major phytochemicals which have many biological activity. In sesame seeds, unique lipid-soluble antioxidative lignans such as sesamol, pinoresinol and sesaminol together with two major lignans (sesamin and sesamol). Recently, functional activities of these lignans have been extensively examined and found to exhibit many type of biological activities. Addition of these lipid-soluble lignans, novel type of water-soluble lignan glucosides were also found in defatted sesame seeds, and sesaminol can be produced both during the purification process of sesame salad oil and also by the hydrolysis of sesaminol glucosides by intestinal bacteria. By using *in vitro* assay system, sesaminol was found to show the strong protective role from LDL oxidation induced by Cu ion and AMVN by evaluation using immunochemical methods. In order to evaluate the protection against atherosclerosis *in vivo* using rabbits, addition of 10% defatted sesame flour to 1% cholesterol diets protected the formation of atherosclerosis. Addition of 0.2% of the isolated sesaminolglucoside has also been found to significantly reduced the development of atherosclerosis in LDL receptor deficient rabbits (WHHL).

Key words : sesame, lignans, LDL oxidation, sesaminol, sesaminolglucoside

1 「リグナン」とは

リグナンとは、C-6とC-3の結合した p -ヒドロキシフェニルプロパンの2分子が β - β 位で酸化的に結合した化合物である。しかしながら、その後の多くの研究の結果、他の結合様式を持つリグナン類や三量体や四量体なども見出されているので、現在では「 p -ヒドロキシフェニルプロパン単位の酸化的カップリングにより生成した低分子の化合物である」とされている¹⁾。リグナンは、広く植物界に存在しており、特に、木材には、糖に結合したリグニンが重合することにより木材組織を構成する高分子構造体、リグニンの最小単位として知られている。このようなリグナン類は、生薬や漢方薬などの薬理成分としてもよく知られている。リグナンは、生合成的にはシキミ酸が出発物質であり、酸化されて生成した p -ヒドロキシフェニルプロパノイド (I) は酸化されて

共鳴構造を持つラジカル (II) を経て Fig. 1 に示したようなリグナン骨格 (III) が形成された後、基本骨格への酸素分子の導入により、種々のリグナン類縁体が生成されるのである。これら、リグナン類の生理活性としては、特に薬草の有効成分としての研究が数多くなされている。例えば、メギ科のミヤオソウ属 (*Podophyllum species*) の抗腫瘍活性成分として見出された podophyllotoxin 類や、北米産の灌木であるハマビシ科の *Larrea divaricata* には強力な抗酸化成分として知られる nordihydroguaiaretic acid (NDGA) が見出されている。また、台湾で実際に魚を採る時に使われる *Justicia hayatai* の魚毒成分として知られる justicidin A, B をはじめ、抗菌作用や抗かび作用、植物ホルモン効果など多種多様な生理活性が知られている (Fig. 2)。

このように植物成分としてのリグナンは極めて一般的であり、セサミンやセサモリンなどゴマ種子も特有なり

Fig. 1 リグナン類の生合成経路

Fig. 2 生理活性をもつ代表的リグナン類

グナン類を含む植物であることは古くから知られていた。ゴマ種子には多量の脂質が含まれているにもかかわらず、ゴマ種子は高温に長時間貯蔵した後でも他の油脂植物種子とは異なり高い発芽率を保つという特性を持っていることは知られていたが、その理由は明らかではなかった。また、ゴマが体に良い、ということは古くから言われつつけてきたが、その根拠は明確ではなかった。古くは、イスラエルのグループが、ゴマ油中にセサモールを見出していたのが唯一の研究であった。このような背景で、われわれはゴマの持つ機能性が、「酸化ストレス予防効果」に基づくものではないか、との予想のもとに15年以上も前に研究をスタートさせ、まず、ゴマ種

子やゴマ油に存在する脂溶性リグナン類の検索を開始したところ、Fig. 3に示したような4種類の抗酸化リグナン類を得ることに成功した。これらのうち、最も抗酸化性が強く、安定なセサミノールは、特にゴマ油中に大量に存在していることが明らかとなった。この「セサミノール」の発見をきっかけに、「ゴマリグナン類」の持つ新しい機能性を中心にした研究が数多く行われた²⁾。

2 今なぜゴマが注目？

ゴマは紀元前3000年ごろにはすでにナイル川流域で栽培され、その後世界の重要な油脂資荷作物として広く広まってきた。日本でも高い油脂含量とともにその油は

Fig. 3 ゴマ種子中に存在する脂溶性抗酸化リグナン類

高品質であるために珍重され、また、ゴマの効能について特によく知られているのは紀元前3世紀ごろ書かれた「神農本草経」である。その内容は、ゴマを食べると、心臓、肝臓、脾臓、腎臓や肺の機能を高め、肌や骨、脳にも活力を与え、長くゴマを服用すると身が軽くなり、年をとっても老いなくなる」という効用が記されている。また、インドでも「ヨガ」と同時代に始まった伝統的医術である「アーユルベダ」も「ゴマ油」が必須で、数種類の薬草と共に加熱して得られた液を体に塗布したり、滴下させる療法で、アメリカを始め日本でも注目を集めつつある。ところが、このようにわたしたちの食生活に必須な「ゴマ」も日本ではほとんど生産されておらず、大部分を輸入に頼っているのが現状である。輸入先は、スーダン、エチオピアなどのアフリカ諸国からメキシコやコロンビアなどの中南米諸国をへて中国が大部分を占めていたが、中国では自国消費が増えたために激減し、現在はインドやミャンマー、タイなどが主な輸入先であるが、「ゴマ」が品薄のために価格も高騰するといった状態である。日本に輸入されている「ゴマ」のほとんどは未加工の種子で、搾油用と食品用に大別されるが、「むきゴマ」や「練りゴマ」などの加工用は3分の1程度で多くは搾油用である。

日本では「ゴマ油」は、ナタネ油や大豆油に較べて高

品位、高品質とされてきた。現在用いられているゴマ油の製造法は圧搾搾油法が一般的で、製造法により大きく2種類に分けられているが (Fig. 4)、まず頭に浮かぶのは特有のフレーバーを持ち日本はもちろん中国や韓国で料理に欠かせない「ゴマ焙煎油」であろう。一方、他の植物油と同じように搾油後脱色や脱臭などの工程を経て精製され、「太白油」とか「白絞油」とよばれる無色無臭の「ゴマサラダ油」も多く用いられている。ゴマ種子中の油量含量は品種によって異なるが、アメリカの研究グループが721品種の「ゴマ種子」から油分を抽出し含油量を調べたところ、平均値は53.1%で、リノール酸とオレイン酸が主成分である。

ゴマ種子の約20%はタンパク質で、ゴマ油について多く含まれるタンパク質含量の高い食品である。ゴマタンパクを構成しているアミノ酸はとても豊富で、イオウを含むアミノ酸であるメチオニンやシステインなど8種類のアミノ酸では大豆タンパクより優れている。大豆タンパクは植物性タンパク源として最も多く生産されており、その特徴はリジンには富むもののイオウを含むアミノ酸は余り多くないという特徴を備えている。このことから、国連では、大豆タンパクの栄養的な不足はゴマタンパクで補う、すなわち、大豆タンパクとゴマタンパクを1:1で混合することで理想的なアミノ酸組成となる

Fig. 4 2つのゴマ油製造プロセス

ことで推奨しており、また、アメリカでもゴマタンパクを製品化することにより肉食中心の食習慣を変えて行こうという動きがある。ゴマの優れた特徴にミネラル、ビタミンなどの優れた微量成分が注目されている。なかでも、「セレン」は、がんや動脈硬化の予防に重要な役割を果たす微量元素として知られている。ゴマ種子中のセレン含量は、ゴマが育った土壤中のセレン含量に依存しているが最も多く含む食品として知られており、特にセレン含量が高いのはベネズエラ産のゴマである。またゴマには鉄、カルシウム、リン、蔞酸などのミネラルにも富んでおり、また、ビタミンB₁、B₂、ナイアシンなどの栄養上重要なビタミンにも富んでいるが、ゴマに多く含まれるのはビタミンEである。ビタミンEとして存在するのは、 α -トコフェロールは少なく、大部分は γ -トコフェロールが占め、最近では「ゴマリグナン類」との間で相乗効果が発見され、新しい機能性として注目されている。本稿では、ゴマに特徴的な「リグナン類」がゴマ油の保存性や風味などの食品としての優れた面のみならず、「がん」や「老化」をはじめとする疾病の予防にも果たす重要な役割について最近の研究を中心に紹介してみたい³⁾。

3 ゴマリグナン類の抽出と抗酸化性について

ゴマ種子中の主要なリグナン類はセサミンとセサモリンである。いずれもゴマ種子中に0.3~0.5%という高含量に存在するリグナンであるが、今まで、ほとんど研究がなされなかった。僅かに、第二次世界大戦中にドイツでピレスリンやロテノンといった殺虫剤に対するノックダウン相乗効果が報告されていたのみであったが、その後、チドメグサ (*Hydrocotyle sibthorpioides* Lam) の止血作用の有効成分としてトセサミンが見出されていた位であった。ところが、このセサミンについては、京都大学の清水らの研究グループを中心に糸状菌によるジホモ γ -リノレン酸からアラキドン酸への変換に重要な $\Delta 5$ 不飽和酵素の特異的な阻害剤であることが発見されて以来、多くの機能性に関する研究成果が発表され注目が集められている。一方、セサモリンの機能性については今まで全く研究例がなかったが、われわれのグループにより、酸化ストレスの傷害の予防に重要な役割を果たしていることが明らかにされている³⁾。

「ゴマ油」は他のサラダ油に較べて、開封後、長期間放置しておいても酸化的劣化が起きにくく、貯蔵安定性に優れていることが経験的にも、また、多くの研究者にも知られていた。実際に、わたしたちの研究でも、Fig. 5に示したように、いろいろな植物油を放置しておく

Fig. 5 市販植物油の貯蔵中の劣化 (60°C)

の酸化安定性は、「焙煎ゴマ油」の黄色い色の原因である「メラノイジン」とセサモリンの熱分解物であるセサモールが抗酸化性に重要な役割を果たしていることは前から知られていたが、「ゴマサラダ油」の場合は、トコフェロールの含量も他のサラダ油に較べてそれほど多くなく強力な酸化安定性の理由は長い間不明であった。われわれの研究グループにより、この「酸化安定性」の理由を化学的に解明することを目的とした研究が行われた結果、明らかとなったのは、この「ゴマサラダ油」を精製する過程、すなわち、脱色・脱臭の過程で強力な抗酸化物質「セサミノール」が二次的に生成し、トコフェロールの4~5倍も含まれていることから、ゴマサラダ油の抗酸化性の本体はセサミノールであるとの結論に至った。

このような研究を通して、さらに筆者らが興味をもったのはゴマ脱脂粕である。ゴマ油は、大豆油やコーン油などのサラダ油がヘキサシタン抽出により生産されているとは異なり、エキスペラーにより圧搾抽出されている。そのときの発熱のためにゴマ脱脂粕は褐変化しており、飼料や肥料以外の使い道は今のところあまりない。もしも熱変性がなければ、ゴマ脱脂粕の有効利用を考えるうえでゴマタンパク質は重要な栄養源となりうる。また、ゴマ脱脂粕中の有用成分として興味あるものにはセレンのような微量元素やフィチン酸などがあげられ、これらについては後で述べるが、筆者らが特に注目したのは脱脂粕中に存在する水溶性のリグナン配糖体である。ゴマ脱脂粕を80%アルコールで抽出し、その抽出物に β -グリコシダーゼを働かせたところ、セサミノールやセサミノールなどの脂溶性リグナン類縁体をいずれも高収量

で得られたことから、リグナン類縁体はゴマ種子の脂質区分に存在するとともに、配糖体のアグリコンとして脱脂粕中に存在することが推測された。そこで、筆者らが、ゴマ脱脂粕中に存在するリグナン配糖体に着目して研究を進めてきた。これらの物質がゴマ種子のもつ抗酸化的防御機構という面からも大きな役割を果たしているものと推定されたからである。また、今のところ飼料以外にはほとんど利用されていないゴマ脱脂粕の有効利用という観点からも興味をもたれたので、抗酸化性を指標にリグナン配糖体の化学的検索を行った。まず、中国産ゴマ種子を粉碎後、ヘキサンにより脱脂し、その後、80%エタノールで抽出した抽出液を減圧濃縮し、ロタン鉄法を中心としたモデル系による抗酸化性を指標にして、分取用HPLCを含む各種クロマトグラフィーを用いて、活性物質の単離、精製を行った。その結果、4種類のピノレジノールをアグリコンとする配糖体を得ることができた (Fig. 6)。このうち3種類はそれ自身でも強い抗酸化性や生理活性を有しているが、収量の多いピノレジノールのジグルコサイドであるKP2は、それ自身では抗酸化性がなく β -グルコシダーゼで加水分解して初めて抗酸化性を示すリグナン配糖体、(+)-Pinoresinol-di- β -glucopyranosideと同定された。この物質は強い血圧降下作用を有する生薬として知られる杜仲に含まれていることが報告されているが、抗酸化性を示した他の3種類のリグナン配糖体は新規物質である。これらのリグナン配糖体は、特に、水溶性領域で強い抗酸化性を示しており、今までのトコフェロールを初めとする脂溶性抗

酸化剤とは異なった利用、開発が期待されている。そのうち、主活性物質であるKPIは、ピノレジノールのトリグルコサイドであり、他の2種類は新しいピノレジノールのジグルコサイドであり、現在、抗酸化性以外での生理機能についても研究を進めている⁹⁾。

ここでは、まず、ゴマ種子中の2大微量成分である「セサミン」と「セサモリン」についての最近の研究を中心に概説してみたい。

4 多様な「セサミン」の生理機能性

ゴマ油の抗酸化成分ではないために余り注目を集めなかった「セサミン」の生理作用に新しい光が与えられたのは、微生物の高度不飽和脂肪酸生成に対する阻害作用である。京都大学の清水教授らのグループは、アラキドン酸などの多価不飽和脂肪酸の工業的な大量生産に重要な不飽和酵素、Fig. 7に示したような $\Delta 5$ 不飽和酵素に対する特異的な阻害作用という興味ある発見であり、ジホモ γ -リノレン酸の大量生産に大きな役割を果たした。さらに、この研究がきっかけとなって、「セサミン」の持つ動物レベルやヒトに対する栄養学的な分野での生理機能が注目されてきた²⁾。なかでも注目されたのは肝臓機能の増強作用と共に明らかにされたアルコール分解の促進効果であった。ヒトの実験でも、血液中からのアルコールの消失を促進することで顔面温度を低下させ、悪酔いの原因であるアセトアルデヒドの毒性を軽減させるという機能であった。この研究結果が、コンビニエンスストアや健康食品の店で見かける「セサミン」の製品

Fig. 6 ゴマ種子中に存在するピノレジノール配糖体

Fig. 7 多価不飽和脂肪酸の代謝とエイコサノイドの産生とセサミンの作用点

X: セサミンの作用点, PG: プロスタグランジン

TX: トロポキサン, LT: ロイコトリエン

化に結びついたものであった。この「セサミン」の生理効果については、その後も数多くの研究が進められ、特に、コレステロール低下作用に関する研究に注目が集められた。その後も、乳がん細胞の増殖抑制効果や免疫機能の改善など、セサミンの持つ機能性は益々注目されてきている。わたしたち、日本人には伝統的で身近な食品である「ゴマ研究」が一步一步着実に進み、「がん予防食品」や「老化制御食品」として開発されることも単なる夢物語ではなく現実となってくるものと期待されている。

5 セサミンの生理機能

セサミンと共にゴマ種子中に大量に含まれている抗酸化リグナン類としてセサモリンが知られている。しかしながら、今までにセサモリンについての生体内の生理作用についてはまったく研究が行われていなかった。そこで、われわれは、ラットを用いて生体内でセサモリンの消化管吸収及びセサモリン投与による体内分布や排泄について検討を行った¹⁾。その結果、摂取されたセサモリンは胃でセサモールやセサモリノールに変換して生体内に吸収、各組織に分布することが明らかになった。セサモリンは約25%が生体内に吸収され、代謝され、特に、ラットの肝臓と腎臓での脂質の過酸化を有意に抑制する結果を得た。さらに、我々が特に注目したのは、ガンをはじめとする老年病のマーカーとしてDNAの酸化傷害で生じる8-ヒドロキシデオキシグアノシン (8-OHdG) である。尿中の8-OHdG排泄量と動物の筋肉量の指標であるクレアチニン量との比はDNA傷害量を示しており、尿中の8-OHdG量を測定することは老年病予防の重要なバイオマーカーとなりうる⁶⁾。実際に、8-OHdGを特異的に簡便に測定できるモノクローナル抗体を応用し、1%セサモリンを投与したラットの尿中における8-OHdGの排泄量を測定した結果、肝臓や腎臓における脂質過酸化反応を抑制するとともに尿中の8-OHdGの排泄を有意に抑制していることが明らかにされ¹⁾、治療

ではなく老年病の予防に大きな期待が向けられている。以上の結果から、今まで *in vitro* 系で抗酸化性を示さなかったセサモリンは、油の精製過程でセサミノールに変換するが、生体内でのセサモリンはセサミノールに変換せずセサモールやセサモリノールに代謝され、抗酸化性を発現することが示唆された。

6 セサミノールの機能性

我々は、セサミノールの持つ新しい機能性を調べるため、まず予備的な研究として、ヒト血清中の低密度リポタンパク質 (Low Density Lipoprotein: LDL) に銅イオン (10 μ M) を加えることにより生じるLDL脂質過酸化度をTBARS生成を指標に検討したところ、高脂血症の治療薬として市販されているプロブコールや α -トコフェロールよりもはるかに強い抑制効果を現すという興味ある結果を得た (Fig. 8)⁷⁾。そこで、動物モデルにより、実際に動脈硬化を予防できるかの検討を進めることにしたが、長期間に及ぶ動物実験では大量の実験試料が必要となる。そこでわれわれは、その素材としてゴマ油精製工程で生じる副産物に着目した。ゴマサラダ油の製造工程の中で、セサミノールは酸性白土を用いたゴマサラダ油の脱色、脱臭工程で二次的に生成し、脱色、脱臭スカムと呼ばれる廃棄物中に大量に含まれていたもので、われわれは、このスカムに着目し、大量にセサミノールを得る研究を進めてきた。現時点での抽出コストは、大豆脱脂スカムからトコフェロールの抽出に比較してはるかに高価であるが、セサミノールに老化や発がんに至る疾病の予防の効果が明確になり機能性を付加することができれば、この未利用資源としてのゴマ脱脂スカムの応用、利用への道が開かれるものと確信している。

ところが、最近の研究の結果、ゴマ種子中に水溶性のセサミノール配糖体が大量に存在していることが明らかとなった。これらのセサミノール配糖体はそれ自身抗酸化性はもたないものの、食品成分として摂取したのち、特に、腸内細菌のもつ β -グルコシダーゼの作用でアグ

Fig. 8 銅イオン添加によるLDL酸化に対する抗酸化物質の抑制効果

Fig. 9 腸内細菌によるセサミノール配糖体からセサミノールへの変換

リコンが加水分解を受けてから腸管から吸収され、最終的には脂溶性であるセサミノールが血液を経て各種臓器中に至り、生体膜などの酸化的障害を防御するという重要なのではないかと考えられた。すなわち、Fig. 9に示したように、セサミノールはゴマ油製造工程で二次的に生成するという経路とともに、ゴマ種子中の水溶性区分にセサミノール配糖体としても存在し、配糖体自身には抗酸化性はないものの、摂取後の腸内細菌の作用でもセサミノールが生成されるという興味ある結果を得ることができた。リグナン配糖体のもう1つの機能として、このような配糖体は抗酸化前駆物質としても定義づけられるのではないかと期待されてきている。すなわち、糖の存在により抗酸化性を示す官能基であるフェノール性水酸基は食品中では保護されているが、食品成分として摂取したのち、特に、腸内細菌のもつβ-グルコシダーゼの作用で加水分解を受けてから腸管から吸収され、最終的には脂溶性であるアグリコンが血液を経て各種臓器中に至り、生体膜などの酸化的障害を防御するという重要な役割ではないかと考えられている。このようなセサミノール配糖体という新しい素材の実際の抗酸化物質として応用開発の可能性を調べるため、最終的には、ヒトを対象とした臨床研究が必要であるが、とりあえず、ウサギを用いた個体レベルでの検討を行った。

ゴマ脱脂粕の有効利用の観点から、今までの試験管レ

ベルの結果から、高脂血症の予防食品として応用できる可能性が考えられたので、高コレステロール負荷（1%コレステロール食）を与えたウサギにおけるゴマ脱脂粕の動脈硬化に対する抑制効果を検討した。コントロール群と脱脂ゴマ粕を投与した実験群は、9週間で1,000 mg/dLを超える高コレステロール血症を起こしたので、ウサギの血清からLDLを分離し、銅イオンによりLDLの酸化誘導したのち脂質過酸化度を検討したところ、ゴマ脱脂粕はLDLでの脂質過酸化産物である4-HNEおよびMDAの付加体の生成を抑制した。また、大動脈内におけるコレステロールの沈着を検討したところ、実験群の大動脈内のコレステロール沈着はコントロール群に比べて有意に抑制した。以上の結果から、ゴマ脱脂粕中に含まれるリグナン配糖体が腸内菌の作用により加水分解され、生成したセサミノールを始めとするリグナン類がLDLの脂質過酸化反応を抑制すると同時に動脈硬化進展を予防する可能性が明らかになった⁸⁾。しかも、ゴマやゴマ脱脂粕という素材の安全性は問題ないと考えられ、今後の動脈硬化予防食品として応用開発の研究の発展が期待されている。また、つい最近に至り、家族性高脂血症のモデルであるWHHL-ウサギへのセサミノール配糖体の投与実験でも抑制効果が確認されており⁹⁾、さらに広範なセサミノール配糖体の有効性が期待されている。

今まで述べたように、これらのリグナン類抗酸化成分は、ゴマ種子の保存やゴマ油の酸化安定性に大きく寄与しているとともに、未利用資源としてのゴマ脱脂粕の有効利用という面からも注目を集めている。最初に述べたように、リグナン類縁体は多くの植物中から見出されているが、油糧種子中に存在するリグナンとしてはゴマリグナンが特異的である。新しいタイプの天然抗酸化物質として油脂食品の酸化防止という食品系での応用、開発の可能性が考えられる¹⁰⁾。

(受付：1999年7月5日，受理：1999年7月12日)

文 献

1) 並木満夫，小林貞作，“ゴマの科学” 朝倉書店

- (1989).
- 2) 並木満夫編，“ゴマの機能性” 丸善 (1998).
 - 3) 大澤俊彦，井上宏生，“スパイスには病気を防ぐこれだけの効能があった” 廣済堂出版 (1999).
 - 4) M-H. Kang *et al.*, *J. Nutr.*, **128**, 1018 (1998).
 - 5) H. Katsuzaki *et al.*, *Biotech. Biochem.*, **56**, 2087 (1992).
 - 6) 大澤俊彦，“フリーラジカル・脂質過酸化傷害マーカーの開発の現状とその応用，フリーラジカルの臨床” **13**, 8 (1998).
 - 7) M-H. Kang *et al.*, *Lipids*, **33**, 1031 (1998).
 - 8) M-H. Kang *et al.*, *J. Nutri.* in press.
 - 9) M-H. Kang *et al.*, *Life Science*, in press.
 - 10) 大澤俊彦，井上宏生，“胡麻の謎” 双葉社 (1999).

[総説] リグナン類の機能性：特にゴマリグナンを中心に

大澤 俊彦

名古屋大学大学院生命農学研究科
(〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町1)

リグナン類は、広く植物界に存在し、様々な生理活性を持つ化合物である。油糧種子中では、特にゴマ種子中に存在するユニークなゴマリグナン類が知られている。主要なリグナン類として、セサミン、セサモリンが知られていたが、ほとんどそれらの生理機能は明らかではなかった。そこで、セサミン、セサモリンをはじめ、セサミノールやピノレジノールなど脂溶性リグナン類が生体内で酸化ストレス予防効果を示すと共に、多くの機能性を有していることが明らかとなった。特に、セサミノールは強力に LDL の酸化を抑制し、ゴマ油の製造工程のみならず脱脂ゴマ粕からも摂取後、腸内細菌によりセサミノール配糖体から二次的に生成することが明らかにされた。さらに、個体レベルにおける動脈硬化予防作用の検討のため、高コレステロール負荷ウサギと共に家族性高脂血症のモデルであるワタナベラビット (WHHL) を対象に実験を行ったところ、有効に抑制し、今後の研究の進展に期待が待たれる。

(連絡者：大澤俊彦) Vol.48, No.10, 1041 (1999)

[総説] 植物エストロゲンとその核内レセプター

金子 秀雄

住友化学工業株式会社生物環境科学研究所
(〒554-8558 大阪府大阪市此花区春日出中3-1-98)

女性ホルモン様作用を有する植物エストロゲンは現在 200 種類が知られており、その中でもイソフラボン類の coumestrol, genistein および daidzein は強い活性を示す。これらのイソフラボン類は、エストロゲンレセプターに対して高い親和性を示す。イソフラボン類は、内分泌攪乱作用で話題となっている合成化合物 (例: bisphenol-A, 4-nonylphenol) よりも強いエストロゲン作用 (*in vitro*) を示し、また、日本人の場合は大豆製品を通じて大量のイソフラボン類を摂取しているために内分泌攪乱作用が議論されている。一方、イソフラボン類は骨粗鬆症治療、前立腺がん予防、乳がん予防、コレステロール低下作用等の種々の薬効があると報告され、植物エストロゲン類のリスク／ベネフィットの両面をよりよく評価するために、さらなる分子レベルの研究の進展が期待される。

(連絡者：金子秀雄) Vol.48, No.10, 1049 (1999)

[総説] テルペノイドの抗変異原性および抗発がん性

宮澤 三雄

近畿大学理工学部
(〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1)

本総説では各種テルペノイドの抗変異原性と抗発がん性について概説する。特に抗変異原性における試験法、変異原物質およびその効果について取り上げた。本稿で扱った 87 種のテルペノイドの抗変異原性および抗発がん性に関する報告は 1989-1999 に報告されたものであり、それらの生理活性の特徴について紹介した。

(連絡者：宮澤三雄) Vol.48, No.10, 1057 (1999)