○日本産おきなくさ屬諸種ノ檢索表

All known Species of Japanese Anemone.

牧野 富太郎

By T. Makino.

●おきなくさ屬 ANEMONE Linn.

(1) 苞ハ花下ニ接在ノ恰モ萼ノ如シ。葉ハ三耳裂、下底ハ心臟形ヲ成ス		(2)
(1) 苞ハ花ト相離ル		(3)
(2) 葉ノ耳片ハ鈍圓頭ヲ成ス		一、すはまざう
(2) 葉ノ耳片ハ銳頭ヲ成ス		二、みすみざう
(3) 子房ハ花柱長ク。瘦果ハ毛アル長尾ヲ曳ク。花ハ點頭シ、萼片毎ニ六片ナリ、花色暗紫赤。葉ハ羽狀深裂、深裂片對生、小裂片互生		三、おきなくさ
(3) 花柱極テ短ク。瘦果ニ尾ナシ。花ハ天ニ朝シ、花色ハ白、藍或ハ紅		(4)
(4) 高サ四半乃至六「デシメ」ノ强健本ニノ上部ニ枝ヲ分ツ。根莖ハ瘦長ニノ長ク曳ク		(5)
(4) 高サ三「デシメ」以下ノ小本、極テ稀ニ四半「デシメ」ニ達スル者アリ。根莖肥厚罕ニ瘦長		(6)
(5) 根葉ハ大形ニノ三全裂、小葉有柄。花徑ハ五乃至六「セ、メ」。萼片多數、舌狀長橢圓形.....四、しうめいぎく		
(5) 根葉ハ三深裂、深裂片長橢圓形、上部尖齒アリ。花徑二「セ、メ」許。萼片五數、廣橢圓形。莖上ノ枝ハ常ニ兩岐ノ出ヅ		五、あうしきな

- (6) 苞葉ノ中ヨリ抽ク小梗ハ二個以上ナリ(繖形の)..... (7)
- (6) 苞葉ノ中ヨリ抽ク小梗ハ唯一個ノミ..... (11)
- (7) 根莖瘦長ニシテ匍枝ヲ成シ。根葉ノ裂片ニハ皆明カナ柄ヲ具ヘ。苞モ亦有柄ナリ..... 六、さんりんさう
- (7) 根莖肥厚。根葉ノ裂片并ニ苞ハ無柄..... (8)
- (8) 體上ニ散毛ヲ被ル。白花。根莖直立。硬質本..... (9)
- (8) 體上總テ無毛。白花往々紅暈アリ。根莖横臥。柔輭本..... 十、にりんさう
- (9) 小梗分枝セズ(單繖形的)..... (10)
- (9) 小梗更ニ梗ヲ分チ花ヲ有ス(複繖形的)..... 九、しこくいちげ
- (10) 體上毛少シ。高サ二乃至三「デシメ」。花徑二「セ、メ」内外。根葉面ノ廣サ五乃至七「セ、メ」内外..... 七、はくさんいちげさう
- (10) 花梗小梗共ニ毛多シ。高サ四半「デシメ」ニ達ス。花徑三半「セ、メ」。根葉面ノ廣サ十五「セ、メ」内外..... 八、せんくわさう
- (11) 苞葉無柄、卵形、披針形或ハ楔形..... (12)
- (11) 苞葉有柄、三全裂..... (13)
- (12) 根葉三全裂、裂片中者ハ三角樣菱狀卵形、側者ハ歪卵形、鋸齒緣。萼片多數、線狀、長橢圓形、藍色..... 十一、ゆきわりいちげ
- (12) 根葉三深裂、深裂片楔形ニシテ三尖裂或ハ鈍齒アリ。萼片五或ハ六數、卵形、白色..... 十二、ちしまいちげさう

- (13) 萼片五數..... (14)
- (13) 萼片多數..... (16)
- (14) 苞葉ノ裂片ハ線形或ハ披針形、全邊或ハ疎ニ鋸齒アリ。根葉ノ裂片ハ卵形、側片ハ二耳ニ分ル、總テ尖裂齒アリ。花徑一乃至一 $\frac{1}{2}$ 「セ、メ」。高サ一乃至二「デシメ」ノ小本..... 十三、ひめいちげさう
- (14) 苞葉ノ裂片羽狀深裂或ハ尖裂鋸齒ヲ成ス..... (15)
- (15) 苞葉ノ裂片ハ羽狀深裂。小梗ハ苞葉ヨリ長ク。萼ノ外面ニ毛アリ..... 十四、いちりんさう
- (15) 苞葉ノ裂片ハ尖裂鋸齒ヲ成ス。小梗ハ苞葉ヨリ短ク。萼ノ兩面全ク無毛ナリ..... 十五、えぞいちげさう
- (16) 苞ノ裂片長橢圓狀倒卵形或ハ楔狀倒卵形、鈍頭、上部二三耳ヲ成シ耳片或ハ鈍齒ヲ有ス..... 十六、あづまいちげ
- (16) 苞ノ裂片深裂尖齒ヲ有ス..... 十七、さくささいちりんさう

上ノ檢索表中ニ收メタル十有六個ノ品種ハ即チ現時吾人ニ知ラレタル該屬ノ本邦產品ノ全數ナリ今左ニ之レガ學名ヲ臚列セン

1. *Anemone Hepatica* Linn. すはななろう
2. *Anemone Hepatica* Linn. var. *acuta* Bigel. みすみなろう
3. *Anemone cernua* Thunb. おろななろう
4. *Anemone japonica* Sieb. et Zucc. しらめさなう 又 さななう
5. *Anemone dichotoma* Linn. あらしさな アイノ名、ふたまたしちげ

- 日本産おきなぐと屬諸種 牧野

日本産おきなぐさ屬諸種 牧野

16. *Anemone Raddeana* Regel. おてまうちげ (新稱)

○うちりんぢうニうらべにいちげノ別稱アリ又ゆさわりいちげニうらべにさうノ副名アリ故ニ本品ヲうらべにいちげト呼ブハ此等ト混雜スルノ恐レアリ依テ予ハ今之レヲあづまいちげト新稱シ以テ其混亂ヲ避クルノ用意ヲナセリ

17. *Anemone altaica* Fisch. おくろあしちめんぢう 又 むりいちげぢう

○こしちげぢうナル者アリニどうぐくいちげト呼ブト云ヘリ此品白花ノモノアリ紫花ノモノアリ全體小形ナリト雖モ別種トなぐさうちりんぢうト分ツベキ標徴ヲ具ヘズ

正誤 予前號ノ本誌上ノ於テ日本産さらしなしようま及びさんばいさう兩屬諸種ノ檢索表ヲ著ハス篇中活字ノ誤植多シ依テ左ニ之レヲ正ス

○247 頁第十行 ●さらしなしようま ハ ●さらしなしようま 屬

○248 頁第十二行 *Cimicifuga japonica* var. *ternata* Maxim. ハ *Cimicifuga japonica* var. *ternata* Maxim.)

○249 頁第一行 *Cimicifuga japonica* var. *bitemata* Maxim. ハ *Cimicifuga japonica* var. *bitemata* Maxim.

此第一行ハ其行頭ヲ前行ト均等ニスベシ

○同頁第五行 ●さんばいさう 屬 ハ ●さんばいさう 屬

○同頁第七行 *Trollius asiaticus* Linn var. *Ledeouri* Maxim. *↳* *Trollius asiaticus* Linn. var. *Ledebourii* Maxim.

○同頁第十二行 ver. *↳* var.

○同頁第十六行 Mianel 氏 *↳* Miquel 氏

○250 頁第二行 ver. *↳* var.

◎ 新 著

○『ボン大學植物學教室細胞學的研究』(前號ノ續) 池野 成 一 郎

○ハーバー氏『子囊ニ於ケル核分裂并ニ分離細胞造成』

Harper, R. A., Kerntheilung und freie Zelltheilung im Ascus. 頁敷二十六圖板二葉

本論文ハ子囊菌 *Erysiphe communis* ノ子囊芽胞發生ノ際ニ於ケル核ノ行爲并ニ芽胞生出ノ狀ヲ論述ス

子囊ニハ其初メ唯一個ノ核アリ此核ニ續テ三回ノ分裂起リ爲ニ八個ノ核ヲ生ジ其内三個乃至六個ノ核ハ芽胞ヲ造成シ他ハ後遂ニ消滅スルモノトス

此三回ノ核分裂ハ其仕方同様ナレモ殊ニ第三回目ノ分裂ヲ以テ研究ニ尤モ便利ナリトス分裂ノ始マラザル内ハ核ニ一個ノ紅色ニ染マル所ノ仁アリ中心球ハ匾平ナル盤狀ヲ爲シテ核膜ニ密着シ其狀恰モ之ト合着セルガ如キ