Rhamnaceæ Formosanæ Liukuensesque.

Auctore

Prof. J. Matsumura.

Ventilago elegans *Hemsl.* Ann. Bot. vol. ix, p. 151, ramulis sulcatis, villosis; foliis brevissime petiolatis ellipticis subacutis, brevissime mucronulatis, vel obovato-cuneatis obtusis, pauci-serrulatis globosis, costis 4-5 subpatentibus; floribus axillaribus 2-4.

Folia supp. 18 mm. longa, 10 mm. lata. Petioli 1 mm. longi.

Takaw, Formosae australi-occidentalis. Benevole misit Cl. A. Henry, no. 489.

Ventilago sp., ramulis teretibus glabrescentibus, foliis longius petiolatis oblongo-acutis mucronatis basi obtusis margine subintegris vel remote subtiliterque serrulatis utrinque glabris nitidis in sicco nigrescentibus, costis 4 suberectis. An nova sp.?

Folia supp. 55 mm. longa, 20 mm. lata. Petioli vulgo 4 mm longi.

Formosa, locus proprius ignotus. Specimen unicum absque flore legit Dr. Honda.

Paliurus ramosissimus *Poir.* Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. vol. xxiii, p. 126.

Paliurus Aubletia Schult. D. C. Prodr. ii, p. 22; Hook. and Arn. Bot. Beech. p. 177; Benth. Fl. Hongk. p. 66 sub *P. Aubletii*; Maxim. Rhamn. Orient. asiat. p. 2.

Aubletia ramosissima Lour. Fl. Cochinch. Tom. I. p. 348.

In Taipei, Formosae borealis, Novembri fr. (T. Makino); ad Kelung (C. Owatari).

Zizyphus Jujuba *Lamk.* D.C. Prodr. II. p. 21; Laws, Hook. Fl. Brit. Ind. I. p. 632; Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. Vol. XXIII, p. 126; G. King, Journ. Asiat. Soc. Beng. Vol. LXV (1896) p. 372.

Rhamnus Jujuba Lour. Fl. Cochinch. Tom. I, p. 195. In Kahtang prope urbem Taiwan, Formosae australi-occidentalis, legit H. Kawakami Octobri 1895; in arenosis prope Taiwan legit Y. Tashiro a. 1896; in monte Takaw legit C. Owatari. fr. Novembri.

Vernacule *Tsooa* dicitur (ex Owatari)

Berchemia lineata DC. Prodr. II, p. 23; Benth. Fl. Hongk. p. 67; Hook. and Arn. Bot. Beech. T. 37; Maxim. Rhamn. Orient. asiat. p. 6; Laws. Hook. Fl. Brit. Ind. I, p. 638; Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXIII, p. 127.

In archipelago Liukiu: ad Senzaki insulae Okinawa legit Yamada anno 1882; in maritimis ins. Okinawa, ins. Ōshima (Tashiro et Tanaka 1887–1890); prope Onnah ins. Okinawa (Matsumura 1897); in Sintik et Tamsui Formosae borealis legit T. Makino fl. et fr. Novembri 1896.

Rhamnella franguloides *Weberbauer*. Rhamn. in Engl. u. Prant. Naturl. Pflanzenf. p. 406.

Microhamnus franguloides Maxim. Rhamn. Orient. asiat. p. 4; Mel. Biol. XII, 431; Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXIII, p. 127.

Rhamnella japonica Miq. Prol. Fl. Jap. p. 218. In montosis ins. Oshima legit Y. Tashiro fr. Septembri anno 1887; ins. Ishigaki archipel. Yaeyama fr. immat. legit S. Tanaka anno 1890.

Ashangi ab indigen. Oshimae vocatur.

Sageretia theezans *Brongn.* Benth. Fl. Hongk. p. 68; Maxim. Rhamn. Orient. Asiat. p. 20; Lawson in Hook. Fl. Brit. Ind. I. p. 641; Hemsl. Journ. Linn. Soc. Bot. XXIII, p. 131. Flores sessiles 2 mm. longi. Calyx 5-fidus, lobis ovatis acutis intus carinatis. Petala calycis lobis multo breviora, brevi unguiculata, concava. Filamenta dilatata, uninervata antheris ovalibus. Fructus 6 mm. longi, calycibus persistentibus.

In ins. Oshima legit Y. Tashiro; ins. Miyako archip. Yaeyama legit S. Tanaka; in Formosa: in Takaw legerunt H. Kawakami et C. Owatari; Suichoolyū (Owatari).

Kuroige (nom. indigen. Oshima) ex Tashiro.

chii-mong (nom. indigen. Formosa) ex Owatari.

Rhamnus virgata *Roxb.* var. *syvestris* Maxim. Rhamn. Orient. Asiat. p. 13.

Pedicelli fructiferi 7–12 mm. longi. Fructus 5 mm. longi et lati, 2–4 pyrenae.

In ins. Okinawa. initio Maii fr. lege anno 1897.

Rhamnus (*Eurhamnus*) **formosana** *Matsumura* sp. nov.

Inermis. Folia perennantia?; rite oblonga. Flores dioeci, pentameri, racemosi. Ovarium triloculare, stylo trifido. Drupa 3-pyrena. Semina dorso profunde sulcata, sulco ab apice ad basin extenso, latiuscule hiantes.

Arbor circiter 6 ped. alta. Truncus circinatione 6 poll. (ex Owatari).

Ramuli brunnei subtomentosi. Folia alternata, petiolata oblonga, alia elliptica alia elliptico-ovata subito acuminata, mucronata, basi obtusa rarius oblique subrotundata, subtiliter mucronato-serrulata, coriacea nitida subtus praeter nervos glabra, costis prominentibus utrinque 6–8 arcuatis. Pl. mas. juven. a me visae racemorum rachidibus, ramulis foliisque villosissimis. an semper? Racemi axillares et terminales. Flores minuti, secus rachidem 6–8 fasciculati. Fl. mas.: calyx (3 mm. longus) campanulatus subvillosus alte 5-lobatus, lobis lanceolatis. Petala 5, calycis lobis breviora, obovata, concava, interdum longe unguiculata glabra. Stamina 5, petalis aequilongis inclusa; filamentis dilatatis carinatis glabris; antheris ellipticis. Ovarium abortivum calycis disco aequilongum. Fl. fem.: calyx hoc fl. mas. parvior, glabrior. Staminodia 5, quam calycis lobos quater breviora, filamentis basi valde dilatatis. Ovarium globosum, glabrum. Drupa globosa nigra, glabra, 3-pyrena. Semina oblongo-ovoidea, 5 mm. longa et lata.

Folia suppetentia maxima 115 mm. longa, 53 mm. lata. Petioli 15–20 mm. longi. Racemi florentes pl. mas. 60–70 mm. longi. Pedicelli 2 mm. longi.

In Takaw (A. Henry No. 1172); Washa et Tooseikaku Formosae mediae legerunt Dr. Honda, et C. Owatari.

Observ. Species *R. javanicae* Miq. affinis (secundum cl. Henry) ad sectionem *Alaternum* DC.⁽¹⁾ pertinere videtur.

Colubrina asiatica *Brongn.* DC. Prodr. II, 30; Lawson in Hook. Fl. Brit. Ind. I, 642; G. King Journ. Asiat. Soc. Beng. vol. LXV (1896) 377.

Ramuli glabri. Folia petiolata alternata, late ovata acuminata crenato-serrulata basi plerumque rotundata utrinque glabra, costis 3–4. arcuatis. Cymae axillares et terminales. Calycis tubus campanulatus, sub-5 angularis; lobis ovato-triangularibus acutis intus carinatis. Petala obovata concavissima, emarginellata vel retusa. Stamina 5, filamentis haud dilatatis quam petala longioribus, sed petalis inclusa; antheris suborbicuribus. Styli 3, breves. Fructus 7 mm. longi, 8 mm. lati, glabri in sicco viridescentes.

Folia suppetentia maxima 90 mm. longa, 50 mm. lata. Petioli 7–10 mm. longi.

In maritinis insularum Nishiomote et Miyako archilagi Yaeyama legit Y. Tashiro anno 1887. Fl. et fr. Julio.

---

(1) D.C. Prodr. II, p. 23; Weberbauer, Rhamn. in Engl. und Prant. natürl. Pflanzenf. 409.