Synopsis Specierum Koreanarum Generis Saussureæ.

auctore

Takenoshin Nakai.

In peninsula Koreana genus *Saussurea* est eximie polyspecificum, et cum *Artemisia* pars difficillimi generis Compositarum facit.

Saussurea Koreana imprimis nostris notanda, sunt tres e. s. *S. affinis*, *S. japonica*, *S. odontolepis* quæ in operis HEMSLEYANIS¹⁾ et PALIBINIS²⁾ enumeratæ. In vol. XVIII 'Acta Horti Petropolitani', V. KOMAROV descripsit multas species novas ex regione Manchuriæ et Koreanæ, et *S. manshurica*, *S. saxatilis* et *S. umbrosa* ibi videri sunt. Postea in Flora Manchuriæ vol. III publicavit *S. grandifolia*, *S. manshurica*, *S. Maximowiczii*, *S. saxatilis*, *S. umbrosa* uti plantæ Koreanæ. Anno 1907 DUNN³⁾ unicam speciem *S. setidens* descripsit. Annis 1909 et 1910 LÉVEILLÉ et VANIOT⁴⁾ sex species ut novas descripserunt, e. s. *Saussurea affinis* v. *conferta*, *S. bicolor*, *S. chinnamponensis*, *S. Taquetii*, *S. Taquetii*, v. *paniculata*, *S. triceps* et . . Vanioti. *Saussurea affinis*, v. *conferta* est *S. affinis vera* sive *Hemistepta carthamoides* mediocriter evoluta.—*S. bicolor* est cum *S. eriolepis*, BUNGE conspecifica.—*S. chinnamponensis* est species propria.—*S. Taquetii* est etiam species propria, veniens proxima ad *S. microcephala*, FR., sed caput densius congestum et folia longe decurrentia sunt. Ejus varietas paniculata est haud varietas sed merus lusus.—*S. triceps* est nihil allia quam *S. Maximowiczii*.

1) HEMSLEY—Journal of Linnæan Society (Botany). vol. XXIII.

2) PALIBIN—Conspectus Floræ Koreanæ. vol. I.

3) DUNN—Journal of Botany (1907).

4) LÉVEILLÉ et VANIOT—Bulletin de Géographie Botanique (1909) et FEDDE.—Repertorium novarum regni vegetabilis. (1910).

zii, HERD.—*S. Vanioti* est forma depauperata *Hemistepta carthamoides* seu *Saussurea affinis*.

Anno 1909 ego descripsi in Tokyo Botanical Magazine *S. koraiensis*, *S. diamantiaca*, *S. japonica* var. *lineariloba*, *S. eriolepis* et *S. seoulensis*, deinde anno 1911 partem secundam Floræ Koreanæ edidi et sequentes species et varietates enumeravi.

1. *Saussurea koraiensis*, NAKAI.
2. *S. japonica*, DC.
var. *subintegra*, REGEL.
var. *pinnatifida*, REGEL.
var. *lineariloba*, NAKAI.
3. *S. eriolepis*, BUNGE.
4. *S. affinis*, SPR.
5. *S. odontolepis*, SCHULZ.
6. *S. Maximowiczii*, HERD.
7. *S. umbrosa*, KOM.
8. *S. setidens*, DUNN.
9. *S. grandifolia*, MAX.
var. *nipponica*, (MIQ) NAKAI.
10. *S. ussuriensis*, MAX.
11. *S. manshurica*, KOM.
12. *S. saxatilis*, KOM.
13. *S. diamantiaca*, NAKAI.
14. *S. triangulata*, TRAUTV. et MEY. β . *elatior*, HERD.
15. *S. seoulensis*, NAKAI.

Inter eas *S. affinis* ex hoc opusculo exclusa; *S. triangulata* est non *triangulata* sed nova species *S. Uchiyamana*, NAKAI. *S. koraiensis* est *S. japonica*, DC. v. *ovata*, (REGEL) KOM., *S. grandifolia* var. *nipponica*, NAKAI est nihil alia quam *S. brachycephala*, FR. quæ considero varietas *S. grandifolia* esse.

Anno 1912 in visi Rec. U. FAURIE et observavi specimina Koreana in suo Herbario servata, invenique duas species novas, quas anno 1913 in Tokyo Botanical Magazine sub nominibus *S. eriophylla* et *S. grandifolioides* descripsi.

In æstate ejusdem anni ego in visi insulam Quelpært, insulam Wangtô et australem partem Peninsulæ et nonnullas *Saussureæ* species discerpsi. Sequenti anno iterum in visi peninsulam Corea-

nam et ex ore fl. Jalu trans Paiktusan (long white mountain v. Paishan) ad ore fl. Tumingan supra 1300 milia passum ambulavi, et nonnullas *Saussureæ* species ad Floram Koreanam novas nec non species novas duas legi.

Nunc igitur sequentes 25 species et 15 varietates ut plantæ Koreanæ sunt agnoscendæ.

1. *S. chinnamponensis*, VNT. et LÉVL.
2. *S. conandrifolia*, NAKAI, sp. nov.
3. *S. diamantiaca*, NAKAI.
 - a. typica*, NAKAI.
 - β. longifolia*, NAKAI, var. nov.
4. *S. elongata*, DC. var. *recurvata*, MAX.
5. *S. eriolepis*, BUNGE.
6. *S. eriophylla*, NAKAI.
 - a. typica*, NAKAI.
 - β. alpina*, NAKAI, nov.
7. *S. grandifolia*, MAX.
 - a. genuina*, HERD.
 - β. macrolepis*, NAKAI, nov.
 - γ. brachycephala*, NAKAI.
 - δ. tenuior*, HERD.
8. *S. grandifolioides*, NAKAI.
9. *S. Hoasii*, NAKAI.
10. *S. japonica*, DC.
 - a. typica*, FR.
 - β. alata*, (REGEL) KOM.
 - γ. subintegra*, (REGEL) KOM.
 - δ. pinnatifida*, (REGEL) KOM.
 - ε. lineariloba*, NAKAI.
 - ζ. ovata*, (REGEL) KOM.
11. *S. manshurica*, KOM.
 - a. typica*, NAKAI.
 - β. pinnatifida*, NAKAI, nov.
12. *S. Matsumuræ*, NAKAI, sp. nov.
13. *S. Maximowiczii*, REGEL.
 - a. typica*, NAKAI.
 - β. serrata*, NAKAI, nov.

14. *S. odontolepis*, SCHULTZ.
15. *S. salicifolia*, DC. var. *angustifolia*, DC.
16. *S. saxatilis*, KOM.
17. *S. seoulensis*, NAKAI.
18. *S. serrata*, DC. var. *amurensis*, HERD.
19. *S. setidens*, DUNN.
20. *S. stenolepis*, NAKAI, sp. nov.
21. *S. Taquetii*, LÉVL.
22. *S. triangulata*, TRAUTV. et MEY.
 - a. genuina*, HERD.
 - β. alpina*, NAKAI, nov.
23. *S. umbrosa*, KOM.
 - a. typica*, NAKAI.
 - β. herbicola*, NAKAI, nov.
24. *S. ussuriensis*, MAX.
 - a. genuina*, MAX.
 - β. incisa*, MAX.
25. *S. Uchiyamana*, NAKAI.

Principalia ingenia systematis *Saussureæ* a clarissimis viris CASSINI¹⁾, LESSING²⁾, DE CANDOLLE³⁾, BENTHAM⁴⁾, J. D. HOOKER⁵⁾, MAXIMOWICZ⁶⁾ et HOFFMAN⁷⁾ etc. adhuc adoptata, sunt inflorescentiæ, involucri squamæ et antherarum caudæ forma.

Sed mea sententia hæ sunt non graves. *Saussurea* imprimo in duas classes perennis et annua v. biennis dividetur, ie. prima est *Saussurea* cum rhizomate perennis et secunda est ea cum radice annua v. bienne tantum seminibus amplificat. Hæ duæ classes ut sequentes forma involucri squamæ, serie pappi, longitudine corollæ, forma antherarum caudæ et inflorescentiæ subdividentur.

Hemistepta carthamoides, O. KUNTZE (*Saussurea affinis*, SPR.)

1) CASSINI—Dictionnaire des Science naturelles de Paris.

2) LESSING—Synopsis generum Compositarum.

3) DE CANDOLLE—Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis vol. VI.

4) BENTHAM et HOOKER—Genera Plantarum. vol. II.

5) J. D. HOOKER—Flora of British India. vol. III.

6) C. J. MAXIMOWICZ.—Melanges Biologique. vol. XI.

7) HOFFMAN—Die Naturliche Pflanzenfamilien. IV. 5.

ab hoc opusculo exclusa, sæpe sub *Saussurea* enumeratur. Polymorpha esse, hæc species multa nomina accepit. e.s.

Aplotaxis Bungei, DC.

A. carthamoides, DC.

A. multicaulis, DC.

Cnicus carthamoides, WALL.

C. multicaulis, WALL.

Cirsium lyratum, BUNGE.

Haplotaxis australasica, MUELL.

H. Bungei, MUELL.

Hemistepta lyrata, BUNGE.

Saussurea carthamoides, HAMILT.

S. Bungei, BENTH. et HOOK.

S. affinis, SPR.

S. stricta, SPR.

S. Vanioti, LÉVL.

Serratula carthamoides, HAMILT.

S. multicaulis, DC.

S. tinctoria, SIEB.

Hæc sine dubio ad *Saussuream* proxima est, sed tubis corollæ tenuissimis, longitudine corollæ tubi, pappis exterioribus persistentibus attamen se a *Saussurea* bene secernit.

Saussurea, DC.

DC. in Ann. Mus. Paris. XVI (1810) p. 197. LEDEB Fl. Ross. II. p. 660, BENTH. et HOOK. Gen. Pl. II. (1876) p. 471. HOOK. fil. Fl. Brit. Ind. III. (1882) p. 365. HOFFM. Pflanzenfam. IV. 5. (1889) p. 320.

Conspectus subgenerum, sectionum et subsectionum.

- A. Planta cum rhizomatibus repentibus elongatis v. brevibus perennis. Corollæ tubus limbo 1–2 plo longior. Pappi 2–3 seriales deciduæ. Anthæræ basi sagittatæ, appendice caudata.Subgn. 1. **Saussurea-vera**, NAKAI.
 - a) Pappi triseriales, extremi imperfecti setulosi, ceteri perfecte annulares plumosi.Sect. 1. **Polychæta**, NAKAI

- b) Pappi biseriales, exteriores imperfecti v. perfecti sed setulosi, interiores plumosi. Sect. 2. **Lagurostemon**, CASS.
- α) Caulis scaposus v. subscaposus. Caput 1 v. 3-5.
Folia subradicalia elliptica v. ovata.
.....Subsect. 1. **Caulescentes**, Hook. fil.
- β) Caulis elongatus foliosus. Inflorescentia corymbosa v. corymboso-paniculata.
.....Subsect. 2. **Corymbiferae**, Hook. fil.
- γ) Involucri squamæ angustissimæ elongatæ erectæ v. reflexæ. Folia sinuata. Inflorescentia racemoso-paniculata.Subsect. 3. **Stenolepis**, NAKAI.
- B. Planta biennis v. forte gemmis innovationibus lateralibus triennis. Pappi biseriales omnes deciduæ, exteriores setulosæ, interiores plumosæ.
- a) Squamæ involucri corollaceo-appendiculatæ. Antheræ basi sagittatæ, appendice caudata.
.....Subgn. 2. **Theodorea**, (CASS.) DC.
- b) Squamæ involucri nunquam corollaceo-appendiculatæ. Antheræ basi truncatæ, appendice eximie elongata.
.....Subgn. 3. **Maritima**, NAKAI.

Subgn. 1. **Saussurea-vera**, NAKAI.

Eusaussurea, Hook. fil Fl. Brit. Ind. III. (1882.) p. 365. p.p.

Planta rhizomate repente perennis. Rhizoma interdum brevissimum. Folia varia. Caput solitarium, racemosum, corymbosum v. paniculatum. Pappi 2-(rarium 3-) seriales. Antheræ basi sagittatæ, cum caudis barbatis v. elongatis. (Sectiones duæ)

Subgn. 1. **Polychæta**, NAKAI, nov.

Pappi triseriales. Corymbus densus. Squamæ involucri ex-appendiculatæ, dorso leviter glutinosæ. (Sp. 1.).

1. **Saussurea grandifolioides**, NAKAI in Tokyo Bot. Mag. (1913). p. 35.

Hab. in Corea media. (FAURIE n. 368. bis.).

Planta endemica !

Sect. 2. **Lagurostemon**, CASS.¹⁾

CASS. Dict. Sc. Nat. LIII. (1828) p. 466. DC. Prodr. VI. p. 532.

BENTH. et HOOK. Gen. Pl. II. p. 472.

Saussurea, CASS. l.c. p. 494.

Benedicta, DC. l.c. p. 533.

Pappi biseriales. Squamæ involucris dorso non glutinosæ.
(Subsectiones tres.)

Subsect. 1. **Caulescentes**, Hook. fil. Fl. Brit. Ind. III. (1882)
p. 372.

Folia radicalia v. subradicalia. Caulis scaposus v. subsca-
posus. Caput 1—paucum. (Species 5).

Conspectus specierum.

1.	{	Folia infra niveo-tomentosa. Caput solitarium terminale.	
		<i>S. eriophylla</i> , NAKAI.	
	{	Folia infra glabra v. arachnoidea. Caput oligomerum.....	2.
2.		Folia secus caulem eximie alato-decurrentia elliptica. Caput
subracemosum.	<i>S. conandrifolia</i> , NAKAI.
	{	Folia non decurrentia.	3.
		Folia ovato-oblonga, infra dense arachnoidea. Involucris
squamæ reflexæ.	<i>S. diamantiaca</i> , NAKAI.
3.	{	Folia elongato-triangularia, infra sparsim aranea Involucris
squamæ erectæ.	4.
		Petioli subglabri. Folia oblongo-triangularia.	<i>S. Uchiyamana</i> , NAKAI.
4.	{	Petioli adpresse villosuli. Folia elongato-triangularia.	
		<i>S. seoulensis</i> , NAKAI.	

2). ***Saussurea eriophylla***, NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXVIII.
(1913) p. 35.

a. typica, NAKAI.

Folia ovata.

Hab. Corea media : in montibus Ouensan (FAURIE n. 1143).

Planta endemica !

1) *Saussurea setidens*, DUNN. verisimiliter huc ducenda, mihi adhuc ignota.

β. alpina, NAKAI, var. nov.

Folia minora v. angusta (5 cm. longa—2 cm. lata; 9-2; 3.5-1.3 etc.), interdum sublyrato-incisa.

Hab. Corea sept.: in arenosis, herbidis et in silvis Paiktusan; sat vulgaris (T. MORI et T. NAKAI). monte Wai-galbon (T. NAKAI)

Planta endemica!

3). **Saussurea conandrifolia**, NAKAI, sp. nov.

Rhizoma breviter repens. Folia subradicalia 3-5 ovato v. oblongo-ovata sparsim arachnoidea argute-serrata acuminata basi cordata (23 cm. longa 12 cm. lata, 15-8.5, 13-10 etc.) basi per petiolem secus caulem alato-decurrentia. Inflorescentia racemosa. Caulis ima angulatus, superiore teres arachnoideus. Caput globosum. Involucri squamæ ovatæ acuminatæ arachnoideæ apice leviter reflexæ.—Specimen mancum. Florentes plantæ non vidi, sed species insigna.

Hab. in Corea sept.: in umbrosis silvis *Abies nephrolepis* montis inter Pyöngan et Hamgyöng 1300 m. ubi huc illuc crescit. (T. NAKAI leg.)

Planta endemica!

4). **Saussurea diamantiaca**, NAKAI *a.* **typica**, NAKAI.

S. diamantiaca, NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXIII. (1909) p. 185. Fl. Kor. II. p. 44.

Hab. in Corea media: in montibus Kumgangsan (T. NAKAI).
Planta endemica!

β. longifolia, NAKAI, var. nov.

Folia omnia radicalia, petiolis 5 cm. haud superantia, lamina 19-20 cm. longa 6.5-8 cm. lata. Sed capitulorum et involucri squamæ figura et foliorum textura a typica non separanda.

Hab. in Corea sept.: in silvis *Picea ajanensis* et *Abies nephrolepis* montis inter Hamgyöng et Pyögan. (T. NAKAI leg.)

Planta endemica!

5) **Saussurea seoulensis**, NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXV. (1911) p. 58. Fl. Kor. l.c.

Pappi exteriores minimi caduci interdum subnulli.

Hab. in Corea media : in monte Namsan Seoul (T. UCHIYAMA) in monte Peukhansan (T. MORI)

Planta endemica !

6. **Saussurea Uchiyamana**, NAKAI, sp. nov.

S. triangulata, var. *elatior*, NAKAI (non TRAUTV. et MEY.) Fl. Kor. II. (1911) p. 44. teste olim a Dr. B. HAYATA in Herb. Kew. Differt mea sententia a posteriore caule humiliore, foliis subradicalibus longe petiolatis, laminis longioribus.

Rhizoma repens basi squamis emarcidis obtectum. Folia subradicalia alterna longissime petiolata. Folia inferiora petiolis 15–19 cm. longis falcato-canaliculatis parce pilosis v. glabris, lamina ovato-lanceolata 18–19 cm. longa 7–8 cm. lata basi leviter cordata v. subtruncata, apice acuminata, margine apiculato-serrata, supra minutissime pilosa, infra primo arachnoidea, demum glabrescentia. Folia media et superiora more ut inferiora, sed decrescentia. Caulis simplex v. ramo unico laterali, araneo-pubescent. Caput solitarium v. secus ramo racemosum, globosum basi rotundatum, foliis squamosis lanceolatis v. linearibus 4–5 mm. longis haud rarum suffultum. Squamæ involucri 7-seriales atro-purpureæ, exteriores ovatae, mediae ellipticae, intimae lanceolatae, omnes acutae exappendiculatae erectae. Pars angusta corollae tubi 6 mm. longa, inflata 2–3 mm. longa. Lobi corollae 3–4 mm. longi angusti purpureo-rosei. Antherae exsertae basi caudatae, appendice barbulatae. Styli bifidi recurvi.

Hab. in Corea media : in silvis montis Kumgangsan. (T. UCHIYAMA).

Planta endemica !

In memoria recentis T. UCHIYAMA legitoris ita nominata est.

Subsect. 2. **Corymbiferae**,¹⁾ Hook. Fl. Brit. Ind. III. (1882) p. 372. HOFFM. in Nat. Pflanzenfamilien IV. 5. p. Folia radicalia nulla v. emarcida v. bene evoluta. Inflorescentia corymbosa, corymboso-paniculata. Foliorum et involucri squamarum forma varia (Sp. 14).

1) **Saussurea sinuatoides**, NAKAI. sp. nov.

S. sinuata forma *japonica* NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXIII. (1909) p. 192.

Conspectus specierum et varietatum.

1	{	Folia secus caule plus minus decurrenti-alata	2.
	{	Folia nunquam decurrentia	6.
2	{	Folia infra niveo-tomentosa linearia. Corymbus densus.	
	{	Involucris squamæ exappendiculatæ arachnoideæ.	
		<i>S. salicifolia</i> , DC. var. <i>angustifolia</i> , DC.	
	{	Folia infra viridia v. glaucina sed non niveo-tomentosa. ...3.	
3	{	Folia elongato-triangularia basi leviter sinuata v. truncata	
	{	v. cuneata.	<i>S. Hoasii</i> , NAKAI.
	{	Folia lanceolata, oblanceolata v. angusta.	4.
4	{	Folia lanceolata v. oblanceolata, viva leviter glaucina.	
	{	Corymbus densus. Caput oblongum diametro 5 mm.	
	{	Involucris squamæ obtusæ exappendiculatæ.	
		<i>S. serrata</i> , DC. var. <i>amurensis</i> , HERD.	
	{	Folia angusta elongata viridia. Caput globosum. Involucris	
	{	squamæ appendiculatæ recurvæ.	5.
5	{	Folia viridissima, radicalia usque 5-7 cm. lata in umbrosis	
	{	silvæ incola.	<i>S. umbrosa</i> , KOM.
	{	Folia viridia, radicalia 2-3 cm. lata. In herbis incola.	
		<i>S. umbrosa</i> , KOM. v. <i>herbicola</i> , NAKAI.	

Quum ego cum figura KOMAROVIANA *S. sinuata* hanc comparanda, ædem satis proxima esse consideravi, sed vero exqua longe distat. Affinior ad *S. kaimontata*, TAKEDA sequenti anno edita, sed involucris squamis 7-serialibus et exterioribus mediisque recurvis etiam exqua differt.

Caulis ad apicem rhizomatis repentis terminalis crispulo-ciliatus. Folia radicalia petiolis 5-10 cm. longis, lamina ambitu oblongo-ovata, medio et basi profunde sinuata, margine mucronato v. punctulato-serrata, subtus pallida glabra, supra viridia sparsissime ciliata, apice acuminata 5-9 cm. longa 4-6 cm. lata. Folia caulina media radicalibus conformia sed brevius petiolata, superiora late-ovata acuminata mucronato-serrata, suprema late-lanceolata subsessilia. Corymbus fere racemosus. Caput campanulatum basi obtusum apice latissimum 1-1.2 cm latum. Involucris squamæ 7-seriales leviter aranæ virides, exteriores v. fere omnes caudato-acuminatæ et recurvæ, sed caudis duplo brevioribus quam in *S. sinuata*. Flores purpurei v. lilacino-purpurei. Pars angusta tubi corollæ 5 mm., inflata, 2 mm. longa. Lobi corollæ angusti 4 mm. longi. Anthere exsertæ basi caudatæ. Pappi biseriales albi. Series exteriores imperfecti cum setis 1-3 mm. longis compositi, interiores perfecti plumosi 8-9 mm. longi. Stigma bifidum minutissime setulosum basi ciliatum.

Nom. Jap. Takao-higotai,

Hab. Nippon: in silvis montis Takaosan (C. FUNABASHI et T. NAKAI).

Planta endemica!

- 6 { Folia infra niveo-tomentosa.7.
 { Folia infra glabra v. arachnoidea.8.
- 7 { Involucris squamæ arachnoideæ v. floccosæ.
 {*S. eriolepis*, BUNGE.
 { Involucris squamæ sericeo-villosulæ.*S. saxatilis*, KOM.
- 8 { Folia media latissima utrinque attenuata, ambitu lanceolata
 { v. oblanceolata.9.
 { Folia basi v. circa basin latissima, basi sinuata v. subtrun-
 { cata10.
- 9 { Folia argute-serrata. Caulis foliosus.
 {*S. Maximowiczii*, HERD. v. *serrata*, NAKAI.
 { Folia pinnatifida. Caulis circa basin foliosus.
 {*S. Maximowiczii*, HERD.
- 10 { Caput ovatum v. globosum v. obovatum.11.
 { Caput oblongum v. cylindricum.12.
- 11 { Involucris squamæ atropurpureæ obtusiusculæ v. acutæ.
 { Caput corymbosum vulgo foliis suffultum, ovatum. Folia
 { elongato-triangularia.
 {*S. triangulata*, TRAUTV. et MEY.
 { Involucris squamæ virides v. purpureæ. Inflorescentia pani-
 { culata non foliosa. Caput globosum v. obovatum v. cam-
 { panulatum.*S. grandifolia*, MAX.
- Caput globosum. Squamæ non appendiculatæ
 leviter arachnoideæ. Folia latissima. Florens
 maxime mense Augusto*α. genuina*, HERD.
 Caput minus diametro 6–8 mm. Squamæ et
 folia ut typus. Florens cum typo eodem tem-
 pora.*β. microcephala*, NAKAI.
 Caput obovatum oligomerum. Involucris squamæ
 glaberrimæ acuminatæ. Florens ut præcedens.
γ. brachycephala, NAKAI.
 Caput globosum. Squamæ longe appendiculatæ
 glaberrimæ. Folia ut typus sed tenuior. Flores
 ut antea.*δ. macrolepis*, NAKAI.
 Caput elliptico-globosum. Involucris squamæ
 virides fuscociliatæ. Folia tenuia. Florens
 maxime mense Julio.*ε. tenuior*, HERD.

- 12 { Involucris squamæ erectæ adpressæ.13.
 { Involucris squamæ reflexæ.16.
 { Involucris squamæ glaberrimæ v. fere glabræ. Caput cylindricum. Folia chartacea.14.
 13 { Involucris squamæ plus minus arachnoideæ. Caput oblongum. Folia tenuia.15.
 { Folia elongato triangularia margine calloso-serrata.S. *manshurica*, KOM.
 14 { Folia pinnatifida, lobis homomorphis.S. *manshurica*, KOM. var. *pinnatifida*, NAKAI.
 { Folia triangularia v. ovata margine calloso-serrata.S. *ussuriensis*, MAX.
 15 { Folia margine profunde incisa.S. *ussuriensis*, MAX. var. *incisa*, MAX.
 { Caput globosum diametro 1 cm. Involucris squamæ appendiculatæ recurvæ. Folia sagittato-lanceolata integra v. sinuata.S. *elongata*, DC. β. *recurvata*, MAX.
 16 { Caput oblongum v. si globosum diametro 5–6 mm.17.
 { Folia pinnatifida v. bipinnatifida ambitu oxata v. oblongo-ovata. Involucris squamæ purpureæ.S. *odontolepis*, SCHULTZ.
 17 { Folia argute-serrata, late-lanceolata. Corymbus densissimus. Involucris squamæ purpureæ. ...S. *Matsumuræ*, NAKAI.

7). **Saussurea salicifolia**, DC. in Ann. Mus. Paris XVI. (1810) p. 200.

β. **angustifolia**, DC. Prodr. VI p. 533. HERD. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1868) p. 8.

S. salicifolia, DC. var. *major*, LEDEB. Fl. Alt. IV. p. 29.

Fl. Ross. II. p. 760. fide HERD.

S. multiflora FISCHER fide HERD.

Hab. in Corea boreali finitima : in silvis Laricis pede montis Paiktusan, ad supremum flum. Tumingan (T. NAKAI).

Distr. Baical. Dahuria, Mongolia, Sibiria orient., Altai et Manshuria.

8). **Saussurea umbrosa**, KOM. in Act. Hort. Petrop. XVIII.

p. 424. Fl. Mansh. III. p. 739. t. XV. NAKAI Fl. Kor. II. p. 43.

Hab. in Corea sept.: in silvis Jalu supremæ (T. NAKAI).

Distr. Manshuria.

var. **herbicola**, NAKAI.

Folia angusta. Caput præter terminale angustum.

Hab. in Corea sept.: in herbidis Jalu supremæ (T. NAKAI leg.).

Planta endemica !

9). **Saussurea serrata**, DC. in Ann. Mus. Paris. XVI (1810) p. 534.

var. **amurensis**, HERD. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1868) p. 19. KOM. Fl. Mansh. III. (1907) p. 735.

Folia viva plus minus glaucina. Vulgo 4–5 pedales et eximie socialiter crescit. Species insignia.

Hab. in Corea sept.: secus torrentibus silvæ *Picea ajanensis* et *Abies nephrolepis* Hamgyöng austr. (T. NAKAI et T. MORI).

Distr. Amur.

10). **Saussurea eriolepis**, BUNGE in litt. fide DC. Prodr. VI. p. 535 sub *S. discolor*. HERD. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1868) p. 31. FRANCH. Pl. Dav. p. 179. FORBES et HEMSL. in Journ. Linn. Soc. XXIII. p. 464. DIELS in ENGL. Bot. Jahrb. XXIX. p. 624.

S. discolor DC. β . *eriolepis*, BUNGE. MAX. Ind. Fl. Pek. p. 473.

S. amurensis, DC. (non TURCZ.) Prodr. VI. p. 534.

S. bicolor, VNT. et LÉVL. in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. (1909) p. 145.

Hab Corea austr.: monte Chirisan (T. MORI, n. 348. T. NAKAI, n. 623) Fusan (T. UCHIYAMA, FAURIE n. 1093) in montibus Naipiang (FAURIE n. 371) Mokpho FAURIE, n. 1103).

Quelpært: in monte Hallaisan (T. ISHIDOYA, n. 96. T. MORI, n. 123, 348. TAQUET, n. 1013, 5711. S. ICHIKAWA et T. NAKAI).

Distr. China bor. et med.

- 11). **Saussurea saxatilis**, KOM. in Act Hort. Petrop. XVIII. p. 422. Fl. Kor. III. (1907) p. 733, t. XIII. NAKAI Fl. Kor. II. (1911) p. 44.

Hab. in Corea sept. ; Fluvium Jalu sup. : vallis Czandshingan (KOMAROV, n. 1617) Radanpo (T. MORI, n. 355). in silvis secus vallis Chanjingan (T. NAKAI)

Planta endemica !

- 12). **Saussurea Maximowiczii**, HERD. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. (1868) p. 14. MAXIM. in Mél. Biol. IX. (1874) p. 337. FR. et SAV. Enum. Pl. Jap. I. p. 254. FR. in Bull. Herb. Boiss. V. (1897). p. 537.

S. triceps, LÉVL. et VNT. in FEDDE Rep. (1910) p. 169.

Miyako-azami in Somokudzusetsu XV. t. 46.

Hab. in Quelpært : in herbidis Hallaisan (TAQUET, n. 1017). Archipelago Coreano : insula Kyosaitô (T. MORI, n. 366). Corea media : circa Kôyang (T. UCHIYAMA) monte Namhansan (T. UCHIYAMA) Suigen (H. UEKI, n. 272, 356, 595). Corea sept. : Fl. Jalu super. circa Ucenpo (KOMAROV, n. 1615).

Distr. Amur, Manshuria et Japonia.

var. **serrata**, NAKAI.

Folia omnia tantum calloso-serrata, interdum inferiora leviter sinuata.

Hab. in Corea media : circa Kôyang (T. UCHIYAMA) cum typo mixte crescit.

Planta endemica !

- 13). **Saussurea Hoasii**, NAKAI. in Tokyo Bot. Mag. XXVIII. (1914) p. 258. nom. nud. XXIX. (1915) p. 10.

Rhizoma longe repens. Caulis basi purpureus, ceterus glaber viridis usque 40–45 cm. altus. Folia radicalia triangularia argute-serrata 4–5 cm. longa 2.5–3.5 cm. lata, supra glabra v. minutissime setulosa, subtus glabra pallidiora, petiolis 5 cm. longis. Folia inferiora radicalibus conformia, media rhombeo-

acuminata, basi cuneata, secus caule plus minus decurrentia, superiora late-lanceolata v. ovato-lanceolata sessilia. Caput corymbosum 3–5, terminale subsessile, fere omne foliis suffultum. Involucri squamæ 5–6 seriales lucidæ apice atropurpureæ obtusæ v. obtusiusculæ. Flores purpurei. Pappi sordide fuscentes, biseriales, decidui, exteriores setulosi, interiores plumosi.

Hab. in Corea bor. finitima : in herbidis silvæ Laricis pede montis Paiktusan sive Shanpeishan (T. MORI, n. 54, T. NAKAI).

Planta endemica !

Hor. recens HOASI cui olim magister Hamgyöng borealis fuit, in æstate anni 1913 regionem Shanpeishan investigandi causa ad jugum ejusdem expeditionem fecit. In hac expeditione T. MORI, magister scholæ in Seoul communicavit hancque species aliis ducentis speciminibus ubi legendam mihi concessit. Ego ipse etiam eadem in herbidis silvæ Laricis crescendas in æstate sequentis anni legi.

14). *Saussurea triangulata*, TRAUTV. et MEY. Fl. Ochot. p. 58. t. 29. MAX. Prim. Fl. Amur. p. 167. SCHMIDT. Amg. n. 39. et Sachal. n. 259. KOM. Fl. Mansh. III. p. 737.

α. *genuina*, HERD. Pl. Radd. III. 3. p. 33.

Hab. Corea sept. : in herbidis Waigalbon 1800 m. 11. VII. 1914. (T. NAKAI, n. 1591).

Distr. Amur et Ussuri.

β. *alpina*, NAKAI.

Planta parva usque 10 cm. alta. Caput 3–4 congestum.

Hab. in herbidis alpinis Paiktusan 2200 m. et supra (T. NAKAI).

Planta endemica !

15). *Saussurea grandifolia*, MAX. in Prim. Fl. Amur. p. 169. et in Mém. Biol. IX. p. 342. FR. et SAV. Enum. Pl. Jap. I. p. 253. FR. in Bull. Herb. Boiss. V. (1897) p. 540.

S. *nikoensis*, FR. et SAV. Enum. Pl. Jap. II. p. 407.

α. *genuina*, HERD. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. (1868) p. 15. KOM. Fl. Mansh. III. (1907) p. 726.

Hab. in Corea sept. : Shayurei (T. MORI, n. 298) in herbidis Hoanguito (T. NAKAI).

Distr. Amur, Ussuri, Manshuria orient. et Nippon merid. .

β. **microcephala**, NAKAI.

Caulis usque 1.30 m. angulato-striatus barbulatus, pilis deciduis. Folia inferiora late-ovata basi sinuata apice acuminata, margine argute-serrata, supra sparsissime pilosa subtus glabra sed leviter pallidiora. Folia superiora ovato-acuminata et sessilia. Inflorescentia corymboso-paniculata, ramis elongatis. Capitula campanulata 6–8 mm. lata. Involucri squamæ leviter araneæ 6–8 seriales virides sed leviter purpurascentes exappendiculatæ.

Hab. in Corea sept. : secus vias margine silvæ montis Kalporyong (T. NAKAI).

Planta endemica !

γ. **brachycephala**, NAKAI.

S. brachycephala, FR. in Bull. Herb. Boiss. V. (1897), p. 540.

S. grandifolia, var. *nipponica*, NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXV (1911) p. 58. Fl. Kor. II. (1911). p. 43.

Hab. in Corea media : monte Kumgangsán (T. UCHIYAMA).

Distr. Nippon.

δ. **macrolepis**, NAKAI.

Folia late-triangularia v. late-ovata glabra.

Hab. in Corea austr. : monte Chirisan (T. NAKAI, n. 626).

Planta endemica !

ε. **tenuior**, HERD. l.c. p. 16. Kom. Fl. Mansh. III. p. 726.

Hab. in Corea sept. : in silvis montis inter Hamgyöng et Pyongan (T. NAKAI) in montibus Changjin (T. NAKAI) in silvis secus fl. Changjingán (T. NAKAI) in silvis montis Atokryöng (T. NAKAI).

Distr. Manshuria orient., Ussuri et Amur.

16). **Saussurea manshurica**, KOM. in Act. Hort. Petrop. XVIII. p. 424. Fl. Mansh. III. p. 730. t. XII. NAKAI, Fl. Kor. II. p. 44 et in Tokyo Bot. Mag. XXVI. (1912) p. 39. SUIZEV. in Trav. Mus. Bot. Acad. Imp. Sc. Petersb. IX. (1912). p. 133.

α. **typica**, NAKAI.

Folia margine serrata, non incisa.

Hab. in Corea sept.: districtus Samsu, Fl. Jalu. Trajectus Peksan-ien (KOMAROV, n. 1614) Myun-Moun-Tang (MILLS, n. 396) Saikarei (T. MORI, n. 269) in silvis secus fl. Chang-jingan, haud rarum (T. NAKAI) in silvis Jalu supremæ, haud rarum (T. NAKAI).

Distr. Amur.

β. **pinnatifida**, NAKAI.

Folia pinnatifida. Cet. ut typo.

Hab. in silvis fl. Jalu supremæ cum typo mixte crescit. (T. NAKAI.)

Planta endemica !

17). **Saussurea ussuriensis**, MAX. in Prim. Fl. Amur. (1859) p. 167. et in Mél. Biol. IX. p. 340. REGEL, Tent. Fl. Uss. n. 290. FR. et SAV. Enum. Pl. Jap. I. p. 254. FR. Pl. Dav. p. 181. FORBES et HEMSL. in Journ. Linn. Soc. XXIII. p. 468. FR. in Bull. Herb. Boiss. V. (1897) p. 538. KOM. Fl. Mansh. III. p. 739. NAKAI. Fl. Kor. II. p. 43.

α. **genuina**. MAX. in Prim. Fl. Amur. p. 168. HERD. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. (1868) p. 13. KOM. Fl. Mansh. III. (1907). p. 740.

Hokuchi-azami in Somokudzusetsu vol. XV. t. 48.

Hab. in Corea media : inter Syöhön et Punjuuön (T. UCHIYAMA).

in Corea sept. : in silvis Hoangguito (T. NAKAI) monte Musangryöng. (K. MAEDA). Anshu. (T. NAKAI).

Distr. Ussuri et Nippon.

β. **incisa**, MAX. l.c. HERD. l.c. KOM. l.c.

Kiku-azami v. *Itachi-azami* in Somokudzuretsu vol. XV. t. 47.

Hab. in Corea austr. : Mokchang (T. UCHIYAMA).

in Corea media : monte Kumgangsán (T. UCHIYAMA).

in Corea sept. ; Yonggaksan (H. IMAI) Ouensan (T. NAKAI) Musan (T. MORI) Hoangguito (T. NAKAI).

Distr. Nippon, Manshuria, Ussuri et China.

18). **Saussurea elongata**. DC. in Ann. Mus. Paris. XVI (1810) p. 201. Prodr. VI. p. 534.

var. **recurvata**, MAX. Prim. Fl. Amur. (1859). p. 167. HERD. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. (1868) p. 12. KOM. Fl. Mansh. III. (1907) p. 723.

Hab. in silvis pede montis Paiktusan (T. MORI, n. 172, T. NAKAI).

Distr. Amur et Dahuria.

19). **Saussurea odontolepis**, SCHULTZ in litt. fide HERD. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. (1868) . p. 13. MAX. in Mém. Biol. XI (1883). p. 803. FORBES et HEMSL. in Journ. Linn. Soc. XXIII. p. 467. PALI B. Consp. Fl. Kor. I. p. 120. KOM. Fl. Mansh. III. p. 732. NAKAI, Fl. Kor. II. p. 42. SUIZEV in Trav. Mus. Bot. Acad. Imp. Sc. Pétersb. IX. (1912). p. 133.

S. pectinata β . *amurensis*, MAX. Prim. Fl. Amur. p. 171.

S. pectinata (non BUNGE) KORSCH. in Act. Hort. Pétrap. XII. p. 360.

S. ussuriensis δ . *odontolepis*, HERD. in Bull. Soc. Nat. Mos. (1868) p. 13.

Hab. in Corea austr. : monte Chirisan (T. NAKAI, n. 22).

in Corea media : circa Yondonpo (T. UCHIYAMA), Chanryong (T. UCHIYAMA). Chinnampo (T. NAKAI).

Distr. Amur.

20). **Saussurea Matsumuræ**, NAKAI. sp. nov.

Affinis *S. ussuriense*, sed exqua foliis late-lanceolatis basi acutis, involucri squamis appendiculatis recurvis differt.

Caulis 60–70 cm. altus angulato-striatus glaber. Folia late lanceolata sinuato-argute-dentata supra scaberula, subtus glabra. Petioli foliorum caulinorum 1–2 cm. longi, superiorum 0.5–0.8 mm. longi. Corymbus densiflorus. Caput oblongum. Involucrum 1–1.2 cm. longum 4–5 mm. latum leviter araneum. Squamæ involucri 7-seriales præter intimas biseriales acuminato-recurvæ virides sed apice purpurascens, intimæ acuminatæ erectæ purpureæ. Pappi albi biseriales caduci, exteriores setacei, interiores plumosi.

Hab. in Corea sept. : in herbidis et in silvis Querci circa Ho-angguito (T. NAKAI).

Planta endemica !

Subsect. 3. **Stenolepis**,¹ NAKAI.

Involucri squamæ omnes longissime caudatæ erectæ v. recurvæ (Sp. 1.).

21). **Saussurea stenolepis**, NAKAI. sp. nov.

Proxima ad *S. sinuata* præcipue forma et textura foliorum congruerunt, sed capite duplo angustiore, squamis involucri erectis et vulgo atropurpureis exqua differt.

Rhizoma breviter repens. Caulis fere glaber angulato-striatus. Folia radicalia emarcida mihi ignota. Folia caulina supra viridia fere glabra minutissime sparsissimeque setulosa, infra pallidiora sinuato-incisa, ambitu ovata. Caput racemosum v. racemoso-paniculatum. Involucrum cylindricum 17–20 mm. longum 5 mm. latum squamis fere glabris, atro-purpureis v. purpurascens angustissimis. Corolla lilacina v. purpurea. Pars tubi corollæ angusti 4–4.5 mm. longi. Anthæræ exertæ basi caudatæ. Pappi sordide albi biseriales, interiores perfecti plumosi, exteriores imperfecti setacei breves. Semen 4.5–5 mm. longum.

Hab. in Corea sept. : in silvis montis Kalporyöng, vulgaris (T. NAKAI).

Planta endemica !

Subgn. 2. **Theodorea**, CASS.

CASS. Dict. Sc. Nat. LIII. (1827). p. 453. (non MEDIK. nec NECK.). DC. Prodr. VI. p. 536. BENTH. et HOOK. Gen. Pl. II. p. 472.

Elatæ, HOOK. fil. Brit. Ind. III. (1882) p. 373. p.p.

Radix biennis v. triennis. Caulis alatus v. exalatus. Folia varia. Involucri squamæ appendiculatæ corollaceæ. Anthæræ basi sagittatæ. Pappi biseriales. (Species duæ).

Conspectus specierum et varietatum.

1. {	Caulis distincte alatus.	2.
	Caulis exalatus.	3.

1) Huc ducenda *Saussurea sinuata*, KOM

2. { Caput minus diametro 5–7 mm. *S. Taquetii*, LÉVL. et VNT.
 { Caput globosum diametro 1–1.2 cm. Alæ caulis sæpe den-
 { tatae. *S. japonica*, DC. var. *alata*, KOM.
3. { Caput diametro 7–10 mm. globosum v. ovatum.
 { *S. japonica*, DC. var. *ovata*, KOM.
 { Caput diametro 1–1.2 cm. globosum. 4.
4. { Folia pinnata, lacinis angustissimis linearibus.
 { *S. japonica* DC. var. *lineariloba*, NAKAI.
 { Folia subintegra, integra v. pinnatifida sed lacinis non
 { linearibus. 5.
5. { Folia fere omnia pinnatifida v. pectinato-incisa.
 { *S. japonica*, DC. v. *pinnatifida*, KOM.
 { Folia radicalia v. inferiora pinnatifida, superiora v. omnia
 { integra. *S. japonica*, DC. v. *subintegra*, KOM.

22). **Saussurea Taquetii**, LÉVL. et VNT. in FEDDE Rep. (1910). p. 169.

S. Taquetii, v. *paniculata*, LÉVL. et VNT. l.c.

Affinis *S. microcephalæ*, FR.*, sed exqua caule eximie alato, foliis pectinato-incisis, involucri squamis præter apicem viridibus differt.

Hab. in Quelpært : in herbis littoralibus (T. NAKAI ; FAURIE, n. 1683 ; ISHIDOYA n. 139 ; TAQUET, n. 1015, 1026, 4331, 5710, 5713).

in Corea austr. : in herbis Mokpho (FAURIE, n. 1081).

Planta endemica !

23). **Saussurea japonica**, (THUNB.) DC. in Ann. Mus. Paris. XVI (1810) p. 203. Prodr. VI. (1837) p. 536.

Serratula japonica, THUNB. Fl. Jap. (1763) p. 305.

Saussurea pulchella, FISCH. in litt. (1822) fide DC. Prodr. VI. p. 537.

a. **subintegra**, (REGEL) KOM. Fl. Mansh. III. (1907). p. 729. NAKAI, Fl. Kor. II. p. 41.

* *Saussurea microcephala*, FR. a recen. YAJIMA in Kiushiu lecta adest in Herbario Universitatis Imperialis Tokyoensis.

Saussurea pulchella, FISCH. *a. subintegra*, REGEL, Tent. Fl. Uss. (1861) p. 93.

Hab. in Corea sept. (T. NAKAI et G. MILLS).

Distr. Amur, Manshuria, Ussuri et Japonia.

β . *alata*, (REGEL) KOM. l.c. NAKAI l.c.

S. pulchella, FISCH. β . *alata*, REGEL l.c.

Hab. in Corea sept. (T. NAKAI)

Distr. Amur et Ussuri.

γ . *pinnatifida*, (REGEL) KOM. l.c. NAKAI l.c. p. 42.

S. pulchella, FISCH. γ . *pinnatifida*, REGEL l.c.

Hime-higotai in Somokudzusetsu XV. t. 44.

Hab. in Corea sept. et media. (T. ISHIDOYA, T. MORI et T. UCHIYAMA).

Distr. Japonia, Manshuria, Amur et Ussuri.

δ . *lineariloba*, NAKAI in Fl. Kor. II. (1911) p. 42 et in Tokyo Bot. Mag. XXV (1911) p. 58.

Hab. in Corea media (T. UCHIYAMA et H. UEKI).

Planta endemica !

ϵ . *ovata*, (REGEL) KOM. l.c. p.p.

S. pulchella, v. *ovata* REGEL l.c.

S. koraiensis, NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXIII (1909) p. 185.

Fl. Kor. II. p. 42.

Nostra *S. koraiensis* est forma caule axalato.

Hab. in Corea media et sept. (T. UCHIYAMA, T. MORI et T. NAKAI).

Distr. Amur, Ussuri et Manshuria.

Subgn. 3. **Maritimæ**, NAKAI.

Radix biennis. Caulis angulatus. Folia integerrima linearia. Caput corymboso-racemosum. Involucri squamæ exappendiculatæ. Pappi biseriales decidui. Antheræ basi truncatæ sed cum caudis valde elongatis. (Sp. 1.).

24). ***Saussurea chinnamponensis***, VNT. et LEVL. in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. (1909) p. 145.

Hab. in Corea sept.: secus mare Chinnampo (FAURIE, n. 370, 1080).

Planta endemica !

Explicatio Tabulæ IX.

- A. *Hemistepta carthamoides*, O. KUNTZE.
- B. Saussurea—Maritimæ.
 - S. chinnamponensis*, LEVL. et VNT.
- C. Saussurea—Polychæta.
 - S. grandifolioides*, NAKAI.
- D. Saussurea—Lagurostemon—Caulescentes.
 - I. *S. Uchiyamana*, NAKAI.
 - II. *S. eriophylla*, NAKAI.
- E. Saussurea-Lagurostemon—Corymbiferæ.
 - I. *S. serrata*, DC. v. *amurensis*, HERD.
 - II. *S. umbrosa*, KOM.
 - III. *S. salicifolia*, DC. v. *angustifolia*, DC.
 - IV. *S. eriolepsis*, BUNGE.
 - V. *S. saxatilis*, KOM.
 - VI. *S. Maximowiczii*, HERD.
 - VII. *S. Hoasii*, NAKAI.

Explicatio Tabulæ X.

- E. VIII. *S. triangulata*, TRAUTV. et MEY. v. *alpina*, NAKAI.
 - IX. *S. grandifolia*, MAX.
 - X. *S. grandifolia*, MAX. v. *brachycephala*, NAKAI.
 - XI. *S. manshurica*, KOM.
 - XII. *S. ussuriensis*, MAX.
 - XIII. *S. elongata*, DC. β . *recurvata*, MAX.
 - XIV. *S. odontolepis*, SCHULZ.
- F. Saussurea—Lagurostemon—Stenolepis.
 - I. *S. sinuata*, KOM.
 - II. *S. stenolepis*, NAKAI.
- G. Saussurea—Theodorea.
 - I. *S. Taquetii*, LÉVL.
 - II. *S. japonica*, DC. v. *alata*, KOM.
 - III. *S. japonica*, DC.