Nouvelles Recherches sur la Fécondation et l'Embryogénie du *Ginkgo biloba*.¹⁾

Par

Sakugorô Hirase (Omuro à Kyôto).

Planche I.

I.

Comme il a été déjà énoncé dans un mémoire précédent,²⁾ on voit lors de la période de fécondation du *Ginkgo biloba* qu'une cavité se forme au sommet du corps endospermique—«archegonial chamber» de WEBBER³⁾—et que le tube pollinique y est suspendu de haut en bas ; d'ailleurs, il est connu qu'au moment de la fécondation elle contient une quantité plus ou moins grande d'un suc, en vertu duquel les anthérozoïdes sortis du tube pollinique peuvent nager jusqu'aux archégones. Le problème, d'où proviendra-t-il ce suc, n'a été pas encore résolu et j'ai exposé l'hypothèse qu'il sera sécrété peut-être par les archégones.⁴⁾ IKENO, dans ses études sur la fécondation du *Cycas revoluta*, a trouvé du suc de même sorte et a émis l'opinion qu'il sera sécrété principalement par l'appareil femelle.⁵⁾ FUJII, au contraire, est en désaccord avec l'avis de l'origine archégoniale du suc et pense qu'il proviendra principalement du tube pollinique,⁶⁾ quoique plus tard⁷⁾ il soit venu à émettre l'avis que sa sécrétion peut avoir lieu possiblement chez le *Ginkgo* autour de la protubérance centrale, et chez le *Cycas* à

1) Sommaire du mémoire paru dans ce Journal, présent volume, partie japonaise, p. 83-108.

2) Journ. Coll. Science, Imp. Univ., Tôkyô, Vol. 22, 1898, p. 103-149.

3) U. S. Dept. Agric., Bureau of Plant Industry. Bull. 2, 1901, p. 63.

4) Bot. Mag., Tôkyô, 1896, partie japonaise, p. 328.

5) Jahrb. wiss. Bot., Bd. 32, 1898, p. 583.

6) Bot. Mag., Tôkyô, Vol. 13, 1899, p. 29-30.

7) Do., p. 72.

la base de la cavité ou même autour de son paroi interne. MIYAKE, qui a étudié les anthérozoïdes du *Cycas revoluta*, est d'avis que le suc tire son origine principalement du tube pollinique.¹⁾ WEBBER, sur le *Zamia*,²⁾ et CHAMBERLAIN sur le *Dioon*,³⁾ sont tout à fait en accord avec MIYAKE, en ce qui concerne l'origine du suc en question.

Les ovules du *Ginkgo* examinées par moi vers la période de fécondation se montent jusqu'aujourd'hui au moins au nombre de plusieurs milliers et j'ai observé très fréquemment que la cavité endospermique, qui est d'un diamètre de plus de 1,5 mm. en moyenne, soit non-seulement quelque peu mouillée, mais encore complètement remplie de ce suc, d'où l'on verra que la quantité de celui-ci contenu dans un tube pollinique, qui est d'une petitesse presque microscopique, ne suffise évidemment pas pour cela. Il est vrai qu'on trouve quelquefois un grand nombre de tubes (même jusqu'à vingt) dans une ovule, mais c'est une rare exception; selon mes observations, même la présence simultanée de deux tubes n'est pas très fréquente et on peut poser la règle générale qu'il y en a seulement un pour chaque ovule.

Pour étudier l'origine de ce suc, j'ai pris des ovules qui sont prêtes à la fécondation ou peu après cela et leur corps endospermique mis à nu par être privé de son chapeau nucellaire (fig. 15) a été placé sur du sable de quartz dans un vase fermé, plus ou moins saturé avec la vapeur d'eau, ou placé dans un vase peu profond de porcelaine avec une mince couche de l'eau de puits. Grâce à ces méthodes de l'expérience, j'ai pu constater maintes fois la formation des gouttelettes de ce suc, qui sont groupées généralement en un cercle assez régulier (ou quelquefois en deux cercles concentriques) à une petite distance en dehors du contour externe de la cavité endospermique (fig. 17, s.) Il a été observé de même que telles gouttelettes se fusionnent peu après les unes aux autres pour produire une quantité assez grande de suc, qui s'accumule alors dans la cavité. Aussi ai-je été conduit à conclure qu'elles se naissent en vertu de l'action sécrétrice de certaines cellules composant le tissu à la place signalée ci-devant et que de plus la quantité du suc ainsi sécrété suffise pour le remplissage complet de la cavité. La formation des gouttelettes a lieu généralement au bout de 10 à 20 heures après le commencement de l'expérience. Pour

1) Ber. der Deutsch. Bot. Ges., Bd. 24, 1906, p. 82-83.

2) l.c., p. 64.

3) Bot. Gaz., Vol. 50, 1910, p. 416.

prouver que la formation des gouttelettes n'est pas due à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans le vase, j'ai répété les mêmes expériences sur les ovules qui sont assez éloignées de la période de fécondation et j'ai constaté le fait que dans tels cas on ne voit jamais aucune formation des gouttelettes.

Je n'ai encore fait moi-même aucune observation sur le *Cycas revoluta*, mais mes expériences sur le *Ginkgo* signalés ci-devant m'ont amené à penser que même chez celui-là l'avis de MIYAKE, qui considère du suc de la cavité endospermique d'être provenu principalement du tube pollinique, ne soit pas bien fondé; de même, je crois qu'il ne sera pas impossible que le mode de la production du suc chez le *Cycas* soit tout à fait semblable à celui chez le *Ginkgo*.

Pour nous rendre compte de l'effet de certaines conditions anormales sur la sécrétion de ce suc, j'ai fait les expériences suivantes. En premier lieu, j'ai placé dans le vase contenant quelques corps endospermiques un morceau de coton mouillé avec du chloroforme et j'ai alors observé que celui-ci agit par accélérer excessivement l'action sécrétrice, car celle-ci commence en tels cas à avoir lieu déjà au bout de 16 minutes et quelquefois même au bout de 3 seulement! De même, la sécrétion a lieu alors non-seulement à la place ordinaire, mais encore en diverses autres. En second lieu, j'ai pu constater que la vapeur d'acide osmique exerce une action entièrement différente de celle du chloroforme, car quand on place les corps endospermiques dans un vase contenant un morceau de coton mouillé avec du liquide de FLEMMING, la sécrétion n'a jamais lieu, même après trois jours, et il est évident que cet acide agit par arrêter l'action sécrétrice des cellules.

II.

Dans ses belles recherches de quelques Cycadées,¹⁾ CHAMBERLAIN a énoncé que vers la période de fécondation une certaine portion du cytoplasma de l'oosphère s'échappe en dehors des cellules de col, de telle sorte qu'une vacuole se forme au sommet de l'oosphère, permettant ainsi l'entrance des anthérozoïdes.

J'ai observé moi-même aussi la formation d'une espace vide au sommet de l'oosphère chez le *Ginkgo*, mais le mode de sa formation est

1) Bot. Gaz., Vol. 50, 1910, p. 417-418; Vol. 53, 1912, p. 16; Vol. 61, 1916, p. 362.

tout à fait différent de ce que CHAMBERLAIN a décrit chez les Cycadées. Voici ce que j'en ai observé moi-même. Pl. I, fig. 1 représente une cellule centrale mûre; fig. 2 et 3 font voir la formation de la cellule de canal; fig. 4 se rapporte au stade peu après sa séparation de l'oosphère. Au stade de fig. 5 on voit au sommet de celle-ci quelques vacuoles, dont la centrale est la plus grosse. Après cela, elles augmentent en grandeur de plus en plus, de telle sorte que finalement le noyau de l'oosphère, en vertu de la pression exercée par elles, prend la forme d'une demi-lune (fig. 6, 7, 8). Ces vacuoles, en en juger selon les préparations faites des matériaux fixés par du liquide de FLEMMING, ou contiennent des substances albuminoïdes assez raréfiées, ou semblent d'être entièrement vides. Elles s'éclatent peu après et finissent par produire une grosse espace vide au-dessus de l'oosphère, qui a l'apparence, comme si elle ait été formée par couper tout d'un coup la partie supérieure de l'oosphère par le canif (fig. 9). Cette grosse espace, qui sert à la réception des anthérozoïdes, peut être nommée leur *chambre réceptive*. La «receptive vacuole» que Mlle. FERGUSON¹⁾ a énoncée²⁾ chez le genre *Pinus* correspondra aux vacuoles qu'on voit chez le *Ginkgo* avant la formation de la chambre réceptive. En même temps avec l'éclatement des vacuoles pour former la chambre réceptive, il semble qu'une petite quantité du suc y contenu s'échappe en dehors des cellules de col, de telle sorte que le suc trouvé dans la cavité endospermique lors de la fécondation est un mélange de celui sécrété par le corps endospermique et celui provenant de l'oosphère.

Explication de la Planche I.

Chacune des fig. 1-14 représente une section longitudinale de l'oosphère, grossie 77 fois.

Fig. 1. Cellule centrale mûre.

Fig. 2-3. La même en voie de la formation de la cellule de canal.

Fig. 4. Stade plus avancé, avec une cellule de canal déjà séparée de l'oosphère.

Fig. 5-8. Stades successifs de la formation des vacuoles au sommet de l'oosphère.

Fig. 9. Chambre réceptive des anthérozoïdes au-dessus de l'oosphère.

Fig. 10 en haut et en bas. Deux sections consécutives provenant d'une l'oosphère. On y voit trois anthérozoïdes, dont l'un est plongé partiellement dans l'oosphère (fig. en haut, droit) et les deux autres en dehors (fig. en haut, gauche et fig. en bas).

Fig. 11. Noyau de l'anthérozoïde, très près de celui de l'oosphère au moment de la fécondation.

Fig. 12-13. Copulation des deux noyaux, mâle et femelle.

1) Proc. Washington Academy Sciences, Vol. 6, 1904, p. 109-110.

Fig. 14. Divisions nucléaires après la fécondation. Au sommet de l'oosphère on voit trois anthérozoïdes qui n'ont pas pu y entrer.

Chez les fig. 15, 16, 17 et 18 la signification des lettres est comme suit:—*e*, intégrument externe charnu; *i*, intégrument interne mince; *n*, nucelle; *c*, corps endospermique; *p*, paroi de la cavité endospermique; *cv*, cavité endospermique; *pr*, protubérance centrale de la cavité; *t*, tube pollinique; *o*, oosphère; *s*, gouttelettes de suc sécrété.

Fig. 15. Corps endospermique nu, montrant sa partie supérieure.

Fig. 16. Schéma d'une section longitudinale faite à travers du chapeau nucellaire et du plan médian du corps endospermique.

Fig. 17. Schéma d'un corps endospermique en voie de la sécrétion des gouttelettes de suc, vu de haut.

Fig. 18. Même que fig. 17. On voit trois gouttelettes en dedans et une en dehors de la cavité.

Prière aux lecteurs qui ne comprennent pas le japonais de bien vouloir employer les fig. 15, 16, 17 et 18 insérées ici au lieu de celles des mêmes numéros contenues dans la Planche I (No. 376) respectivement.

BERICHTIGUNGEN.

Vol. XXXII. No. 377 (Y. YAMAGUCHI:—Beitrag zur Kenntnis der Xenien bei *Oryza sativa*, L.)

Seite 83, Zeile 8 von oben:	Statt ,Untersuchungen'	lies ,Untersuchung'.
„ 85, Tab. I unter VII Z. 1:	„ ,69''''	„ ,69''''d'
„ 87, „ III „ VII Z. 1:	„ ,11,0'	„ ,10,5'.
„ „ „ „ „ Z. 2:	„ ,14,0'	„ ,14,7'.
„ „ „ „ „ Durch-		
„ „ „ „ „ schnitt Z. 2:	„ ,12,6'	„ ,11,6'.
„ 89, Zeile 5 von oben:	„ ,kann	„ ,können'.
„ „ „ 10 „ :	„ ,unterstützt'	„ ,gestützt'.
„ „ Tab. VI Zeile 2 von oben:	„ ,Individ'	„ ,Individ'.
„ „ „ „ unter hetero.		
„ „ „ „ Körner:	„ ,1740'	„ ,1742'.
„ „ „ „ „ gewöhn.		
„ „ „ „ Körner:	„ ,910'	„ ,910,5'.
„ „ „ „ „ hetero.		
„ „ „ „ Körner:	„ ,1820'	„ ,1821'.
„ „ „ „ „ Klebreis-		
„ „ „ „ Körner:	„ ,910'	„ ,910,5'.

Seite 86 Tab. II, S. 87 Tab. III, und Tab. IV, S. 88 Tab. V: streiche ,versuchte'.