Experimentelle zytologische Beiträge

III. Mitteilung. Über die Wirkung einiger Chemikalien auf die Pollenmutterzellen von *Daphne odora*, THUNB.

Contributions to Cytology and Genetics from the Departments of Plant-Morphology and of Genetics, Botanical Institute, Faculty of Science, Tokyo Imperial University, No. 63

Von

G. Yamaha

Mit Tafel IV

EINLEITUNG

Gleichzeitig mit den experimentell-zytologischen Untersuchungen mit den Wurzelspitzen, wie sie in der ersten Mitteilung abgehandelt worden sind, wurden eine Reihe von Parallelversuchen mit den Blütenknospen von einigen Pflanzen angestellt, um darüber Klarheit zu gewinnen, wie sich die Gonotokonten (Pollenmutterzellen) im Vergleich zu somatischen Zellen verschiedenen chemischen Agenzien gegenüber verhalten. Da es aber bei den Pollenmutterzellen natürlich einer ungleich grösseren Menge des Versuchsmaterials bedarf, als bei den Wurzelspitzenzellen, um irgend ein brauchbares Resultat erzielen zu können, so war ich leider nicht imstande, so verschiedene Arten Chemikalien, wie sie bei den Versuchen mit den Wurzelspitzen zur Anwendung gelangten, weiterer Prüfung zu unterziehen. Mithin haben sich bei manchen verwandten, schwer eindringbaren Stoffen, wie z. B. bei Mineralsäuren und neutralen Salzen, die Versuchsergebnisse, abgesehen von den Fixierungsformen sowie typischen Nekroformen (vgl. I. u. II. Mitteilungen), ganz negativ herausgestellt, indem dieselben keine eigentlich metabiotischen Strukturmodifikationen entstehen liessen. Näheres über die verschiedenartigsten Fixierungsbilder, welche die betreffenden Substanzen bei den Pollenmutterzellen bewirken, möchte ich somit einer weiteren Mitteilung dieser Beiträge mir vorbehalten, wo über verschiedene Fixierungsbilder eingehende theoretische Besprechung stattfinden soll. So beschränke ich mich unten nur auf die Wirkung folgender Chemikalien: Salpetersäure, NaCl, Na₂SO₃, Essigsäure, Trichloressigsäure, Oxalsäure, Methylalkohol, Äthylalkohol, Amylenhydrat, Isoamyl-

alkohol, Chloroform, Benzol, Xylol, Azeton, Äthyläther, Chloralhydrat und Pyridin.

Es fiel mir zunächst schwer, bei den vorliegenden Versuchen ein geeignetes Fixiermittel zu finden, welches Versuchsobjekte unfehlbar zu fixieren vermochte, ohne dabei die sämtlichen Zellstrukturen der geringsten Zerstörung anheimzugeben. Denn ein genauer Vergleich der unter verschiedenen Aussenbedingungen zur Entwicklung kommenden Strukturbilder untereinander setzt unbedingt eine einwandfreie, d. h. immer gleich gut gelungene Nachfixierung voraus. In dieser Hinsicht wurde schon für das mit FLEMMINGScher Lösung fixierte Material, worauf sich die vorhergehenden Mitteilungen ausschliesslich bezogen, jede Anwendungsmöglichkeit ganz ausgeschlossen, weil bei der Fixierung mit FLEMMINGScher Lösung der Prozentsatz der zerstörten Pollenmutterzellen zu hoch ausfällt (etwa 70 proz.). Ausserdem bewirkt das genannte Fixiermittel bei den Pollenmutterzellen täuschend ähnliche Fixierungsbilder, wie Chromessigsäure, oder sogar verdünnte Essigsäure allein, so dass auch bei der Anwendung der FLEMMINGSchen Flüssigkeit von einer zuverlässigen Kontrolle mit den Ergebnissen bei Wurzelzellen keine Rede sein würde. Die vorläufigen Fixierungsversuche an normalen Objekten ergeben dennoch weiter, dass keine von den gebräuchlichen Fixagen den aufgestellten Forderungen sich anpassen kann. Die sublimathaltigen Lösungen wirken hier allerdings erfahrungsgemäss auf die Pollenmutterzellen am geringsten strukturzerstörend ein, und zwar kommt die ZENKERSche Flüssigkeit ohne Zusatz von Essigsäure dem Ideale am nächsten. In Bezug auf die Fixierungsbilder der karyoplasmatischen Strukturen steht sie jedoch hinter der gewöhnlichen ZENKERSchen Lösung bei weitem zurück. Aus diesem Grunde wird hier zur Nachfixierung der behandelten Versuchsobjekte das letztgenannte Fixierungsmittel herangezogen. Nur bei den Versuchsreihen mit Säuren wurde der Essigsäurezusatz ausgelassen.

Bei der Vorbehandlung wurde die ganze Blütenknospe 2 Stunden in der wässrigen Lösung einzelner Chemikalien belassen. Dabei wurde vor dem Einlegen in die Versuchsflüssigkeit die Knospenspitze ein wenig abgeschnitten, um das leichtere Hineindringen der Lösung in die Pollenmutterzellen zu ermöglichen.

Die sämtlichen nachstehenden Versuchsreihen beziehen sich auf die Pollenmutterzellen von *Daphne odora*. Über die normal fixierten Zellstrukturen der letzteren wird in nachfolgender Mitteilung manches besprochen werden. Nur möchte ich vorläufig folgendes hervorheben;

1. Die Pollenmutterzellen von *Daphne odora* stellen eines der schwer fixierbaren Objekte dar. Demgemäss sind sie in fixiertem Zustand immer leicht zur Zytomixis geneigt. Die Tendenz macht sich besonders im ganzen Laufe der Prophasen der heterotypischen Mitose auffallend bemerkbar (s. YAMAHA '26b).

2. Im Stadium von Diakinese bleibt die Geminibildung für gewöhnlich gänzlich aus. Dafür ist die kettenartige Endverklebung der Diakinesenchromosomen sehr häufig anzutreffen. Das Verhältnis erinnert an die Pollenmutterzellen von Oenotheren, welche neuerdings von CLELAND ('26 S. 56, 57) beschrieben wurden.

3. Die Tetradenbildung geschieht nach dem Schema von Membranleistentypus (vgl. YAMAHA '26b S. 145, 151).

4. Anomalien der Karyokinesen werden in normalem Zustand nicht so häufig beobachtet, wie OSAWA ('13 S. 244, 246 usw.) seinerzeit hervorgehoben hat.

EXPERIMENTELLER TEIL

1. Versuche mit destilliertem Wasser

Es befremdet uns nicht im geringsten, dass das destillierte Wasser allein auf die Pollenmutterzellen schon in 2-stündiger Wirkungsdauer unverkennbar schädlich wirkt, weil auch bei Wurzelzellen, welche 3 Stunden in destilliertem Wasser verweilt haben, verschiedene Struktur-anomalien sich deutlich bemerken lassen (s. I. Mitteilung S. 7ff.).

Bei den Objekten, die nach 2-stündigem Verweilen im destillierten Wasser mit ZENKERScher Lösung (ohne Essigsäurezusatz) fixiert wurden, beobachtet man in den Pollenmutterzellen folgende Bilder;

Zytoplasma ist meistens von der Zellwand abgelöst, was bei denjenigen Zellen immer der Fall ist, welche sich in heterotypischer Prophase und Metaphase befinden, und im Vergleich zur Kontrolle etwas substanzärmer, also schlechthin gerinnig (in normalem Zustand homogen-gerinnig). Hier und da sind zerstörte Zellen anzutreffen. Spindelfäden zeigen sich gewöhnlich ziemlich deutlich, Chromosomen in der Regel klumpig verunstaltet, nicht selten miteinander verschmolzen. Es ist weiterhin auffallend, dass Diakinesenchromosomen recht häufig merklich zusammengeschrumpft erscheinen (Fig. 1). Vereinzelt werden etwas entstellte Kernanlagen in heterotypischer Telophase gefunden.

Aus obigem kann man über die Wirkung des destillierten Wasser folgende Schlüsse ziehen;

1. Das destillierte Wasser wirkt bei den Pollenmutterzellen, ähnlich wie bei den Wurzelzellen, auf Zytoplasma deutlich entquellend ein, und zwar derartig, dass das Exosmieren der Plasmagrundsubstanz befördert wird (vgl. I. u. II. Mitteilungen).

2. Pollenmutterzellen neigen sich offenbar leichter zur Schrump-

fung als Wurzelzellen. Dieselbe Tendenz gibt sich vorzüglich bei den in heterotypischer Prophase und Metaphase befindlichen Zellen immer zu erkennen (vgl. oben).

3. Dem destillierten Wasser gegenüber verhalten sich Pollenmutterzellen deutlich empfindlicher als Wurzelzellen, was in erster Linie bei den karyoplasmatischen Strukturen augenfällig nachzuweisen ist.

4. Die Chromosomen erscheinen nämlich nicht selten klumpig verunstaltet, oder merklich zusammengeschrumpft, und deuten eine aggregative Tendenz an (s. unten).

2. Versuche mit Salpetersäure

Stammlösung; 2 Vol.-proz. käufliche HNO_3 (ca. 0,317 Mol).

2 proz. (pH 0,42) und 2 proz. $\times 2^{-1}$ (pH 0,84). Zellen zum Teil zerstört unter Schrumpfung, sonst ziemlich gut fixiert; Zytoplasma gerinnslig-flockig oder grob gerinnslig, falls es von Zellwand unabgelöst bleibt, oder flockig-vakuolig, falls es von Zellwand abgelöst ist; Karyotin häufig ausgehöhlt; Nukleolus blass gefärbt. Chromosomen merklich zusammengeschrumpft. Spindelfäden nur schwach angedeutet. Sonst so gut wie normal.

2 proz. $\times 2^{-3}$ (pH 1,4) u. $\times 2^{-4}$ (pH 1,7). Zellen zumeist zerstört. Verschiedene Nekroformen.

2 proz. $\times 2^{-5}$ (pH 2,0) u. $\times 2^{-6}$ (pH 2,2). Wirkungslos.

Zusammenfassung. 1. Die Beeinflussung der Zellstrukturen durch Salpetersäure fällt bei den Pollenmutterzellen und den Wurzelzellen im grossen ganzen übereinstimmend aus (vgl. I. Mitteilung S. 12).

2. Die unverkennbare verminderte Wirksamkeit und die erhöhte Lage der Konzentrationszonen bei den Pollenmutterzellen im Vergleich zu den Wurzelzellen deuten zweifellos auf die schwere Eindringbarkeit in die erstere Art der Zellen hin, was auch bei anderen anorganischen Säuren und verschiedenen anorganischen Salzen zur Geltung zu kommen scheint.

3. Wie bei den Wurzelzellen erweist sich die wirksame Konzentrationszone der Salpetersäure auch hier augenscheinlich sehr schmal.

4. Minimale Fixierungskonzentration liegt etwa bei 1 proz. (pH 0,84).

5. Zur optimalen Fixierung muss Salpetersäure höher als 2 proz. (0,3 Mol) sein.

3. Versuche mit Kochsalz

Versuchsobjekte; Pollenmutterzellen von *Daphne odora* und *Gallonia candicans*. Stammlösung; 2 Mol wässrige Lösung von NaCl (ca. 11,7 proz.).

2 Mol u. 1 Mol. Färbung ganz diffus. Zytoplasma unter Abrundung von Zell-

membran abgelöst, gerinnslig oder homogen-gerinnslig. Kern und Nukleolus entsteht (etwas zusammengeschrumpft?). Karyotin teilweise aufgelöst oder exosmiert unter Aushöhlung, grob vakuolig strukturiert. Spindelfäden deutlich oder degeneriert (Nekroform?). Chromosomen ganz blass gefärbt oder aufgelöst unter Quellung; weiter Chromosomensubstanz etwas exosmiert (Fig. 2, 3).

Mol×2⁻¹. Färbung diffus. Zytoplasma von Membran abgelöst, gerinnslig (schwach netzig). Karyotin homogen-vakuolig. Spindelfäden schwach angedeutet. Chromosomen teilweise aufgelöst (etwas vakuolig?). Verschiedene Nekroformen.

Mol×2⁻². Zellen vereinzelt homogenisiert, Zytoplasma von Zellwand abgelöst, gerinnslig-netzig oder etwas filzig. Karyotin grob netzig oder flockig, häufig etwas ausgehöhlt.

Mol×2⁻³. Zellen nachfixiert. Zytoplasma noch etwas von Membran abgelöst, gerinnslig-netzig (filzig). Chromosomen etwas eckig oder klumpig, leise dispersive Tendenz aufweisend. Sonst normal.

Mol×2⁻⁴. So gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. Verschiedene Konzentrationszonen verhalten sich im Grossen ähnlich wie bei den Wurzelzellen (vgl. I. Mitteilung S. 50), während die Wirksamkeit von NaCl, abgesehen von der Karyotinauflösung, bei jeder Konzentration deutlich vermindert erscheint, ein Umstand, der sich mit der Annahme leicht in Einklang bringen lässt, dass den Pollenmutterzellen eine höhere Empfindlichkeit zukommt, welche schon bei zweifelsohne geringerer Konzentration des eingedrungenen wirksamen Agens gleichartigen Strukturmodifikationen Ausdruck verleihen kann.

2. Karyotin und Chromosomen der Pollenmutterzellen zeichnen sich gegenüber denjenigen der Wurzelzellen durch die leichtere Löslichkeit bzw. Exosmierbarkeit durch konzentriertes NaCl (0,5–2 Mol) aus.

3. Allgemein gesprochen ist die Wirkung von NaCl bei nicht zu hoher Konzentration, wenn überhaupt bemerkbar, lediglich von nekrobiotischer Natur.

4. Versuche mit Natriumsulfit

Stammlösung; 1 Mol wässrige Lösung von Na₂SO₃·3H₂O (ca. 25,2 proz.).

1 Mol (pH 10,33) u. *Mol*×2⁻¹ (pH 10,26). Färbung (mit Eisenhämatoxylin) sehr blass. Zytoplasma zusammengeschrumpft, gerinnslig. Karyotin teilweise aufgelöst, vakuolig oder gerinnslig. Nukleolus etwas zusammengeschrumpft. Spindelfäden verschwommen sichtbar. Chromosomen quellend gelöst oder exosmiert.

Mol×2⁻² (pH 10,1) u. *Mol*×2⁻³ (pH 10,0). Zellen teilweise zerstört. Zytoplasma recht gerinnslig. Spindelfäden ziemlich deutlich. Chromosomen ungelöst, flockig. Karyomeren oder vereinzelte Chromosomen (?). Weiter verschiedene Nekroformen. Sonst normal.

Mol×2⁻⁴ (pH 9,9). Alle Zellen besser fixiert als bei Kontrollen. Zytoplasma gerinnslig oder gerinnslig-filzig. Spindelfäden deutlich sichtbar. Chromosomen zackig oder etwas eckig, häufig miteinander gebrückt. Anaphasen- und Telophasenbrücken. Karyomeren oder vereinzelte Chromosomen (extranukleare Nukleolen?).

Unregelmässig gestaltete Tochteranlagen in Telophase.

$Mol \times 2^{-5}$ (pH 9,7) u. $\times 2^{-6}$ (pH 9,5). Einige Mitosenanomalien wie oben. Fixierung wie normal.

$Mol \times 2^{-7}$ (pH 9,3). So gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. Auch durch konzentriertes Na-Sulfit (0,5–1 Mol) löst sich das Karyotin bei den Pollenmutterzellen leichter als bei den Wurzelzellen (vgl. I. Mitteilung S. 64).

2. Optimale Fixierung wird auch hier ebenso wie bei Wurzelzellen bei der Konzentration von $Mol \times 2^{-4}$ erzielt, wobei die angebliche permeabilitätssteigernde Wirkung von OH-Ionen wahrscheinlich zur Geltung kommt.

3. Natriumsulfit wirkt in mancher Hinsicht ähnlich wie Natriumchlorid und zwar erweist es sich etwas wirksamer als das letztere. Diese Tatsache lässt die leichtere Permeabilität des Protoplasmas für das Sulfit vermuten.

4. Es verdient hier besonders bemerkt zu werden, dass die Löslichkeit des Karyotins durch Na_2SO_3 in jedem Mitosenstadium nicht ganz dieselbe ist. In der späteren Synapsis und Diakinese löst sich nämlich von Karyotin das meiste auf, während dasselbe in Tetradenstadium bei weitem schwerer löslich wird. Ferner lassen sich Metaphasen- und Anaphasenchromosomen leichter auflösen als Telophasenchromosomen. Der relativen Löslichkeit nach gilt somit die Reihe;

Tetradenstadium < Telophase < Metaphase, Anaphase < Prophase

5. Im Vergleich mit den Versuchsreihen bei Wurzelzellen wird auch hier bezüglich der Wirksamkeit (Beeinflussbarkeit) sowie Konzentrationszonen Ebendasselbe bestätigt, was oben bei NaCl gesagt ist (vgl. oben).

5. Versuche mit Essigsäure

Stammlösung; 1 Mol wässrige Lösung von Essigsäure (ca. 6 proz.).

1 Mol (pH 2,2). Alle Zellen gut fixiert, vereinzelt diffus gefärbt. Zytoplasma nicht von Zellwand abgelöst, gerinnslig-filzig. Nukleolus im Prophasenkerne blass gefärbt. Spindelfäden ausgeprägt. Chromosomen eckig, etwas gequollen, in Diakinese etwas abgerundet. Mitunter vereinzelte Chromosomen oder Karyomeren (Fig. 4).

$Mol \times 2^{-1}$ (pH 2,4). Fixierung ebenso gut wie oben, vereinzelt zerstörte Zellen. Färbung noch diffus. Spindelfäden deutlich sichtbar. Zytoplasma und Chromosomen ganz wie oben, die letzteren weiter klumpig und miteinander verschmolzen (in Diakinese und Metaphase) (Nekroformen?). Extranukleare Nukleolen in Metaphase und Telophase. Praktisch minimale Fixierungskonzentration.

$Mol \times 2^{-2}$ (pH 2,5). Fixierung schlecht. Zellen teilweise oder vereinzelt zerstört. Färbung noch etwas diffus. Zytoplasma meistens von Membran abgelöst, arm gerinnslig-filzig oder homogen-gerinnslig. Chromosomen klumpig, deutlich

eckig, zuweilen miteinander verschmolzen oder zusammengedrückt; Spiegelfärbung beobachtet bei Nukleolus sowie Metaphasen- und Diakinesenchromosomen, welche letztere häufig karyosomartig aussehen (Fig. 5, 6). Sonst wie oben.

$Mol \times 2^{-3}$ (pH 2,6). Zellen teilweise zerstört. Färbung etwas diffus. Zytoplasma meistens von Zellwand abgelöst, gerinnslig-filzig. Spindelfäden deutlich oder schwach angedeutet. Chromosomen aggregativ ungeordnet, miteinander verschmolzen, anastomosiert oder zusammengeballt, mitunter vereinzelt (abgelegen.) Karyomeren. Vereinzelte Anaphasen- und Telophasenbrücken. Brückenbildung zwischen Schwesterkernplatten in homöotypischer Metaphase (Schwesterbrücken). Spiegelfärbung bei Chromosomen und Prophasennukleolus.

$Mol \times 2^{-4}$ (pH 2,7) u. $\times 2^{-5}$ (pH 2,8). Zellen teilweise geschrumpft und zerstört, sonst nachfixiert so gut wie normal. Zytoplasma homogen-gerinnslig, vereinzelt gerinnslig-filzig. Spindelfäden nur schwach angedeutet, vereinzelt deutlich. Chromosomen abgerundet, aggregativ verteilt (in Metaphase immer zusammengedrückt), miteinander verschmolzen. Karyomerenbildung und überschüssige Tetradenbildung (Polysporie nach SHOEMAKER (26 S. 160 ff.). Anaphasen-, Telophasen- und Schwesterbrücken. Nukleolus spiegelartig gefärbt (Fig. 7, 8).

$Mol \times 2^{-6}$ (pH 3,0) u. $\times 2^{-7}$ (pH 3,1). Zellen teilweise zerstört. Zytoplasma von Membran abgelöst, homogen-gerinnslig. Spindelfäden ebenso wie normal, d. h. schwach angedeutet. Extranukleare Nukleolen in Anaphase und Telophase noch sichtbar. Chromosomen aggregativ oder dispersiv verteilt, mitunter eckig, vereinzelt abgelegen, in Diakinese etwas abgerundet. Anaphasen- und Telophasenbrücken. Überschüssige Tetraden usw.

$Mol \times 2^{-8}$ (pH 3,4). So gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. Ähnlich wie bei Wurzelzellen bewirkt Essigsäure bei den Fixierungskonzentrationen (bis $1/8$ Mol oder 0,75 Proz.) färbbarkeitsvermindernd. Dabei erscheinen weiter Spindelfäden ausgeprägt und Chromosomen verunstaltet.

2. Bei den minimalen Fixierungskonzentrationen werden Zellstrukturen am häufigsten zerstört und daneben treten verschiedenartige Nekroformen auf.

3. Im Vergleich zu Metaphasen- und Anaphasenchromosomen fallen Diakinesenchromosomen (Gemini) auch hier leichter der Abrundung anheim.

4. Unter anderen Nekroformen verdienen die Spiegelfärbung der Nukleolen und Chromosomen und die Brückenbildung zwischen Schwesterkernplatten in homöotypischer Metaphase (Schwesterbrücke) besondere Beachtung.

5. Hier tritt ein scharfer Gegensatz zwischen Nekrobiose und Metabiose selbst bei ein und derselben Konzentration deutlich hervor. Dabei haben wir ein frappantes Beispiel der Korrelation verschiedener Strukturmodifikationen untereinander vor uns. Bei der nekrobiotisch bewirkten Zelle sieht man nämlich das Zytoplasma von Zellmembran abgelöst und homogen-gerinnslig strukturiert, die Chromosomen deutlich abgerundet (mitunter mit Spiegelfärbung) und die Spindel-

fäden kaum angedeutet. Bei der Metabiose wird demgegenüber das Zytoplasma gerinnslig-filzig, mehr oder minder geschrumpft und körnigen Niederschlägen besät, wobei die Chromosomen recht eckig und die Spindelfäden ausgesprochen erscheinen.

6. Die minimale Fixierungskonzentration beträgt ungefähr $1/8$ Mol oder 0,75 proz. (pH 2,6) und die minimale wirksame Konzentration ca. 0,0078 Mol oder 0,047 proz. Verschiedene Konzentrationszonen verteilen sich also annähernd gleicherweise wie bei den Wurzelzellen (vgl. I. Mitteilung).

7. Beträchtlich hohe Empfindlichkeit der Chromosomen wird auch hier wieder bestätigt.

6. Versuche mit Trichloressigsäure

Stammlösung; 1 Mol wässrige Lösung von $\text{CCl}_3\text{CO}_2\text{H}$ (ca. 16,34 proz.).

Mol (pH ?). Alle Zellen ohne Zerstörung fixiert. Färbung aber etwas diffus. Zytoplasma meistens nicht von Membran abgelöst, gerinnslig oder gerinnslig-filzig (in den in Prophase befindlichen Zellen). Nukleolus grau gefärbt, vakuolig. Spindelfäden ausgeprägt. Chromosomen abgerundet, aggregativ oder dispersiv verteilt (Fig. 9). Telophasenbrücken. Anastomosierte Spireme in Synapsis (Fig. 10, 11).

Mol $\times 2^{-1}$ (pH ?). Fixierung im Ganzen besser als oben. Färbung noch diffus. Spindelfäden ziemlich deutlich. Chromosomen abgerundet oder etwas geschrumpft, aggregativ oder dispersiv verteilt (Fig. 12), miteinander verschmolzen. In Diakinese klumpig (Fig. 13) oder abgerundet (Fig. 14). Anaphasen- und Telophasenbrücken. Schwesterbrücken (Fig. 15). Anaphase und Telophase mit unregelmässig gestalteten Tochteranlagen. Karyomerenbildung (Fig. 16).

Mol $\times 2^{-2}$ (pH 0,7). Minder anomal als oben. Chromosomen abgerundet, ausschliesslich aggregativ ungeordnet, miteinander verschmolzen. Ausserdem vereinzelt Chromosomen. Sonst so gut wie oben. Minimale Fixierungskonzentration.

Mol $\times 2^{-3}$ (pH 1,03). Zellen gut fixiert und Färbung normal. Zytoplasma homogen-gerinnslig oder gerinnslig. Nukleolus blass oder spiegelartig gefärbt (Fig. 19). Spindelfäden homogen oder schwach angeseutet. Chromosomen lediglich aggregativ ungeordnet (Fig. 17). Chromosomen in Metaphase und Diakinese eckig, geschrumpft, miteinander verschmolzen, anastomosiert, gebrückt oder zusammengeballt (Fig. 18, 19), vereinzelt abgerundet und verstreut. Anaphasen- und Telophasenbrücken. Tochteranlagen unregelmässig gestaltet.

Mol $\times 2^{-4}$ (pH 1,2) u. $\times 2^{-5}$ (pH 1,4). Etwas minder anomal, sonst ganz wie oben (Fig. 20).

Mol $\times 2^{-6}$ (pH 1,7) u. $\times 2^{-7}$ (pH 2,0). Zellen vereinzelt zerstört. Fixierung schlechter als oben. Weiterhin noch verschiedene Nekroformen.

Mol $\times 2^{-8}$ (pH 2,2). So gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. Fixierende Wirkung der Trichloressigsäure macht sich bis zur Konzentration von $1/4$ Mol (ca. 4 proz. pH 0,7) bemerkbar, wobei ganze Zellstrukturen diffus gefärbt und Spindelfäden ausgeprägt erscheinen. Dem pH-Wert nach verhält sich die Säure wie eine Mineralsäure (vgl. I. Mitteilung S. 73, 123).

2. Karyokinese wird hier unverkennbar schwerer angegriffen als bei Essigsäure, so dass Teilungsanomalien zahlreicher zu bemerken sind.

3. Bei den Konzentrationen zwischen $1/8$ – $1/16$ Mol (vgl. Essigsäure) kommt die fixierende Wirkung der Trichloressigsäure allerdings kaum zur Geltung, aber dieselbe wirkt dahin, dass das Fixiermittel beim behandelten Material leichter eindringen kann. Beachtenswert ist weiter, dass die minimale Konzentration ebensolcher Wirkung ungefähr der unteren Grenze der Fixierung bei Wurzelzellen entspricht.

4. Es ist von Interesse, dass die Strukturzerstörung bei den Pollenmutterzellen viel seltener erfolgt, als bei den Wurzelzellen, und zwar nur vereinzelt bei den Konzentrationen, $1/64$ und $1/128$ Mol, welche sich gerade mit der Zerstörungszone bei den letzteren decken.

5. Die aggregative Störung der Chromosomenanordnung ist überall weit verbreitet, und von den damit zusammenhängenden Formenmodifikationen der Chromosomen (z. B. Abrundung, Miteinanderbrückung usw.) begleitet.

7. Versuche mit Oxalsäure

Stammlösung; 1 Mol wässrige Lösung von $(\text{COOH})_2$ (ca. 12,6 proz.).

Mol (pH 0,58) u. $\text{Mol} \times 2^{-1}$ (pH 0,8). Zellen meistens gut fixiert, vereinzelt zerstört. Färbung etwas diffus. Zytoplasma meistens nicht geschrumpft, gerrinslig (schwach filzig). Nukleolus blass gefärbt. Spindelfäden ausgeprägt. Chromosomen meistens eckig verunstaltet, etwas dispersiv verteilt. Vereinzelt Telophasen- und Schwesterbrücken.

$\text{Mol} \times 2^{-2}$ (pH 1,0). Zellen mehr zerstört als oben. Chromosomen flockig strukturiert, häufig vereinzelt. Sonst wie oben. Praktisch minimale Fixierkonzentration.

$\text{Mol} \times 2^{-3}$ (pH 1,2). Zellen teilweise fixiert. Färbbarkeit wie normal. Zytoplasma von Zellmembran abgelöst, homogen-gerinnig (wie normal). Spindelfäden gewöhnlich schwach angedeutet. Chromosomen teilweise wie oben, weiter etwas abgerundet, miteinander verschmolzen oder zusammengedrängt.

$\text{Mol} \times 2^{-4}$ (pH 1,3). Zellen teilweise zerstört. Zytoplasma etwas geschrumpft, homogen-gerinnig. Spindelfäden schwach angedeutet. Anaphasen- und Telophasenbrücken, weiter Schwesterbrücken.

$\text{Mol} \times 2^{-5}$ (pH 1,5), $\times 2^{-6}$ (pH 1,8), $\times 2^{-7}$ (pH 2,0) u. $\times 2^{-8}$ (pH 2,2). Zellen häufig zerstört. Vereinzelte Anaphasen- und Schwesterbrücken. Sonst so gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. In groben Zügen wirkt Oxalsäure in ähnlicher Weise wie Mineralsäuren.

2. Minimale Fixierkonzentration entspricht ca. $1/4$ Mol (3,15 proz.) Lösung (pH 1,0), wobei die diffuse Färbung, Zytoplasmaschrumpfung und ausgeprägte Fadenstruktur der Spindelsubstanz immer auftreten.

3. Miteinanderverklebung der Chromosomen verbunden mit Zytoplasmaschrumpfung findet man hier immer wieder.

4. Beim Vergleich mit den Versuchsreihen bei der Wurzelzellen (s. I. Mitteilung S. 75) tritt ohne Weiteres hervor, dass verschiedene Strukturelemente bei den Pollenmutterzellen durch Oxalsäure zwar ganz gleichartig beeinflusst werden, aber die höhere Empfindlichkeit der Gonotokonten auch hier nicht zu bestreiten ist.

8. Versuche mit Methylalkohol

Stammlösung; käuflicher Methylalkohol (als 100 proz. gesetzt, also ca. 31,25 Mol).

100 proz. Zellen vereinzelt zerstört, meistens fixiert und diffus gefärbt. Zytoplasma von Membran abgelöst, homogen arm gerinnlig, mitunter mit fein körnigen Niederschlägen. Nukleolus blass gefärbt. Spindelfäden ziemlich deutlich. Chromosomen (auch in Diakinese) geschrumpft, körnig strukturiert, zackig oder eckig, sehr zerstreut! Karyomerenbildung. Verunstaltete Tochteranlagen (Fig. 21, 22).

$\times 2^{-1}$. Zellen vereinzelt zerstört. Färbung noch etwas diffus. Zytoplasma noch etwas geschrumpft oder abgerundet, gerinnlig mit Niederschlägen. Nukleolus grau gefärbt. Spindelfäden ziemlich deutlich. Chromosomen sehr verstreut, geschrumpft, eckig oder gezackt (auch in Diakinese). Sonst wie oben. Minimale Fixierungskonzentration.

$\times 2^{-2}$ u. $\times 2^{-3}$. Zellen vereinzelt zerstört. Zytoplasma meistens von Membran abgelöst, gerinnlig mit Niederschlägen. Spindelfäden ausgeprägt. Chromosomen eckig oder gezackt, etwas verstreut. Karyomerenbildung, Schwesterbrücken.

$\times 2^{-4}$ u. $\times 2^{-5}$. Zellen teilweise zerstört. Zytoplasma gerinnlig oder homogen-gerinnlig. Spindelfäden deutlich wie normal. Chromosomen und Spireme etwas flockig und gezackt. Vereinzelte Anaphasenbrücken. Sonst normal.

$\times 2^{-6}$ u. $\times 2^{-7}$. Meistens normal fixiert. Chromosomen häufig miteinander verschmolzen oder anastomosiert. Sonst normal.

Zusammenfassung. 1. Methylalkohol wirkt auf Pollenmutterzellen im Grossen und Ganzen auf dieselbe Weise wie auf Wurzelzellen (vgl. I. Mitteilung S. 88).

2. Bei der Fixierungskonzentration des Methylalkohols wird die Färbbarkeit (Siderophilie) der Zellstrukturen vermindert, Zytoplasma und Chromosomen erscheinen immer zusammengeschrumpft, während Spindelfäden etliche Schwächung (Homogenisierung) andeuten.

3. Es ist weiter auffallend, dass hier die Chromosomen starke dispersive Tendenz aufweisen, was bei den Wurzelzellen kaum zu bemerken ist (vgl. I. Mitteilung S. 88).

4. Fixierende Wirkung des Methylalkohols verschwindet schon bei der Konzentration zwischen 25 und 50 proz. gänzlich.

9. Versuche mit Äthylalkohol

Stammlösung; Käuflicher absoluter Alkohol (als 100 proz. gesetzt, also ca. 21,7 Mol).

100 proz. u. $\times 2^{-1}$. Zellen teilweise zerstört. Färbung diffus. Zytoplasma stets

von Zellmembran abgelöst, arm gerinnslig, zuweilen mit Niederschlägen. Nukleolus blass gefärbt. Spindelfäden ziemlich deutlich. Chromosomen geschrumpft, flockig oder eckig.

×2-2. Zellen teilweise zerstört. Färbung noch etwas diffus. Zytoplasma von Membran abgelöst, gerinnslig. Nukleolus blass oder grau gefärbt. Spindelfäden deutlich. Chromosomen wie oben. Anaphasenbrücken. Minimale Fixierungskonzentration.

×2-3. Chromosomen wie oben, weiter häufig miteinander verschmolzen, in Diakinese flockig, verkürzt oder klumpig. Sonst gerade wie oben.

×2-4. Spindelfäden deutlich wie normal. Chromosomen etwas geschrumpft, eckig oder zackig, miteinander gebrückt oder verschmolzen, in Diakinese verdickt und verkürzt, eckig. Überschüssige Tetradenbildung und Karyomerenbildung.

×2-5, ×2-6 u. ×2-7. Zellen häufig zerstört. Zytoplasma meistens von Membran abgelöst, gerinnslig mit extranuklearen Nukleolen. Spindelfäden wie normal. Chromosomen noch etwas wie oben. Anaphasen- und Telophasenbrücken. Anaphase mit nicht auseinandergewichenen Tochteranlagen. Überschüssige Tetradenbildung usw.

×2-8. So gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. Die Wirkung des Äthylalkohols stimmt wesentlich mit der des Methylalkohols überein, nur dass der letztere in der Wirksamkeit dem ersteren etwas nachsteht (s. I. Mitteilung S. 89).

2. Der Äthylalkohol bewirkt nämlich in höherem Masse strukturerstörend, und demgemäss gibt er zu verschiedenen Nekroformen Veranlassung.

3. Von der dispersiven Tendenz der Chromosomen ist hier nichts zu bemerken.

4. Als Fixiermittel für Pollenmutterzellen kommt weder Methylalkohol noch Äthylalkohol ohne Zusatzmittel bei jeder Konzentration kaum zur Verwendung.

5. Minimale Fixierungskonzentration stellt sich bei Äthylalkohol etwas niedriger als bei Methylalkohol.

6. Chromosomen verhalten sich auch gegenüber Alkoholen erheblich empfindlicher als die sonstigen Strukturelemente.

10. Versuche mit Amylenhydrat

1 Vol.-proz. wässrige Lösung von Amylenhydrat (tertiärem Amylalkohol), ca. 0,009 Mol;

Zellen teilweise zerstört. Zytoplasma von Zellmembran abgelöst. Karyotin nicht netzig, sondern körnig. Spindelfäden deutlich. Chromosomen geschrumpft, körnig, etwas aggregativ ungeordnet. Anaphasen- und Telophasenbrücken (Fig. 23).

Zusammenfassung. 1. Pollenmutterzellen werden durch 1 proz. Amylenhydrat offenbar schwerer betroffen als Wurzelzellen (vgl. I. Mitteilung S. 92), und zwar etwa in ähnlicher Weise wie durch Äthylalkohol bei gleicher Konzentration (s. oben).

2. Auch hier ist keine dispersive Tendenz der Chromosomen nachweisbar.

11. *Versuche mit Isoamylalkohol*

Gesättigte wässrige Lösung von Isoamylalkohol (ca. 3 Vol.-proz., 0,288 Mol).

Zellen meistens fixiert. Färbung diffus. Zytoplasma arm gerinnig, von Zellwand abgelöst. Nukleolus grau gefärbt. Spindelfäden ziemlich deutlich. Spireme, in Synapsis flockig, in Diakinese etwas verkürzt, aber nicht abgerundet. Chromosomen flockig, geschrumpft. Anaphasenbrücken.

Zusammenfassung. 1. Die Wirkung von Isoamylalkohol ist dem Wesen nach mit derjenigen von anderen Alkoholen, oder von indifferenten Narkotika überhaupt vergleichbar. Wir finden nämlich auch hier die diffuse Färbung der Zellstrukturen, das geschrumpfte und in geringem Masse homogenisierte Zytoplasma und deutlich entquollene Chromosomen wieder.

2. Wie man von vornherein erwarten kann, bewährt sich Isoamylalkohol unter den geprüften Alkoholen aufs wirksamste, was ohne Zweifel auf die leichteste Eindringbarkeit desselben schliessen lässt.

3. Beim Vergleich mit den Versuchen bei Wurzelzellen tritt ohne Weiteres hervor, dass die obenstehenden Strukturbilder (bei 3 proz. Isoamylalkohol) gerade denjenigen entsprechen, welche man dort bei 1,5 proz. Lösung, also 2 maliger Verdünnung gesehen hat, ein Umstand, welcher die um die Hälfte verminderte Permeabilität der Pollenmutterzellen im Vergleich zu Wurzelzellen anzeigt, wenn wir auch die vermeintliche höhere Empfindlichkeit des Protoplasmas der ersteren ganz ausser Acht lassen.

12. *Versuche mit Chloroform, Benzol und Xylol*

Zum Vergleiche mit Isoamylalkohol wurden eine Reihe von Parallelversuchen mit einigen spielend wasserlöslichen organischen Flüssigkeiten angestellt.

Chloroform (gesättigt; 0,7 proz. oder 0,06 Mol). Zellen teilweise zerstört. Färbung diffus. Zytoplasma gerinnig, von Zellmembran abgelöst. Spindelfäden für gewöhnlich schwach angedeutet, vereinzelt deutlich sichtbar. Zellplattenanlagen angedeutet! (Fig. 24). Chromosomen eckig oder abgerundet, deutlich geschrumpft, ausschliesslich aggregativ verteilt, weiter spiegelartig gefärbt (Fig. 25).

Benzol (gesättigt). Zellen teilweise zerstört. Färbung diffus. Zytoplasma homogen-gerinnig, von Membran abgelöst, vereinzelt vakuolisiert. Spindelfäden nur schwach angedeutet. Chromosomen geschrumpft, eckig oder abgerundet, oder sonst verunstaltet, immer aggregativ verteilt, miteinander verschmolzen oder zusammengedrängt.

Xylol (gesättigt). Ganze Bilder ähnlich wie bei Benzol, Wirkung aber etwas schwächer.

Zusammenfassung. 1. Chloroform, Benzol und Xylol schliessen sich der Wirkung nach dem Amylalkohol an. So beobachtet man auch hier wieder die Färbbarkeitsverminderung der Zellstrukturen, die Schrumpfung des Zytoplasmas und der Chromosomen und mächtige aggregative Tendenz der letzteren.

2. Benzol und Xylol stehen auch bezüglich der Wirkung einander sehr nahe, und zwar wirkt das letztere wahrscheinlich wegen leichter Diffusibilität etwas stärker als das letztere. Beide homogenisieren das Zytoplasma und die Spindelsubstanz andeutungsweise.

3. Demgegenüber ähnelt die Wirkung von Chloroform vielmehr derselben von Amylalkohol. Hier erscheint das Zytoplasma deutlich gerinnlig und die Spindelfigur ziemlich faserig (vgl. I. Mitteilung S. 92).

4. Merkwürdig ist weiterhin, dass die Zellplattenbildung, die in normalem Zustande nur ausnahmesweise stattfindet (s. YAMAHA '26b, Tafel V. Fig. 20–22), durch Chloroform augenscheinlich begünstigt wird. In dieser Hinsicht ist Chloroform dem Äthyläther und Chloralhydrat beiseite zu stellen (vgl. unten).

13. Versuche mit Azeton

Stammlösung; käufliches Azeton (als 100 proz. gesetzt, also ca. 18 Mol).

100 proz. Zellen teilweise zerstört. Färbung diffus. Zytoplasma meistens von Membran abgelöst, gerinnlig oder homogen-gerinnlig, mit fein körnigen Niederschlägen in Form von „Chondriommantel bzw. -schränke“ (s. YAMAHA '26b) (Fig. 26). Nukleolus blass gefärbt oder vakuolig. Spindelfäden kaum oder nur schwach angedeutet. Chromosomen und Spireme (Gemini) geschrumpft, körnig oder körnig-vakuolig (Fig. 26–28), aber nicht aggregativ ungeordnet, sondern vielmehr etwas verstreut, mitunter spiegelartig gefärbt, ohne ganz abgerundet zu werden, weiterhin zuweilen miteinander gebrückt. Anaphasen- und Schwesterbrücken.

$\times 2^{-1}$. Zellen teilweise zerstört. Färbung mitunter diffus. Zytoplasma und Nukleolus ganz wie oben (Fig. 29, 30). Spindelfäden und sonstige Membranstrukturen etwas deutlicher als oben (Fig. 29, 30). Chromosomen minder geschrumpft, körnig, etwas eckig, weiter miteinander verschmolzen oder gebrückt, spiegelartig gefärbt. Anaphasenbrücken. Minimale Fixierungskonzentration.

$\times 2^{-2}$. Zellen vereinzelt zerstört, meistens gut nachfixiert. Färbung mitunter etwas diffus. Zytoplasma gerinnlig. Spindelfäden deutlich. Chromosomen und Spireme geschrumpft, eckig, miteinander gebrückt, aber aggregative Tendenz nicht deutlich. Schwesterbrücken.

$\times 2^{-3}$, $\times 2^{-4}$. Zellen vereinzelt zerstört. Chromosomen und Spireme nicht geschrumpft, flockig-körnig oder klumpig (eckig), zuweilen miteinander gebrückt, ohne aber aggregative Tendenz aufzuweisen. Sonst normal.

$\times 2^{-5}$, $\times 2^{-6}$ u. $\times 2^{-7}$. So gut wie normal.

Zusammenfassung. 1. Bei der Fixierungskonzentration (50–100 proz.) wirkt Azeton auf Zytoplasma schrumpfend und etwas homo-

genisierend, auf Chromosomen deutlich entquellend aber nicht merklich aggregierend ein. Im Zytoplasma werden dabei häufig körnige Niederschläge gebildet.

2. Die Pollenmutterzellen werden also hier auf ganz dieselbe Weise beeinflusst wie die Wurzelzellen (vgl. I. Mitteilung S. 97).

3. Der Wirkung nach steht Azeton dem Methyl- und Äthylalkohol am nächsten.

4. Minimale wirksame Konzentration beläuft sich ungefähr auf 1,13 Mol oder 6,25 Proz.

5. Die Fixierung der Pollenmutterzellen wird durch die Vorbehandlung mit verdünntem Azeton (etwa 25 Proz.) anscheinend erleichtert.

14. *Versuche mit Äthyläther*

Stammlösung; gesättigte wässrige Lösung von Äthyläther (etwa 10 Vol.-proz. oder 0,96 Mol).

10 Proz. Zellen vereinzelt zerstört, meistens fixiert, etwa ähnlich wie durch Trichloressigsäure (vgl. oben). Färbung etwas diffus. Chromosomen bläulich gefärbt. Zytoplasma immer von Zellmembran abgelöst, gerinnslig. Nukleolus niemals blass, sondern ebenso satt gefärbt wie Chromosomen. Spindelfäden ausgeprägt, Äquatorialplasma deutlich, Zellplattenbildung begünstigt. Chromosomen etwas geschrumpft (?) und eckig, doppelstrukturiert, miteinander verschmolzen, dispersiv verteilt, in Diakinese geschrumpft und abgerundet, mitunter spiegelartig gefärbt. Schwesterbrücken (Fig. 31, 32).

×2-1. Fixierung besser als oben. Membranstrukturen verdeutlicht. Zytoplasma meistens (besonders in Prophase) von Membran abgelöst, gerinnslig. Extranukleare Nukleolen in Anaphase und Telophase. Spindelfäden überaus deutlich. Chromosomen eckig, miteinander verschmolzen, aber nicht aggregativ ungeordnet. Tripolige Metaphase häufig (Fig. 33). Zellplatte angedeutet (Fig. 34).

×2-2. Chromosomen (in Diakinese und Metaphase) klumpig, eckig oder gezackt (Fig. 35), miteinander verschmolzen, etwas dispersiv verteilt. Anaphasen- und Telophasenbrücken. Verunstaltete Tochteranlagen in Telophase. Sonst wie oben.

×2-3. Chromosomen noch etwas entstellt. Einige Teilungsanomalien wie oben. Sonst normal (Fig. 36).

×2-4 u. ×2-5. Ganz normal.

Zusammenfassung. 1. Äthyläther befördert augenscheinlich die Exosmose der Zellgrundsubstanz, so dass das Eindringen des Fixiermittels in die Zellen erleichtert wird. Dementsprechend treten die Membranstrukturen (also auch fädige Struktur der Spindelsubstanz) verdeutlicht hervor.

2. Mit dieser exosmierenden Wirkung scheint die starke Neigung zur Zellplattenbildung und Multipolarität in engem Zusammenhange zu stehen.

3. Metaphasenchromosomen zeigen sich hier für gewöhnlich merklich gezackt und verteilen sich etwas dispersiv, während

Diakinesenchromosomen häufig deutliche Abrundung und leise Schrumpfung erfahren.

4. Die strukturzerstörende Wirkung kommt hier nur minimal zur Geltung (vgl. I. Mitteilung S. 98).

5. Durch Äthyläther werden die Pollenmutterzellen, abgesehen von den Chromosomen in ganz analoger Weise beeinflusst wie die Wurzelzellen. Über die höhere Strukturabilität der Pollenmutterzellen wird auch hier nicht mehr gezweifelt.

5. Minimale wirksame Konzentration geht hier bis auf 0,6 proz. hinunter, also um 4 mal niedriger als bei Wurzelzellen.

15. *Versuche mit Chloralhydrat*

Stammlösung; 0,75 proz. wässrige Lösung (ca. 0,045 Mol).

0,75 proz. (pH 4,5). Zellen meistens gut fixiert, vereinzelt zerstört. Färbung mitunter etwas diffus. Zytoplasma arm gerinnslig, meistens etwas geschrumpft. Spindelfäden sehr deutlich oder nur schwach angedeutet. Zellplattenanlage, Polplasma und „Chondriomantel“ angedeutet. Chromosomen geschrumpft, eckig oder gezackt, miteinander gebrückt, Spireme etwas geschrumpft, keine aggregative Tendenz zeigend. Verunstaltete Tochteranlagen in Telophase. Karyomerenbildung (Fig. 37).

$\times 2^{-1}$ (pH 4,7). Zellen mehr zerstört. Anomalien minder als oben. Anaphasen- und Telophasenbrücken. Sonst wie oben.

$\times 2^{-2}$ (pH 4,9). Chromosomen deutlich geschrumpft, eckig, miteinander gebrückt. Unregelmässig gestaltete Tochteranlagen. Telophasen- und Schwesterbrücken. Sonst normal.

Zusammenfassung. 1. Chloralhydrat wirkt sowohl auf Zytoplasma wie auf Chromosomen merklich entquellend ein. Dabei erscheint das Zytoplasma etwas an Gerinnsel ärmer, und die Chromosomen werden immer zackig verunstaltet.

2. Merkwürdig ist weiter, dass die Zellplattenanlage und das Polplasma zusammen mit ausgeprägten Spindelfäden sichtbar hervortreten.

3. Die ganzen Strukturbilder deuten scheinbar auf die erhöhte Dehydratation der Plasmakolloide hin.

4. Der Wirkung nach steht Chloralhydrat vor allem dem Äthyläther am nächsten.

5. Die Schrumpfung des Zytoplasmas und die Membranstrukturen treten am auffallendsten im Diakinesenstadium und am geringsten im Tetradenstadium auf. Es liegt auf der Hand, dass die beiden Strukturmodifikationen durch die Erhöhung der Plasmapermeabilität befördert werden (vgl. I. Mitteilung S. 142, 143 usw. u. II. Mitteilung). Wenn man also die Pollenmutterzellen, die sich in verschiedenen Mitosenphasen befinden, auf die beiden obengenannten Struktur-

veränderungen hin miteinander vergleicht, so lässt sich in Bezug auf die relative Permeabilität der Pollenmutterzellen in verschiedenen Teilungsstadien folgende Reihe aufstellen ;

Pollentetrade < homöotypische Mitose, heterotypische Anaphase
< Synapsis < heterotypische Metaphase < Diakinese

16. *Versuche mit Pyridin*

1 Tropfen Pyridin auf 10 ccm Aq. (etwa 0,5 proz. pH ca. 8,0).

Zellen teilweise zerstört. Färbung diffus. Zytoplasma entweder nicht geschrumpft und gerinnlig oder homogen-armgerinnlig und etwas geschrumpft. Spindelfigur gerinnlig-fädig oder deutlich fädig. Chromosomen klumpig oder zackig, etwas dispersiv verteilt, miteinander gebrückt. Telophasenbrücken. Telophase mit unregelmässig gestalteten Tochteranlagen. Karyomerenbildung (Fig. 38, 39).

Zusammenfassung. 1. Auch bei den Pollenmutterzellen erweist sich Pyridin sehr wirksam, indem es zu verschiedenartigen Mitosenanomalien Veranlassung gibt.

2. Die Wirkung findet auch hier in den Hauptzügen nach derselben Richtung hin statt, wie bei den Wurzelzellen.

THEORETISCHER TEIL

A. Über die relative Wirksamkeit verschiedener Chemikalien.

Da bei den vorliegenden Versuchsreihen mit Pollenmutterzellen Blütenknospen als ganzes zur Anwendung gelangten, so musste hier die minimale Konzentrationsgrenze der Wirksamkeit für jede Substanz natürlich höher liegen als bei den Wurzelzellen, auch wenn man von der zweifellosen höheren Empfindlichkeit seitens der Pollenmutterzellen absieht. Nach dieser Richtung hin wirkt weiter auch die abweichende Beschaffenheit der Zellmembran (etwa die Kutinisierung), welche die aussenliegenden Gewebezellen, d. h. Blütenhüllen, Antherenwände usw. dem Anschein nach besitzen, nicht in geringem Masse. Es muss daher jedem einleuchten, dass die annähernd übereinstimmende Permeabilität des Protoplasmas bei beiden Zellarten vorausgesetzt, dass die in die Pollenmutterzellen eingedrungene Menge des wirksamen Stoffes im Vergleiche viel geringer ist, als die Aussenkonzentration, d. h. die dargereichte Menge desselben. Dafür sprechen u. a. die Umstände,

(1) Dass verschiedenartige Strukturmodifikationen zweifelsohne von metabiotischer Natur hier auch bei den in die Fixierungszone entfallenen Konzentrationen zustandekommen.

(2) Dass die untere Grenze der Fixierungs- und wirksamen Konzentrationszone, besonders bei den Säuren erheblich höher liegt, als bei Wurzelzellen.

(3) Dass sich die Grenze zwischen den einzelnen Konzentrationszonen nicht so scharf bestimmen lässt, wie dort. Mit anderen Worten, fällt die Beeinflussung der Zellstrukturen bei jeder Pollenmutterzelle in ein und derselben Blütenknospe oder Anthere, welche in gleicher Weise behandelt wurden ist, nicht so gleichmässig aus, so dass sich hier von der Zerstorungszone nichts genaues aufstellen lässt.

(4) Dass Nekroformen verschiedener Kategorien (s. unten) hier im Vergleich mit Wurzelzellen bei weitem überwiegen.

Übersichtlichkeitshalber wird unten die minimale Grenze der Fixierungskonzentrationszone und der wirksamen Konzentrationszone für erprobte Chemikalien sowohl bei den Pollenmutterzellen als bei den Wurzelzellen tabellarisch zusammengestellt (vgl. I. Mitteilung S. 113ff.). In der sechsten und siebenten Spalte der Tabelle wird

Stammlösung	Minimale Fix.-Kon.		Minimale wirksame Konzentration		Numerisches Verhältnis (Pollenmutterzellen : Wurzelzellen)	
	Pollenmutterzellen	Wurzelzellen	Pollenmutterzellen	Wurzelzellen	Fix.-Konz.	Wirks. Konz.
NaCl (1 Mol)	—	—	2^{-3} – 2^{-4}	2^{-3}	—	$\frac{1}{2}$ –1
Na ₂ SO ₃ (1 Mol)	—	—	2^{-5} – 2^{-6}	2^{-8}	—	4–8
HNO ₃ (2% = 0.317 Mol)	2^{-1} (pH 0.84)	2^{-3} (pH 1.4)	2^{-6} (pH 2.2)	2^{-15} (pH 3.1)	4	512
CH ₃ COOH	2^{-1} – 2^{-3} (pH 2.4–2.6)	2^{-2} (pH 2.5)	2^{-7} (pH 3.1)	2^{-8} (pH 3.4)	$\frac{1}{2}$ –2	2
CCl ₃ COOH	2^{-2} (pH 0.7)	2^{-5} (pH 1.4)	2^{-7} (pH 2.0)	2^{-12} (pH 3.3)	8	32
(COOH) ₂	2^{-2} (pH 1.0)	2^{-4} (pH 1.3)	2^{-7} – 2^{-8} (pH 2.0–2.2)	2^{-9} (pH 2.5)	4	2–4
Methylalkohol (100%)	2^{-1} – 2^{-2}	2^{-1} – 2^{-2}	2^{-7}	2^{-6}	1	$\frac{1}{2}$
Äthylalkohol (100%)	2^{-2}	2^{-2}	2^{-7}	2^{-7}	1	1
Azeton (100%)	2^{-1}	2^{-1}	2^{-4} – 2^{-5}	2^{-6}	1	2–4
Äthyläther (10%)	2^{-2}	?	2^{-3} – 2^{-4}	2^{-2}	?	$\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$
Chloralhydrat (0.75%)	—	—	2^{-3} (?)	2^{-4}	—	2 (?)

weiter das numerische Verhältnis der betreffenden minimalen Konzentrationsgrößen zwischen Pollenmutterzellen und Wurzelzellen, welches über die relative Empfindlichkeit gegen bzw. Permeabilität für die einzelnen Chemikalien Aufschluss geben kann.

Aus der obenstehenden Tabelle lassen sich folgende Schlüsse ziehen ;

i) Die minimale Fixierungskonzentration beträgt bei Salpetersäure, Trichloressigsäure, Oxalsäure und höchstwahrscheinlich auch anderen Mineralsäuren ungefähr $1/4$ Mol, welches pH 0,7–1,0 entspricht. Bei Essigsäure liegt der betreffende Wert etwas niedriger, nämlich $1/8$ Mol (pH 2,6).

ii) Die minimale Wirksamkeit entspricht bei Essigsäure und Trichloressigsäure der Konzentration von 2^{-7} (0,0078) Mol (pH 3,1 bei der ersteren, 2,0 bei der letzteren). Der minimale Wert erweist sich bei Salpetersäure etwas höher, bei Oxalsäure dagegen etwas niedriger. Dem pH-Wert nach gelten somit folgende Wirksamkeitsreihen ;

Bei Pollenmutterzellen: $\text{CCl}_3\text{COOH} < (\text{COOH})_2 < \text{HNO}_3 < \text{CH}_3\text{COOH}$

Bei Wurzelzellen: $(\text{COOH})_2 < \text{HNO}_3 < \text{CCl}_3\text{COOH} < \text{CH}_3\text{COOH}$

In beiden Fällen ergibt sich also, dass Essigsäure im Vergleich zu Mineralsäuren unverkennbar wirksamer ausfällt, was auch bezüglich des Fixierungsvermögens voll zur Geltung kommt. Aus dieser Tatsache dürften wir hier auf die höhere Permeabilität des Protoplasmas für Essigsäure schließen, wozu man um so mehr berechtigt ist, wenn man die geringe Abweichung der wirksamen Konzentration bei beiden Versuchsobjekten in Betracht zieht.

iii) Das numerische Verhältnis des wirksamen Konzentrationsminimums zwischen beiden Zellarten zeigt sich je nach der Art der Chemikalien sehr verschieden. Bei der minimalen Fixierungskonzentration beträgt das Verhältnis annähernd 1–8, und zwar bei den Säuren schwankt es zwischen 2–8, während es bei den Alkoholen und Azeton gerade 1 gleicht, d. h. das Fixierungsminimum stimmt hier bei beiden Zellarten völlig überein. Für das Wirkungsminimum zeigt sich die Abweichung dieser Grösse noch beträchtlicher, abgesehen von Salpetersäure und Trichloressigsäure, wo das Verhältnis ungemein grösser ist als sonst, und schwankt im allgemeinen zwischen $1/4$ –8. Bei NaCl, Methylalkohol und Äthyläther liegt der Wert niedriger als 1. Das bedeutet, dass die betreffenden Chemikalien auf Pollenmutterzellen wirksamer sind als auf Wurzelzellen. Das Verhältnis steht bei anderen Stoffen eben umgekehrt. Diesbezüglich gesellt sich Essigsäure vielmehr zu den indifferenten Narkotika. Für die

fragliche Konzentrationsabweichung scheinen einerseits die relative Permeabilität sowie Empfindlichkeit der beiden Zellarten und andererseits die relative Diffundierbarkeit der Chemikalien massgebend zu sein. Der Grösse dieser numerischen Werte, insbesondere für das Fixierungsminimum, kommt weiterhin eine mikrotechnische Bedeutung zu. Dieselbe zeigt nämlich an, dass man verschiedene Chemikalien als Fixiermittel für Pollenmutterzellen in einer um ebenso viel konzentrierterer Lösung anwenden soll, als für Wurzelzellen, um in beiden Fällen eine praktisch übereinstimmende Fixierung zu erreichen. Aus alledem tritt ohne Weiteren hervor, dass bei der Fixierung der Pollenmutterzellen, im Vergleich zu Wurzelzellen, die Säuren um 2 bis 8 mal konzentriert werden müssen, die Alkohole dagegen bei beiderlei Objekten in ebengleicher Konzentration zur Anwendung kommen können.

B. Verschiedene Empfindlichkeit unter Zellarten und zellularen Strukturelementen.

Es verdient zuvorderst besonders hervorgehoben zu werden, dass sich die Pollenmutterzellen im Vergleich zu den Wurzelzellen deutlich strukturelabiler zeigen, worauf u. a. folgende Tatsachen schliessen lassen;

(1) Pollenmutterzellen erleiden im allgemeinen durch die Wirkung von destilliertem Wasser und wässrigen Lösungen verschiedener Substanzen schwerere strukturelle Beeinflussung als Wurzelzellen.

(2) Offenkundig empfindlicher erweisen sich die Pollenmutterzellen gegenüber der Wirkung von NaCl, Methylalkohol und Äthyläther, wobei die minimale wirksame Konzentration beträchtlich niedriger liegt.

(3) Bei den meisten angewandten Chemikalien findet die Wirkung auf beide Arten der Zellen allerdings qualitativ völlig übereinstimmend statt, aber hierbei treten bei den Pollenmutterzellen die Strukturveränderungen insbesondere der Chromosomen mit grösserer Häufigkeit und Mannigfaltigkeit hervor.

(4) Nach den Versuchsergebnissen scheinen die Pollenmutterzellen leichter der Nekrobiose ausgesetzt zu sein. Dementsprechend kommen verschiedenartige Nekroformen, so z. B. Färbbarkeitsverminderung der karyoplasmatischen Strukturelemente, Schrumpfung des Zytoplasmas, die Tendenz der Chromosomen zur Abrundung und zur aggregativen Verteilung usw. weit verbreitet vor (vgl. unten).

Die bestätigte schwerere Strukturveränderung der Pollenmutterzellen im Vergleich mit Wurzelzellen erklärt sich zum Teil schon aus dem Umstand, dass das Einlegen ins Wasser allein den normalerweise

in der Luft lebenden Pollenmutterzellen bereits eine anomale Bedingung verschaffen muss. Abgesehen hiervon ist dennoch die strukturelle Labilität seitens der Pollenmutterzellen kaum zu leugnen, was zum mindesten bei den karyoplasmatischen Strukturen zweifellos erscheint¹⁾. Bezüglich der höheren Labilität des Karyoplasmas in Vergleich zum Zytoplasma habe ich schon früher manches besprochen (s. II. Mitteilung). In diesem Zusammenhang ist weiter die leichte Löslichkeit bzw. Exosmierbarkeit des Karyotins bei Pollenmutterzellen beachtenswert. Die vorherrschende diffuse Färbung bei den behandelten Pollenmutterzellen scheint fernerhin hierzu in Beziehung zu stehen (vgl. gleich unten).

C. Über einige Nekroformen.

Wie schon oben bemerkt, verfallen die Pollenmutterzellen unter abnormen Bedingungen mit Leichtigkeit in die Nekrobiose. So wiegen bei den vorliegenden Versuchen Nekroformen verschiedener Kategorien mächtig vor. Hierher gehören in erster Linie, Strukturzerstörung, diffuse Färbung, Zytoplasmaschrumpfung, Abrundung und aggregative Tendenz der Chromosomen, Spiegelfärbung der Chromosomen und der Nukleolen.

(1) Die Strukturzerstörung tritt nicht selten auch bei den normal fixierten Pollenmutterzellen auf²⁾. Bei den behandelten Objekten ist die Zahl der zerstörten Zellen bei den minimalen Fixierungskonzentrationen am grössten. Von der sogenannten Zerstörungszone lässt sich aber dabei für gewöhnlich nichts genaues nachweisen. Die Strukturzerstörung kommt bei der Fixierungskonzentration von Essigsäure und Trichloressigsäure niemals, bei der verdünnten Essigsäure, Methylalkohol, Isoamylalkohol und Äthyläther nur in geringem Masse zum Vorschein. Im letzten Falle wird die Nachfixierung der Zellstrukturen sicherlich durch genannten Chemikalien begünstigt. Erheblich strukturzerstörend wirkt u. a. Äthylalkohol ein, der also zur Fixierung der Pollenmutterzellen kaum brauchbar ist.

(2) Die diffuse Färbung der Zellstrukturen bezieht sich hier auf die Siderophilie, welche in normalen Zellen sowohl dem Karyotin als auch dem Nukleolus zukommt. Für die Siderophilie bzw. Basophilie der Zellstrukturen sind meiner Ansicht nach zwei Faktoren ausschlaggebend, nämlich Karyotinkonservierung und Exosmose der Protoplasmagrundsubstanz (Lipoproteide?). Die beiden Faktoren

1) Vgl. KOERNICKE ('05 S. 414), SAKAMURA ('20 S. 140) usw.

2) Der Prozentsatz der zerstörenden Wirkung der Fixiermittel beträgt bei ZENKERScher Lösung ca. 45 proz., bei derselben ohne Essigsäurezusatz ca. 30 proz.

scheinen ihrerseits wesentlich durch das zur Anwendung kommende Fixiermittel bedingt zu werden. Eine absolute Reinheit der Karyotinfärbung wird nun nur dann erreicht, wenn bei der Fixierung das Karyotin vollkommen gefällt wird, und weiter von der Plasma-grundsubstanz durch Exosmose möglichst viel ausgezogen wird. In dieser Hinsicht lassen die sublimathaltigen Fixagen noch viel zu wünschen übrig. Weiteres über die theoretische Betrachtung der Karyotinfärbung verweise ich auf meine besondere Abhandlung. Die ausprobierten Säuren und indifferenten Narkotika wirken bei der Fixierungskonzentration mehr oder minder färbbarkeitsvermindernd und zwar bei Salpetersäure, Trichloressigsäure, Methyl- und Äthylalkohol, Chloroform usw. am stärksten. Bei Essigsäure, Oxalsäure, Amylenhydrat und Chloralhydrat erscheint die diffuse Färbung der Objekte nicht so erheblich¹⁾.

Es hat mit der Siderophilie des Nukleolus eine andere Bewandtnis. Die blasse Färbung desselben tritt bei der Wirkung von HNO_3 , Oxalsäure und Azeton auf, und zwar ohne Ausnahme bei der Fixierungskonzentration. Bei Trichloressigsäure, Isoamylalkohol, Methylalkohol und Äthylalkohol färbt sich der Nukleolus nur grau. Hier muss es sich natürlich um den Übergang zum normalen Zustand handeln. Äthyläther, Chloralhydrat und Amylenhydrat vermindern die Siderophilie des Nukleolus gar nicht.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse bei den Wurzelzellen ergibt sich übrigens, dass das relative Vermögen verschiedener Chemikalien, dem Nukleolus Siderophilie zu entziehen, bei beiderlei Zellen annähernd dasselbe bleibt. Bei den Pollenmutterzellen zeigt sich aber der Nukleolus etwas leichter entfärbbar, was mit dem Umstand zusammenzuhängen scheint, dass ich bei den vorliegenden Versuchen immer ausschliesslich den Nukleolus des Prophasenkerns, nicht aber des Ruhekerns ins Auge gefasst habe.

(3) Die Pollenmutterzellen erfahren ungleich häufiger Schrumpfung als die Wurzelzellen, was schon bei den normalen Objekten, die mit ZENKERScher Lösung fixiert wurden, bemerkbar ist. Ohne Zusatz von Essigsäure wirkt doch diese Fixierungsflüssigkeit auf Zytoplasma kaum schrumpfend ein. Bei den sämtlichen ausprobierten Chemikalien, mit Ausnahme von Salpetersäure, Essigsäure und Trichloressigsäure, findet man das Zytoplasma der Pollenmutterzellen am häufigsten von den Zellwänden abgelöst. Die fragliche Schrumpfung tritt bei Oxalsäure überaus beträchtlich auf, während Essig-

(1) Vgl. WOYCICKI ('06), BORGSTAM ('22 S. 7) usw.

säure und Trichloressigsäure immer, und Salpetersäure meistens bei der Fixierungskonzentration keine Schrumpfung des Zytoplasmas hervorrufen. Diese Erscheinung schliesst sich ohne jeden Zweifel den Nekroformen an und demgemäss wird sie unausbleiblich von bestimmten Innenstrukturen des Zytoplasmas (gerinnslig oder homogen-gerinnslig) begleitet (vgl. oben). Die Neigung des Zytoplasmas zur Schrumpfung scheint sich weiter je nach dem Mitosenstadium nachweisbarerweise verschieden zu sein. So pflegt das Zytoplasma bei der heterotypischen Mitose in Prophase und Metaphase häufiger von Zellmembran abgelöst zu erscheinen als in Anaphase und Telophase (vgl. oben).

(4) Nekrobiotische Formen- und Verteilungsmodifikation der Chromosomen.

Bei der Nekrobiose der Pollenmutterzellen werden die Chromosomen in der Regel zur Abrundung sowie zur aggregativen Verteilung geführt (vgl. I. u. II. Mitteilungen). Die Abrundung der Chromosomen kann, wenn auch nicht immer, von der Volumverkleinerung derselben begleitet werden, wie es im Stadium von Diakinese am deutlichsten zutage tritt (Fig. 1, 13, 14, 27, 36)¹⁾. Die Chromosomen nehmen im allgemeinen am häufigsten bei der Einwirkung von Oxalsäure und Trichloressigsäure abgerundete Formen an.

Die normale Verteilung der Chromosomen wird bei der Zellnekrobiose nach der aggregativen Richtung hin gestört. Die aggregative Tendenz der Chromosomen schreitet manchmal weiterhin zur Zusammenklumpung ganzer Chromosomen oder zur Miteinanderverklebung der einzelnen (Fig. 17, 18, 35)²⁾. Ähnliche Verteilungsmodifikationen der Chromosomen machen sich auch bei normalen Zellen bemerkbar; zumal, wenn das benutzte Fixiermittel Säurezusatz (z. B. Essigsäure) entbehrt³⁾. Die betreffenden Chromosomennekroformen treten insbesondere bei der Wirkung von Essigsäure, Oxalsäure, Chloroform, Benzol usw. auffallend hervor. Als Mitosenanomalien bringt diese Verteilungsstörung der Chromosomen neben Anaphasen- und Telophasenbrücken, weiter auch „Schwesterbrücken“ mit sich, welche letztere sich bei der homöotypischen Mitose zwischen Schwesterkernplatten bilden (s. Fig. 8, 15). Solch ein Bild ist oft sichtbar bei

1) Weiter s. KOERNICKE ('05 S. 411), SAKAMURA u. STOW ('26 S. 117), MICHAELIS ('26 S. 572) usw.

2) Vgl. KOERNICKE ('05 S. 412), WOYCICKI ('06 S. 538). NĚMEC ('10 S. 193), TAKAMINE ('23 S. 110), MICHAELIS ('26 S. 574) usw.

3) Die Zusammenballung der Chromosomen im Übergangsstadium zwischen Diakinese und Metaphase („tassement équatorial“) ist im übrigen auch bei normalen Pollenmutterzellen deutlich nachweisbar.

Essigsäure, Trichloressigsäure, Oxalsäure, Äthyläther, Chloralhydrat, Azeton, Methylalkohol usw. Es ist hier noch hinzuzufügen, dass die Verklebung einzelner Chromosomen miteinander auch bei der dispersiven Verteilung derselben nicht ganz ausgeschlossen ist (vgl. z. B. Fig. 32, 35 usw.).

(5) Eine eigenartige Nekroform stellt schliesslich die Spiegelfärbung der Chromosomen und der Nukleolen, wobei in den betreffenden Strukturelementen, wie bei einer Schützenscheibe ein allein noch gefärbtes, scharf nach aussen hin kontouriertes Zentrum hervortritt, welches von einem ganz entfärbten und durch Kontrastfarben sekundär färbbaren Rand, Scheibe oder Rahmen umgeben ist. Eine Reihe von Beispielen für ebendieselbe Spiegelfärbung wurden schon früher von FISCHER ('99, S. 32, 240ff. usw.) bei den mit Eisenhämatoxylin gefärbten künstlichen Granula sowie bei verschiedenen natürlichen Objekten hervorgehoben¹⁾. Wir haben auch schon oben mehrere Male Gelegenheit gehabt, ähnliche Bilder zu beobachten (vgl. Fig. 5, 6, 19, 25).

Die Spiegelfärbung des Nukleolus bemerkt man ausschliesslich im Diakinesenstadium bei der „nekrobiotischen“ Konzentration von Essigsäure und Trichloressigsäure. Dieselbe der Chromosomen (in Diakinese sowie in Metaphase) tritt sowohl bei der ähnlichen Konzentration von Essigsäure als bei der offenbar Fixierungskonzentration einiger indifferenten Narkotika, z. B. Äthyläther, Chloroform und Azeton auf. In beiden Fällen bestätigte ich bei der Differenzierung der Spiegelfärbung ebendasselbe, was FISCHER (a.a.O.) seinerzeit hervorgehoben hat, nämlich dass die Breite des Spiegels von dem Grade der Differenzierung abhängt, so dass er sehr breit bei geringer, sehr klein und also einem Scheibenspiegel um so ähnlicher bei stärker Differenzierung erscheint.

Für die nekrobiotische Natur der Spiegelfärbung sprechen u. a. die Umstände, dass dieselbe in der Regel gerade bei der Zerstörungszone entsprechender Konzentration zutage tritt, und weiter, dass die Spiegelfärbung nur dann stattfindet, wo die Schrumpfung bzw. Abrundung der Chromosomen und die Homogenisierung des Zytoplasmas deutlich sich zu erkennen geben.

D. Strukturmodifikationen des Zytoplasmas und der Spindelsubstanz.

Bei normal fixierten Pollenmutterzellen erscheint im allgemeinen das Zytoplasma bei ZENKERScher Fixage gerinnslig oder gerinnslig-

1) s. weiter SAKAMURA ('20 S. 86 und Fig. 130).

schwachfilzig, bei derselben ohne Essigsäurezusatz aber durchaus homogen-gerinnslig strukturiert. Durch die Vorbehandlung mit einzelnen Chemikalien wird es jenach dem Grade der Konservierung (Menge) sowie der Verteilung (Dispersität und Quellungsgrad) der Plasmagrundsubstanz entweder homogenisiert, also ganz homogen bzw. homogen-gerinnslig, oder noch substanzärmer, also arm gerinnslig oder gerinnslig-filzig. Auf die erstgenannte Weise wirken durchgehende Methylalkohol und Äthylalkohol, Chloroform, Xylol, Benzol und Azeton ein. Zur Homogenisierung neigt sich das Zytoplasma bei der Nekrobiose überhaupt, wobei es sehr häufig mit Eisenhämatoxylin färbbaren chondriomartigen Körnern besät ist, welche letztere bei weiter gerückter Entfärbung merklich lichtbrechend erscheinen und nicht selten zu einer Anzahl von kugeligen Massen zusammengeballt sind (Fig. 21, 26). Solche Körperchen sieht man auch in normalen Wurzel- und Pollenmutterzellen bei gewissen Fixiermitteln. Bei flüchtigem Anblick treten sie wie Plastiden hervor. Es erweckt bei mir den Anschein, als ob sie von der Verstreuung der Zytosomen bei der Fixierung stammen. Die in Rede stehenden Niederschläge kommen recht häufig bei Methyl- und Äthylalkohol, Xylol, Benzol und Azeton vor.

Bei den Säuren, besonders Essigsäure und Trichloressigsäure, weist das Zytoplasma im allgemeinen eine schwach filzige Struktur auf. Bei Salpetersäure erleidet der gerinnslige Anteil des Zytoplasmas eine gröbere Verteilung und demgemäss erscheint dasselbe etwas körnig oder flockig. Deutlich gerinnselärmer wird das Zytoplasma bei der Wirkung von Alkoholen, Äther und Chloralhydrat.

Es bietet ein theoretisches Interesse, dass das Zytoplasma bei den Pollenmutterzellen viel seltener filzigen bzw. vakuoligen Bau zeigt als bei den Wurzelzellen.

Die strukturelle Veränderung der Spindelsubstanz geht mit derselben des eigentlichen Zytoplasmas anscheinend völlig parallel. So tritt die faserige Struktur derselben bei Salpetersäure, Xylol, Benzol, Azeton usw. sehr schwach hervor¹⁾. Dagegen erscheinen die Spindelfäden abnormerweise ausgeprägt bei Oxal-, Essig- und Trichloressigsäure, Äther, Chloralhydrat usw.²⁾. Aus obigem kann man ohne Weiteres darauf schliessen, dass die fädige Struktur der Spindelsubstanz, ebenso wie die Membranstrukturen, im allgemeinen

1) Vgl. WOYCICKI ('06 S. 538), SAKAMURA ('20 S. 141), BORGSTAM ('22 S. 12ff.) usw.

2) Vgl. KOERNICKE ('05 S. 412, 414), NĚMEC ('10 S. 200), MICHAELIS ('26 S. 574, 578) usw.

um so deutlicher auftritt, je gerinnseärmer, also filziger das Zytoplasma wird, somit mit der Exosmose der Plasmagrundsubstanz unterstrichen erscheint¹⁾. Mit dem Hervortreten der Spindelfäden werden die allenfalls transitorische Zellplattenbildung und die multipolare Spindelbildung augenscheinlich befördert (vgl. oben, Fig. 31, 33, 37)²⁾.

E. Einige Mitosenanomalien bei den Pollenmutterzellen.

Über die künstliche Erzeugung der anomalen Karyokinese bei den Pollenmutterzellen durch verschiedene Eingriffe sind schon früher eine Menge von stattlichen Versuchen angestellt³⁾. In neuester Zeit bezwecken die Forscher, von der angesprochenen Bedeutsamkeit der Chromosomenmorphologie in experimenteller Genetik ausgehend, dadurch sehr gern den Mechanismus der Entstehung neuer äußerlichen Merkmale des Pflanzenorganismus zu analysieren. Bei den jetzt vorliegenden Literaturen, wo es in erster Linie auf die Bedeutung der erzielten Mitosenanomalien für die Organismen als ganzes ankommen sollte, scheint man aber über die Beschreibung einzelner Vorgänge die Nachforschung der Kausalität bzw. Entstehungsmomente derselben versäumt zu haben. Wir wollen nunmehr hier bei unseren Untersuchungen einzig allein auf das letztgenannte Moment hin abzielen, und zwar aus dem Grunde, dass bei dem wissenschaftlichen Gedankengänge das Wie immer dem Warum vorausgehen soll. Nach dieser Betrachtung hoffe ich, abgesehen von meiner leider mangelhafter Versuchsanordnung, wie sie über die „Nachwirkung“ bewirkter Teilungsabnormitäten gar nichts ergeben kann, doch dass in dieser Forschungsrichtung etwas Taugliches zu finden sein wird.

Die Mitosenanomalien sind eigentlich auf die Störung des normalen Verhaltens der Chromosomen zurückzuführen, welche ihrerseits entweder die zeitliche oder die räumliche sein kann. Die zeitliche Störung der karyokinetischen Prozesse bezieht sich allem Anschein nach vorwiegend auf die Verschiebung der Geschwindigkeitskonstanten für einzelne Mitosenphasen, welche die Verlangsamung (Hemmung bzw. Verhinderung) oder Beschleunigung (Beförderung) eines gewissen Stadiums der Karyokinese, demzufolge weiter die Korrelationsstörung des normalen Mitosenverlaufes zur Folge hat. In diese Kategorie gehören z. B. frühzeitige Chromosomenbildung im Prophasenkerne, verspätete Rekonstruktion des Telophasenkerns

1) Vgl. YAMAHA ('26a), weiter I. und II. Mitteilungen.

2) s. weiter SAKAMURA ('20 s. 141), MICHAELIS ('26 S. 574) usw.

3) Vgl. KOERNICKE ('05), WOYCICKI ('06), NĚMEC ('06, '10), SAKAMURA ('20), BORGESTAM ('22), TAKAMINE ('23), SAKAMURA u. STOW ('26), MICHAELIS ('26) usw.

usw¹⁾. Durch den chemischen Eingriff scheinen Mitosenanomalien dieser Art verhältnismässig selten zur Entstehung zu kommen. Was die räumliche Störung des Chromosomenverhaltens betrifft, so läuft sie der Hauptsache nach auf die dispersive Verteilungsmodifikation der Chromosomen hinaus, wenn auch anderweitige Störung der Chromosomenanordnung, so z. B. aggregative Tendenz der Chromosomen, zweifelsohne eine Anzahl der anomalen Mitosenfiguren, etwa wie Anaphasen- und Telophasenbrücken, Kernverschmelzung usw. nach sich zieht²⁾. Dispersive Tendenz der Chromosomen tritt bei Trichloressigsäure, Methylalkohol und Äthyläther merkwürdigerweise zutage³⁾, und zwar zusammen mit anderartigen Entquellungsformen des Protoplasmas überhaupt (s. I. u. II. Mitteilungen), was ein theoretisches Interesse in Anspruch nimmt. Von der Verstreuerung der Chromosomen lassen sich ableiten u.a. Karyomerenbildung⁴⁾, unregelmässig gestaltete Kernanlagen⁵⁾ usw. In diesem Zusammenhange ist beachtenswert, dass isolierte, abgelegene oder vereinzelte Chromosomen auch bei der aggregativen Verteilung der Chromosomen zu bemerken sind (s. Fig. 17)⁶⁾. Allgemein gesprochen verunstalten sich einzelne Chromosomen bei ihrer Zerstreuung keineswegs abgerundet, sondern immer eckig oder gezackt (s. Fig. 9, 21, 22, 26, 35 usw., vgl. weiter II. Mitteilung).

Im Gegensatz zu mannigfachen Mitosenanomalien treten anomale Zytokinese auch bei Pollenmutterzellen ungleich seltener hervor, was ohne Zweifel mit der verminderten Labilität des Zytoplasmas im Vergleich mit dem Karyoplasma zusammenhängt. Bei dem hier zum Versuche herangezogenen Objekte wird die Zytokinese bei der Pollentetradenbildung normalerweise nach dem Schema von Membranleistentyp bewerkstelligt (s. YAMAHA '26b). Zellplattenbildung tritt demgegenüber in normalem Zustand nur ausnahmsweise auf. Bei den behandelten Pollenmutterzellen bleibt aber die Membranleistenbildung niemals aus, während die Zellplattenbildung, wenn

1) SAKAMURA u. STOW ('26 S. 117 ff.), MICHAELIS ('26 S. 574), weiter s. II. Mitteilung.

2) s. KOERNICKE ('05 S. 411), NĚMEC ('06, '10 S. 202ff.), SAKAMURA ('20 S. 141), BORGSTAM ('22 S. 12ff.), MICHAELIS ('26 S. 576, 578) usw.

3) Vgl. NĚMEC ('10 S. 204), SAKAMURA ('20 S. 141), BORGSTAM ('22 S. 12ff.), SAKAMURA u. STOW ('26 S. 117, 118, 120), MICHAELIS ('26 S. 574) usw.

4) Vgl. KOERNICKE ('05 S. 412), BORGSTAM ('22 S. 12ff.), SAKAMURA u. STOW ('26 S. 118), MICHAELIS ('26 S. 574, 578) usw.

5) Vgl. KOERNICKE ('05 S. 413), BORGSTAM ('22 S. 12ff.) usw.

6) Vgl. SAKAMURA ('20 S. 141), BORGSTAM ('22 S. 12ff.), TAKAMINE ('23 S. 110) usw.

auch höchstwahrscheinlich von transitorischer Natur, bei einigen indifferenten Narkotika (Chloroform, Äthyläther, Chloralhydrat usw.) augenscheinlich begünstigt wird. Nach WOYCICKI ('06), NĚMEC ('60, '10 S. 194, 202 usw.), SAKAMURA ('20 S. 141), BORGENSTAM ('22 S. 12ff.), MICHAELIS ('26 S. 576) usw. soll die Zytokinese bei der Pollentetradenbildung, wie sie in normalem Zustand mittelst Zellplattenbildung vorgeführt wird, durch die Wirkung von Narkotika und Kälte ganz unterdrückt werden. Bei den Pollenmutterzellen von *Gagea*, wo die Tetradenbildung normalerweise durch Zellplattenbildung zustandekommt, wird die Membranleistenbildung nach SAKAMURA u. STOW ('26) durch Wärmewirkung ausgelöst.

Die Polysporie bzw. Bildung der überschüssigen Pollentetraden¹⁾ wird bei unseren Versuchsobjekten ausschliesslich mit Hilfe von Membranleisten herbeigeführt.

Nach der Häufigkeit, mit welcher obenerwähnte Teilungsanomalien bewirkt werden, gilt für die erprobten Säuren folgende Reihe;

Salpetersäure < Oxalsäure < Essigsäure < Trichloressigsäure

Unter sonstigen Chemikalien erweisen sich Äthyläther und Pyridin diesbezüglich aufs wirksamste, und weiter Methyl- und Äthylalkohol, Amylenhydrat und Chloralhydrat mässig aber minder wirksam. In dieser Hinsicht verhalten sich die Pollenmutterzellen mit den Wurzelzellen nicht völlig übereinstimmend (vgl. I. Mitteilung).

ZUSAMMENFASSUNG

1. Folgende 17 Arten Chemikalien wurden bei verschiedenen Konzentrationen mit 2-stündiger Versuchsdauer auf die strukturelle Wirkung auf die Pollenmutterzellen von *Daphne odora* hin geprüft: Salpetersäure, NaCl, Na₂SO₃, Essigsäure, Trichloressigsäure, Oxalsäure, Methylalkohol, Äthylalkohol, Amylenhydrat, Isoamylalkohol, Chloroform, Benzol, Xylol, Azeton, Äthyläther, Chloralhydrat und Pyridin.

2. Die Wirkung einzelner Chemikalien werden im experimentellen Teil im Vergleich mit den Versuchsergebnissen bei Wurzelzellen zusammenfassend beschrieben. Dabei ist auf die fixierende sowie strukturzerstörende Wirkung jeder Chemikalien, relative Wirksamkeit und Eindringbarkeit derselben und die strukturelle Beeinflussung sowohl der karyoplasmatischen als auch zytoplasmatischen Zellbestandteile besondere Rücksicht genommen.

3. Die Pollenmutterzellen erweisen sich destilliertem Wasser

1) s. Fig. 7, weiter KOERNICKE ('05 S. 412), NĚMEC ('10 S. 192ff.), SAKAMURA ('20 S. 142) usw.

sowie wässrigen Lösungen verschiedenartiger Chemikalien gegenüber bedeutend empfindlicher als die Wurzelzellen, was besonders bei karyoplasmatischen Strukturelementen deutlich hervortritt.

4. Das Karyotin der Pollenmutterzellen zeigt sich durch NaCl und Na_2SO_3 leichter löslich bzw. exosmierbar als dasselbe von Wurzelzellen.

5. Die Fixierungskonzentration und wirksame Konzentration für erprobte Chemikalien werden bei beiden Zellarten vergleichend tabellarisch zusammengestellt, wobei das numerische Verhältnis des Wirksamkeitsminimums zwischen beiden Zellarten besonders hervorgehoben wird.

6. Aus den Versuchen tritt höchstwahrscheinlich hervor, dass die Permeabilität des Protoplasmas für verschiedene Chemikalien bei einzelnen Mitosenstadien verschieden ausfällt.

7. Als Nekroformen wurden Strukturzerstörung, diffuse Färbbarkeit ganzer Zellstrukturen, Zytoplasmaschrumpfung, Abrundung und aggregative Tendenz der Chromosomen und Spiegelfärbung der Chromosomen und des Nukleolus ausführlich besprochen.

8. Verschiedenheit der Strukturen des Zytoplasmas und der Spindelsubstanz richtet sich wesentlich nach der Menge und Verteilungsweise konservierter Plasmagrundsubstanz, also mutmasslich nach dem Quellungsgrad des Protoplasmas.

9. Mitosenanomalien sind entweder auf die zeitliche oder die räumliche Störung normalen Chromosomenverhaltens zurückführbar. Bei dem chemischen Eingriffe kommt die erste Art der Mitosenstörung relativ selten vor.

10. Eine Mehrzahl der beobachteten Mitosenanomalien lassen sich von der nach dispersiver Richtung hin stattfindenden Verteilungsmodifikation der Chromosomen ableiten.

11. Auch bei den Pollenmutterzellen wird der Zytokinesenvorgang bei der Mannigfaltigkeit der Mitosenanomalien verhältnismässig selten angegriffen.

12. Weitere Beispiele für die Korrelation der Strukturmodifikationen untereinander werden angeführt; damit hat die angenommene Gegensätzlichkeit der kolloidalen Veränderungen im Protoplasma zwischen Metabiose und Nekrobiose weitere Bestätigung gefunden.

Zum Schlusse möchte ich meinem hochgeehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. K. FUJII für seine freundliche Unterstützung bei dieser Untersuchung meinen herzlichsten Dank aussprechen.

LITERATURVERZEICHNIS

- BORGENSTAM, E. (1922) Zur Zytologie der Gattung *Syringa*, nebst Erörterungen über den Einfluss äussere Faktoren auf die Kernteilungsvorgänge. Arkiv f. Bot. 17 (Separat.).
- CLELAND, R. E. (1926) Cytological study of meiosis in anthers of *Oenothera muricata*. Bot. Gaz. 82: 55-70.
- FISCHER, A. (1899) Fixierung, Färbung und Bau des Protoplasmas. Jena.
- KOERNICKE, M. (1905) Über die Wirkung von Röntgen- und Radiumstrahlen auf pflanzliche Gewebe und Zellen. Ber. d. D. bot. Ges. 23: 404-415.
- MICHAELIS, P. (1925) Über Einfluss der Kälte auf die Reduktionsteilung von *Epilobium*. Planta. 1: 569-582.
- NĚMEC, B. (1906) Über die Bedeutung der Chromosomenzahl. (V.M.). Bull. Inter. Acad. Sc. Bohême (Separat.).
- (1910) Das Problem der Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Fragen. Berlin.
- OSAWA, I. (1913) On the development of the pollen and embryo-sac of *Daphne*, with special reference to the sterility of *Daphne odora*. Journ. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo. 4: 237-264.
- SAKAMURA, T. (1920) Experimentelle Studien über die Zell- und Kerteilung mit besonderer Rücksicht auf Form, Grösse und Zahl der Chromosomen. Journ. Coll. Sc. Imp. Univ. Tokyo. 39: Art 11.
- SAKAMURA, T. und STOW, I. (1926) Über die experimentell veranlasste Entstehung von keimfähigen Pollenkörnern mit abweichenden Chromosomenzahlen. Jap. Journ.-Bot. 3: 111-137.
- SHOEMAKER, J. S. (1926) Pollen development in the apple, with special reference to chromosome behavior. Bot. Gaz. 81: 148-172.
- TAKAMINE, N. (1923) On the effect of ultraviolet ray upon nuclear divisions of plants. Bot. Mag. Tokyo. 37: 109-112.
- WOYCICKI, Z. (1906) Über die Einwirkung des Äthers und des Chloroforms auf die Teilung der Pollenmutterzellen und deren Produkte bei *Larix dahurica*. Bull. de l'Acad. de Sc. Cracovie. Cl. Sc. Math. et Nat. S. 506-553.
- YAMAHA, G. (1926a) Über die Lebendbeobachtung der Zellstrukturen, nebst dem Artefaktproblem in Pflanzenzytologie. Bot. Mag. Tokyo. 40: 172-197.
- (1926b) Über die Zytokinese bei der Pollentetradenbildung, zugleich weitere Beiträge zur Kenntnis über die Zytokinese im Pflanzenreich. Jap. Journ. Bot. 3: 139-162.
- (1927a) Experimentelle zytologische Beiträge. I. Mitteilung. Orientierungsversuche an den Wurzelspitzen einiger Pflanzen. Journ. Fac. Sc. Imp. Univ. Tokyo, Sect. 3. 2: 1-214.
- (1927b) Experimentelle zytologische Beiträge. II. Mitteilung. Über die Wirkung des destillierten Wassers auf die Wurzelspitzenzellen von *Vicia Faba* bei verschiedenen Temperaturen. (Unter Druck).

Figurenerklärung der Tafel IV

Die sämtlichen Figuren beziehen sich auf die Pollenmutterzellen von *Daphne odora*, die nach Vorbehandlung mit ZENKERSchem Gemisch (mit oder ohne Essigsäurezusatz) fixiert und mit HEIDENHAINschem Eisenhämatoxylin und Lichtgrün gefärbt wurden. Schnittdicke immer 5 μ ; Vergrösserung ca. 1000 mal.

- Fig. 1. Destilliertes Wasser (2 Stunden); Zytoplasma gerinnslig schwach filzig, von Membran abgelöst. Chromosomen etwas geschrumpft, abgerundet.
- Fig. 2. NaCl (5,85 Proz.); Homöotypische Metaphase. Zytoplasma gerinnslig. Chromosomen teilweise gelöst mit körnigen Resten. Spindelfäden ausgeprägt.
- Fig. 3. NaCl (5,85 %); Heterotypische Metaphase. Zytoplasma gerinnslig. Chromosomen quellend gelöst bzw. exosmiert.
- Fig. 4. Essigsäure (6 %); Synapsis. Zytoplasma gerinnslig-filzig. Nukleolus etwas blass gefärbt.
- Fig. 5. Essigsäure (1,5 %); Heterotypische Metaphase. Zytoplasma nicht geschrumpft, homogen-gerinnslig. Chromosomen klumpig, spiegelartig gefärbt.
- Fig. 6. Essigsäure (1,5 %); Diakinese. Zytoplasma von Membran abgelöst, gerinnslig-filzig. Chromosomen abgerundet, spiegelartig gefärbt.
- Fig. 7. Essigsäure (0,375 %); Überschüssige Tetradenbildung (Polysporie).
- Fig. 8. Essigsäure (0,375 %); Homöotypische Metaphase. Zytoplasma homogen-gerinnslig, Chromosomen miteinander verschmolzen. „Schwesterbrücken“.
- Fig. 9. Trichloressigsäure (16,34 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen verstreut, etwas abgerundet. Zytoplasma gerinnslig.
- Fig. 10 & 11. Trichloressigsäure (16,34 %); Spätere Synapsis. Zytoplasma gerinnslig-filzig. Nukleolus blass gefärbt. Spireme anastomosiert.
- Fig. 12. Trichloressigsäure (8,17 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen abgerundet, aggregativ.
- Fig. 13. Trichloressigsäure (8,17 %); Diakinese. Chromosomen klumpig.
- Fig. 14. Trichloressigsäure (8,17 %); Spätere Diakinese. Chromosomen abgerundet. Zytoplasma geschrumpft.
- Fig. 15. Trichloressigsäure (8,17 %); Homöotypische Metaphase. „Schwesterbrücken“. Chromosomen miteinander verschmolzen.
- Fig. 16. Trichloressigsäure (8,17 %); Heterotypische Telophase. Karyomerenbildung.
- Fig. 17. Trichloressigsäure (2,04 %); „Tassement équatorial“. Chromosomen zusammengedrängt, mit vereinzelt Chromosomen. Zytoplasma geschrumpft, homogen-gerinnslig. Spindelfäden sehr schwach angedeutet.
- Fig. 18. Trichloressigsäure (2,04 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen miteinander anastomosiert.
- Fig. 19. Trichloressigsäure (2,04 %); Frühere Diakinese. Spireme anastomosiert. Nukleolus spiegelartig gefärbt.
- Fig. 20. Trichloressigsäure (0,51 %); Spätere Diakinese. Chromosomen klumpig. Nukleolus spiegelartig gefärbt.
- Fig. 21. Methylalkohol (100 %); Heterotypische Metaphase. Zytoplasma arm gerinnslig, mit rundlichen Gebilden. Chromosomen zackig, verstreut, Spindelfäden deutlich.
- Fig. 22. Methylalkohol (100 %); Heterotypische Metaphase. Zytoplasma arm gerinnslig, mit körnigen Niederschlägen. Chromosomen zackig, verstreut.
- Fig. 23. Amylenhydrat (1 %); Homöotypische Telophase. Kernverschmelzung.
- Fig. 24. Chloroform (0,7 %); Heterotypische Anaphase. Zytoplasma geschrumpft, gerinnslig. Spindelfäden deutlich. Zellplattenanlage.
- Fig. 25. Chloroform (0,7 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen geschrumpft, aggregativ ungeordnet, spiegelartig gefärbt.
- Fig. 26. Azeton (100 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen verstreut, geschrumpft. Zytoplasma mit körnigen Niederschlägen.

- Fig. 27. Azeton (100 %); Diakinese. Kern geschrumpft. Chromosomen abgerundet. Nukleolus blass gefärbt.
- Fig. 28. Azeton (100 %); Homöotypische Metaphase, Chromosomen körnig, geschrumpft. Körnige Plasmaschranke.
- Fig. 29. Azeton (50 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen eckig, miteinander verschmolzen. Spindelfäden ausgeprägt. „Chondriommantel?“.
- Fig. 30. Azeton (50 %); Homöotypische Metaphase. Chromosomen körnig. Zytoplasma mit körnigen Niederschlägen („Chondriommantel?“).
- Fig. 31. Äther (10 %); Heterotypische Telophase mit Zellplattenanlage.
- Fig. 32. Äther (10 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen eckig, verstreut. Spindelfäden deutlich.
- Fig. 33. Äther (5 %); Heterotypische Metaphase. Tripolig. Chromosomen miteinander gebrückt.
- Fig. 34. Äther (5 %); Diakinese. Chromosomen erheblich abgerundet.
- Fig. 35. Äther (2,5 %); Heterotypische Metaphase. Chromosomen gezackt. Spindelfäden deutlich.
- Fig. 36. Äther (1,25 %); Spätere Diakinese. Chromosomen zusammengeschrumpft, etwas abgerundet.
- Fig. 37. Chloralhydrat (0,75 %); Heterotypische Anaphase (Tassement polaire), mit Zellplattenanlage. Zytoplasma arm gerinnlig.
- Fig. 38. Pyridin (0,5 %); Homöotypische Telophase. Telophasenbrücke.
- Fig. 39. Pyridin (0,5 %); Heterotypische Telophase. Karyomerenbildung.

Vermehren sich die Plastiden auch in der Meristemzelle von *Hydrilla verticillata* nur durch Teilung oder nicht?

(Beobachtungen über die Chloroplastenteilung von *Hydrilla*
verticillata FRESL. II.)

Contributions to Cytology and Genetics from the Departments of Plant-
Morphology and of Genetics, Botanical Institute, Faculty of
Science, Tokyo Imperial University, No. 64

Von

K. Kiyohara

Mit Tafel V und einer Textfigur

In einer früheren Mitteilung habe ich über einige Ergebnisse der direkten Beobachtung der Chloroplastenteilung bei einer Blüten-