Beobachtungen über japanische Moosflora (II).

von

K. Sakurai (Tokio)

Received May 30, 1932.

Rhacopilum aristatum MITT.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Isoma (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2203, 17-Mai-1931), Mt. Shibi (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2205, 17-Okt.-1931), Mt. Chōya (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2143, 22-Nov.-1931).

Liukiu: Nishi-Omotejima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2204, 11-Aug.-1931).

Distributio: Planta endemica.

Eriopus japonicus CARD. et THÉR.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Shibi, auf Humus, c. fr. (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2199 17-Okt.-1931).

Hondo: Prov. Ise, Daijingu (Coll. TSUCHIYA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2197, 18-Aug.-1927).

Distributio: Planta endemica.

Distichophyllum Mittenii Bryol. jav.

Liukiu: Nishi-Omotejima, auf Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2200, 8-Aug.-1931).

Distributio: Ceylon, Malacca, Java, Philippin, Neukaledonia.

N. B. Bei uns auf Formosa bisher sehr selten gefunden.

Distichophyllum Gonoi CARD.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Noma, auf schattig-feuchten Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2201, 30-Dez.-1931)

Distributio: Planta endemica.

Distichophyllum Maibarae BESCH.

Hondo: Prov. Aki, Itsukushima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2198, 24-Dez.-1924).

Distributio: Planta endemica.

Hypopterygium sinicum MITT.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Insula Biloo (Coll. HIROTSU in Herb. K. SAKURAI Nr. 2213, 12-Dez.-1911). Prov. Satsuma, Yamazaki-dorf, auf Lavaasche, (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2470, 1-Nov.-1931).

Distributio: Süd-China? In Symbolae sinicae nicht genannt.

Floribundaria (Eufloribundaria) **implicata** SAKURAI, sp. nov.

Tenella, caespitosa, caespitibus valde densis, implicatis, haud pendulis, sordide fusco-flavescentibus, aetate fuscidulis, vix nitidis. Caulis repens, 3-5 cm. longus, laxiuscule foliosus, saepe defoliatus, hic illic parce radiculosus, laxe ramulosus, apice interdum flagelliferus. Folia caulina e basi late triangularia, 0,4 mm. longa et 0,1-0,2 mm. lata, raptim in subulam attenuata, subula reflexa, 0,18 mm longa, minutisque remote serrulata, apice saepe hyalina; enervia. Folia ramea et ramulina majora, 0,6-0,7 mm. longa et 0,3 mm. lata, e basi semiauriculata, longe triangularia, acuta, supra medium minute serrulata; enervia. Folia flagellifera e basi ovalia, longe acuminata, in subulam attenuata, concaviuscula, distincte diffuse serrulata, supra medium saepe reflexula; enervia. Lamina obscura, cellulis laminarum anguste rhomboideis, pluri-papillosis, alaribus (tantum folia caulina) diversis, fuscis. Caetera desunt. Kiusiu: Prov. Higo, Mt. Ichibusa, am lebenden Baumstamme (Coll.

Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2304, Aug. 1930).

N. B. Von sehr verworrenem und zartem Habitus kann man leicht bestimmen.

Homalia subarcuata BROTH.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Städtchen Izūin (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2268, 7-Jan.-1931. Nr. 2270, 23-März-1931. Nr. 2269, 1-Oct.-1930).

Distributio: Planta endemica.

Fabronia kiusiana SAKURAI, sp. nov.

Lignicola. Gracillima, caespitosa, caespitibus densis, late extensis, flavo-fuscescentibus, mollibus, haud nitidis. Caulis elongatus, repens, rubiginosus, fasciculatim rubiginoso-radiculosus, laxiuscule foliosus, ca. 3 cm. longus, irregulariter laxe ramosus; ramis brevibus, ultra 3 mm. altis, erectis, saepe breve ramulosus, laxiuscule foliosis. Folia caulina e basi ovato-lanceolata, sensim longe acuminata, falcata, reflexa, semidecurrentia, margine integra vel indistincte serrata, plerumque erecta, interdum basi anguste incurva, 0,7 mm longa et 0,2 mm. lata; nervo lato, haud crasso, supra medium folii evanido, basi rubiginoso. Lamina pellucida, cellulis laxis, rhomboideo-hexagonis, medii 0,04 : 0,007 mm., versus basin laxioribus, infimis rubiginosis, marginibus infimis numerose quadratis vel rectangulis, haud chlorophyllosis. Folia ramea et ramulina anguste lanceolata, apice semitorta, cellulis infimis haud coloratis, apicibus unicellularibus et indistincte serratis. Flores masculinei gemmiforme in ramis vel ramulis, sat numerosos. Caetera ignota.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Mt. Kurinodake (Coll. Y. DOI Typus in Herb.

K. SAKURAI, Nr. 2218, 24-Mai-1930).

N. B. Nach der Beschreibung ist diese Art *F. curvirostris* Doz. et MOLK. ähnlich, ob meine Material steril ist. Doch bei mir Rippe weit breiter, Basalzellen gefärbt, Astblätter weit schmaler.

Haplodon Noguchii SAKURAI, sp. nov.

Autoicus. Gracilis, caespitosus, caespitibus densis, late extensis, luteis vel luteo-fuscescentibus, sericeis, mollibus. Caulis elongatus, repens, hic illic fusco-radiculosus, ca. 5 cm. longus, dense foliosus, irregulariter ramosus; ramis patulis, ultra 1 cm. longis, densissime foliosis, homomallulis. Folia sicca imbricata, caulina madida erecto-patentia, e basi ovato-lanceolata, longe acuminata, sensim piliforme attenuata, cochleariforme-concava interdum plicatula, symmetrica, marginibus integris, erectis, ca. 1,4 cm. longa et 0,4–0,5 mm. lata; enervia; cellulis laminarum pellucidis, oblongis, sensim basin versus rhomboideis, sed marginibus inferioribus pluri-seriate (8–10) quadratis, infimis aureis. Folia ramea et ramulina distincte plicata, breve acuminata, acuta; enervia. Flores masculinei gemmiforme in caule. Bractee perichaetii intimae erectae, ovato-lanceolatae, longe acuminatae, piliforme attenuatae. Vaginula longe cylindrica. Seta 8 mm. longa, crassiuscula, levis, luteo-rubiginosa, madida haud torta. Theca erecta, symmetrica, ovalis, sicca sub ore haud constricta; cellulis exothecii rotundato-quadratis vel rectangulis, fuscis. Annulus 0,03–0,04 mm. altus, persistens. Endostomium nullum. Exostomii dentes basi haud connati, sed haud remoti, lanceolati, obtusi, ca. 0,2–0,3 mm. longi et 0,04 mm. lati, linea media obsoleta, strato dorsali lutescenti-fusco, levi, apice papilloso, strato ventrali dense transverse vel oblique lamelloso, obscuro, luteo, apice decolorato, sed apicibus distincte papillosis. Appendix margini dentis adhaesiva, hyalina, distinctissime minuteque papillosa, apici utriusque libero. Spori leves, fuscescenti-virides, 0,03 mm. Caetera desunt.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Kitamorokatagun, Nakanogomura, Yasuhisa (Coll. A. NOGUCHI, Typus in Herb. K. SAKURAI Nr. 2217, 7-April-1927).

N. B. Von dem Blattbau und besonderer Peristomumstruktur kann man vielleicht eine neue Gattung *Neo-Haplodon* für diese interessante Art machen.

Schwetschkea Doii SAKURAI sp. nov.

Autoica. Gracilis, caespitosa, caespitibus sat densis, atro-viridibus, sericeonitidis. Caulis repens, per totam longitudinem, ca. 3–4 cm. longus, hic illic fusco-radiculosus, dense foliosus, irregulariter pinnam ramosus; ramis brevibus, infra 5 mm. altis. Folia sicca subadpressa, madida erecto-patentia, e basi anguste ovato-lanceolata, breve acuminata,

acuta, haud homomalla, plus minus concava, symmetrica, integra, sed minutissime papilloso-serrulata, ca. 1,0 mm longa et 0,4 mm. lata; nervo tenui, ad $2/3$ folii evanido; cellulis laminarum linearibus vel anguste hexagonis, marginibus infimis bi-tri-seriate quadratis vel transverse dilatatis. Bractee perichaetii intt. ovato-lanceolatae, haud subulatae; nervo obsoleto. Seta sicca flexuosula, luteorubra, distincte scaberrima, sed infima levis, ca. 6–7 mm. alta. Theca suberecta, ovalis, regularis, sicca sub ore constricta, levis, 1,2 mm. longa et 0,6 mm. crassa; cellulis exothecii irregulariter quadrato-hexagonis, leptodermis. Annulus persistans, bi-tri-seriatus. Vaginula cylindrica, apice fusca, 0,7 mm. longa et 0,2 mm. crassa. Peristomium duplex; exostomii dentes longe lanceolati, luteo-fusci, transverse striatuli, hyaline limbati, superne sublutei et papilloso, ca. 0,04 mm. lati et 0,3 mm. alti; processus fere brevior, lanceolato-subulatus, carinatus, in carina rimosus, minutissime papillosus; cilia nulla. Operculum brevirostrum. Spori virides, ca. 0,01–0,02 mm.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Jusso (Coll. Y. Doi, Typus in Herb. K. SAKURAI Nr. 2701, 2-April-1932, an der Rinde von *Quercus gilva* Bl.)

N. B. Vegetativ ist voliegende Art der javanischen *Schwetschkea javensis* FL. verwandt.

***Schwetschkea formosica* CARD.**

Formosa: Prov. Taichiu, Horisha (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2234, 1-Jan.-1927).

***Schwetschkea laxa* (WILS.) JAEG.**

Formosa: Prov. Shinchiku, Tikunan (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2231, 4-Mai-1912). Ohne nähere Standortangabe (Coll. FAURIE in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2232).

Distributio: Ostchina.

***Haplocladium kiusiuense* SAKURAI, sp. nov.**

Gracile, caespitosum, caespitibus densis, sordide flavo-viridibus, mollibus, haud nitidis. Caulis elongatus, ca. 4–5 cm. longus, hic illic fusco-fasciculatim radiculosus, papillosus, parce paraphyllosus, laxiuscule foliosus, irregulariter pinnam ramosus. Ramus 1,5 cm. longus vel brevior, simplex, caudiformiter attenuatus. Folia madida patentia, ovato-oblonga, obtuse attenuata, vix semidecurrentia, vix plicata, symmetrica vel asymmetrica, integra vel infra medium undulatula, supra medium papillose exstante, 0,9 mm. longa et 0,5 mm. lata; nervo valido, undulato, subcontinuo, dorso distincte mamilloso. Lamina obscura, chlorophyllosa, unipapillosa; cellulis irregulariter rhomboideo-hexagonis, basin versus laxioribus, lateralibus infimis quadratis. Caetera desunt.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Dorfchen Ata, am Felsen im Bächlein (Coll.

Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI Nr. 2469, 14-Dez.-1930).

N. B. Mehr stumpfe Blattspitze und undeutliche Blattfalte ist sehr charakteristisch.

Hygrohypnum liukiense SAKURAI, sp. nov.

Gracile, caespitosum, caespitibus valde densis, implicatis, rigidulis, flavo-fuscescentibus, aetate atratis. Caulis repens, ca. 3-5 cm. longus, parce fasciculatim radiculosus, irregulariter ramosus, plerumque foliis destructis. Ramus ca. 1 cm longus, imbricate foliosus, autem plerumque defoliatus, parce ramulosus. Folia e basi ovato-lanceolata, obtusa vel breve acuta, vix decurrentia, asymmetrica, concaviuscula, integra, undulata, ca. 1,0 mm. longa et 0,4 mm. lata, haud plicata; nervis binis, infra medium folii evanidis, autem indistinctis; cellulis laminarum subobscuris, chlorophyllosis, anguste linearibus, vermicularibus, infimis laxioribus, alaribus rhomboideo-quadratis, vix vesiculosis, hyalinis. Sterile.

Liukiu: Nishi-Omotejima, im Bächlein (Coll. Y. DOI, Typus in Herb.

K. SAKURAI, Nr. 2236, 7-Aug.-1931).

N. B. Es ist sehr merkwürdig, dass *Hygrohypnum* in Tropen wie Liukiu wächst. Dunkle Farbe mit drahtartig rigidem Habitus ist sehr auffallend. Wohl in der Nähe von *H. dilatatum* (WILS) LOESKE. anreihen.

forma **subrigidulum** SAKURAI, forma. n.

Planta subrigidula, fusca.

Liukiu: Nishi-Omotejima, an Felsen im Bächlein (Coll. Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2237, 11-Aug.-1931).

N. B. Wohl im stehenden Wasser.

Hygrohypnum molle (DICKS.) LOESKE.

var. **japonicum** (DIX.) SAKURAI, var. nov.

Syn. *H. japonicum* DIX. in litt.

Nervus folii validiusculus, basi 0,03 mm. latus, plerumque unus, raro furcatus, ad medium (saepe supra medium) folii evanidus.

Hondo: Prov. Ettiu, Mt. Tateyama, in alpiner Lege (Coll. K. HISAUCHI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2235, 27-Juli-1928)

N. B. Rippe an der Base breiterer und kräftigerer, sonst passt diese Art gut dem Hauptform an.

Entodon (Erythropus) **plagiothecioides** SAKURAI, sp. n.

Autoicus. Plantae graciles, caespitosae, caespitibus valde densis, vix depressis, late extensis, laete viridibus, nitidiusculis. Caulis repens, usque ad 5 cm. longus, hic illic fusco-radiculosus, irregulariter ramosus; ramis prostratis, ca. 1 cm. longis, saepe ramulosis, ramis ramulisque

dense foliosis apice obtuse ventro-recurvatis, cum foliis ca. 1,0 mm. latis. Folia sicca vix mutata, concava, dorsalia et latelaria uniformia, e basi angusta late ovato-oblonga, apice breve cuspidata, ca. 1,0 mm. longa et 0,5 mm. lata, marginibus uno latere saepe incurvis, integris vel raro apice minutissime serrulatis; nervis binis, tenellis, 0,3-0,4 mm. longis; cellulis laminarum laevissimis, anguste linearibus, superioribus brevioribus, infimis laxioribus, alaribus numerosis, quadratis vel breviter rectangulis, hyalinis. Flores utriusque sexus gemmiformes in caule vel ramule. Bractee perichaetii intimae e basi semivaginante lanceolatae, anguste attenuatae, ca. 1,8 mm. longae et 0,5 mm. latae, apice denticulatae. Vaginula longe cylindrica. Seta ca. 6-8 mm. longa, erecta, flexuosa, luteo-rubiginosa. Theca destructa.

Hondo: Prov. Mimasaku, ohne nähere Standortangabe (Coll. H. KOMATSU, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2369, Aug.-1918).

N. B. Äussere Tracht ist wie irgend ein kleines *Plagiothecium*, microscopisch wie *E. compressus*, doch bei meiner Art ist dichter beblättert und Spross hat mehr rundlichere Charakter, was von dichter dorsaler Beblätterung herrührt.

Entodon dolicho-cucullatus SH. OKAM.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Dorfchen Tabuse, auf Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2373, 1-März-1931).

N. B. Bisher nur auf Formosa gefunden.

Entodon Drummondii (Br. eur.) JAEG.

Kiusiu: Prov. Hizen, Nagasaki (Coll. WICHURA, Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2366). Prov. Satsuma, Mt. Kammuri (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2380, 11-Mai-1930).

Hondo: Prov. Izumo, Kiyomizu (Coll. M. NAKAJI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2362, 11-Jan.-1914).

N. B. Letzte Localität ist vielleicht nördlichste Grenze dieser tropischen Art.

Distributio: Mexico, südliche Teile von Nord-America, Süd-China.

Entodon Bandongiae (C.M.) JAEG.

Formosa: Prov. Taihoku, Hokutoshu, Shichiseigun (Coll. S. SUZUKI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2363, März-1925)

Distributio: Java, Sumatra, Celebes.

N. B. In Material aus Süd-China von HANDEL MAZZETTI nicht vorhanden.

Plagiothecium rhizophyllum SAKURAI, sp. n.

Tenellum, caespitosum, caespitibus laxis, depressis, laete viridibus, nitidiusculis, vix mollibus. Caulis elongatus, repens, hic illic rhizoideis, 3-4 cm. longus, cum foliis 6 mm. latus, simplex vel parcissime ramosus,

depressa et laxiuscule foliosus, stoloniferus, stolonibus ca. 1,5 cm. longis, minutissime foliosis, rhizoideis. Folia sicca undulata, madida patentia, e basi constricta obovato-lanceolata, acuminata, acuta, distincte asymmetrica, haud concava, haud decurrentia, marginibus erectis, integris vel apice parce serrulatis, 1,2-1,7 mm. longa et 0,4-0,7 mm. lata; nervo furcato, cruribus inaequalibus, tenui, infra medium folii (vel brevior) evanido. Lamina lucida, haud transverse undulata, laxa reticulata, chlorophyllosa, levis, lumine longe rhombeis, in medium 0,1: 0,008 mm., infimis laxioribus, rhomboideo-hexagonis, hyalinis, alaribus haud diversis. Infra apicem folii ventralis numerose rhizoideis, radicibus plerumque simplicibus, fuscis, 0,3-1,0 mm. longis, haud propagulis. Flores masculinei gemmiforme in caule infimo. Caetera desunt.

Kiusiu: Prov. Higo, Mt. Ichibusa, auf schattigen Erdboden (Coll. Y.

Doi in Herb. K. SAKURAI Nr. 2282, 10-Aug.-1930).

N. B. Vorliegende Art ist sehr eigentümlich. Von einfachem Stengel, lockerem Zellnetz und von nicht herablaufender Blattbase, ja sogar vom Wurzel an der Blattspitze kann man nicht schwer bestimmen. Habituell nähert sie zum *Catagonium*.

Plagiothecium delicatulum BROTH.

Hondo: Prov. Rikuchiu, Iwategun, Nishiyamamura (Coll. G. TOBA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2300, 8-Mai-1927).

Kiusiu: Prov. Satsuma, Städtchen Izūin (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI Nr. 2289, 10-Febr.-1930).

N. B. Planta endemica. Bisher in Nord-Japan ab und zu gefunden.

Plagiothecium neglectum MOENKEM.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Insula Koshiki, Mt. Odake, an Rinde (Coll.

Y. Doi in Herb. K. SAKURAI Nr. 2283, 29-Juli-1930).

Distributio: Mittel-europa.

N. B. Die Beschreibung mit Figur im Werke von MÖNKENMEYER (RABENHORST's Kryptogamenflora, Ergänzungsband) stimmt gut mit meinem Material. Sehr lang und schmal herablaufendes Band aus verlängerten Zellen ist charakteristisch, doch ist diese Art, was ich beobachtete, keine gute Art, anscheinend nur ein Form von *Pl. sylvaticum* (HUDS) Br. eur.

Neu für japanische Flora!

Brotherella longiseta SAKURAI, sp. nov.

Gracilis, caespitosa, caespitibus valde densis, late extensis, fusciscenti-viridibus, mollibus, nitidiusculis. Caulis elongatus, ca. 5 cm. longus, hic illic fasciculatim radiculosus, dense foliosus, haud complanatus, dense pinnatim ramosus; ramis patulis, brevibus, obtusis, ca. 1,0-1,5 cm longis, simplicibus vel ramulosis. Folia caulina distincte

falcatula, e basi late ovalis vel obovata, e medio ad apicem raptim filiforme attenuata, acuta, ca. 0,7 mm. longa et 0,2–0,3 mm. lata, filia reflexa, marginibus erectis, integris; nervis binis, brevissimis vel indistinctis. Folia ramea et ramulina falcatula, concaviuscula, vix reflexa, e basi longe lanceolata, filiforme attenuata, acuta, 1,2–1,3 mm. longa et 0,3 mm. lata, marginibus erectis, acumine remotisque argute serratis; nervis binis, brevissimis. Lamina obscura, cellulis laminarum anguste linearibus, basilaribus laxioribus, aureis, alaribus subquadratis, paucis, hyalinis, in bi-triseriate dispositis. Seta 4 cm. alta, rubra, superne lutescenti-rubescens, sicca flexuosula, levis. Theca suberecta vel horizontalis, conicooblunga, sicca deoperculata sub ore constricta, vix plicatula, 1,3 mm. longa et 0,5 mm. crassa, asymmetrica, fusca, turgida; cellulis exothecii quadratis vel rectangularibus. Bractee perichaetii internae erectae, e basi lanceolato-subulatae, supra medium distincte serrulatae; enervia. Lamina pellucida, cellulis anguste linearibus, basilaribus aureis, 1,5 mm longa et 0,18 mm lata. Vaginula longe cylindrica, apice fuscidula. Peristomium pro genere.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Shibi, ad ligna putrida (Coll. Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2161, 6-Octob. 1931)

N. B. Mit *Brotherella amblystegia* (Mitt) Broth. verglichen, doch bei meiner Art Statur sehr zarter, Seta auffallend lang, Basalzellen immer schön goldig, nie braunrot. Auch Blattform etwas anders.

***Brotherella robustula* SAKURAI, n. sp.**

Autoica. Robustiuscula, caespitosa, caespitibus densis, compressis, lutescentiviridibus, nitidis. Caulis elongatus, repens, ca. 5–7 cm. longus, per totam longitudinem fusco-radiculosus, irregulariter pinnam ramosus; ramis patulis, ca. 0,5–1,5 cm. longis, dense foliosis, complanatis, cum foliis ultra 3 mm. latis, simplicibus vel ramulosis, obtusis. Folia ramea patula, concava, asymmetrica, ovato-lanceolata, acumen in subulam attenuata, superne serrulata, ca. 1,5 mm. longa et 0,4 mm. lata; nervis binis, brevissimis vel indistinctis; cellulis laminarum anguste linearibus, levis, basilaribus laxioribus, alaribus oblongis, vesiculosis, aureis. Folia caulina indistincte remote serrulata, latiora. Bractee perichaetii intt. distincte serratae, saepe reflexulae, subulato-attenuatae, basilaribus pluriseriate aureis. Flores masculinei gemmiformes, in caule vel ramule. Seta 3 cm. longa, rigidiuscula, rubra, superne rubiginoso-flavescens. Theca suberecta, oblonga, asymmetrica, sicca haud plicata; cellulis exothecii lumine rotundato-rectangularibus, levibus, turgescens. Peristomii dentes lanceolati, sensim longe acuminati, 0,3 mm. longi et 0,07 mm. lati, lutei, indistincte anguste limbati, apice minutissime papilloso; endostomium luteum; processus carinatus, lanceolato-

subulatus, minutissime papillosus, haud perforatus; cilia rudimentaria vel unum normale. Spori virides, ca. 0,01 mm.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Kimpu, ad ligna putrida (Coll. Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2158, 19-Octob.-1930).

N. B. Diese neue Art ist im allg. wie *Brotherella planissima* BROTH., aber nicht so platt wie letzte Art, auch im allg. robuster. Von B. HENONI (DUB.) FL. kann man von platterem und robusterem Habitus schon leicht unterscheiden.

Warburgiella lutschiana (BROTH.) BROTH.

Liukiu: Nishi-Omotejima, auf Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2168, 2169, 7-Aug.-1931).

Distributio: Planta endemica.

Trichosteleum aculeatum B. P.

Liukiu: Nishi-Omotejima, an Bäumen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2172, 11-Aug.-1931).

Distributio: Formosa.

Trichosteleum Boschii (D. M.) JAEG.

Liukiu: Nishi-Omotejima, an Rinde (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2171, 6-Aug.-1931)

N. B. Neu für japanische Flora.

Distributio: Java, Borneo, Banka, Sumatra.

Sematophyllum tristiculum (MITT) FL.

Liukiu: Nishi-Omotejima, an Rinde (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2147, 6-Aug.-1931)

Formosa: Prov. Taihoku, Maruyama-Parke, (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2145, 7-Nov.-1925).

N. B. Neu fuer japanische Flora! Nach DIXON soll diese Art mit *S. caespitosum* MITT. identisch sein. BROTH. aber nicht gefolgt.

Distributio: Ceylon, Annam, Assam, Khasia, Java, Malakka, Sumatra.

Acroporium (Euacroporium) **Suzukii** SAKURAI, sp. nov.

Gracile, caespitosum, caespitibus densis, flavo-fuscescentibus, nitidis, mollibus. Caulis elongatus, ramis erectis vel decumbentibus, ca. 2 cm. altis, obtusis, innovationis raro acutis, rubris, dense foliosis, breve ramulosis. Folia imbricata, e basi distinctissime auriculata, longe obovata, acuminata, acuta, concava, symmetrica vel subasymmetrica, integra, supra medium folii anguste incurvata, ca. 1,3-1,5 mm. longa et 0,4 mm. lata; enervia; cellulis laminarum anguste linealibus, infimis laxioribus, lucidis, angulis indistincte papillosis, basilaribus aureis, alaribus binisque vesiculosus, aureis. Bracteae perichaetii internae vaginantes, rhizoideae, apice minute serrulatae, ca. 1 mm longae, breve acuminatae, acutae, Seta erecta, rubra, crassiuscula, levis, ca. 7 mm.

longa. Theca in maturata. Calyptra longe conica, flavo-fusca, apice atrata, 1,4 mm. longa.

Formosa: Prov. Tainan, Mt. Arisan, an Rinde (Coll. S. SUZUKI, Typus! in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2167, 25-Dez.-1925)

N. B. Vorliegende Art hat ausgezeichnet deutlich geöhrte Blatbase, Alarzellen immer zwei und aufgeblasen, so kann man, ob sie keine reife Sporogone hat, doch nicht schwer andere Arten ausschliessen.

Taxithelium (Polystigma aptera) **liukiense** SAKURAI, sp. nov.

Autoicum. Gracilescens, caespitosum, caespitibus densis, lutescenti-viridibus, mollibus, haud nitidis. Caulis repens, 1,5 cm. longus, hic illic fasciculatim fusco-radiculosus, irregulariter laxiuscule ramosus; ramis patulis, brevibus, dense et complanate foliosis, cum foliis vix 1 mm. latis, obtusis. Folia distincte concava, ventralia et dorsalia minora, asymmetrica, saepe homomallula, lateralialia majora, subasymmetrica, e basi anguste ovalis vel obovata, breve acuta, minutissime holodonta, erecta, ca. 0,6–0,8 mm longa et 0,3 mm lata; enervia; cellulis laminarum subpellucidis, pluri-papillois, chlorophyllosis, anguste prosenchymatis, inferioribus laxiusculis, basilaribus hyalinis, raro fusco-aureis, alaribus parce diversis, saepe quadratis, hyalinis vel fusco-aureis. Flores masculinei in caule vel ramule. Bractae perichaetii internae e basi vaginantes, 1,1 mm longae et 0,3 mm latae, pellucidae; lamina dorsalis papillosa; enervis. Seta ca. 1,7 cm. alta, erecta, rubra, levis, flexuosula, capsula suberecta, sub ore constricta, ovalis. Vaginula 0,5 mm. longa et 0,3 mm. lata, apice fulva.

Liukiu: Nishi-Omotejima, auf Felsen (Coll. Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2170, 6-Aug.-1931).

N. B. Die neue Art hat zu vergleichen mit *T. nepalense* (SCHWR.) BROTH. Doch bei meiner Art ist Statur weit zarter; Blattrand diffus fein gezähmelt und Alarzellen weit weniger.

Acanthocladium japonicum BROTH. et PAR.

Hondo: Prov. Aki, Itsukushima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2156, 30-März-1930). Prov. Kii, Higashi-murogun, Mt. Myohō (Coll. K. MINAKATA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2148, 12-Febr.-1902)

Acanthocladium deflexifolium (MITT) REN. et CARD.

Formosa: Prov. Taichiu, Mt. Kiraishiu (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2149, 6-März-1918).

Distributio: Sikkim, Bhotan.

N. B. Neu für japanische Flora.

Acanthocladium semitortipilum (C. M.) FL.

Formosa: Prov. Taichiu, Mt. Hassen (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2150, 24-Nov.-1922).

Distributio: Himalaya, Bhotan.

N. B. Neu für japanische Flora.

Acanthocladium Nakanishikii BROTH.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Mt. Kirishima, ad ligna putrida (Coll. Y. DOR in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2154, 27-April-1930)

N. B. Ob ich leider keine Gelegenheit habe, Originalexemplare zu prüfen, stimmt die Beschreibung sehr gut überein. Da BROTHERUS über die Sporogone gar nicht geschrieben hat, will ich kurz darüber notieren: Seta ca. 1,5 cm. hoch, purpurn, glatt, flexiert. Theca horizontal bis etwas aufrecht, lang cylindrisch, asymmetrisch, trocken unter der Mündung geschnürt, ca. 4 mm. lang und 0,4 mm. dick. Exotheciumzellen derb, unregelmässig oval bis viereckig. Zähne unten verschmolzen, Saum hyalin, oben papillös, gelb bis dünn bräunlich. Endostomium gelb; Fortsatz lanzettlich pfriemlich wie Zähne, gelb, papillös, geschlitzt. Grundhaut fast zur Hälfte der Zahnhöhe; Wimpern einzeln, etwas kürzer als der Fortsatz. Sporen dünn gelblich, unregelmässig kuglig, glatt, ca. 0,03 mm.

Acanthocladium (Tanythrix) **Doii** SAKURAI, sp. nov.

Gracile, caespitosum, caespitibus valde densis, mollibus, late extensis, laete viridibus, intus fusciscentibus, nitidis. Caulis repens, rubiginosus, parce radiculosus, ca. 5 cm. longus, dense et complanate foliosus, laxiuscule pinnam ramosus, ramis patulis, ultra 2 cm. longis, simplicibus vel irregulariter bipinnate ramulosis, densiuscule et complanate foliosis, obtusis. Folia caulina e basi ovato-oblonga, sensim anguste acuminata, semifalcatula, saepe pilifera, haud deflexa, concaviuscula, ca. 1,4 mm. longa et 0,4 mm. lata, marginibus erectis, supra medium serratis; enervia; cellulis laminarum laevissimis, anguste linearibus, infimis laxioribus, aureis, alaribus vesiculosis, aureis. Bractee perichaetii intimae e basi semivaginantibus, sensim in lanceolato-subulatam attenuatae, apice distincte remote serratae; lamina pellucida, infima aurea; enervis. Seta 3-4 cm. alta, tenuis, rubiginosa, levis, superne flexuosula. Theca horizontalis vel subnutans, cylindrica, asymmetrica, sicca sub ore constricta, ca. 1,2 mm. longa et 0,5 mm. crassa, fusca; cellulis exothecii quadratis vel rectangulis, incrassatis. Exostomii dentes lanceolati, ca. 0,3 mm. alti, lutei, apice decolorati, hyaline limbati, superne parce papilloso, intus dense (ca. 30) lamellosi. Endostomium subluteum; corona basilaris 0,15 mm alta; processus superne minute papillosus, carinatus, haud perforatus, ca. 0,3 m.m. altus. Cilia bina, breviora, parce papillosa, saepe unum. Spori leves, subvirides, 0,02 mm.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Mt. Kurinodake, auf Felsen (Coll. Y. DOR Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2154, 6-Mai-1931).

N. B. Im Ganzen wie *A. deflexifolium*, doch bei meiner Art sind die Blätter wenig deflexiert, Pflanzen weicher, die Verzweigung lockerer, flacher und länger.

Microthamnium (Pseudo-Microthamnium) **japonense** SAKURAI, sp. nov.

Autoicum. Gracile, caespitosum, caespitibus densis, viridibus vel viridi-flavescentibus, nitidis, mollibus. Caulis repens, hic illic rhizoideis, ca. 5 cm. longus, irregulariter pinnatim ramosus, dense foliosus; ramis ultra 1 cm. longis, erectis, dense foliosis, simplex, apice plerumque ventroflexis. Folia caulina e basi ovato-lanceolata, sensim acuminata, acuta, asymmetrica, concava, haud decurrentia, marginibus anguste curvatis, supra medium folii serrulatis, 0,9 mm. longa et 0,3 mm. lata; nervis binis, distinctis, sed plerumque inaequalibus, infra medium folii evanidis; cellulis laminarum linearibus, angulis papillosis (tantum supra medium folii), basilaribus brevioribusque laxioribus, alaribus haud diversis, haud coloratis. Folia ramea distincte serrata, breve acuta. Bracteae perichaetii intimae e basi semivaginant, raptim longe pili-forme attenuatae, ca. 2 mm, longae et 0,4 mm. latae. Vaginula longe cylindrica, apice fusca, 7 mm. longa et 0,3 mm. crassa. Seta 1,8 cm. alta, tenuis, levis, purpurea, sicca torta. Theca horizontalis vel subinclinata, ovoidea, regularis, sicca sub ore constricta, levis. Annulus persistans, fuscus. Exostomii dentes lanceolato-subulati, ca. 0,4 mm. alti et 0,07 mm. lati, inferne lutei, transverse striatuli, e medio ad apicem hyaline papilloso, intus densiuscule lamellosi. Endostomium luteum; processus 0,4 mm. altus, carinatus, in carina anguste rimosus, papillosus. Cilia bina, papillosa. Spori virides, leves, 0,02 mm. Calyptra cucullata (0,4 mm. longa). Operculum brevirostratum (ca. 0,6 mm). Kiusiu: Prov. Satsuma, Kawabegun, Mt. Chōya, auf feuchten Felsen (Coll. Y. Doi. Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2142, 6-Nov.-1931).

N. B. Interessante Art! Kein Species zu dieser Gattung bis heute nicht nur in Japan sondern auch in Orient gefunden.

Gollania arisanensis SAKURAI, sp. nov.

Gracilis, caespitosa, caespitibus laxiusculis, luteo-fuscis, plerumque rubro-variegatis, aetate sordide fuscidulis, haud nitidis. Caulis repens, hic illic rhizoideis, plusminus compressusque dense foliosus, irregulariter pinnam ramosus, ca. 5 cm. longus; ramis erectis vel ascendentibus, ultra 1,5 cm. longis, subpinnam ramulosis, obtusis, dense et complanate foliosis. Folia madida erecto-patentia, caulina e basi late ovata vel ovato-oblonga, subsensim in acumen lanceolata attenuata, concava, vix decurrentia, superne transverse undulata, marginibus plerumque anguste recurvis, supra medium vel in toto distincte serratis, ca. 2 mm. longa

et 0,6 mm lata; nervis binis inaequalibus, ad $\frac{1}{3}$ folii evanidis; cellulis laminarum anguste linearibus, basilaribus laxioribus, angulis papillois, saepe dentibus, alaribus numerose quadratis, infimis aureis. Folia ramea ramulosaque distinctissime serrata. Caetera ignota.

Formosa: Prov. Tainan, Mt. Arisan, auf Erdboden (Coll. S. SUZUKI, Typus in Herb. K. SAKURAI Nr. 2136, 25-Dez.-1925).

N. B. Von schön rot schimmerndem Habitus kann man leicht bestimmen. Blattbau nähert zur *Gollania ruginosa* (MITT) BROTH.

Gollania tereticaulis BROTH. (in Symbolae sinicae 4. Teil).

Hondo: Prov. Aki, Miyajima, auf Erdboden (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2134, Oktober-1926)

Distributio: Süd-China.

Okamuraea plicata CARD.

Hondo: Prov. Kii, Nishimurogun, Futagawamura, (Coll. K. MINAKATA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2130, 28-Nov.-1910).

Kiusiu: Prov. Hiuga, Mt. Yanagidake (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2131, 20-Aug.-1930).

Bryhnia olivacea SAKURAI sp. nov.

Planta robustiuscula, caespitosa, caespitibus laxis, olivaceis, aetate fuscescentibus, subopacis. Caulis prostratus, irregulariter ramosus, ca. 3-5 cm. longus, ramis in medio caespitis erectis, dense complanate foliosis, irregulariter ramulosis, apice saepe caudiformiter attenuatis. Folia sicca laxe imbricata, humida erecto-patentia, ramea e basi late ovato-deltaidea, breve acuminata, acuta, breviter decurrentia, haud concava, sed plicatula, circumcirca minutissime serrata, apice semitorta, supra medium frequens undulatula, ca. 1,4 mm. longa et 0,9 mm. lata; nervo validiusculo, viridi, infra apicem folii evanido, apice haud extante, dorso superne integra; cellulis laminarum anguste rhomboideis, chlorophyllosis, sublaevis, alaribus in ventrem dispositis, breviter rectangularis vel subquadratis. Folia ramulina e basi ovato-lanceolata, plicatula, distincte minute serrata; cellulis laminarum chlorophyllosis, papillois. Sterile.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Jūsso, auf feuchten Felsen (Coll. Y. DOR, Typus in Herb. K. SAKURAI Nr. 2705, 2-April-1932).

N. B. Von mehr platter Beblätterung, papillärer Lamina und glatter Rippe kann man nahestehende *Bryhnia turgescens* B. Y. ausschliessen. Von *Bryhnia sublaevifolia* B.P. kann man in weit robustem Habitus und mehr platter Beblätterung unterscheiden.

Hypnum plumaeformis WILS.

var. **lavaecola** SAKURAI, var. nov.

Margines folii distinctissime undulati saepe crispi.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Insula Sakurajima, Vulkan Sakurajima, auf Lava (Coll. Y. DOI, Typus in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2395, 29-Nov.-1925).

N. B. Diese neue Varietät ist zweifellos eine xerophil extremer Form von *Hypnum plumaeformis*.

Hyocomium flagellare (DICKS) Bryol. eur.

Syn. *Bryhnia pilifera* BROTH. msc. (K. SAKURAI Nr. 703).

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Chōya, auf feuchten Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2141, 21-Nov.-1931). Prov. Satsuma, Kawanabegun, Kawanabe-machi (Coll. Y. DOI in Hab. K. SAKURAI, Nr. 2477, 8-No.-1931)

Distributio: Mittel und Nordeuropa.

N. B. Zuerst wurde diese Art bei uns von mir in Mt. Nokogiri (Prov. Awa) im Jahre 1921 interessanterweise gefunden, Prov. Satsuma ist der zweite Fundort in Japan. Sein Lieblingsplatz ist überrieselter Felsen beim Gebirgesbächlein.

Macrothamnium macrocarpum (R. et H.) FL.

Formosa: Prov. Taihoku, Bunzangun, Uraisha (Coll. Y. SHIMADA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2202, 31-März-1918).

Distributio: Java, Sumatra, Sunda-inseln, Philippin, Ostindien.

N. B. Betreffende Art ist von Statur weit kleiner als javanische Art. Wie FLEISCHER angibt, variiert diese Art sehr häufig in der äusseren Gestalt. Jedenfalls neu für japanische Flora.