Beobachtungen über japanische Moosflora (III).

von

K. Sakurai (Tokio).

Received August 20, 1932.

Ditrichum (Euditrichum) **kiusiuense** SAKURAI sp. nov.

Dioicum. Gracile, caespitosum, caespitibus laxiusculis, flavo-viridibus, mollibus. Caulis erectus, ca. 1 cm. altus (excl. seta), basi fusco-radiculosus, dense foliosus, simplex. Folia homomalla, haud vaginata, lanceolato-subulata, vix piliforme attenuata, marginibus infra medium anguste recurvis, superne denticulatis, ca. 1,8–2,0 mm. longa, 0,35 mm. lata; nervo haud crassiusculo, basi 0,08 mm. lato, infra apicem folii evanido, dorso superne denticulato; cellulis anguste rectangularibus, versus basin laxioribus et brevioribus. Bracteae perichaetii intimae haud diversae. Seta tenuis, in sicco flexuosula, flava, ca. 8 mm. alta. Theca erecta, anguste cylindrica, recta, flavescens, ca. 1,2–1,3 mm. alta, 0,45 mm. crassa. Dentes peristomii rubro-fusci, ad basis profunde bipartiti, lineares, usque ad 0,15 mm. alti, minutissime papilloso, haud torti. Operculum longe-rostratum (ca. 0,7 mm. altum).

Kiusiu: Prov. Higo, Hitoyoshi-dorf (Coll. K. MAEBARA Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2756, 11-Nov.-1918).

N. B. Im Ganzen wie *Ditrichum tortile* (SCHRAD.) LINDB., doch Seta gelb, Pflanzen im allg. zarter, Rippe am Rücken oben gezähnt.

Campylopus gracilentus CARD.

Formosa: Prov. Taichiu, Mt. Hassen (Coll. S. SASAKI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2799, 24-Nov.-1922).

Kiusiu: Prov. Satuma, Insula Sakurajima, Vulkan Sakurajima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2772, 26-Mai-1926. Nr. 2773, 14-März.-1926).

N. B. Bisher nur auf Formosa gesammelt.

Distributio: Planta endemica.

Campylododium euphorocladum (C. M.) BESCH.

Kiusiu: Prov. Satuma, Insula Sakurajima, Vulkan Sakurajima am Gipfel (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2770, 26-Mai-1926. Nr. 2771, 15-März-1927).

Distributio: Java, Sumatra, Borneo, indische Archipel, Ostafrika, Formosa?

N. B. Wohl nordlichste Grenze dieser tropischen Art.

Leucoloma molle (C. M.) MITT.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Jusso (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2708, 2-April-1932). Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2743, 20-Juni-1932).

Formosa: Mt. Daibu (Coll. KODAIRA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2776, Jan.-1928).

Distributio: Süd-China, Philippin, Java, Borneo, Sunda, Neuguinea.

Physcomitrium (Euphyscomitrium) **kiusiuense** SAKURAI sp. nov.

Pusillum, gregarie crescens, fuscescenti-viride. Caulis erectus, ca. 1,1 mm. altus (excl. seta), inferne vix foliosus, simplex, basi rubiginoso-radiculosus. Folia spathulato-obovata, inferiora minora, breviter acuminata, acuta, concaviuscula, marginibus undulatis, elimbatis, supra medium distincte serratis, ca. 1,8 mm. longa, 0,6 mm. lata; nervo luteo, infra apicem folii evanido; cellulis laxis, rhomboideo-hexagonis, basilariis elongate rectangularibus. Seta 7–8 mm. alta, lutea, tenuis in sicco flexuosa. Vaginula conico-cylindrica, 0,7 mm. longa. Theca erecta, breve pyriformis; cellulis sub ore 4-seriate breviter quadratis. Peristomium nullum. Spori virides, papillosoi.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Uchinoura (Coll. Y. DOI Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2759, 8-März-1930).

N. B. Im Ganzen wie *Ph. curystomum* (NEES.) SENDTN., doch Rasen weit niedriger, Rippe nicht ganz bis zur Spitze und Blätter oberwärts deutlich gesägt.

Physcomitrium (Euphyscomitrium) **longifolium** SAKURAI sp. nov.

Pusillum, gregarie crescens, fuscescenti-viride. Caulis erectus, usque ad 1,2 mm. altus (excl. seta), basi fusco-radiculosus, inferne depauperate foliosus. Folia ovato-lanceolata, longe acuminata, acuta, concaviuscula, marginibus undulatis, elimbatis, superne indistincte serrulatis, ca. 3,0 mm. longa, 0,6 mm. lata; nervo luteo, subcontinuo; cellulis laxis, rhomboideo-hexagonis. Theca globosa, erecta, distincte macrostoma (1,1 mm. lata); cellulis sub ore 3–4 seriate breviter quadratis. Peristomium nullum. Spori fusci, distincte papillosoi, 0,02 mm.

Formosa: Prov. Taihoku, Sichiseigun, Hokutō (Coll. S. SUZUKI, Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2757, 1-März-1925).

N. B. Von den ausgezeichnet langen Blättern mit langer Seta kann man sofort bestimmen.

Physcomitrium eurystomum (NEES.) SENDTN.

Kiusiu: Prov. Higo, Hitoyoshi (Coll. K. MAEBARA in Herb. K. SAKU-

RAI Nr. 2761, 2-Oktob.-1928).

Distributio: Europa.

Physcomitrium subeury stomum CARD.

Formosa: Prov. Taihoku, Botanischer Garten (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2760, 7-März-1927).

Distributio: Planta endemica.

Macromitrium Formosae CARD.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Kitamorokatagun, Yasuhisa (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2000, 7-April-1927).

N. B. Bisher nur auf Formosa gesammelt.

Drummondia claveolata Hook.

Hondo: Prov. Harima, Katogun, Ono (Coll. K. MATSUSHIMA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2350, 10-März-1917).

Distributio: Nord-America.

Schlotheimia japonica BESCH. et CARD.

Hondo: Prov. Aki, Miyajima (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2352, Octob.-1926).

N. B. Bei uns nicht häufig; nach CARDOT soll diese Art nur ein östlicher Ausläufer von *Schl. Grevilleana* MITT. sein.

Syrrhopodon tosaensis CARD.

Liukiu: Nishi-Omotejima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2751, 7-Aug.-1931, auf Felsen beim Bächlein).

N. B. Der zweite Standort in Japan.

Rhizogonium venustum BESCH.

Bonin: Insula Chichijima (Coll. J. TOYOSHIMA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2748, 8-Febr.-1924).

Kiusin: Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2744, 20-Juni-1932). Prov. Ohsumi, Uchinoura (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 1691, 8-1930).

Distributio: Planta endemica.

Endotrichella elegans (D. M.) FL.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Mt. Aoi (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2686, Aug.-1929).

Formosa: Prov. Tainan, Mt. Arisan (Coll. OGATA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2685, Jan.-1926).

Distributio: Philippin, Carolin, Java, Sumatra, Celebes, Annam.

Duthiella flaccida GARD.

Formosa: Prov. Taihoku (Coll. U. FAURIE, Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2682).

Distributio: Planta endemica.

Duthiella japonica BROTH.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Kagoshima-stadt (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2681, 22-Febr.-1931).

Hondo: Prov. Ise, Daijingu (Coll. Y. TSUCHIYA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2680, 22-Mai-1927).

Distributio: Planta endemica.

Myurium sinicum (MITT.) BROTH.

var. **flagelliferum** SAKURAI var. nov.

Planta perrobusta. Caulis primarius ca. 15 cm. longus repens. Caulis secundarius 2–3 cm. altus, simplex vel ramosus, saepe caudiformiter attenuatus, plerumque flagelliferus, flagellibus (2–5) ca. 1–3 cm. longis, microphyllinis. Folia sicca distincte bi-tri-plicata, e basi anguste ovalia, cochleariforme concava, subito piliforme attenuata, ca. 1,2–1,3 mm. longa (excl. pilo), 0,5 cm. lata; nervis binis, bifurcatis, sed indistinctis; cellulis anguste linearibus, in medio folii ca. 10 : 1, inferioribus distincte inter se porosis, alaribus paucis, quadratis, omnium levis, infimis saepe fuscis. Theca globosa, erecta, fusca, symmetrica, 1,4 mm. longa et 0,8 mm. crassa.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Insula Yakushima (Coll. Y. DOI Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2800, 26-Juli-1932). Insula Tanegashima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2737, 20-Juni-1932).

N. B. In Mitteljapan kommt die Hauptart nicht selten vor, trotzdem habe ich keinmal Flagellen beobachtet.

Aerobryopsis mollissima Broth.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Jūsso, an der Rinde (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2691, 2-April-1932).

N. B. Bisher nur in Shikoku (Mt. Honokawa) gesammelt.

Barbella kiusiuensis BROTH.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Mt. Aoi (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2332, 6-Jan.-1914). Prov. Satsuma, Mt. Jūsso (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2692, 2-April-1932).

N. B. Wohl prächtigste *Barbella* in Japan.

Barbella Levieri (REN. et CARD.) FL.

Formosa: Prov. Taichiu, Mt. Nokō (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2333, 6-Aug.-1926).

Hondo: Prov. Ise, Tomoda-dorf (Coll. Y. TSUCHIYA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2331, 22-März-1918).

Distributio: Himalaya.

N. B. *Barbella cordata* DIX. in litt. ist nicht anders als diese gut bekannte Art.

Meteorium Miquelianum (C. M.) FL.

Hondo: Prov. Aki, Miyajima (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2693, Octob.-1926).

var. **repens** FL.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Jüso (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2690, 2-April-1932).

N. B. Während die Hauptart in SüdJapan ziemlich verbreitet ist, wurde die Varietät erst bei uns gefunden. Ihre Heimat ist Java.

Meteorium cuspidatum SH. OKAM.

Kiusiu: Prov. Hiuga, Miyakonojō (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2318, April-1927).

Lescuraea striata (SCHWAEGR) Bryol. eur.

Syn. *L. brevifolia* BROTH. in litt.

L. brachycladula BROTH. in litt.

Hondo: Prov. Iwate, Mt. Iwate, in alpiner Lage (Coll. G. TOBA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2670, 27-Juli-1927).

Distributio: Zentraleuropa, Kashmir, Kaukasas.

N. B. Neu für japanische Flora.

Pseudoleskea (Pseudo-Pterogonium) **flagellifera** SAKURAI sp. nov.

Gracilis, caespitosa, caespitibus densis, mollibus, sericeo-nitidis, atroviridibus. Caulis repens, ca. 3 cm. longus, fasciculatim pauci-radiculosus, haud paraphyllosus, dense ramosus; ramis erectis, infra 1,5 cm. altis, raro ramulosis, saepe caudiformiter attenuatis, dense foliosis. Folia sicca laxè imbricata, plus minus homomalla, madida erecto-patentia, caulina e basi late ovato-lanceolata, longe acuminata, piliforme attenuata, subdecurentia, basi bifurcata, asymmetrica, marginibus erectis sed minutissime papilloso-serrulatis, ca. 1,2–1,3 mm. longa, 0,5–0,6 mm. lata; nervo crassiusculo, lutei, supra medium folii evanido; cellulis laminarum ovalibus, in medio folii 6:2, infimis quadratis, plerumque ad angulum cellularum minutissime papillosis. Folia ramea minora. Flagella simplex, infra 5 mm. longa, in apicis ramis, saepe fasciculatim fusco-radiculosis. Flora masculina gemmiforme in ramula. Caetera desunt.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Shibi, rupicola (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2673, Typus, ! 6-Octob.-1931, Nr. 2671 ebenso).

N. B. Von lang piliformer Blattspitze und glänzendem Habitus, ja sogar von Flagella kann man bestimmen.

Pseudoleskea (Pseudo-Pterogonium) **tanegashimensis** SAKURAI sp. nov.

Planta mediocris, dense caespitosa, caespitibus viridibus, intus fusciscentibus, rigidiusculis, haud nitidis. Caulis repens, brevis, numerosissime ramosus, haud paraphyllosus; ramis erectis, ca. 1 cm. altis, obtusis, curvatis, dense foliosis, haud ramulosis. Folia sicca laxè imbricata, madida

patentia, e basi contracta, ovato-oblonga, acuminata, breve acuta, subsymmetrica, apice homomallula, paulum decurrentia, marginibus integris et erectis, ca. 0,78 mm. longa, 0,45 mm. lata; nervo subcontinuo, basi 0,04 mm. lato, levi; cellulis paucis, obovato-quadratis, infimis quadrato-hexagonis, levibus. Seta ca. 1 cm. alta, luteo-fusca, sicca flexuosula, levis. Theca suberecta vel horizontalis, ovalis, sicca sub ore constricta. Annulus simplex, rubro-fuscus; cellulis exothecii rotundato-hexagonis. Bractee perichaetii intt. vaginantes, lanceolatae, ca. 1,4 cm. longae. Exostomii dentes lanceolato-subulati, ca. 0,3 mm. longi, basi 0,08 mm. lati, transverse striatuli, limbati, e medio ad apicem papilloso, lutei, intus densiuscule lamellosi (ca. 35); endostomium luteum, minutissime papillosum; processus dentium lanceolato-subulatus, ca. 0,28 mm. altus, carinatus, in carina rimosus, papillosus. Cilia rudimentaria vel unum, breve. Operculum oblique brevirostratum. Spori virides, ca. 0,017 mm.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima (Coll. Y. DOI, Typus! in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2736, Mitte Juni 1932, auf feuchten Felsen).

N. B. Wohl eine Verbindungsart von *Eu-Pseudoleskea* zur *Pseudopterogonium*. Habitus wie *Pseudoleskea imbricata* (HK. f. et WILS) BROTH.

Brachythecium velutinum (L.) Bryol. eur.

Kiusiu: Prov. Satuma, Hioki-dorf, auf Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2581, 8-Febr.-1931).

Distributio: Europa, Kaukasas, Persien, Kashmir, Nord-America.

N. B. Bei uns bisher nur auf Sachalin gesammelt.

Brachythecium eustegium BESCH.

Hondo: Prov. Mutsu, Shichinohe (Coll. U. FAURIE, Typus! in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2642). Prov. Shinano, Higashi-Chikumagun (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2636, 9-Nov.-1918).

Distributio: Planta endemica.

Brachythecium kuroishicum BESCH.

Hondo: Prov. Harima (Coll. K. MATSUSHIMA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2635, 20-März-1917).

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Shigehira, ad ligna (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2589 5-Jan.-1931).

Distributio: Planta endemica.

Brachythecium glareosum (BRUCH) Bryol. eur.

Kiusiu: Prov. Higo, Mt. Ichibusa (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2584, 10-Aug.-1930). Prov. Satsuma, Nagayoshi-dorf (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2585, 14-Nov.-1930).

Distributio: Europa, Kaukasas, Sibirien, Südchina.

N. B. Neu für japanische Flora.

Brachythecium (Salebrosa) **satumense** SAKURAI sp. nov.

Dioicum. Robustiusculum, pallide viride, nitidiusculum. Caulis elongatus, hic illic fasticulatim radiculosus, irregulariter ramosus; ramis erectis, ca. 1–3 cm. altis, dense foliosis, plerumque simplicibus, breviter attenuatis. Folia sicca erecto-patentia, humida patentia, subdecurrentia, e basi ovato-rotunda, apice breve acuta, plicatula, marginibus erectis, in toto minute serrulatis, ca. 1,3 mm. longa et 0,9–1,0 mm. lata; nervo viridi, basi validiusculo, longe ultra medium folii evanido; cellulis anguste linearibus, dein sensim basin versus laxioribus, alaribus paulum quadratis. Bracteae perichaetii internae e basi vaginates, obovato-lanceolatae. Seta sicca flexuosa, subcrassiuscula, laevissima, ca. 1,7 cm. alta. Theca suberecta, cylindrica, sub ore constricta, 1 mm. longa et 0,5 mm. crassa, viridis. Operculum brevirostratum.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Shibi (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI Nr. 2578, Typus! 6-Oktob.-1931).

N. B. Vorliegende Art nähert im allgemein zum *Br. Tsunodae* BROTH., doch Blattform ist sehr eigentümlich. Man kann leicht bestimmen.

Brachythecium plumosum (Sw). Bryol. eur.

var. **brevisetum** SAKURAI var. nov.

Seta brevis, ca. 5 mm. alta, apice scaberrima. Planta minor.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Insula Sakurajima, auf Lavaasche (Coll. Y. Doi Typus! in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2591, 15-März-1926). Prov. Satsuma, Mt. Shigehira (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2588, 5-Jan.-1931). Prov. Satsuma, Kagoshima-stadt (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2586, 22-Febr.-1931).

Brachythecium plumosum (Sw). Bryol. eur.

var. **perrobustum** SAKURAI var. nov.

Planta perrobusta, distincte brunnea. Seta 3 cm. longa. Folia caulina 1,6 mm. longa et 0,9 mm. lata.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Shibi (Coll. Y. Doi, Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2606, 6-Oktob.-1931).

N. B. Habitus weit robuster als *Br. plumosum* var. *major* oder var. *longiseta* in Europa.

Anomodon rostratus (HEDW.). SCHPR.

var. **japonicus** SAKURAI var. nov.

Nervus tenuis, ad medium vel sub medium folii evanidus.

Hondo: Prov. Aki, Miyajima (Coll. J. KASHIMURA, Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2496, 13-Nov.-1925).

N. B. Im Ganzen wie die Hauptart in Europa, nur die Rippe zarter und meist unter der Blattmitte verschwindend.

Thuidium orientale MITT.

Hondo: Prov. Ise, Daijingu, Ujiyamada (Coll. Y. TSUCHIYA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2019, 10-Juli-1927).

Distributio: Penang, Java.

N. B. Von rückwärts vortreibender Blattrippe kann man leicht nahestehenden *Th. glaucinum* (MITT) MITT. unterscheiden. Neu für japanische Flora.

Pleuropus fenestratus GRIFF.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Isoma, auf Androsite (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2601, 17-Mai-1931).

Distributio: Ceylon (Coll. J. NICTNER in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2603), Java, Assam, Nilghiri, Südchina.

N. B. Neu für japanische Flora.

Homalothecium laevisetum LAC.

Shikoku: Prov. Iyo, Mt. Iwaya (Coll. A. YASUDA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2600).

Kiusiu: Prov. Higo, Mt. Ichibusa, an Rinde (Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2598, 10-Aug.-1930). Prov. Satsuma, Mt. Shibi (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2599, 17-October-1931).

Distributio: Planta endemica.

Rhynchostegiella formosana SAKURAI sp. nov.

Tenella; caespitosa, caespitibus densis, viridi-flavescentibus, mollibus, subnitidis. Caulis repens, hic illic radiculosus, ca. 5 cm. longus, plerumque defoliatus, remote ramosus; ramis ca. 1-2 cm. altis, laxe foliosis. Folia sicca erecto-patentia, madida patentia, caulina haud decurrentia, asymmetrica, e basi obovato-lanceolata, sensim longe acuminata, acuta, 1,1 mm. longa et 0,4 mm. lata, marginibus erectis, minute holodontis. Lamina sublucida, cellulis anguste linearibus, infimis laxioribus, marginibus inferioribus quadratis, haud coloratis. Nervus tenuis, supra medium folii evanidus. Folia ramea et ramulina piliforme attenuata, saepe tortipila. Bracteae perichaetii intimae e basi lanceolatae, longe piliforme attenuatae, semitortipilae, ca. 1,5 mm. longae; nervo indistincto. Seta rubiginosa, superne lutea, s-forme flexuosula, scaberrima, ca. 8 mm. alta. Theca in maturata. Calyptra lutea, ca. 1,5 mm. longa. Caetera ignota.

Formosa: Prov. Taichiu, Nōkōgun, Horigai, ad ligna putrida (Coll. S. SUZUKI Typus! in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2604, 1-Jan.-1927).

N. B. Vorliegende Art ist ähnlich wie *R. curviseta* (BRID.) LIMPR. in Europa, Doch bei meiner Art Blätter vollständig gezähnt und Seta nicht so grobwarzig.

Eurhynchium strigosum (HOFFM.) Bryol. eur.

Hondo: Prov. Rikuzen, Kesengun, Otome-dorf, (Coll. G. TOBA in Herb.

K. SAKURAI, Nr. 2620, 23-Mai-1920).

N. B. Neu für japanische Flora.

Distributio: Europa, Nordamerica, Sibirien.

Eurhynchium Stokesii (TURN). Bryol. eur.

Hondo: Prov. Mimasaku, Tomodagun, Kegaminami-dorf (Coll. K. YANO in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2621, 25-Juli-1921).

N. B. Neu für japanische Flora.

Distributio: Europa, Nordamerica, Südchina.

Oxyrhynchium Swartzii (TURN). WARNST.

Hondo: Prov. Ise, Daijingu (Coll. Y. TSUCHIYA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2619, 22-Mai-1927).

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Kimpu (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2613 16-Febr.-1930). Mt. Noma (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2618, 30-Dez.-1930, auf feucht schattigen Felsen).

N. B. Neu für japanische Flora.

Distributio: Europa, Kaukasas.

Oxyrhynchium hians (HEDW). LOESKE.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Yahazu (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2617, 30-Jan.-1930).

N. B. Neu für japanische Flora.

Distributio: Europa, Nordamerica, Kaukasas. Südchina.

Oxyrhynchium Sasaokae (BROTH). SAKURAI sp. nov.

Syn. *Rhynchostegium Sasaokae* BROTH. msc.

Gracile; caespitosum, caespitibus laxis, luteo-fuscescentibus, haud nitidis. Caulis repens, distincte mamillosus, ca. 5-8 cm. longus, apice caudiformiter attenuatus, parce fusco-radiculosus, regulariter pinnam ramosus, plerumque foliis destructis; ramis erectis, ca. 1 cm. altis, dense foliosis, submamillosis. Folia sicca erecto-patentia, madida patentia, caulina e basi subdecurrentia, obovato-lanceolata, sensim longe acuminata, saepe in tortipilam attenuata, acuta, symmetrica vel subsylmetrica, subreflexa, marginibus erectis, minute holodontis, ca. 1,1 cm. longa et 0,4 mm. lata; nervo distincto, ad $\frac{2}{3}$ folii evanido, apice extante; cellulis laminarum anguste linearibus, in medio folii 1:18, infimis laxioribus, alaribus parce ovato-rhombeis, hyalinis. Folia ramea oblonga, breve acuta, haud reflexa, distinctissime serrata. Sterile.

Formosa: Prov. Taichiu, Mt. Hassen. (Coll. S. SASAKI, Typus! in Herb.

K. SAKURAI, Nr. 2622, 24-Nov.-1922).

N. B. Von mamillösem Stengel kann man sofort bestimmen.

Oxyrhynchium satsumense SAKURAI sp. nov.

Dioicum. Gracillimum, caespitosum, caespitibus sat densis, viridibus, aetate fuscescentibus, submicans. Caulis repens, hic illic fusco-radiculosus,

ca. 3 cm. longus, laxiuscule ramosus, ramis in medio caespitis erectis, laxe foliosis, irregulariter ramulosis. Folia caulina subreflexa, e basi ovato-delhoidea, longe acuminata, acuta, semidecurrentia, circumcirca erecta, minute remoteque serrulata, ca. 0,4 mm. longa, 0,24 mm. lata; nervo subcrassiusculo, ad $\frac{3}{4}$ folii evanido, apice extante; cellulis laminarum anguste prosenchymatis, in medio folii 0,045 mm. longis, 0,004 mm. latis, infimis sat laxioribus, ad angulum cellularum indistincte papillose exstantibus. Folia ramea et ramulina e basi lanceolata, longe acuminata, acuta, 0,6 mm. longa, 0,24 mm. lata; nervo crassiusculo, apice distincte extante. Flora masculina in caule infimis gemmiformis. Caetera desunt. Kiusiu: Prov. Satsuma, Städtchen Akune, auf Felsen am Strande (Coll.

Y. Doi Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2245, 25-Juli-1930).

N. B. Von lang zugespitztem Blattforme, subpapillöser Zelllamina, ja sogar vom sehr zarteren Habitus kann man die nahestehende Art *O. laxirete* BROTH. leicht ausschliessen.

***Oxyrhynchium Doii* SAKURAI sp. nov.**

Lavaecola. Autoicum. Gracile, caespitosum, caespitibus sat laxis, flavescentibus, haud nitidis. Caulis prostratus, hic illic rubiginose radiculosus, ca. 3–5 cm. longus, laxiuscule foliosus, subpinnam ramosus; ramis ca. 0,5–1,0 cm. longis, plus minus complanate foliosis, saepe ramulosis. Folia sicca patentia, madida mutata, e basi anguste ovata vel ovato-delhoidea, sensim acuminata, acuta, semidecurrentia, apice tortipila ubique erecta sed minute serrulata, ca. 0,4 mm. lata et 0,8 mm. longa; nervo subcrassiusculo, ad $\frac{4}{5}$ folii evanido, apice exstante, dorso levi; cellulis laminarum anguste prosenchymatis, infimis laxioribus, inter se porosis. Folia ramea argute serrata, breviora acuminata, acuta, semitortipila. Bractae perichaetii intt. vaginantes, raptim piliforme attenuatae, reflexae. Seta ca. 1,8 cm. alta, crassa, sicca flexuosula, flavo-fusca, in toto mamillosa. Theca horizontalis, longe ovoidea, flavo-fusca, sub ore constricta; cellulis exothecii pachydermis, irregulariter quadratis vel hexagonis. Annulus persistans. Peristomium duplex; exostomii dentes fusi, apice sed decolorati, papilloso, ca. 0,45 mm. longi et 0,08 mm. lati; processus luteus, carinatus, in carina rimosus, minute papilloso; endostomium aureum; cilia bina, nodulosa, conformia.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Städtchen Izüin (Coll. Y. Doi Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2612, 27-Jan.-1930).

N. B. Von nicht so lang gespitzter, trotzdem gedrehter Blattspitze kann man gut bestimmen, wohl *O. clinocarpum* (TAYL.) BROTH. hat nahe Stelle zu dieser neuen Art.

***Rhynchostegium Doii* SAKURAI sp. nov.**

Autoicum; caespitosum, caespitibus plus minus depressis, laxioribus,

crassiusculis, flavo-viridibus, aetate fusciscentibus. Caulis repens, ca. 3–5 cm. longus, irregulariter ramosus; ramis erectis, ca. 1 cm. altis, apice curvatis. Folia sicca laxe erecto-patentia, madida imbricata, e basi angusta ovato-lanceolata, sensim acuminata, acuta, saepe semitortipila, concaviuscula, semidecurrentia, marginibus erectis, ubique minute serratis, ca. 1,9 mm. longa et 0,7 mm. lata; nervo ca. $\frac{4}{5}$ folii evanido, levi; cellulis anguste linearibus, in medio 15:1, chlorophyllosis, infimis laxioribus, subquadratis, alaribus ibidemque diversis. Bractee perichaetii intt. e basi semivaginantibus, subito lanceolato-subulatae, undulatulae, reflexae. Seta 1 cm. alta, rubra, crassiuscula, sicca flexuosula, suprema subscaberrima. Theca horizontalis, ovalis, sicca sub ore constricta. Peristomium pro genere.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Eboshi, auf Lavasche (Coll. Y. Doi, Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 27-April-1932).

N. B. Wohl eine Verbindungsart von *Rhynchostegium* zu *Oxyrhynchium*, d. h. Rippe als Dorn nicht endend, trotzdem Seta oberwärts nicht ganz glatt. Blattbau wie *Rh. pallidifolium* oder *inclinatum*, Habitus aber wie ein *Oxyrhynchium*.

Raphidorrhynchium (Cupressinopsis) **tanegashimense** SAKURAI
sp. nov.

Gracillimum; caespitosum, caespitibus densis, laete viridibus, intus fusciscentibus, mollibus, nitidiusculis. Caulis repens, ca. 3–5 cm. longus, plerumque foliis destructis, hic illic fasciculatim fusco-radiculosus, irregulariter pinnam ramosus; ramis ca. 1 cm. altis, dense foliosis, subpinnam ramulosis. Folia caulina ovato-lanceolata, sensim acuminata, breve acuta, distincte concava, falcata, asymmetrica, saepe deflexa, marginibus anguste incurvis, supra medium indistincte serrulatis, ca. 0,7–0,8 mm. longa et 0,25–0,3 mm. lata; nervis binis, tenuibus, 0,15 mm. longis, indistinctis; cellulis anguste linearibus, infimis laxioribus, subfuscis, alaribus vesiculosis, hyalinis, supra medium folii sublevibus. Seta ca. 2 cm. alta, tenuis, rubra, sicca flexuosula. Bractee perichaetii intt. e basi semivaginate lanceolato-subulatae, leves. Theca nutans, ovoidea, sicca sub ore paulum constricta, 0,85 mm. longa et 0,7 mm. crassa; cellulis exothecii rotundatis. Annulus rubro-fuscus. Exostomii dentes basi connati, lanceolato-subulati, 0,3 mm. longi et 0,06 mm. lati, lutei, e medio ad apicem hyalini et papillosi, anguste hyaline limbati, transverse striatuli, intus ca. 30 lamellosi; endostomium luteum; corona basilaris 0,15 mm. alta; processus minutissime papillosus, carinatus, in carina rimosus. Spori virides, 0,02 mm.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima, Naka-Tanemura (Coll. Y. Doi Typus! in Herb. K. SAKURAI Nr. 2728, Mitte Juni 1932).

N. B. Von Vorhandensein relativ langer Doppeltrippe kann diese

Art eventuell zum *Acanthocladium* gehören; doch Blätter sind immer sichelförmig einseitswendig wie eine *Brotherella* oder ein *Hypnum*, was beim *Acanthocladium* nicht vorzukommen pflegt.

Glossadelphus nanophyllus SAKURAI sp. nov.

Gracillimus; caespitosus, caespitibus sat densis, luteo-viridibus, molibus, nitidiusculis. Caulis prostratus, hic illic fasciculatim fusco-radiculosus, irregulariter pinnam ramosus, ca. 2-3 cm. longus; ramis infra 1 cm. longis, dense foliosis, haud ramulosus. Folia sicca vix crispata, leniter patentia, madida erecto-patentia, caulina e basi ovata vel oblonga, breve acuta, concava, asymmetrica, marginibus planis, supra medium minute serrulatis, ca. 0,6 mm. longa et 0,25 mm. lata; nervis binis, ad $\frac{2}{3}$ folii evanidis; cellulis chlorophyllosis, paulum obscuris, papillosis, omnium linearibus vel leniter vermicularibus, in medio folii 8-10 : 1, alaribus haud diversis. Reliqua desunt.

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima, Hamazubaki (Coll. Y.

Doi in Herb. K. SAKURAI Nr. 2719 Typus! Am Felsen im Wasser; Nr. 2720, Juni-1932).

N. B. Im Ganzen wie *Gl. planifrons* (B. P.) FL. oder *Gl. kiusiuense* BROTH. Doch Blätter doppelt kleiner, ovaler, Papilla deutlicher.

Meiothecium microcarpum (HARV.) MITT.

Formosa: Prov. Taihoku, Sozan (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI Nr. 2164, 7-Nov.-1926).

Distributio: Java, Ceylon, Nepal, Malacca, Banka, Neuguinea, Samoa.

N. B. Neu für japanische Flora.

Heterophyllum adscendens (LDB.) BROTH.

Kurile: Shikotan (Coll. H. MAYR in Herb. K. SAKURAI Typus! Nr. 2194, 25-Aug.-1890.)

Distributio: Amur, Sachalin.

Vesicularia rotundifolia (SH. OKAM). SAKURAI comb. nov.

Syn. *Ectropothecium rotundifolium* SH. OKAM. (in Contributiones novae ad Floram Bryophyton Japonicam Seite 32, 1915).

Kiusiu: Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima, Hamazubaki (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI Nr. 2727, Mitte Juni 1932).

N. B. Bisher nur in Prov. Nagato gesammelt.

Vesicularia japonica BROTH.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Kaseda (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2426, 31-Mai-1930), Ata-dorf (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2425, 14-Dez.-1930), Higashi-ichiki (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2429, 20-März-1930), Isaku-städtchen (Coll. Y. Doi in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2428, 1-März-1931).

Hondo: Prov. Musashi, Kitatamagun, Jindai-dorf (Coll. H. SASAOKA in

Herb. K. SAKURAI, Nr. 2385, 3-Nov.-1929).

N. B. Sie wächst immer an Felsen im Bächlein. Es ist sehr merkwürdig, dass diese subtropische Art unweit Tokio vom Herrn H. SASAOKA gesammelt wurde.

Vesicularia reticulata (D. M). BROTH.

Formosa: Prov. Taihoku, Taihoku-stadt, Mt. Kentan (Coll. H. SASAOKA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2388, 31-Oktob.-1925).

Distributio: Nepal, Himalaya, Sumatra, Java, Celebes, Indien, Philippin, Ceylon.

N. B. Neu für japanische Flora.

Ectropothecium (Ectropothecidium) **planuloides** SAKURAI sp. nov.

Sterile; gracile, densissime depresso-caespitosum, luteo-viride, aetate fuscescens, sericeo-nitidum. Caulis repens, ca. 3–4 cm. longus, hic illic fusco-maculatus, fusco-radicellus, numerose paraphyllosus, regulariter pinnam ramosus; ramis ca. 2–3 mm. altis, dense foliosis. Folia caulina e basi anguste ovata, subsensim lanceolata, in acumen piliforme attenuata, valde concava, asymmetrica, marginibus remote serrulatis sed erectis vel basi raro recurvis, ca. 1 mm. longa et 0,3 mm. lata; nervo nullo; cellulis laminarum anguste linearibus, infimis laxioribus, alaribus irregulariter breviter vermicularibus, plus minus chlorophyllosis. Folia ramea haud piliforme attenuata, distinctissime serrulata; nervo nullo; cellulis laminarum sat chlorophyllosis. Paraphyllia hyalina, simplex, ca. 1 mm. longa, 3–5 cellularis. Caetera ignota.

Kiusiu: Prov. Satsuma, Mt. Jūsso, ad ligna putrida (Coll. Y. DOI Typus in Herb. K. SAKURAI Nr. 2704, 2-April-1932).

N. B. Im Ganzen wie *E. planulum* CARD. Man kann aber von rippenlosem Blatte, vorhandener Paraphyllien und wurmförmigem Alarzellen sofort bestimmen.

Ectropothecium planulum CARD.

Formosa: Prov. Taichiu, Horisha (Coll. S. SUZUKI in K. Herb. SAKURAI Nr. 2411, 1-Jan.-1927).

Kiusiu: Prov. Satsuma, Kagoshima-stadt (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2421, 22-Febr.-1931).

Distributio: Planta endemica.

N. B. Bisher nur auf Formosa gesammelt.

Ectropothecium subplanulum CARD.

Formosa: Prov. Shinchiku, Mt. Sedopan (Coll. Y. SHIMADA in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2412, 24-Juni-1928).

Distributio: Planta endemica.

Ectropothecium kiusiense BROTH.

Kiusiu; Prov. Hiuga, Mt. Aoi (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI,

Nr. 2413, 8-Aug.-1929).

Distributio: Planta endemica.

Ctenidium hastile (MITT) BROTH.

Kiusiu: Prov. Hizen, Nagasaki (Coll. WICHURA, Typus! in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2478, 7-Jan.-1861). Prov. Satsuma, Städtchen Izūin auf Lavaasche (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2467, 6-Jan.-1931), Mt. Noma (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2480, 30-Dez.-1931). Prov. Ohsumi, Insula Tanegashima (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2717, Juni 1932).

Distributio: Planta endemica.

Ctenidium serratifolium (CARD). BROTH.

Hondo: Prov. Aki, Hiroshima (Coll. A. NOGUCHI in Herb. K. SAKURAI Nr. 2464, 14-Nov.-1936).

Kiusiu: Prov. Satsuma, Nagayoshi-dorf, auf Felsen (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2461, 19-April-1931).

Distributio: Formosa, Annam.

N. B. Da die Sporogone bisher keinmal beschrieben worden ist, will ich kurz notieren: Seta s-förmig gekrümmt, purpurn, 1,2-1,5 cm. hoch, glatt. Theca subnutans oder horizontal, cylindrisch, trocken unter der Mündung geschnürt, ca. 1,0 cm. lang und 0,4 mm. breit, gelbbraunlich. Deckel kegelig. Innere Perichaetialblätter lang haarförmig, gefranst.

Ctenidium plumicaule Fl.

Kiusiu: Städtchen Izūin, auf Erdboden (Coll. Y. DOI in Herb. K. SAKURAI, Nr. 2459, 15-Febr.-1931).

Distributio: West-Java, Gedeh.

N. B. Ob ich keine Gelegenheit habe, Originalexemplar zu sehen, doch stimmt diese hochinteressante Art ganz gut zur FLEISCHER's Beschreibung überein. Japanische Art hat etwas kleinere Stengelblätter.

Neu für japanische Flora!