Nuntia ad Floram Japoniae. XXVIII.

auctore

M. Honda.

Received August 22, 1936.

241) *Agropyrum japonense* HONDA.

var. **macilentum** HONDA var. nov.

Planta gracillima, 40–50 cm alta. Folia angusta, 2–3 mm lata, scabrosa.

Spica parva, 4–6 cm longa, erectiusecula. Spiculae minores.

Nom. Nipp. Hosoba-tatikamozigusa (nov.).

Hab.

Honsyû: Ongata, prov. Musasi (T. SATOW, no. 3708, anno 1936—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

242) *Polypara cordata* BUECK.

var. **plena** (MAKINO) HONDA comb. nov.

Houttuynia cordata var. *plena* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VI. (1929)

p. 38; NEMOTO Fl. Jap. Suppl. (1936) p. 101.

Nom. Nipp. Yae-dokudami.

Hab. sine loco speciali (ex T. MAKINO).

var. **variegata** (MAKINO) HONDA comb. nov.

Houttuynia cordata var. *variegata* MAKINO l. c.; NEMOTO l. c.

Nom. Nipp. Fui-ri-dokudami.

Hab. cult.

243) *Buckleya lanceolata* MIQUEL.

var. **tanigawaensis** (OHKI) HONDA comb. nov.

Buckleya Joan var. *tanigawaensis* OHKI in Journ. Jap. Bot. IX. (1933)

p. 390; NEMOTO Fl. Jap. Suppl. (1936) p. 153.

Nom. Nipp. Tanigawa-tukubane (K. OHKI).

Hab.

Honsyû: in monte Tanigawa, prov. Kôzuke (K. OHKI, anno 1933); Sizutama, prov. Tôtômi (ex S. OKUYAMA).

Planta endemica.

244) ***Clinelymus coreana*** (HONDA) HONDA comb. nov.

Agropyrum repens (non BEAUVOIS) NAKAI in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo XXXI. (1911) p. 375; MORI Enum. Pl. Cor. (1922) p. 36.

Elymus coreanus HONDA in Journ. Facult. Sci. Imp. Univ. Tokyo Sect.

III, Vol. III. (1930) p. 17.

Asprella coreana NEVSKI in KOMAROV Fl. USSR. II. (1934) p. 693.

Hystrix coreana HONDA mss.

Nom. Nipp. Kôrai-hamamugi (M. HONDA).

Hab.

Tyôsen: vallis Segel-tu-korani, districtus Musang (V. KOMAROV, no. 197, anno 1897—type of *Elymus coreanus* HONDA); Hokôri (M. FURUMI, no. 71, anno 1917); in monte Kanbôhō (Y. TAKENAKA, no. 24, anno 1932).

Distrib. Manshuria.

245) **Clinelymus tsukushiensis** (HONDA) HONDA comb. nov.

Elymus tsukushiensis HONDA in Bot. Mag. (Tokyo) L. (1936) p. 391.

Nom. Nipp. Oni-kamozigusa (M. HONDA).

Hab.

Kyûsyû: Prov. Tusima et Tikuzen.

Planta endemica.

246) **Clinelymus villosulus** (OHWI) HONDA comb. nov.

Elymus villosulus OHWI in Bot. Mag. (Tokyo) XLV. (1931) p. 183;

NEMOTO Fl. Jap. Suppl. (1936) p. 923.

Nom. Nipp. Yama-mugi (J. OHWI).

Hab.

Honsyû: Hirogawara, prov. Kai (J. SUGIMOTO, no. 8435, anno 1927).

Planta endemica.

247) **Clinelymus yubaridakensis** HONDA sp. nov.

Radices fibrosae. Culmi erecti, 50–60 cm alti, glabri. Vaginae glabrae, internodiis breviores, nodis glabris. Ligula brevissima, truncata, glabra. Folia linearia, brevia, plana, acuminata, 6–10 cm longa, 3–6 mm lata, supra villosa, subtus glabra. Spica subnutans, 9–12 cm longa, rhachi ad angulos aculeato-scabra. Spiculae binae vel unae, erectae, 3-florae, lanceolatae, 1 cm longae, glabrae. Glumae steriles subulato-lanceolatae, 6 mm longae, acuminatae, 3-nerves, glabrae. Gluma fertilis lanceolata, 1 cm longa, 5-nervis, glabra, apice longe aristata, arista rigidiuseula, 2–2.5 cm longa, recurvata. Palea lanceolata, 9 mm longa, bicarinata, apice bidentula.

Nom. Nipp. Takane-ezomugi (nov.).

Hab.

Hokkaidô: in monte Yûbari-dake, prov. Isikari (J. SUGIMOTO, no. 25397, anno 1933—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

(To be continued.)