Nuntia ad Floram Japoniae. XXXII.

auctore

Masazi Honda.

Received February 8, 1937.

271) *Inula japonica* THUNBERG.

var. **antiplena** HONDA var. nov.

Flores capituli omnes tubiflori. Capitulum semisphaericum. circ. 13 mm in diam.

Nom. Nipp. Maruzaki-oguruma (nov.).

Hab.

Honsyû: Morioka, prov. Rikutyû (G. TOBA, no. 904, anno 1936—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

272) *Plantago japonica* FRANCHET et SAVATIER.

form. **fastigiata** HONDA form. nov.

Spica ramosissima, fastigiato-corymbosa.

Nom. Nipp. Hôki-tô-ôbako (nov.).

Hab.

Honsyû: Hirota, prov. Rikuzen (G. TOBA, no. 902, anno 1936—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

273) *Rosa Wichuraiana* CREPIN.

var. **glandulifera** (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.

Rosa Luciae a. *euluciae* subvar. *glandulifera* KOIDZUMI in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo XXXIV, 2 (1913) p. 234.

Nom. Nipp. Ryûkyû-terihaibara (G. KOIDZUMI).

Hab.

Honsyû: Kabeya, prov. Iwaki (Z. NOZAKI, no. 2072, anno 1936); in monte Huzi (B. HAYATA, anno 1924).

Ryûkyû: Yontanzen (J. MATSUMURA, anno 1899).

Planta endemica.

274) *Rhamnus senanensis* KOIDZUMI.

var. **parvifolia** HONDA var. nov.

Folia minora, 3–5.5 cm longa, 1.3–1.7 cm lata, oblongo-lanceolata vel

obovato-elliptica.

Nom. Nipp. Oze-no-kuroumemodoki (nov.).

Hab.

Honsyû: Oze, prov. Iwasiro (M. NAKAMURA, anno 1934—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

275) *Eragrostis ferruginea* BEAUVOIS.

form. **viridis** HONDA form. nov.

Spiculae virides.

Nom. Nipp. Ao-kazekusa (nov.).

Hab.

Honsyû: Siga, prov. Sinano (T. OSAKA, no. 26, anno 1936); Takahasi, prov. Bittyû (Z. YOSINO, no. 3, anno 1925—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Sikoku: in monte Yahazu, prov. Tosa (S. ÔKUBO, no. 226, anno 1888).

Planta endemica.

276) *Adenophora remotiflora* MIQUEL.

var. **angustifolia** (MAKINO) HONDA comb. nov.

Adenophora remotiflora form. *angustifolia* MAKINO in IINUMA Sômoku-zusetu ed. 3. I. (1907) p. 184; MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. (1925) p. 110, et ed. 2. (1931) p. 1168; NEMOTO Fl. Jap. Suppl. (1936) p. 723.

Folia lanceolata, apice acuminata, basi cuneata non cordata.

Nom. Nipp. Hosoba-sobana (T. MAKINO).

Hab.

Honsyû: Daibosatu-tôge, prov. Kai (T. OSAKA, no. 4, anno 1936).

Planta endemica.

277) *Persicaria Thunbergii* GROSS.

var. *stolonifera* NAKAI.

form. **foliacea** HONDA form. nov.

Ochrea superiore foliaceo-dilatata, subrotundata, undulato-dentata, ciliata.

Nom. Nipp. Ohatuki-ômizosoba (nov.).

Hab.

Honsyû: Siga, prov. Sinano (T. OSAKA, no. 1, anno 1936—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

278) *Solidago Virga-aurea* LINNAEUS.

var. **paludosa** HONDA var. nov.

Planta 30 cm alta. Folia lanceolata vel oblongo-lanceolata, acuta vel acuminata, glabrescentia, margine serratula, ciliatula. Capitula corymbosa, longe pedunculata. Achenium hispidulum.

Nom. Nipp. Kirigamine-akinokirinsô (nov.).

Hab.

Honsyû: in monte Kirigamine, prov. Sinano (T. OSAKA, no. 34, anno 1936 –typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

279) **Poa Makinoi** HONDA nom. nov.

Poa tuberifera MAKINO in Bot. Mag. (Tokyo) VI. (1892) p. 48 nom. nud., et XXVII. (1913) p. 116 nom. nud.; MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. (1925) p. 1489, et ed. 2. (1931) p. 1386.

Poa tuberifera (non MAKINO) FAURIE ex HACKEL in Öster. Bot. Zeit. LIII. (1902) p. 451; MATSUMURA Ind. Pl. Jap. II. 1. (1905) p. 79; HONDA in Journ. Facult. Sci. Imp. Univ. Tokyo Sect. III, Vol. III, pt. 1 (1930) p. 87, et in “Syokubutu oyobi Dôbutu” III. (1935) p. 641; NEMOTO Fl. Jap. Suppl. (1936) p. 952.

Nom. Nipp. Mukago-tuzuri (T. MAKINO).

Hab.

Honsyû: Huzisawa, prov. Rikutyû (M. KIKUTI, anno 1932); Tamanyû, prov. Simotuke (H. NEMOTO, anno 1935); in pede montis Bukô, prov. Musasi (K. HISAUTI et H. HARA, anno 1934); in monte Kôya, prov. Kii (S. SAKAGUTI, anno 1934).

Sikoku: Zinryô, prov. Awa (T. INOBE, anno 1935); Kôbôsigoë, prov. Tosa (T. YOSINAGA, anno 1935); in monte Torigata, prov. Tosa (T. MAKINO, anno 1889).

Planta endemica.

(To be continued.)