Explanation of Plate XII.

All the photomicrographs were taken with Agfa-Isochrom plates; Figs. 1–8 with a Wratten C5 (violet) filter, and Figs. 9–18 with a Wratten B2 (green) filter. Figs. 1–8, living materials; Figs. 9–18, FEULGEN-preparations. $\times 900$.

1. *Ixia* sp., 2. *Clivia nobilis*, 3. *Hippeastrum vittatum*, 4. *Lilium longiflorum*, 5. *Haworthia retusa*, 6. *Puschkinia scilloides*, 7. *Scilla sibirica*, 8. *Luzula perennis*, 9. *Haworthia retusa*, 10. *Puschkinia scilloides*, 11. *Scilla sibirica*, 12. *Clivia nobilis*, 13. *Hippeastrum vittatum*, 14. *Tradescantia* sp., 15. *Ixia* sp., 16. *Echinopsis* sp., 17. *Lathyrus odoratus*, 18. *Brassica chinensis*.

Über das Auftreten des Schwefelkügelchens im Zellinnern von einigen niederen Algen.*

Von

Hirosi Nakamura.

Mit 4 Textfiguren.

Eingegangen am 31. März 1937.

Unter niederen Algen (Cyanophyceen, Diatomeen, Flagellaten u.a.) gibt es manchmal diejenigen, die in reichlich schwefelwasserstoffhaltigen Medien (schwefelwasserstoffhaltigem Wasser, Schwefelthermen u.a.) recht üppig gedeihen können. So ist z.B. *Oscillatoria coerulescens*, eine Cyanophycee, imstande, selbst in gesättigter Schwefelwasserstofflösung etwa 10 Tage am Leben zu bleiben¹⁾, was angesichts der starken Giftwirkung von Schwefelwasserstoff auf gewöhnlichen Organismen eine merkwürdige Tatsache ist.

Bekanntlich enthalten die Zellen von Thiorhodaceen, die ebenfalls in schwefelwasserstoffhaltigen Medien kräftig wachsen, stets mehr oder weniger deutliche Mengen des Schwefelkörnchens, das zwar durch die Oxydation des Schwefelwasserstoffs abgeschieden wird. Zweck der vorliegenden Arbeit war nun zu untersuchen, ob auch bei niederen Algen bei Züchtung in schwefelwasserstoffhaltigen Medien eine Bildung des freien Schwefels im Zellinnern stattfindet.

* Mitteilung aus dem botanischen Institut der Kaiserl. Universität zu Tokyo.

1) Vergl. GEITLER, L.: Die Süßwasser-Flora Deutschlands u.s.w. Heft 12: Cyanophyceae, Jena, 1925.

Folgende Algen wurden aus Faulschlamm und Schwefelthermen zu Nikko gewonnen und im Laboratorium unter Anwendung des Agarbodens nach DETMER¹⁾ kultiviert.

Fig. 1. Schwefelkugeln in den Zellen von *Oscillatoria neglecta*, die einen Tag lang in einer 0.5% $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$ enthaltenden Nährlösung gelegt worden war. $\times 1200$.

Fig. 2. Derselbe Organismus wie oben, ohne Zugabe von $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$. $\times 1200$.

Cyanophyceae:

Oscillatoria amphibia,
Osc. neglecta und
Spirulina Jenneri.

Diatomeae:

Pinnularia molaris.

Flagellate:

Euglena viridis.

Die gezüchteten Organismen wurden dann in die Lösung übergeführt, in welcher neben den DETMERschen Nährsalzen 0.05–0.5 Proz. Natriumsulfid zugesetzt wurde. Nach 1–5 Tage langem Stehen an hellem Ort wurden die Algen lebend, nötigenfalls unter Zusatz von 0.001–0.01-proz. Methylenblaulösung, mikroskopiert, wobei folgendes konstatiert wurde.

Soweit es das makroskopische sowie mikroskopische Aussehen angeht, wirkt das Natriumsulfid in der angewandten Konzentration gar nicht schädlich auf unsere Versuchsalgen. Als Folge des Zusatzes von Natriumsulfid fand nun im Zellinnern von allen untersuchten Algen stets eine Bildung von mehr oder

1) 1.0 g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, 0.25 g KCl, 0.25 g $\text{MgSO}_4\cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 0.25 g KH_2PO_4 in Liter Wasser. 1 Teil dieses Mediums mit 2 Teilen des Wassers verdünnt und mit 0.01 Proz. $\text{FeCl}_3\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ versetzt.

weniger zahlreichen runden stark lichtbrechenden Gebilden statt. Figg. 1 und 3 zeigen diese Gebilde in den Zellen von *Oscillatoria neglecta* bzw. *Pinnularia molaris*, die einen Tag lang in einer 0.5 Proz. Natriumsulfid enthaltenden Nährlösung gelegt wurden. In den Kontroll-Organismen (Figg. 2 und 4), die sich bei Abwesenheit von Natriumsulfid entwickelt hatten, war das Gebilde gar nicht nachzuweisen.

Das ähnliche Kügelchen wurde schon früher von HINZE¹⁾ bei den in schwefelwasserstoffhaltigen Medien wachsenden *Oscillatoria*-Arten aufgefunden und als Schwefeltropfen angegeben, weil dessen mikrochemischen Reaktionen nicht mit denen der „Gasvakuolen“ KLEBAHNS²⁾ („Pseudogasvakuolen“ GEITLERS³⁾) sowie der „Schwebekörper“ MOLISCHS⁴⁾ in Phycochromaceen, wohl aber vollständig mit denjenigen des Schwefeltropfens in den Beggiatoenzellen übereinstimmen. Allem Anschein nach ist auch das Kügelchen in unseren Algen Tropfen von zähflüssigem Schwefel, weil es sich ganz wie der Schwefel-

Fig. 3. Schwefelkügelchen in den Zellen von *Pinnularia molaris*, die einen Tag lang in einer 0.5% $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ enthaltenden Nährlösung gelegt worden war. $\times 1200$.

Fig. 4. Derselbe Organismus wie oben, ohne zugabe von $\text{Na}_2\text{S} \cdot 9\text{H}_2\text{O}$. $\times 1200$.

1) HINZE, G.: Ber. d. D. bot. Ges., **21** (1903), 394.

2) KLEBAHN, H.: Flora, **80** (1895), 241.

3) GEITLER, L.: loc. cit.

4) MOLISCH, H.: Bot. Zeitung, **61** (1903), 47; Mikrochemie der Pflanze, Jena, 1923.

tropfen in Beggiatoen durch Behandlung mit Glycerin oder konzentrierter Salpetersäure früher oder später in monokline Krystallform überführen lässt.

Als Ursprung des Schwefelkügelchens in Oscillarien-Zellen hat HINZE¹⁾ angenommen, dass es aus Schwefelwasserstoff, der in den Medien prä-existierte und in die Algenzellen eindrang, durch die Oxydation durch den bei der Kohlensäure-Assimilation gebildeten Sauerstoff gebildet worden sei. Nach dieser Auffassung hat die Bildung des Schwefelkörnchens für die Algenzellen keine positive physiologische Bedeutung, weil danach sowohl das Eindringen des Schwefelwasserstoffs ins Zellinnere als auch dessen Oxydation durch Assimilationssauerstoff nur unwillkürliche oder nebensächliche Begleiterscheinung darstellen sollten.

Heutzutage unterliegt es wohl keinem Zweifel mehr, dass im Mechanismus der Kohlensäure-Assimilation primär, gekoppelt mit der Reduktion der Kohlensäure, aus Wassermolekül das Wasserstoffsuperoxyd gebildet wird, aus welchem dann durch die Wirkung der Katalase der Sauerstoff freigemacht wird²⁾. Da der Schwefelwasserstoff bekanntlich auf die Katalasewirkung stark giftig wirkt, könnte in dessen Anwesenheit der Assimilationsprozess nicht weiter fortschreiten als bis zur Stufe der H_2O_2 -Bildung. So erscheint uns die Auffassung von HINZE kaum plausibel, wenn er behauptet, dass der Schwefelwasserstoff durch Assimilationssauerstoff oxydiert wird.

Durch eine Reihe der Untersuchungen über den Mechanismus der Photosynthese von Purpurbakterien³⁾ kam ich neulich zu dem Schluss, dass bei der Reduktion der Kohlensäure auch hier zunächst H_2O_2 gebildet wird, welches nun gewöhnlich durch Katalase in H_2O und O_2 gespalten wird, in Anwesenheit des Schwefelwasserstoffs aber—ohne Beteiligung der Katalase—direkt mit diesem in Reaktion eingeht, um so die Bildung des freien Schwefels und des Wassers zur Folge zu haben. Am nächsten liegt die Annahme, dass auch der Schwefelbildung von den in Betracht kommenden niederen Algen eine analoge physiologische Bedeutung zukommt, indem die Wirkung des H_2O_2 mit dem H_2S teils zur Bewerkstelligung des Assimilationsprozesses und teils zur Neutralisierung der etwaigen Giftwirkung des Schwefelwasserstoffes dienen könnte.

Untersuchungen über die Photosynthese von niederen Algen in Anwesenheit des Schwefelwasserstoffes sind jetzt im Gange, worüber in

1) HINZE: loc. cit.

2) Vergl. die Assimilationstheorie SHIBATAS (SHIBATA, K.: Kohlenstoff- und Stickstoffassimilation. (Japanisch.) Tokyo, 1931. S. 35 ff.; SHIBATA, K. u. E. YAKUSHIJI: Naturwiss., **21** (1933), 267; YAKUSHIJI, E.: Acta Phytochimica, **7** (1933), 93.

3) NAKAMURA, H.: Acta Phytochimica, **9** (1937), 189.

anderer Gelegenheit näher berichtet werden soll.

Zum Schluss erlaube ich mir, Herrn Prof. Dr. K. SHIBATA, Herrn Prof. Dr. H. NAKANO, Herrn Dr. H. TAMIYA und Herrn Dr. T. MIDUNO für ihre gütige Unterstützung und stetige Anregung bei dieser Arbeit meinen besten Dank auszusprechen.

Botanisches Institut, Naturwissenschaftliche Fakultät,
Kaiserl. Universität zu Tokyo.

Zur Methodik und Theorie der Vitalfärbung pflanzlicher Protoplasten.

Von

Gihei Yamaha.

Eingegangen am 31. März 1937.

Die Methode der Vitalfärbung wurde von PFEFFER (1886) in die Botanik eingeführt, und von KÜSTER, RUHLAND, COLLANDER, GUILLIERMOND usw. weiter ausgearbeitet. Erst in der letzten Zeit befasst man sich auch bei pflanzlichem Material mit der Vitalfärbung protoplasmatischer Strukturen, welche früheren Forschern (PFEFFER, A. MEYER) so gut wie unmöglich erschien (BECKER 1936). Wenn dieses Forschungsgebiet auch zur Aufklärung lebender Struktur bzw. Beschaffenheit des Protoplasmas schon bislang nicht wenig beigetragen zu haben scheint, so bleibt es doch noch sehr fraglich, ob die vital gefärbten Protoplasten noch in völlig gesundem Zustand leben können. Dieses Bedenken macht sich umso mehr geltend, als es sich, wie bei der Vitalfärbung der Organ- oder Gewebestücke, um sogenannte „supravitale Färbung“ handelt. In dieser Beziehung lässt die Vitalfärbung pflanzlicher Zellen methodisch noch viel zu wünschen übrig. Abgesehen von der Transpirations- und Mikroinjektionsmethode, wie sie nur vereinzelt Anwendung finden, bedient man sich denn hier in den meisten Fällen ausschliesslich der Milieufärbung (VONWILLER 1928 S. 476) (Eintauchmethode, Infiltrationsmethode, Aussaatmethode usw.). Von der Einführung des Farbstoffes per os, sowie der Injektion desselben durch Blutgefässe ist hier natürlich keine Rede. „Intravitale Färbung“