Nuntia ad Floram Japoniae. XXXIV.

Auctore

Masazi Honda

Received September 12, 1937.

290) *Aucuba japonica* THUNBERG.

var. **brachyphylla** HONDA var. nov.

Folia parva, elliptica vel oblongo-elliptica vel obovata, 7–10 cm longa, 4–6 cm lata, supra medium serrato-dentata.

Nom. Nipp. *Hiroha-no-aoki* (Y. IKOMA).

Hab.

Honsyû: Tottori, prov. Inaba (Y. IKOMA, no. 1001, anno 1937—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

291) *Pinellia ternata* BREITENBACH.

form. **subcuspidata** HONDA form. nov.

Lobi folii elliptici vel ovati, apice acuti vel saepe subcuspidati, cuspidibus dilatato-triangularibus.

Nom. Nipp. *Yama-hange* (nov.).

Hab.

Honsyû: Simonokawa, prov. Ise (N. OZU, anno 1935—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

292) *Ajuga decumbens* THUNBERG.

form. **purpurina** HONDA form. nov.

Corolla rosea vel roseo-purpurina.

Nom. Nipp. *Momoiro-kiransô* (nov.).

Hab.

Kyûsyû: Mozi, Prov. Buzen (S. YOSIOKA, anno 1937—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

293) *Leontopodium japonicum* MIQUEL.

var. **angustifolium** HONDA var. nov.

Folia angustiora et longiora, tenuiter acuminata, 5–8 cm longa, 4–7 mm lata.

Nom. Nipp. *Hosoba-usuyukisô* (T. OSAKA).

Hab.

Honsyû: in monte Kirigamine, prov. Sinano (T. OSAKA, no. 5, anno 1936—
typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

294) *Festuca ovina* LINNAEUS.

form. **straminea** HONDA form. nov.

Panicula stramineo-viridis.

Nom. Nipp. *Kibana-usinokegusa* (nov.).

Hab.

Honsyû: Hagikura, prov. Sinano (T. OSAKA, no. 4, anno 1936—typus in
Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

295) *Ajuga incisa* MAXIMOWICZ.

form. **rosea** HONDA form. nov.

Corolla rosea.

Nom. Nipp. *Benibana-hiiragisô* (nov.).

Hab.

Honsyû: in monte Izugatake, prov. Musasi (M. TAKAHASI, anno 1937—
typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

296) *Deutzia Sieboldii* KOERNICKE.

var. **megaphylla** HONDA var. nov.

Folia majora, 5–10 cm longa, 4–5 cm lata.

Nom. Nipp. *Ô-maruba-utugi* (nov.).

Hab.

Honsyû: Itukaiti, prov. Musasi (M. HONDA, anno 1937—typus in Herb.
Imp. Univ. Tokyo); in monte Izugatake, prov. Musasi (M. HONDA,
anno 1937.)

Planta endemica.

297) *Platycodon glaucum* NAKAI.

var. **typicum** HONDA.

form. **albiflorum** HONDA form. nov.

Corolla alba.

Nom. Nipp. *Siro-gikyô* (nov.).

Hab.

Cultum in Tokyo (M. HONDA, anno 1937—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

298) *Lysimachia Fortunei* MAXIMOWICZ.var. **pilophora** HONDA var. nov.

Caulis pubescens. Inflorescentia puberula. Filamenta glanduloso-pubescentia.

Nom. Nipp. *Inu-numa-torano-o* (nov.).

Hab.

Honsyû: Kunimoto, prov. Simotuke (H. SEKIMOTO, no. 1, anno 1937—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

299) *Vicia japonica* A. GRAY.form. **albiflora** HONDA form. nov.

Flores albi.

Nom. Nipp. *Sirobana-hiroha-kusahuzi* (T. MAGOHUKU).

Hab.

Honsyû: Daiôzaki, prov. Sima (T. MAGOHUKU, no. 291, anno 1937—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

300) **Poa uda** HONDA sp. nov.

Culmi basi geniculati, ad nodos radicales, 50–70 cm alti, scabri. Vaginae internodiis breviores vel longiores, striatae, scabrae, nodis nudis. Ligula hyalino-membranacea, deltoidea, 5–6 mm longa, glabra. Folia linearia, plana, apice acuta, 15–20 cm longa, 5–7 mm lata, striata, utrinque margineque scabra. Panicula terminalis, oblonga, effusa, 18 cm longa, 6 cm lata, ramis semiverticillatis, 6–7 cm longis, erecto-patulis, ramulosissimis, cum ramulis scaberrimis. Spiculae ellipticae, acutae, 3.5 mm longae, 1.5 mm latae, viridulae, 3-florae. Glumae steriles inaequales, acuminatae, ovato-lanceolatae, viridulae, scariosae; prima 2 mm longa, 1-nervis, nervo albo, scabro, secunda 2.5 mm longa, 3-nervis, nervis albis, tenuibus, scabris. Gluma fertilis ovato-oblonga, acuta, 2.5 mm longa, glabra, viridescens, 5-nervis, nervis tenuissimis. Palea minor, 3-nervis. Antherae lineares. Ovarium ignotum.

Nom. Nipp. *Mizu-itigotunagi* (nov.).

Hab.

Honsyû: in monte Mitu-tôge, prov. Kai (K. HIYAMA, no. 81, anno 1937—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.