und auch sehr reduziert bei *Microsporon japonicum* und *Epidermophyton inguinale* beobachtet wird.

Ich muss auch so vermuten, dass durch die noch genaueren Untersuchungen solcher Arten, wie *Achorion Schönleinii* und *Trichophyton coccineum* var. *Keio*, bei welchen das sogenannte Knotenorgan (Organe nodulaire) sich zu entwickeln pflegt, die typische Ascusbildung beobachtet werden soll, ja sogar gefunden werden muss.

Literatur.

- 1). MATRUCHOT, M. M. T. et DASSONVILLE, CH., 1899, Sur le champignon de l'Herpès etc. (Bull. soc. Myc. France, 15, p. 240–253.)
- 2). do. 1899, Sur le *Ctenomyces serratus* etc. (l.c., p. 305–310.)
- 3). MATRUCHOT, M. M. T. et DASSONVILLE, CH., 1901, *Eidamella spinosa*, dermatophyte produisant des périthèces (planche V), (l.c. 17, p. 123–132.)
- 4). GUÉGNEN, 1911, Affinités botaniques des champignons des teignes. (Revue scientifique, N° 12–2°, 49 année, 16. Sept.)
- 5). NANNICCI, A., 1934, Repertorio sistematico del miceti dell' uomo e degli animali, (p. 141.)
- 6). KAMBAYASHI, T., 1932, *Microsporon japonicum*, (The Botanical Magazine, Vol. XLVI, No. 552, p. 751.)
- 7). DODGE, C. W., 1935, Medical Mycology, (p. 429.)
- 8). KNIEP, H., 1928, Die Sexualität der niederen Pflanzen, (p. 468.)
- 9). GÄUMANN, E., 1926, Vergleichende Morphologie der Pilze, (S. 165–168).

Februar 1938.

Dermato-urologische Abteilung der Tokyoer
medizinischen Hochschule, Tokyo.

Die Rotfärbung der Milch durch Purpurbakterien.

Von

Hiroshi Nakamura.

Mit 1 Textfigur.

Eingegangen am 15. März 1938.

Die Purpurbakterien, die bisher vielfach in der Literatur¹⁾ beschrieben wurden, sind entweder aus Schwefelthermen, oder Meereswasser oder aber aus Schlamm isoliert worden. Im folgenden soll einen neuen Fundort von diesen Bakterien mitgeteilt werden.

1) Vergl. z.B. MOLISCH, H.: Die Purpurbakterien u.s.w. Jena, 1907; BAVENDAMM, W.: Die farblosen u. roten Schwefelbakterien des Süß- u. Salzwasser, Jena, 1924; Ergebnisse der Biologie, 13 (1936), 1.

Es gelang mir nämlich festzustellen, dass Kuhmilch, die gelegentlich an einem sonnigen Ort gestellt wurde, sich allmählich rötlich anfärbt. Diese Rotfärbung der Kuhmilch wurde einer bakteriologischen Untersuchung unterzogen, wobei es sich erwies, dass sie auf Gedeihen von Purpurbakterien zurückzuführen ist, weil sich aus der gefärbten Milch eine Art *Rhodobacillus* isolieren liess:

Zur Isolierung dieses *Rhodobacillus* wurde ein Milch-Agar-Nährboden verwendet, dessen Zusammensetzung folgende ist:

Magermilch	1000 ccm,
Agar-Agar	15 g.

Der pH-Wert dieses Nährbodens wurde auf 7.0 reguliert. Nach der Sterilisierung wurde der Nährboden mittels der Platinöse mit roter Milch geimpft und so dann in einem Lichtkasten aufbewahrt.

Nach vier bis fünf Tagen entwickelten sich rote Kolonien von Purpurbakterien auf der Agar-Platte, aus denen sich der *Rhodobacillus* mit Leichtigkeit isoliert werden konnte.

Mit dieser reinen Kultur von *Rhodobacillus* wurde dessen Stoffwechsel in Milch untersucht. Zuerst wurde die pH-Änderung des Milchbodens ermittelt. Wie in Tabelle I gezeigt, verschiebt sich der pH-Wert und zwar in acht bis zehn Tagen nach alkalischer Seite. Die Farbvertiefung der Milch ins Rot hielt gleichen Schritt mit dem Wachstum der Purpurbakterien (Siehe Figur 1). Erst nach zehn Tagen trat partielle Koagulierung der Milch ein. Prüfung mit NESSLERSchem Reagens gibt uns darüber kund, dass dieses Alkalischwerden auf der Bildung von Ammoniak

TABELLE I. Die durch Wachsen von *Rhodobacillus* hervorgebrachte pH-Änderung der Milch.

Je 20 ccm sterilisierte Magermilch im Reagensglas, Belichtung mit einer 100-Watt-Lampe in 20 cm Abstand in einem Lichtkasten, Kulturtemperatur: 35°.

Zeit in Tagen.	pH-Wert.	Wachstum.	Farbe der Milch.	Bemerkungen.
Anfang	6.6	—	weiss	
1	6.6	—	”	
3	6.9	+	hellrosa	
5	7.2	+	”	
7	7.5	++	”	Am Boden des Reagensglases roter Niederschlag
9	8.2	+++	rötlich	die Milch gänzlich gefärbt
11	8.7	++++	karminrot	Milch zum Teil koaguliert

durch *Rhodobacillus* zurückzuführen ist.

Setzt man der Milch eine geringe Menge von Natriumbicarbonat zu, so wird das Wachstum der Bakterien beträchtlich befördert. Diese Tatsache ist begreiflich, wenn man in Betracht zieht, dass diese Bakterien photosynthetisch leben.

Weiter wurde geprüft, ob diese Bakterien etwaiges Gas abgeben oder nicht, falls sie in Milch gezüchtet wird. Wenn die Bakterien im EINHORN-Gefäß kultiviert wird, so tritt allerdings in späterem, nicht aber in anfänglichem, Kulturstadium, eine deutliche Gasbildung ein. Gasanalytische Untersuchung lehrt uns, dass dieses Gas vollständig aus Wasserstoff besteht.

Diese Wasserstoffproduktion aus Milch durch *Rhodobacillus* wurde weiter manometrisch untersucht. Der Wasserstoff wird nur im Dunkeln, fast gar nicht aber im Lichte ausgegeben. Diese Tatsache ist dadurch erklärbar, dass dieser Bakterie die Fähigkeit zukommt, im Lichte Kohlensäure mit Hilfe von Wasserstoff zu assimilieren, worauf ich schon in meinen früheren Mitteilungen hingewiesen habe.¹⁾

Zum vergleichenden Zweck wurden analoge Versuche wie oben an Hand verschiedenen früher von mir isolierten *Rhodobacillus*-Arten sowie eines Stammes von *Chromatium* ausgeführt, wodurch es sich zeigte, dass die untersuchte *Rhodobacillus*-Arten gewissermassen, aber *Chromatium* gar nicht, auf Milch gedeihen und dies abbauen. Die hier besprochene Art der

Fig. 1. I. Ein Tag alte Kultur nach der Impfung. II. Fünf Tage alte Kultur nach der Impfung. III. Sieben Tage alte Kultur nach der Impfung. IV. Elf Tage alte Kultur nach Impfung. (Vergl. Tabelle I.)

1) NAKAMURA, H.: Acta phytochimica, 9 (1937), 189; 10 (1937-38), 211.

Rhodobacillen ist durch ihre Fähigkeit der Milchvergärung gekennzeichnet. Über die systematische Charakterisierung von dieser Bakterienart soll später näher berichtet werden.

Zum Schluss erlaube ich mir, Herrn Prof. Dr. K. SHIBATA, Herrn Dr. H. TAMIYA und Herrn Dr. S. HATTORI für ihre gütige Unterstützung bei dieser Arbeit meinen besten Dank auszusprechen. Der Stiftung Hattori Hôkôkwai-Gesellschaft bin ich hier für die finanzielle Unterstützung meiner Arbeiten zum grössten Dank verpflichtet.

Botanisches Institut, Naturwissenschaftliche Fakultät,
kaiserl. Universität zu Tokyo.

Eine theoretische Betrachtung über die Infiltrationsmethode.

Von

Masami Monzi.

Mit 3 Textfiguren.

Eingegangen am 10. März 1938.

Einleitung.

Jede der bisher gebrauchten Bestimmungsmethoden der Spaltöffnungsweite hat ihren besonderen Vorzug, ist aber nicht immer vollkommen geeignet eine genaue Stomaweite zu ermitteln. Daher klaffen mit direkter mikroskopischer Bestimmung die Lücken, indem man die Durchschnittswerte der zahlreichen, in sehr verschiedenen Weiten geöffneten Stomata nicht in kurzer Zeit zu erhalten vermag, und dass die Öffnungsweite kleiner als 1μ , welche nach LOFTFIELD (1921) stark die Transpiration hemmen kann, damit kaum gemessen werden kann (STÅLFELT, 1932). Auch die Veränderung der Spaltweite kann oft durch das starke Licht, das für die mikroskopische Bestimmung unentbehrlich ist, hervorgerufen werden. Die LLOYDSche Alkoholfixierungsmethode kann mehr oder weniger dieselben Lücken vermeiden, aber sie verliert Allgemeingültigkeit damit, dass die Versuchsbehandlungen die Spaltweite nicht selten ändern, und dass die Epidermis mancher Pflanzenblätter in einer dünnen Schicht nicht leicht abgezogen oder abgeschält werden kann. Die DARWINSche Porometermethode hat ihren Vorzug in der Registrierbarkeit der Stomabewegungen