Nuntia ad Floram Japoniae. XLI.

Auctore

Masazi Honda.

Received November 20, 1939.

346) *Caradamine impatiens* LINNAEUS

var. **tenuissima** HONDA var. nov.

Lobi foliorum tenues. Inflorescentia glabra. Siliqua nuda.

Nom. Nipp. Hosoba-zyaninzin (nov.).

Hab.

Kyūsyū: Ituki, prov. Higo (K. MAYEBARA, no. 3702, anno 1939—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo); Nisimera, prov. Hyūga (S. YOSIE, no. 230, anno 1936.

Planta endemica.

347) *Anemone flaccida* FR. SCHMIDT

var. **Tagawae** (OHWI) HONDA comb. nov.

Anemone Tagawae OHWI in Bot. Mag. Tokyo XLV (1931) p. 387.

Anemone flaccida (non FR. SCHMIDT) OHWI in Act. Phytotax. Geobot.

IV. (1935) p. 33 pro parte.

Nom. Nipp. Otome-itige (J. OHWI).

Hab.

Honsyū: in monte Ryūgatake, prov. Tanba (J. OHWI, no. 38, anno 1931).

Kyūsyū: Ituki, prov. Higo (K. MAYEBARA, no. 3703, anno 1939).

Planta endemica.

348) *Agropyron ciliare* FRANCHET

var. **eriorhabdum** HONDA var. nov.

Culmi vaginaeque albo-tomentosi, nodis villosis.

Nom. Nipp. Sirage-kamozigusa (nov.).

Hab.

Sikoku: Sanakōti, prov. Awa (T. INOBE, no. 3, anno 1939—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

349) *Rhododendron macrosepalum* MAXIMOWICZ

var. **diplandrum** HONDA var. nov.

Stamina 10.

Nom. Nipp. Awa-no-motitutuzi (nov.).

Hab.

Sikoku: Sanakōti, prov. Awa (T. INOBE, no. 5, anno 1939—typus in Herb.

Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

350) *Epilobium cephalostigma* HAUSSKNECHT

form. **leucanthum** HONDA form. nov.

Flores albi.

Nom. Nipp. Sirobana-iwa-akabana (nov.).

Hab.

Honsyū: Towada, prov. Mutu (G. KOIE, no. 7, anno 1939—typus in Herb.

Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

351) *Prunus Sargentii* REHDER

var. **pendula** HONDA var. nov.

Rami penduli.

Nom. Nipp. Sidare-ōyamazakura (nov.).

Hab.

Honsyū: Towada, prov. Ugo (G. KOIE, no. 17, anno 1939—typus in Herb.

Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

352) *Fraxinus Sieboldiana* BLUME

var. **Koiei** HONDA var. nov.

Pinna major, 8–13 cm longa, 3–5 cm lata, margine serrulata, utrinque pubescens. Petioli petiolulique pubescentes.

Nom. Nipp. Towada-aodamo (nov.).

Hab.

Honsyū: Towada, prov. Ugo (G. KOIE, no. 16, anno 1939—typus in Herb.

Imp. Univ. Tokyo); ibidem (K. KOIE, no. 18, anno 1939).

Planta endemica.

353) **Amethystanthus effusus** (MAXIMOWICZ) HONDA comb. nov.

Plectranthus longitubus var. *effusa* MAXIMOWICZ in Mel. Biol. IX. (1877) p. 423; MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XII. (1898) p. (17); MATSUMURA et KUDO in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 302.

Plectranthus longitubus var. *effusus* MAXIMOWICZ apud MAKINO in Bot. Mag. Tokyo IV. (1890) p. 173; MATSUMURA Ind. Pl. Jap. II. 2. (1912) p. 547; MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. (1925) p. 276, et ed. 2. (1931) p. 1029.

Isodon longitubus var. *effusus* KUDO in Mem. Facult. Sci. Agric. Taih. Imp. Univ. Formos. II. (1929) p. 140.

Plectranthus effusus HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLVI. (1932) p. 419.

Amethystanthus longitubus var. *effusus* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLVIII. (1934) p. 791; NEMOTO Fl. Jap. Suppl. (1936) p. 629; HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 293.

Nom. Nipp. Kage-tyōzi (T. MAKINO); Sekiya-no-akityōzi (T. MAKINO); Hikage-tyōzi (J. MATSUMURA); Sekiya-no-hikiokosi (J. MATSUMURA); Sekiya-hikiokosi (T. MAKINO et K. NEMOTO).

Hab.

Honsyū: Kariyose, prov. Musasi (K. HISAUTI, no. 1383, anno 1935); Hakone, prov. Sagami (S. ŌKUBO, anno 1890); ibidem (G. KODZUMI, anno 1911); Kamisekisuzi, prov. Kai (T. NAKAI, anno 1911); in monte Komagatake, prov. Sinano (Y. YABE, anno 1903); Agematu, prov. Sinano (J. MATSUMURA, anno 1884); in monte Akiha, prov. Tōtōmi (D. SIMIZU, no. 131, anno 1930).

Planta endemica.

form. **leucanthus** HONDA form. nov.

Flores albi.

Nom. Nipp. Sirobana-sekiya-no-akityōzi (nov.).

Hab.

Honsyū: in monte Ryūsō, prov. Suruga (T. ŌMURA, no. 3, anno 1939—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

354) *Lychnis Miqueliana* ROHRBACH

form. **albescens** HONDA form. nov.

Flores roseialbi.

Nom. Nipp. Usuiro-husigurosenō (nov.).

Hab.

Honsyū: in monte Ryūsō, prov. Suruga (T. ŌMURA, no. 1, anno 1939—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

355) *Clinopodium Fauriei* HARA

form. **albiflorum** HONDA form. nov.

Flores albi.

Nom. Nipp. Sirobana-inu-tōbana (nov.).

Hab.

Honsyū: in monte Ryūsō, prov. Suruga (T. ŌMURA, no. 1, anno 1939—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

356) *Orthodon punctulatum* OHWI

form. **leucanthum** HONDA form. nov.

Flores albi.

Nom. Nipp. Sirobana-inukōzyu (nov.).

Hab.

Honsyū: in monte Takakusa, prov. Suruga (T. ŌMURA, no. 4, anno 1939—
typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

357) *Amethystanthus japonicus* NAKAI

form. **albidus** (NAKAI) HONDA comb. nov.

Plectranthus japonicus var. *glaucocalyx* form. *albidus* NAKAI in sched.
Herb. Imp. Univ. Tokyo.

Caulis et folia viridissima. Labium corollae superius lilacinum intense
purpureo-maculatum, inferius cum tubo candidissimum. (ex descrip. T.
NAKAI).

Nom. Nipp. Sirobana-hikiokosi (T. NAKAI).

Hab.

Honsyū: Isobe, prov. Sima (T. NAKAI, anno 1932—typus in Herb. Imp.
Univ. Tokyo).

Planta endemica.

var. **albiflorus** HONDA var. nov.

Calyx viridis. Corolla in toto alba, non purpureo-maculata. Stamina
brevia, antheris albis.

Nom. Nipp. Siro-hikiokosi (nov.).

Hab.

Honsyū: Hirayama, prov. Suruga (T. ŌMURA, no. 1B, anno 1939—typus
in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.

358) *Arisaema Sugimotoi* NAKAI

form. **variegatum** HONDA form. nov.

Folia variegata.

Nom. Nipp. Huiiri-surugatennansyō (nov.).

Hab.

Honsyū: in monte Ryūsō, prov. Suruga (T. ŌMURA, no. 2, anno 1939—
typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo).

Planta endemica.