綜 説

色素體の細胞學的研究* II

湯 淺 明

Akira YUASA: Cytological studies on plastids.* II

3. 色素體分裂について

コンテリクラマゴケの假根および葉について観察すると、三つの分裂の型がみられる。

1. ふつう型 (normal type) 従来知られているように、色素體が亞鈴形になつて二つにちぎれるものであつて、1細胞中に多數ふくまれている小葉綠體、1細胞中に1~數個ふくまれている大形葉綠體および有色體にみられるものであり、この型の中にも二つの場合が區別される。一つは、亞鈴形になつて分裂するふつうのものであり、他の一つはツヅミモ型になつて分裂するものである。

1日の中、外界の状態にしたがつてほとんどつねに分裂が行われているが、同化澱粉のみちているものでは、分裂は少く、また、分裂の途中で澱粉のでき始めたものは一時、分裂を中止し、ふたたび分裂を始めるときは、同化澱粉の量が少くなつていゝように思われる。

したがつて、分裂と同化澱粉の貯藏と連關があり、分裂が比較的に多いということも、上述の事實と關連してゐるようである。したがつて、分裂を観察するには、しばらく暗室中に入れておいたものについて行方よい。

分裂の實際的觀察はつぎの二つの例の示すように、亞鈴形となるものでは約14時間を要し、ツヅミモ型になるものでは9時間以上を要した。圖6 c~g はふつう型による分裂で、晝間および夜間の分裂を連続的にみて、平均するとcの状態からdまで2時間、d~eまで7時間、e~gまで5時間で、全過程には約14時間を要する。6圖 i~p は虹波12號水溶液(濃度 10^{-7})を用いた場合で、ツヅミモ型の分裂に約5時間を要して、ふつうの場合より少し速くなつてゐる。

分裂によつて二つになつた色素體は、ふたたび接合して融合するような感じを呈することもあり、また、従来知られているように、いくつもの色素體基質で連絡されて色素體連結を形成してゐることも多い。

1細胞中の葉綠素の量はかなり一定してゐると思われ、色素體の大きいときは數は少く、小形のときは數が多い。

2. 二割型 (transverse type) 1細胞中に1乃至數個の色素體がふくまれている場合、大形の色素體に主としてみられるもので、その他の場合にも觀察されることがある。すなわち1細胞中に1葉綠體をふくんでいて2葉綠體細胞にうつるもの(葉の基部細胞など)、2葉綠體細胞から多葉綠體細胞にうつるものなどにみられる。

二割型の場合には葉綠體はまず中央部分にわれ目を生じ、一端からわれはじめ、中央部の基質のみで連絡した二つの杯狀となり、ついに二つに分離し、2葉綠體が完成する。1葉綠體が二割型によつて2葉綠體となるときには、核ははじめ葉綠體の表面にあり、しだいに葉綠體のわれ目に入りこむことがみられる。

* 東京大學教養學部生物學教室業績 Contribution from the Biological Institute, Faculty of Culture, University of Tokyo.

圖 6. コンテリクラマゴケの葉の裏面細胞中の葉緑體. a, 10 時の細胞状態. b, 18 時における同じ細胞. c~g, ふつう型による葉緑體分裂. i~p, 葉の裏面細胞中のふつう型 (ツツミモ型) による分裂. h, 10 時 30 分の細胞状態. この細胞の 1 葉緑體を追跡すると圖 i~p のように變化した. ただし, 虹波 12 號 (10-7) を媒體として觀察した. i, 10 時 30 分. j, 10 時 50 分. k, 12 時. l, 12 時 40 分. m, 14 時 20 分. n, 14 時 50 分. o, 15 時. p, 15 時 30 分. a, b, $\times$ ca. 700. h, $\times$ ca. 750. c~g, $\times$ ca. 850. i~p, $\times$ ca. 850. (原圖)

圖 7 は, 葉の莖部の 1 細胞中に 1 葉緑體のあるものが 2 葉緑體となるときみられる二割型の分裂を追跡したもので, 21 時 20 分から翌日の 9 時までに約 12 時間かかった。

分裂中に分裂しつつある 2 部分の相互の位置はしばしば變化し, またたがいにおし合ったり, 引合ったりするようすもみられたが, これは一部は原形質流動により, 一部は分裂しつつある色素體の 2 部分間の基質の流動によるものと考えられる。ときに分裂の逆もどりすることもある。

3. 縦割型 (longitudinal type). 有色體およびきわめてわかい葉の細胞などにみられるもので, 色素體は棒状で, これがわれて二つになるものである。棒状の色素體は上からみると圓形にみえることがある。

部分的に追跡した分裂過程をつぎ合せてみると, 圖 8 のようになり, まず棒状の色素體は, その端部にわれ目を生じて, しだいにわれ目を深めて二つの棒状色素體となる。この線ラセンはまわりながら 2 本にとけるらしい。棒状色素體はまた, しだいに太くなつて後, ふつう型によつて分裂することもある。

葉の基部の細胞中には色素體の数が多く、また小形であり、葉の裏面および葉柄の細胞内には小形色素體が多く存在する。葉の表面および内部細胞中には2色素體をもち、きわめて若い葉では、細胞内には2色素體または1色素體をもつか、あるいは分裂型がみられる。これら種々な細胞間の移行は、つぎのように考えられる。

葉の基部の細胞中には葉緑體が多数ふくまれており、ここから若い葉が形成されるために細胞が分裂すると、その細胞中には少数（1個または2個）の葉緑體がふくまれるようになり、葉緑體は白色體の状態に移行する。2個の色素體をふくむものは、細胞の分裂によつて娘細胞は1色素體をもち、この色素體は二分して2色素體の細胞となる。また、2個以上の色素體を葉の基部細胞からえたものは、1または2色素體ののこして他は退化する。きわめて若い細胞中で、1~2色素體をもつものの内部に退化色素體の小塊がみられる場合があり、また、退化色素體の内部が退化して外部の膜のみのこつていて、色素體の外部に膜状構造のあることの證明となる場合もある。

圖7. a~i. 二割型による分裂を、同一葉緑體について追跡したもの。×ca. 970. a, 21時20分. b, 21時40分. c, 23時20分. d, 24時10分. e, 2時30分. f, 3時. g, 4時. h, 7時15分. i, 9時。
(原圖)

圖8. a~f, きわめて若い葉の細胞にみえる棒状色素體の縦割型。×ca. 870. a, 色素體中に1本のラセンがみえる. b~e, ラセンは2本にわれて、二つの色素體ができ上る. f, 各々の色素體中にラセンは数を増す。
(原圖)

これらの細胞は分裂して、1色素體をふくむようになり、色素體は二分して2色素體をふくむ細胞を形成し、しだいに葉の主要部分をつくりあげる。葉の始原の細胞中では、色素體は白色體であり、はじめ圓形であるが、やがて棒状に變つてから縦割型によつて二分し、さらに圓く變化する。

きわめて若い葉または、まだ白色の若い葉の周邊部では、1または2色素體をもつ細胞の棒状色素體がきわめて不規則形となり、ちぎれて多数の色素體をもつ細胞ができ上ることもある（圖 g~i）。

圖9. a~i. 葉の始原における色素體分裂. a, $\times$ ca. 170. b~f, $\times$ ca. 700. g~i, $\times$ ca. 130. b, aのC部分附近の細胞の葉綠體分裂. c, D部分附近の細胞の色素體. d, E部分附近の細胞の葉綠體. e, F部分附近の細胞の葉綠體. f, eの状態のつぎには, このようになる, g, 葉の始原の縁邊細胞中で, 色素體がコンドリオンゾーム状の小粒にうつる状態を示す. h, aのA部分の詳細圖. i, aのB部分の詳細圖.

かなり成熟した, または, ほとんど成熟した葉では, 基部の細胞は多数の色素體をもつものが多く, 晝間とはくにある時間という限定は不明であるが, ほとんどつねに分裂時期にあるものがみられる。また夜間でも, 20時~翌日2時以外の時刻にも, もちろん分裂を行っていることのある。

すでにのべたように, 色素體分裂に三つの型を區別することができるが, これら分裂の間に, 緑ラセンは, どのように行動するであろうか。

まず, 縦割型の場合には, 緑ラセンが2本づつ接着し, さらにそれらは接着して, 1本のやや太いラセンとなる。この一次のラセンはのびて棒状となる。この中に, 二次のラセンがみえ, 縦裂して2本となる(圖10, 0~s)。

やがて, 2本の二次ラセンは分離して完全な2本となるが, このときまでに, 葉綠體の基質も縦裂して二つとなり, その各々の中に, それぞれ1本づつ緑ラセンが入って, ここに二つの棒状色素體ができ上る(圖10, t~x)。緑ラセンが分離するときには, ときに2本のラセンのからみ合ったキアズマ状を呈することもある。2個にわかれた色素體中では, 緑ラセンはそのまま止まっていることもあるが, 緑ラセンは縦裂をかさねて数を増し, 同時に色素體は球形または, 橢圓形に變じてふつうの色素體を形成することもある。(圖10, y, n)。

縦裂した2本のラセンが分離するとき, その状態を顯微鏡下にみることもできるが, それらが2本にはなれる速度は, かなり速い。縦割型の場合に, 二次の緑ラセンがみえ, 一次のラセンがのびのびのころに,

二次のラセンも2本に縦裂し、一次のラセンはのび切つて、短棒状となつて2本の短棒状體をつくるときに、その中に1本づつ二次のラセンが入りこんで、2個の色素體ができ上る(圖10, p~w)。

このときはすでに一次のラセンはなく、2個の色素體のそれぞれの中には、二次の緑ラセンが一次の緑ラセンとなつてみえている(圖10, w, x)。

圖10, t から w にうつるまでに、二次のラセンがとけて一次のラセンが縦裂して2本になるのであるが、二次のラセンのとけるようすは、生體のままで顯微鏡にみることができる。

圖10. 色素體分裂の模式圖. a~g, 二割型. h~m, ふつう型. n~x, 縦割型. (原圖)

この縦裂は生體で觀察すると60分くらいの短時間である。そのようすは、圖11, a~e または f~j のようであり、緑ラセンは、しだいにとける。

染色体のラセン糸が縦裂して2本になる場合に、ラセン糸が部分的に回旋してねじれをもどして2本になるのか、相關ラセンが回旋ごとに切れてはなれ、ふたたびつづいて附着するかに問題があるが、緑ラセンでは、しだいにとけていくようである。

この解釈は、緑ラセン自身の基質中の回旋によるものであるか、基質をともないつつとけていくものであるか、ここにも問題がのこされている。

棒状1色素體の細胞では、色素體分裂は縦割型であり、2色素體細胞の場合は、二割型で、多色素體細胞の場合は、主としてふつう型である。

圖11. a~e, f~j, 縦割型による二次のラセンのとけ方. x ca. 1500. (原圖)

二割型あるいはふつう型の色素體分裂では、線ラセンの行動を直接追跡することは困難であるが、いろいろな観察を総合すると、線ラセンはいく本にも切れ、まず2本に縦裂し(圖10, a), — このとき、線ラセンは、はじめからいくつにも切れるものか、このときに切れるものか不明である。— 端部からひらき(圖10, b~c), 中央部分でたがいに接して、接着部分を一束にあつめ、他端は開いているので、圖10 d のようになる。

やがて折曲つた部分が束にあつめられ、他端はしだいに開いて圖10, d, のようになり、線ラセンの開いている部分から色素體基質に割れ目が入つて葉緑體は二つとなり、二割型の過程となる。また、圖10, e~f のとき、線ラセンの開いた部分が兩方に引張られ、基質は兩側から等しくくびれとなり、亞鈴型となつて、さらに引張られて2個の色素體となれば、これはふつう型である(圖10 h~m)。

このようにして線ラセンは、かなり規則正しく分離して二つの色素體をつくり上げるのであつて、でき上つた二つの色素體のふくむ線ラセンの量は、大體同等になる。しかし、珪色素體の形の變化によつて、後に、線ラセンの量に變化を生ずるものと思われる。

色素體分裂を人為的に促進するために、次のようないろいろの試みをしたが、まだ成功しない。

(A) 明るい場所から暗所にうつす: 分裂速度に影響はない。前述のように、葉緑體分裂中に、澱粉を蓄積しはじめると、分裂を中止するものが多い。(B) 暗所から明るい場所にうつす: 同前。(C) 室内から直射日光線の下にうつす: 色素體は細胞膜の近くに移動。(D) HCl (0.01%): 色素體はたがいに接近して、長形の色素體は圓形となり、また、分裂は阻害される。(E) HNO_3 (0.01%), HCl (0.001%): 同前。(F) KOH (0.01%): 分裂速度やや速くなる。(G) 醋酸、蟻酸、蓚酸の稀水溶液: いちぢるしい變化はない。HCl の場合に似ている。(H) 過マンガン酸カリ (0.01%): 色素體相互の位置のはばされ、KOH と同じ結果となる。(I) オキシフル (0.01%): 葉緑體は圓形となつて、接着する。(J) グリセリン (うすいもの): 分裂を阻害する。(K) 蔗糖 (20%): 原形質分離のような状態、うすい蔗糖水溶液では分裂速度は變化しない。(L) 流動パラフィン: 原形質分離のような状態となる。色素體は接着する。

4. 色素體とコンドリオゾーム

ウラボシ科の植物であるホウライシダ、イヌワラビ、ヒメワラビ (*Dryopteris oligophlebia* var. *elegans*), オクマワラビ (*Dryopteris uniformis*), クサツテツ (*Matteuccia struthiopteris*), イワガネソウ (*Notogramme japonica*), ジウモンジシダ (*Polystichum tripterum*), ハゴロモシダ (*Pteris cretica* var. *albo-lineata*), イノモトソウ (*Pteris multifida*) などを用いた。

材料を0.1% ヤヌス緑水溶液で、スライド上で20分間染め検鏡した。コンドリオゾームは淡青綠色にそまり、色素體は染まらない、ときにヨード沃化カリ液、ズダン III の飽和アルコール溶液を用いた。

胞子: コンドリオゾームは小粒状、小棒状、じゅず状などの小體で、数は多い。色素體はコンドリオゾームよりは大きく、白色體で、その数は3~5である。

ズダン III のアルコール溶液で染めると、油滴や液胞は明かにみえ、白色體は多少、粒状構造で、コンドリオゾームとは明かに區別される。胞子が、發芽に近づくとき、白色體は葉緑體とかわり、分裂によつて數を増す(圖12)。コンドリオゾームの数は、ほとんど變らない。

したがつて、このころからすでに、色素體とコンドリオゾームとは區別される。

前葉體: 胞子が發芽して第1分裂をすると、その胚細胞中には、多くの緑色の葉緑體と小形のコンドリオゾームとがふくまれている(圖13, A)。二つの形は明かに區別され、葉緑體は大形綠色で、コンドリオゾームは小形で無色である。葉緑體は、その中に澱粉粒をふくんでいる。

葉緑體は、種子植物の場合と同じ方式で、分裂する(清原 1935; 楠および川崎 1936)(圖13, B, a~e)。1例では葉緑體は亞鈴形となつた後、約20時間の中に分裂する。コンドリオゾームも二分法でふえるが、1

細胞中のコンドリオゾームの数は、ほとんど一定している (圖 13, B, f, g)。

1 細胞の分裂がおこると、細胞質中に散在していた色素體やコンドリオゾームは核分配像のまわりに不規則に散在し、やがて、2 娘細胞中へ、それぞれの位置にしたがつて、分裂される。2 娘細胞にふくまれてから、色素體もコンドリオゾームも分裂によつて數を増す。

精子をつくるために、最初の造精細胞がつくられると、この中の葉綠體は數も少く、また白色體で、コンドリオゾームよりは大型である。しかし、ときには、白色體とコンドリオゾームとがほとんど同じ形で小さく、區別できないこともあるが、ヤマス緑によればコンドリオゾームは染色される。精細胞ができると、やはり數個乃至10個の白色體と多くの小形コンドリオゾームをもっている。これら二つの形の小板は、ヤマス緑で區別できる。

最初の造精細胞も精細胞もともに約10個の色素體と多くのコンドリオゾームをふくんでおり、分裂のときに、分裂して數を増す (圖 13, D, a~c)。前葉體の細胞が卵細胞と藏卵器の細胞のもとなると、色素體は白色體となつて形も小さい。コンドリオゾームと白色體は同じくらいの數で、兩細胞にふくまれている。細胞のもととは2度相ついで分裂して、腹溝細胞、腹溝細胞および卵細胞となるが、ともに10個くらいの小形の白色體と、多くの小形で、粒狀、小棒狀、じゅず狀のコンドリオゾームをふくんでいる (圖 13, E, a, b)。

精細胞：精細胞中には5~10個くらいの白色體と、多くの小形粒狀のコンドリオゾームとがふくまれ、ヤマス緑の水溶液で區別できる。

精細胞中の白色體は澱粉をふくんでいて、ヨード沃化カリ液で染まるが、精子が成熟するにつれて、澱粉は大型となり、したがつて白色體も大型となる (圖 13, F, a~f)。數はほとんど變りなく5~10個くらいで、コンドリオゾームは明かに區別される (圖 13, F, g~l)。

コンドリオゾームは精細胞から精子完成まで、ほとんど數は變りなく、やがて精子ができると、色素體もコンドリオゾームもともに、精子のラセンの中まきこまれる (圖 13, G)。精子がおよぎ始めると、色素體やコンドリオゾームは細胞質とともに精子のからだのまわりについており、やがて精子の盛な運動中にすてられる。ときにコンドリオゾームは、精子の生毛帶の上にならんで、ちょうど纖毛の基粒のようなようすを示すこともある。したがつて、受精のけつかは、卵細胞中のコンドリオゾームと色素體とがもとなつて、造胞體細胞の色素體やコンドリオゾームができてくる。

卵細胞：若い卵細胞中には、約10個の白色體と小形コンドリオゾームとがみられる (圖 13, H)。兩者は形で區別できる。色素體は球形で、コンドリオゾームは粒狀、小棒狀、じゅず狀で、コンドリオゾームは色素體より多少、小さい。完成した卵細胞中では、約10個の球狀白色體と多くの小形粒狀のコンドリオゾームとがある。兩者は、受精のときに、そのままのこつている。受精卵中では、白色體はしだいに綠色となり、第1回目の分裂まえに葉綠體となる。これらは、自由に配列され、分裂によつて數を増していく。

造胞體：造胞體では、色素體は内部の組織、地上莖、根および假根をのぞいてすべて葉綠體で、二分

圖 12. ホウライシダの胞子。
× ca. 1125. a, ヨード沃化カリ液で染めたもの。b, ヤマス緑の0.1%水溶液で染色したもの。c, コンドリオゾーム。n, 核。o, 油滴。p, 色素體。v, 液胞。(原圖)

圖 13. A, ホウライシダの發芽した胞子. $\times ca. 357$. a, コルヒチンの5%水溶液中で發芽したもの. b, コルヒチン0.01%水溶液中で發芽したもの. c, コンドリオゾーム. ch, 葉緑體. B, a~e, ジウモンジシダの前葉體細胞中の葉緑體の分裂. $\times ca. 1000$. f, g, ジウモンジシダの前葉體細胞中のコンドリオゾームの分裂. $\times ca. 1000$. C, a~d, ホウライシダの前葉體細胞の細胞分裂. $\times ca. 540$. c, コンドリオゾーム. ch, 葉緑體. g, グラナ狀の綠ラセン. n, 核. D, 造精細胞と藏精器. a, ホウライシダの若い藏精器. $\times ca. 1000$. b, 同, 最初の造精細胞. $\times ca. 1000$. c, クサソテツの藏精器. $\times ca. 1000$. c, コンドリオゾーム. ch, 葉緑體. l, 白色體. n, 核. s, 最初の造精細胞. sp, 精細胞. w, 藏精器のかべの細胞. E, 若い藏卵器. a, ホウライシダの卵細胞のはじめ. $\times ca. 540$. b, 同, 若い卵細胞(e). $\times ca. 460$. F, a~b, ホウライシダの精子完成過程における色素體. 多少模式的に示してある. p, 白色體. s, 澱粉粒. $\times ca. 1600$. g~l, イヌワラビの精子完成過程中的コンドリオゾーム. ヤマズ緑の1%水溶液で染めたもの. c, コンドリオゾーム. $\times ca. 1600$. G, a~d, コンドリオゾームと精子. a, b, ヘマトキシリンで染めたクサソテツの精子. $\times ca. 1400$. c, d, 同, ヒメワラビ. $\times ca. 1000$. c, コンドリオゾーム. H, a~c, 卵細胞. a, ヒメワラビの若い卵細胞. $\times ca. 750$. b, 同, 完成した卵細胞. $\times ca. 1500$. c, 同, 胚の第1分裂. c, コンドリオゾーム. l, 白色體. m, 核分裂像. n, 核. (原圖)

法でふえる。コンドリオゾームは、小粒狀、小棒狀、じゅず狀で、その形の小さいことで、葉緑體から區別できる。地下莖、根、假根では色素體はひじょうに小形となることがある。

胞子形成：造胞細胞は、5~10個の白色體と多くの小形コンドリオゾームをふくんでいる(圖14)。最初の造胞細胞が成熟すると、色素體はしだいに小形となる。數回の分裂の後に、多くの胞子母細胞がつくられるが、その中には多くの粒狀のコンドリオゾームと5~10の白色體をみることできる。最初の造胞細胞中の色素體は、コンドリオゾームよりは多少大きい。最初の造胞細胞の分裂によつて生じる胞子母細胞は、すべてみな、最初の造胞細胞と同じくらいの數の色素體とコンドリオゾームをもっている。

胞子母細胞の減數分裂第1分裂に、色素體やコンドリオゾームは中期には赤道板の附近にあつまるが、後期、終期には、しだいに細胞板の中心部分に向つて入つていつていく。細胞板が赤道面の中央から周邊部につくられるにしたがつて、色素體やコンドリオゾームを二つの娘細胞に分配する。第2分裂になると、

第1分裂と同じようにして、色素體やコンドリオゾームは、四つの胞子細胞にわけられる(圖15, e, f)。

胞子細胞中では、胞子の成熟にともなつて、色素體(白色體)は、しだいに大きさを増し、コンドリオゾームから區別できる(圖15, g)。

圖 14. a, ハゴロモシダの最初の造胞細胞. $\times ca. 240$. b, 同, 最初の造胞細胞の第1分裂. $\times ca. 240$. c, コンドリオゾーム. l, 白色體. n, 核. (原圖)

圖 15. a~d, ジウモンジシダの減數分裂の間の色素體とコンドリオゾームの行動. $\times ca. 1000$. a, ディアキネシス期. b, 中期. c, 後期. d, 終期. e, 第2分裂の中期. f, 第2分裂の終期. g, ホウライシダの若い胞子. ch, コンドリオゾーム. l, 白色體. $\times ca. 500$. (原圖)

最初に述べたように、ヤムス緑で生體染色される粒狀、小棒狀、じゅうず狀の小體をコンドリオゾームとなぜけると、それらはつねに、ウラボシ科の生活史の全時期に通じて、つねに區別できる(圖18)。

5. 色素體の分配

コンテリクラマゴケでは、莖の細胞の大部分は、多色素體の細胞で、葉の上面表皮の細胞は、2葉綠體、下面表皮は多葉綠體の細胞であり、内部の細胞2は葉綠體で、葉のへりは1層の細胞から成り、この葉縁の細胞の中には、多數の葉綠體がふくまれている(圖16)。

葉の頂端細胞が分裂してのびるときには、細胞分裂に先立つて、色素體は縦割型の分裂をし、二つとなつてから細胞も二分して、各細胞は一つづつの色素體をふくむようになる。したがつて、この部分は細胞はつねに、1あるいは2色素體をふくみ、しかも、その型は棒狀である。このような状態の細胞中、莖の細胞となるものは、そのまま、棒狀色素體が球狀となり、二割型、またはふつう型によつて分裂して多色素體となる。

葉の原基の細胞は、莖の頂端の細胞と同じように1色素體の細胞であるが、縦割型によつて盛に分裂し、分裂中の細胞は、つねに1またわ2色素體の状態であるが、分裂を停止した細胞は、2色素體となり、そのまま葉の内部細胞を構成して、つねに2葉綠體としてとどまる。また、表皮をつくる細胞は、原基の1色素體細胞の分裂によつてつくられた1色素體細胞が、細胞分裂を停止した後、上面では2、下面では多色素體となつて、表皮細胞となる。

ときに、葉の内部の2色素體の細胞は、それぞれ二割型によつて二分して4色素體となり、細胞分裂の後、2色素體づつをふくむようになることもある。4色素體となつた後に、3と1の色素體をふくむようになったときには、3色素體の方は、細胞分裂と色素體分裂とによつて2色素體をもつ2細胞となり、1色素體の方は、色素體分裂によつて、2色素體となる。したがつて、葉の内部細胞は、つねに2色素體としてとどまる。このようにして、盛に細胞分裂する部分はつねに1~2色素體の状態であり、これらが葉の一定部分(表皮、内部組織)の構成成分としてきめられると、細胞分裂を停止して、色素體のみ、分裂し、内部では2色素體として止る。元來、1色素體の始原状態の細胞が、機能に応じて2または多色素體の状態に変わるものである。この際、同一組織内で色素體の数の異常ができた場合には、すぐ調整が行われて、つねに同一色素體数をもつようになる場合が多い。

始原細胞の棒狀色素體のラセン構造は、色素體分裂ごとにたもたれるが、表皮または内部組織の細胞ときめられたものでは、ラセンの數を増し、あるいは配列状態をかえる。このような變化は、核および細胞質との關聯においてなされるのであろうが、元來、色素體は細胞質との關聯において光合成を行い、また、細胞の状態によつて葉綠素の量の増減するなど、細胞質的影響が多いものであるから、上述の色素體の状態の變化は、細胞質のある因子によつて主として支配され、このような因子は、plasmagene と總稱されるものと一致するものではなからうか。

圖16. コンテリクラマゴケにおける色素體の分配模式圖。黒點は核、輪廓を示したものは色素體。a, 葉の原基の一部。b~d, この部分の色素體分裂(縦割型)。e~h, 下面表皮細胞への分配。i~k, 柔組織の細胞。l, m, n, o, p, q, 下面表皮への分配。r, 上面表皮細胞。s, 柔組織細胞。t, 下面表皮細胞。(原圖)

莖の一部から新しく葉を生ずることがある。このような場合には、永久組織の一つが細胞分裂して、この細胞は1または2色素體以上をふくむようになり、2色素體以上をふくむようになった細胞は、しだいに細胞分裂して、ついに1色素體の原始分裂組織の細胞状態となつて、細胞分裂とともに、葉を形成するようになる。このように色素體は分裂していくが、ラセンの行動は前述のように規則正しく、色素體分裂の直後には、つねに2色素體は等しい構造をもっており、細胞分裂の後にも、そのふくむ色素體数が同一になるように、つねに調整されることは、このような統一を行わせる何らかのはたらきのあることを考えさせ、これを *plasmagene* とよぶこともできるであろう。これらの色素體の行動は、核の行動とよくにている。

色素體の分裂および分配の規則性は、タチクラマゴケその他のイワヒバ属 (*Selaginella*) に同じようにみられるが、イワヒバ (*Selaginella involvens*) などは観察が困難であり、イワヒバ以外のシダ植物や種子植物では、しだいに不規則となつていく。

コンテリクラマゴケでは胞子ができにくいので、胞子発芽、精子や、卵細胞形成、受精などのようすをしらべることはできないが、タチクラマゴケ (*Sel. Savatieri*) あるいは、イワヒバなどの研究を総合すると、つぎのように色素體の行動を推定することができる。イワヒバでは精子の尾端に3個のだえん體形の小體が1列についており、未決定の性質をもっているが、その精細胞中の状態から、白色體にふくまれた炭水化物あるいは色素體と考えられるが、これは精子の運動中にすてられる。したがって、精子は受精のときには、細胞質的の部分をとみなわないで、卵細胞中に入るものと考えられる。

イワヒバやタチクラマゴケの卵細胞は1色素體をふくむ。精子は色素體をとみなわないから、受精卵細胞は卵細胞に由来する1色素體をふくむのみである。したがって、この発芽によつて生ずる新しい植物は、その色素體をつねに母方からうけついでいるのみである (圖17)。

タチクラマゴケでは、このような1色素體の細胞は縦割型の分裂によつて、つねに1色素體の細胞をつくり、したがって、分裂組織の細胞は、つねに1色素體である。1色素體が分裂して、2色素體となると、細胞分裂がつづいておこる。やがて葉が形成されると、表皮、葉縁の細胞は多色素體であり、葉の内部細胞は2色素體である。

タチクラマゴケ、コンテリクラマゴケの分裂組織は1色素體細胞で、色素體をみると、前者では胚状色素體中にたてに2~3本の緑ラセン、後者の場合には1本の緑ラセン (これらの場合は、白色體であるから、緑色ではない。ときにわずかに緑色のこともある) がみられ、色素體のちがいがみられるが、完成した組織の色素體では、兩植物の間に區別がみられない。また、色素體のはたらきについても、ほとんどちがいはないと思われる。しかし、ちがいがあるとすれば、母方に由来した色素體のちがいがよるものであり、また、*plasmagene* によつて支配される點も多い。

したがって、色素體について突然變異をおこさせようとするれば、卵細胞または受精卵などの變化をおこさせればよいことになる。色素體が核の支配をどの程度にうけているかということは興味のある問題であり、この點については、研究を將來にゆずる。

圖17. クラマゴケの受精における色素體分配模式圖. a, 卵細胞. b, 精子. c, 受精. 精子の核のみ卵細胞中に入る. d, 受精卵細胞の分裂.

(原圖)

6. 論 議

葉緑體の葉緑素が網狀構造の中にふくまれているということは、すでに Frommann (1880), Schmitz (1884) などによつて述べられ、Wager (1905) はまた葉緑體の纖維狀構造説を述べている。

著者はすでに (1940, 1940, 1940), 生體觀察, ヨード沃化カリ液, ヤヌス綠液, エオシン液による觀察, 固定染色による觀察によつてシダ植物の葉緑體が網狀構造を示し, その中に葉緑素のふくまれていることを示したが, この網狀構造は grana (A. Meyer 1883, Heitz 1936, 1936) と, これをむすぶ糸から成ると考えられた。しかし, その後の研究によつて, 糸は實は不規則なラセン糸で, その歩みは長短いろいろであり, また, ひじょうに引のばされていることもある。また, ラセンは太さ一様でなく, ところどころにふくらみをもっている。

この構造は, 核が粒狀構造とみえても, 實はラセン糸のあつまりであるのと全く同様である。固定したもの, 固定染色したもの, 生體のものについても, 結果は同一である。

葉緑素の周圍には Bredow (1891) によれば, plasma membrane があり, Senn (1906) によれば fine membrane があるという。また, 著者 (1940) も, 葉緑體の周圍には, thin membrane があると考えたが, 醋酸カーミン・ブレバートで, 内容が收縮して外部にうすい膜ののこされている事實や, 黒線のみえる事實などからみて, 葉緑體の外周は, 内部よりやや緻密な原形質があり, 原形質的の膜 (plasmic membrane) となつているものと考えられる。

細胞質が固定されたときにも, そのふくむ粒狀體の存在が, あたかもラセンが, そこにあるように思われる場合がある。しかし, これは單なる光學的虚像であつて, 實際は糸ではない。しかし, 綠ラセンの場合は, 不規則にまく淡綠色のラセンをみとめることができる。

従來, シダ植物の葉の葉緑體が一樣にみえるといわれた場合は, 澱粉粒の貯藏のために綠ラセンのみえにくくなつたときか, 綠ラセンがひじょうに細くわれたときであり, 纖維狀または網狀といわれた場合は, 綠ラセンが正しく見られなかつたときである。Grana と綠ラセンとの關係については, 後に論じる。

Menke および Kogdl (1939) が, ツノゴケ (*Anthoceros punctatus*) で膜狀構造をみ, Kausche および Ruska (1940), Ardenne (1940) が葉緑體は膜狀構造のあつまりで, grana も膜狀構造におおわれているとしたのも實は, 綠ラセンがさらに細く縦裂した場合, あるいは綠ラセンそのものであると考えられる。Granick および Porter (1948) は, 電子顯微鏡で grana の部分には小粒子があつまり, その間にまた小粒子の散在しているようすをみているが, これは綠ラセン上の粒狀部 (grana) の部分では小粒子が多くあつまり, その間に少數の小粒子がならんでいるようすではないかと考えられる。

Heitz (1936, 1936) は多くの植物の葉緑體に grana をみ, これが色素體一ばんのつくりであると考えられたが, 著者は色素體のつくりの一樣とみられるものも綠ラセンのふくらんだ状態か, 細くわれた状態あるいはきわめて小さな grana であること, これを暗所に入れることによつて, 綠ラセンとなること, 天然に綠ラセンと grana 状態または一樣構造との間に可逆的變換のあること, grana と綠ラセンの變換の途中では, grana が細長くなり, 細い糸でつづけられている状態のみえること, また, このような状態をふつうとするもののあること, 人的爲に基質をふくらませて, 綠ラセンをみるようにできること, 基質と綠ラセンとがともにふくらむと綠ラセンが見えないこと, 綠ラセン構造も人爲的に一樣構造にできること, 凝固させると綠ラセンの見えてくることなどの事實から, 綠ラセン構造は, 色素體が可逆的凝固の状態にあるもので, 天然にも grana 状態または一樣構造との間に轉換があり, しかも, イワヒバ, オモト, シダ植物のように, つねに綠ラセンを示すもののあることからみて, 色素體の基礎構造は綠ラセンで, 種により, 條件によつて, grana 状を呈すると考えた方が妥當であると思われる。

色素體が規則正しい分裂の行動を示す場合がみられ, 分裂の型もつくりもかなり核と似ている場合が

あるのであるから、Muller (1947) のいうように、核中の染色體中にできるまゝの状態の遺傳子と色素體とは、共同の祖先をもつもの、あるいは、核と色素體とは同じ記原をもつものと考えられる。

いろいろの試薬によつて、人爲的に色素體の grana 状、緑ラセン状、一樣構造がつくり出されるが、これは天然にも行われる變換であり、色素體の基礎構造はラセンづくりで、いろいろの條件とくに、膨潤、失潤の関係、可逆的凝固などの現象が関係をもち、また、加水現象、脱水現象（新家 1939）が關聯すると思われる。

シダ植物では一ぱんに緑ラセンをみることができ（著者 1944）、緑ラセンは必ずしもコイル状にはみえないもので、むしろ引のばされた形であり、ねじれて引のばされた糸状體とみえる場合もあり（ムラサキツユクサ、シャジクモ、アオミドロ、ケゼニゴケなど）、また、ほとんどねじれていない曲りくねった糸状體であることもある（*Jungermannia*、シャジクモ、ヒルムシロ屬など）。

シダ植物以外のものでも、多くの場合に緑ラセンがみえるようであり、ときに一樣にみえるような場合にも、日かげに入れておくとみえるようになる。また、同一植物でも條件によつて緑ラセンがみえることとみえないことがある。

酸やアルカリによつても緑ラセンはみえるようになるが、この場合は葉緑體は死ぬのであるから、緑ラセンがみえるようになったのは、この場合は非可逆的の凝固である。

一方、日かげにあつて、しかも原形質流動の盛な葉緑體に緑ラセンがみえることがあり、また、緑ラセンのみえないときも 0.1% KOH をはたらかせて可視にすることもできる。コンテリクヤマゴケでは、アンモニア處理によつては、葉緑體は變化しないが、0.1% KOH で處理すると、しだいに緑ラセンが明かとなることは、葉緑體の基質はアンモニアによつてふくらまず、KOH によつて基質がこわされて、緑ラセンのみが明かにみえてくるものと推定される。

一樣にみえていた葉緑體が、緑ラセンを示すようになるのは、元來そのようにつくりがあつて、緑ラセン自身の膨潤によつて不可視の状態になっているからで、緑ラセン自身が失潤すると、みえるようになるかと考えるか、あるいは、元來、一樣に色素が分散して一樣にみえたものが、日かげに入れたり、試薬をはたらかせたりしたことによつて、ラセンづくりを示すようになるかと考えるか、あるいはまた、一時的に凝固してラセンづくりとなるかの、の三つの場合が考えられる。

しかし、つねに緑ラセンを示して、ラセンづくりをもつものもあり（コンテリクヤマゴケ、オモト、その他）、これらの場合、緑ラセンの部分が基質とちがつた性質を示すことからみて、葉緑體中に元來、ラセンづくりがある方と考える方が妥當であり、また、一時的の緑ラセンは凝固すると考えることは、葉緑體中にこのような凝固のようすを示すつくりがあることを肯定することになる。

Weier (1936, 1938) は、サトウダイコンの葉緑體で、日あたりにあつた葉や若い葉では、grana がみえるとして、葉緑體づくりの變化しうることを述べている。また、Liebaldt (1913) は、葉緑體は hydroid-phase と lipoidphase とから成り、後者は乳濁液様に前者にふくまれ、顯微鏡的に判定できないが、表面活性物質の水溶液で兩相にわけることができ、amikronisch の状態から submikronisch の状態へ、さらに mikronisch に變化し、滴狀分離と色素滴をつくるとしている。

Strohmeyer (1935) は、優滲壓または劣滲壓の溶液によつて、脱水または加水をおこさせて、核内構造を可視または不可視にしており、新家 (1937) も同じ結果をみているが、これと似た現象が葉緑體にもおこるのであつて、 NH_4Cl 水溶液によつて緑ラセンがふくらんで一樣づくりになり、うすいアルコール、ホルマリンその他によつて緑ラセンがらちんで、可視となり、固定液によつて凝固してもみえるようになり、また、シャジクモなどの原形質流動の盛な明かに生きている細胞中の葉緑體が、天然に緑ラセンのふくらみとちぢみを示して不可視あるいは、可視となることなどから、葉緑體は元來、緑ラセンのつくりがあり、これがふくらみとちぢみによつて不可視あるいは可視になる場合もあるものと思われる。

Sachs (1862, 1863), A. Meyer (1883), Wager (1908), Doutreling (1935), Weier (1936), Heitz (1936, 1936) は, grana が葉緑素をもつ部分であるとしたが, コンテリクアラマゴケ, オモト, ムラサキツユクサなどでは, grana とみえる場合もあるが, 實は緑ラセンの光學的断面であつて, 顯微鏡のネジの上下によつて, 相互の連絡がみえる。また, 澱粉粒が葉緑體中に多數つくられるときは, 葉緑體をつぶすと, 澱粉粒はつぶつぶとなつて出てきて, grana がおし出されたようにみえるが實は, grana は緑ラセンの一部の光學的断面であるか, 緑ラセン自身のふくらみか, ちみつにまいた部分か, あるいは同化産物と考えられる。

また, 前述のように, grana 状態と緑ラセン状態との間に可逆的に轉換することもある。ムラサキツユクサやハウライシダは葉緑體が膨潤してふくらみきつて, 緑ラセンが緑色のかごのような状態になる場合があつて, 葉緑素は緑ラセンにふくまれることを示している。緑ラセンは必ずしも一様な糸狀體ではなく, ところどころふくらみがあり, このようすは, ヒルムシロ屬, ハマユウ, などにみられ, grana の感じをもたせるが, 實はラセン糸のつくべつな構造である。

ときにデンドロビウムやアマリリスのように, 光合成の産物が多くふくまれて, grana のようにみえることもある。

色素體の觀察方法としては, 従來, 生體觀察のほかに主として Heidenhain 鐵明礬染色法が用いられていたが, そのほかに Kolatschev 法 (1916), Hirschler 法 (1915), Weigle 法 (1915) などがあるが, いずれもパラフィン法によるものである。著者はパラフィン法を用いず, 固定染色して totalpreparation とし, 生體の totalpreparation と比較研究した。これらの方法は有効であつた。

また, NaOH, KOH あるいは HNO_3 などによつて葉緑體の基質を破壊してラセンをみることも試みたが, この方法も有効で, このことからラセンの部分が基質にくらべて強靱であることが知れる。

葉緑體中に蛋白質の結晶のある場合が, イワヒバ屬について知られているが, 著者の觀察によれば, この結晶様體は必ず細胞中の1葉緑體に限られ, 緑ラセンと連絡していることがある。また, 葉緑體分裂に際して, 一方の娘葉緑體のみに入ることも明かとなり, この小體と葉緑體の分裂とは何かの關係をもつように思われる。清原 (1926) はクロモ (*Hydrilla verticillata*) の葉を水中に封じて觀察し, 楠および川崎 (1936) はイワタバコ (*Conandron ramondoides*) およびスヌキモ (*Utricularia vulgaris*) の葉を水中で觀察して色素體の分裂をみている。また, Reinhard (1933) は, コケ, スギナ, 顯花植物の葉を Knop 液, Knop 寒天, ぶどう糖などの0.5, 1~2% 水溶液中で觀察し, 8~10日間生存することをみている。著者は材料を井戸水, ときに蒸溜水, 水道水で觀察し, 細胞の生死は, ブラウン運動の有無, 原形質分離からの恢復, 葉緑體の移動, 分裂などから判断した。この方法によつて, 2日以上生活させ得る。

サンショウモ (*Salvinia*) の水葉の毛の中では, 色素體が退化して小形となつてしまうことがあると, Cholodny (1923) によつて報告されているが, 著者の研究では, 葉の基部の多色素體の細胞から1乃至2色素體の細胞にうつるときに細胞中に退化色素體が觀察された。色素體の分裂については, 古くは Nägeli (1863), Kny (1897), Sachs (1875), Strasburger (1880), Haberlandt (1882, 1888, 1905), Schmidt (1882), Nemec (1910), Scherrer (1914), Carter (1919, 1920), Heitz (1922, 1925) などの研究があり, 大體, 二分法によつて増殖することが知られたが, 二分法についての確固たる證據は缺けていた。しかし, 1926年に清原がクロモで同一色素體を追跡し, 分裂をたしかめ, つづいて Ma (1928), Senjaninova (1928), Stone (1932), Reinhard (1933), 楠および川崎 (1936) などの研究となつた。Stone (1932) などは, 細胞質の一部がしだいに凝縮して色素體に変わるものであるとしている。色素體の分裂の研究とともに, 色素體とコンドリオゾームとの相同の問題が引おこされたが, この問題については, 前述した。

著者は色素體の分裂型として, ふつう型すなわち, ふつうの二分法の他に, 二割型および縦割型を區

別することができた。説明はないが、二割型は Haberlandt (1888) のイワヒバ属の論文, Scherrer (1914) のツノゴケの論文にもみつけることができる。縦割型は Scherrer (1914) のツノゴケの論文に見出すことができる。1色素體が二つに分裂しつつある途中で、これと直角な分裂軸をもつて第2の分裂のおこることがあり、このような現象は、Stone (1932) が観察している。色素體分裂に要する時間について清原 (1926) は、朝分裂がおこりはじめ、夜の8~11時に急にくびれ出し、夜中の1時ころに分裂を終り、約20時間を要するとしている。また、楠および川崎 (1936) はある場合に、タヌキモ (*Utricularia vulgaris*) およびイワタバコでは、16時間半以上を要することをみている。これらの時間は、もちろん色素體内外の条件によつて左右されるものであるが、著者の場合には、ふつう型は14時間、二割型は12時間、縦割型で緑ラセンの縦裂に30分くらいを要した。これら色素體の分裂に、緑ラセンが規則正しく行動することがみられ、とくに縦割型の場合には緑ラセンの行動の規則正しさがみられた。

著者はすでに (1939) に、ウラボシ科の生活圏中に精子は、その色素體とコンドリオゾームとをすて去り、受精卵は、卵細胞の色素體とコンドリオゾームをもっているのみであるとしたが、すでに1914年 Scherrer はツノゴケの卵細胞は1色素體で、造精細胞にはコンドリオゾームは多少みられるが、色素體はみられないとしている。イワヒバの場合にも、色素體は母方のものに由来すると思われる (圖18)。

したがつて、色素體の遺傳は、母系的であるが、受精卵から發育した植物體の細胞中の色素體の行動やつくりは、plasmagene および核の影響をうけることとなる。

Senjaninova (1928) の *Ca-tharine undulata*, *Physcomitrium piriforme* における研究は、多色

素體の細胞で胞子をつくる細胞分裂中に色素體數を減じ、胞子母細胞では1色素體となり、胞子中では1色素體であるが、受精卵では多色素體である。このような分配調整は、核より、むしろ細胞質の影響をうけ、plasmagene によるものであらう。

高等植物の色素體の中には、色素體自身の力によつて行動するもの、一部、核のはたらきをうけているもの、核のはたらきのみによつて行動するものがあるとは、すでに今井 (1936) の述べているところであるが、このような色素體の行動が、どの程度まで、核の支配をうけているかを決定することが必要である。植田 (1949, 1949) は葉緑體の光合成の能力は核や細胞質の影響をうけていないが、葉緑體と細胞質との相關性は、なお研究の要があるとしているから、葉緑體の分配も主として細胞質の影響によると思われる。

圖18. ウラボシ科植物の生活圏中の色素體とコンドリオゾームの行動模式圖。a, 胞子。b, 發芽した胞子。c, 前葉體細胞。d, 精細胞。e, 精子。f, 藏卵器中の精子。g, 卵細胞。h, 胚の第1分裂。i, 造胞體の葉の細胞。j, 胞子母細胞。k, 胞子細胞。白い小球は白色體、點をうつた小球は葉綠體、黒い小粒はコンドリオゾーム。

(原圖)

摘 要

1) シダ植物の葉緑體は、基質とその中にふくまれた緑ラセン (green spiral) とからなり、基質の外圍はうすい原形質膜につつまれている。緑ラセンは不規則に廻旋し、多くは、その上にふくらみをもつ糸で、この中に葉緑素がふくまれている。白色體 (leucoplast) および有色體 (chromoplast) も、その中にラセン構造を藏しているものと思われる。

2) シダ植物以外の高等植物では、固定染色したときに、原則としてラセンづくりがつられるが、ときにラセンは圓板狀體に連絡したり (ヒルムシロ屬の1種)、また粒狀體がラセンの糸によつて結ばれた形 (ハムユウ) となつていこともある。生體でも緑ラセンの見えることが多い。また、デンドロビウムのように同化産物が大部分で、緑ラセンはきわめて少なく、したがつて、粒狀にみえることもある。

3) 日かげまたは暗所におくと、一樣構造にみえた葉緑體にも緑ラセンが明瞭となる。2/5 M NH_4Cl 水溶液によつて、コンテリク라마ゴケの葉緑體などは、緑ラセンはふくらんで、ラセンづくりは不明瞭となる。ある植物では、一樣にみえる葉緑體も酸、アルカリ、固定液などによつて、緑ラセンを示す。緑ラセンを示す葉緑體は、日かげまたは暗所に12時間くらいおくと、緑ラセンはさらに明瞭となる。

4) 盛に原形質流動をしている細胞中で、葉緑體は緑ラセンの明瞭な状態と不明瞭な状態との間に、うつり變わりをする場合もある。

5) 色素體の基礎構造は緑ラセンであるが、grana または一樣構造との間に天然にも、また人爲的にも可逆的變換がある。つねに緑ラセンを示す植物もある。緑ラセンから grana にうつるときは、ラセンづくりのみのこして、葉緑素が grana にあたる部分にあつまつて grana を構成し、grana が緑ラセンにうつるときには、葉緑素がラセンづくり全體にふくまれるようになるものと思われる。

いろいろな植物の色素體の構造をつぎのように示すことができる。〔1〕つねに緑ラセンを示すもの (イワヒバ、オモト、サンショウモ、その他多くのシダ植物)。これらの状態は、人爲的に一樣構造に變換することができる。〔2〕自然状態で、一樣構造と緑ラセンとの間に轉換するもの (シャジクモ、フラスモ、ツノゴケその他)。これらの變換は人爲的にも行わせることができる。〔3〕Grana が細い糸で、つづけられているもの (ヒルムシロ屬、ハムユウなど)。完全に grana の状態になつている場合もある。また、grana から緑ラセンにうつり變わる途中の状態にも、このようすのみられることがある (たとえばマツモ)。〔4〕Grana 状と緑ラセン状との間に、變換しうるもの (スギナ、イヌワラビ、ジャゴケ、タマネギ、マツヨイグサ)。

6) 色素體の緑ラセンや基質のと、膨潤、失潤、色素體の可逆的凝固などによつて、緑ラセンの變換は説明できる。

7) Heitz (1936, 1936) の grana は、緑ラセンの光學的断面、緑ラセン自身のふくらみ、ちみつにまいた部分、同化産物である場合のほかに、實際 grana を示して、緑ラセンとの間に變換する場合もあると考えられる。従来、あみ状、せんい状、一樣、粒狀などと考えられた場合、電子顯微鏡による像なども、緑ラセンを元とて説明することができる。

8) 葉緑體の外圍には、形態學的にはみにくい、内部と構造のちがう膜部分があると考え得る。

9) コンテリク라마ゴ、ケタチク라마ゴケ、イワヒバなどでは白色體、有色體、葉緑體は、部分によつてふつう型、二割型、および縦割型の三つの型の分裂を行う。

10) 分裂に要する時間は、ふつう型は平均約14時間、二割型は平均約12時間、縦割型は60分くらいである。色素體分裂と澱粉粒形成の間には、密接な関係がある。ふつう型の分裂は、夜は19~翌日2時に終るものが多いが、晝間も澱粉形成と関係しつつ分裂がおこなわれており、ほとんどつねに分裂期にあるものがみられる。

11) イワヒバ屬では、色素體分裂において、緑ラセンの行動は規則正しく、とくに縦割型の場合には、

そのようすが明かである。しかし、他の植物では、このような規則正しきは失われている。

12) 色素體分裂における線ラセンの行動は、染色體のラセン糸の行動と似ており、前者はこれによって色素體の基本構造が2娘色素體に等しくわけられるしくみであり、後者は遺傳子が2娘核に等しく分配されるしくみである。また、色素體と核との構造もラセンづくりで等しいことは、色素體が元來、核と關係が深いものではないかということをおもわせる。

13) いろいろな試薬の中に、イワヒバ属の葉を入れて色素體分裂を行わせてみると、分裂がやや早くなるもの、阻害されるものなどがあり、適当な方法によつて、分裂促進の可能性があると考えられる。

14) ヤマシダ科 B で生體染色される細胞質中の小體をコンドリオゾームとして、ウラボシ科植物の生活史についてしらべてみると、コンドリオゾームと色素體とはつねに別々に存在していることがわかる。精子が受精までに、コンドリオゾームと色素體とを失い、受精卵から發育してくる新しい植物では、色素體やコンドリオゾームは、卵細胞からうけつぐこととなる。

15) イワヒバ属では卵細胞は1色素體をもち、精子は色素體をとまなわないから、受精卵は1色素體で、分裂組織はつねに1色素體である。組織の構成部分のきめられた細胞は、細胞分裂を停止し、色素體は分裂して、そのはたらきに應じて2色素體または多色素體の細胞となる。

16) 葉の内部組織の細胞は、つねに大形2色素體をもっているが、他の細胞でも分裂直後のある期間には、つねに等しい数の色素體をもっている。このような色素體分配における規則性は、核の支配より、むしろ細胞質の影響下にあるものと思われ、細胞質中の、plasmagene とよぶべきものの支配が考えられる。

17) 色素體の行動に對して、どの程度に核が影響しているかは、將來の研究にまつこととする。

本論文の發表に際して、種々御配慮を給われる東大教授理學博士篠達喜人先生に深く感謝の意を表する。なお、ここに綜説した研究の一部は文部省科學研究費および額田生物醫學研究所研究費によるものであり、ここに御禮申上げる。

参 考 文 獻

- Alvarado, S. 1923. Ber. Deut. Bot. Ges. 41: 85~96: Anderson, E. G. 1935. Genetics 20: 70~83: Ardenne, M. von 1940. Naturwiss. 28: 113~127: Bowen, R. 1927. Biol. Bull. 56: 179~196: — and Buck, L. H. 1930. Ann. of Bot. 44: 565~586: Bredow, H. 1889. Jahrb. wiss. Bot. 22: 349~414: Carter, N. 1919. Ann. Bot. 33: 215~454: — 1920. ib. 34: 265~285, 303~320: Cavers, F. 1914. New. Phyt. 13: 96~106: Cholodony, N. 1923. Ber. Deut. Bot. Ges. 41: 70~79: Cowdry, E. V. 1926. Amer. Nat. 60: 157~165: Cunha, A. G. de 1929. Arch. Portug. Sic. Biol. 2: 247~285. — 1944. Brotéria Ciênc. Nat. 13: 49~72: Dangeard, P. A. 1919. C. R. Ac. Sci. Paris 169: 1005~1010: — 1920. ib. 170: 301~306, 709~714: Dangeard, P. A. 1931. Le Botaniste 12: 325~389: Doutrelingue, J. 1935. Boc. Kon. Akad. Weten. Amsterdam 38: 886~896: Emberger, L. 1920. C. R. Acad. Sci. Paris. 171: — 1921. Arch. Morph. gén. et exp., Fasc. 1: — 1927. Rev. gén. Bot. 39: 341~363: Forenbacher, A. 1911. Ber. Deut. Bot. Ges. 29: 648~660: Friedrichs, G. 1922. Jahrb. wiss. Bot. 61: 430~458: Frommann, C. 1880. Beobachtungen über Struktur und Bewegungserscheinungen des Protoplasmas der Pflanze. Jena: Fry-Wyssling, A. 1938. Submikroskopische Morphologie des Protoplasmas und Seiner Derivate (Protoplasma-Monographien Bd. 15) Berlin: Gicklhorn, L. 1932. Protoplasma 15: 71~89: Gicklhorn, L. 1932. b. 16: 571~592: Granicke, S. and Porter, K. R. 1948. (Rabinowitch, E. I. 1948. Sci. Amer. (8) による): Guillard, A., Mangelot, G. et Plantefol, L. 1933. Traité de Cytologie végétale. Paris: Haberlandt, G. 1888. Flora 71: 291~307: Harper, R. H. 1919. Amer. Jour. Bot. 6: 273~300: Heitz, E. 1922. Untersuchungen über die Teilung der Chloroplasten usw. Strasburg: — 1925. Zeit. f. Zellf. 2:

- 29~86: — 1936. *Planta* 26: 134~163: — 1936. *Ber. Deut. Bot. Ges.* 54: 362~368: 今井喜孝 1936. *Zeits. ind. Abst. Vererbl.* 71: 61~83: Kausche, G. A. und Ruska, H. 1940. *Naturwiss.* 28: 303: Kirby, K. S. N. 1928. *Jour. Roy. Micr. Soc.* 48: 10~35: 清原金 1926. *Bot. Mag. (Tokyo)* 40: 1~6: Krupko, S. 1926. *Acta Soc. Bot. Poloniae* 4: 77~86: 楠正貫・川崎義雄 1936. *Cytologia* 7: 530~534: Küster, E. 1935. *Die Pflanzenzelle*. Jena: Lewitzky, G. A. 1910. *Ber. Deut. Bot. Ges.* 28: 538~546: — 1925. *Arch. wiss. Bot.* 1: 310~316: Liebaltd, E. 1913. *Zeit. Bot.* 5: 65~112: Lloyd, D. E. 1923. *Michigan Ac. Sc. Arts and Lett: Loui, J. von* 1981. *Planta* 12: 191~238: Löwschen, A. M. 1914. *Ber. Deut. Bot. Ges.* 31: 266~270: Lundegårdh, H. 1910. *Jahrb. wiss. Bot.* 48: 285~378: Mangenot, G. 1925. *C. R. Ac. Sci.* 180: 157~160: Menke, W. 1940. *Naturwiss.* 28: 158~159: — und Koydl, E. 1939. *Naturwiss.* 27: 29: Ma, R. M. 1928. *Amer. Jour. Bot.* 15: 277~284: Metzner, P. 1922. *Ber. Deut. Bot. Ges.* 40: 125~129: Meyer, A. 1883. *Das Chlorophyllkon in chemischer, morphologischer und biologischer Beziehung*. Leipzig: — 1911. *Ber. Deut. Bot. Ges.* 29: 158~160: Moreau, M. F. 1914. *Bull. Soc. Bot. France* 61: 70~74: Mohl, H. von 1855. *Bot. Zeit* 13: 89~99, 105~115: Motte, J. 1928. *Ann. Sci. Nat. Bot.* 20: 293~543: Mottier, D. M. 1918. *Ann. Bot.* 32: 91~114: — 1921. *ib.* 35: 349~364: Muller, H. J. 1947. *Proc. Roy. Soc. B*, 134: 1~37: Nägeli, C. von 1858: *Die Stärkekörner*. Zürich: — 1866. *Sitzb. K. Akad. Wiss München* 2: 280~312: Neměc, B. 1910. *Das Problem der Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Frage*. Berlin: Newcomer, E. H. 1946. *Amer. Jour. Bot.* 33: 221, 684~697: Noack, K. L. 1921. *Zeit. Bot.* 13: 1~35: Pringsheim, N. 1881. *Jahrb. wiss. Bot.* 12: 288~437: — 1882. *ib.* 13: 377~490: Randolph, F. 1922. *Bot. Gaz.* 73: 337~375: Reinhard, H. 1933. *Protoplasma* 19: 541~564: Sachs, J. 1862. *Bot. Zeit.* 20: 365~373: — 1863. *Flora* 46: 195~204, 214~220: 1864. *Bot. Zeit.* 22: 289~294: 坂村 徹 1933. *Jour. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. Ser. V, Vol. II, No. 4*: 287~316: — 1933. *植物生理學*. 東京: Sapehin, A. H. 1915. *Arch. Zellf.* 13: 319~398: Scarth, G. W. 1924. *Quart. Jour. Exp. Physiol.* 14: 99~122: Scherrer, A. 1914. *Flora* 107: 1~56: Schimper, A. F. W. 1883. *Bot. Zeit.* 41: 105~111, 121~131, 137~146, 153~162: — 1885. *Jahrb. wiss. Bot.* 16: 1~247: Schmitz, F. 1882. *Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. u. Westf.* 41: Schürhoff, P. N. 1924. *Die Plastiden*. Jena: Senjaninova, M. 1927. *Zeit. Zellf. Mikr. Anat.* 6: 464~492: — 1927. *ib.* 6: 493~508: Senn, G. 1907. *Arch. Sci. Phys. Nat.* 24: 499~501: Sharp, L. W. 1934. *Introduction to Cytology*. New York and London: 新家浪雄 1939. *Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. Ser. B.* 15: 1~126: Sorokin, H. 1938. *Amer. Jour. Bot.* 25: 28~33: Stone, W. E. 1932. *Jour. Agr. Res.* 45: 421~435: Strasburger, E. 1880. *Ueber Zellbildung. und Zellteilung*. Jena: Strohmeier, G. 1935: *Planta* 24: 470~509: Tschirch, A. 1883. *Ber. Deut. Bot. Ges.* 17: 202~207: 植田利器造 1949. *Bot. Mag. [Tokyo]* 62: 62~63: — 1949. *生物學の進歩第4集*. 4 242~259: Wager, H. 1905: *Rep. Brit. Assn. Adv. Sci.* 75: 573~575: Weier, E. 1936. *Amer. Jour. Bot.* 23: 645~652: Weier, 1938. *Protoplasma* 31: 345~350: 山内繁雄 1908. *Bot. Gaz.* 45: 1~30: 湯淺 明 1939. *Jap. Jour. Gen.* 15: 47~61: — 1940. *Jap. Jour. Bot.* 10: 465~475: — 1940. *Bot. Mag. (Tokyo)* 54: 196~197. — 1940. *ib.* 54: 215~222: — 1940. *ib.* 54: 338~342: — 1944. *ib.* 58: 53~61: — 1947: *Seibutu* 2: 129~135: — 1947. *Bot. Mag. (Tokyo)* 60: 703~714: — 1949. *ib.* 62: 727~728: — • 上方澄子 1945. *Kagwaku* 15: 21~22: — • 山崎典子 1946. *ib.* 16: 12~14: Zirkle, C. 1926. *Amer. Jour. Bot.* 13: 301~320: — 1926. *ib.* 13: 321~341.