Trittgemeinschaften auf den Japanischen Inseln*

von Akira MIYAWAKI**

Eingegangen am 13. Juli 1964

Unter dem Tritt von Mensch und Tier entstehen entlang der Wege und Straßen bestimmte Pflanzengesellschaften. Sie sind mit Tüxen¹⁾ als anthropogene Ersatzgesellschaften 4 Grades anzusehen. Je nach Art und Stärke des menschlichen Einflusses ändert sich das Mengenverhältnis oder sogar die Artenzusammensetzung der sie bildenden Pflanzen.

Im Gegensatz zu Europa, wo die Trittgemeinschaften in vielen Gebieten und von mehreren Autoren²⁻²⁹⁾ studiert worden sind, liegen aus Japan wenige Berichte darüber vor. Über Dynamik und Synökologie von Trittvegetation arbeiteten Yoshioka³⁰⁾ sowie Horikawa und Miyawaki³¹⁾. Yoshioka³²⁾ teilte, wenn auch ohne Angabe von Charakterarten, als erster drei Vegetationsaufnahmen des *Eragrostidetum ferrugineae* von Sendai, N-Honshu, mit.

In den Jahren von 1954 bis 1963 konnte ich von Hokkaido, der nördlichsten Insel Japans, bis zu den Ryukyu-Inseln als dessen südlichem Teil eine Reihe pflanzensoziologischer Aufnahmen von Trittgemeinschaften zumeist an Feldwegen, Straßen, Kinderspielflächen u. a. erarbeiten.

Weil manche Pflanzenarten, wie z. B. *Eleusine indica*, *Eragrostis multicaulis* und *Polygonum aviculare* im Winter fehlen und *Poa annua* im Süden während des Sommers mengenmäßig zurückgeht oder sogar ganz ausfällt, wurden zunächst einige Dauerflächen in der Umgebung Yokohama ganzjährig beobachtet, um die günstigste Jahreszeit für die Aufnahme der Vegetation zu finden. Als solche ergab sich die Zeit vom Frühsommer bis zum Herbst, und unsere Aufnahmen wurden deshalb in den Monaten Mai bis Oktober gewonnen. Dadurch, daß sich die Aufnahmen der Gesellschaften über diesen ganzen Zeitraum erstreckt, ergeben sich zwar teilweise kleinere Unterschiede in ihrem Mengenverhältnis, nicht aber in ihrer Artenzusammensetzung.

Bei einer Länge von etwa 3000 km in NO-SW-Richtung reichen die Japanischen Inseln von der subarktischen bis in die subtropische Region. Das mag erklären, warum sich trotz des extremen menschlichen Einflusses klimatische und edaphische Unterschiede im Gesellschaftsgefüge der Trittrasen ausprägen.

Nach eingehender pflanzensoziologischer Analyse und Synthese unserer Vegetationsaufnahmen, nach vergleichenden Untersuchungen in anderen anthropogenen Gesellschaften Japans, z. B. der Äcker, Grünländereien und der Dämme zwischen den Reisfeldern, wurden die Trittrasen Japans in 6 Assoziationen und ihre Unter-

* Die vorgelegte Arbeit habe ich als Gast der Alexander von Humboldt-Stiftung bei Herrn Prof. Dr. R. Tüxen in der Bundesanstalt für Vegetationskartierung in Stolzenau (Deutschland) zum Abschluß gebracht. Die Ergebnisse wurden auf dem Internationalen Symposium über pflanzensoziologische Systematik in Stolzenau, 23.-26. März 1964, zum Teil bereits anläßlich des Kongresses der Botanical Society of Japan, Nagoya, 8.-11. Oktober 1962 vorgetragen.

** Biological Institute, Yokohama National University, Kamakura, Japan.

einheiten gegliedert. Dabei wurde vergleichend auch die Systematik der europäischen Trittvegetation^{6,12,20,25,u.a.)} berücksichtigt.

Anhand der Übersichtstabelle (Tab. 7) und einiger Verbreitungskarten (Abb. 1-6) sollen zunächst Systematik, Gefüge und Verbreitung der Assoziationen und ihrer wichtigsten Untereinheiten dargestellt werden.

Systematik, Gefüge und Verbreitung der Gesellschaften

1. *Juncus tenuis*-*Polygonum aequale*-Ass.: Die Aufnahmen von Süd-, Mittel- und Ost-Hokkaido sowie dem nördlichsten Teil Honshus, hier aus mehr als 800 m Meereshöhe, wurden zu einer Gesellschaft vereinigt, die im Gebiet durch *Juncus tenuis* und *Polygonum aequale* gekennzeichnet und daher *Juncus tenuis* *Polygonum aequale*-Ass. genannt wird. *Polygonum aequale* unterscheidet sich von *Polygonum aviculare* durch die kleinen und spärlichen Blätter (vgl. Ito, K. 1964)³³⁾. Außer Pflanzen der Plantaginetalia wie *Polygonum aviculare*, *Plantago asiatica*, *Sagina japonica* und *Poa annua* kommen *Trifolium repens*,

Abb. 1. *Juncus tenuis*-*Polygonum aequale*-Ass. ○ Var. v. *Eragrostis multicaulis*, ● Typische Variante.

Digitaria violascens, *Poa pratensis* und *Taraxacum officinale* vor. Die durchschnittliche Artenzahl beträgt 10-13. Die Pflanzengesellschaft siedelt im allgemeinen auf tonigen Böden oder in kleinen Mulden von Sandböden und verlangt anscheinend eine gewisse Feuchtigkeit zu ihrem Gedeihen.

Außer einer Typischen Subassoziation kann man in der Assoziation eine Subassoziation von *Eragrostis multicaulis* ausscheiden (Tab. 1). *Eragrostis multicaulis* ist als mehr oder weniger wärmeliebende Art bekannt, und so ist es verständlich (vgl. Abb. 1), daß diese Subassoziation auf N-Honshu verbreitet ist, aber auch im Norden, wo Flüsse, Seen oder Küstennähe ein wärmeres Lokalklima bedingen vorkommt.

2. *Matricaria matricarioides*-*Polygonum aequale*-Ass.: Alle anderen Trittrasen von Hokkaido und Nord-Honshu werden als gesonderte Assoziation betrachtet, die nach ihren bezeichnendsten Arten, *Matricaria matricarioides* und *Polygonum aequale* benannt wird. Sie wird unterteilt in eine Typische, in die Subassoziation von *Dactylis glomerata* und die von *Eragrostis multicaulis* (Tab. 2).

Abb. 2. *Matricaria matricarioides*-*Polygonum aequale*-Ass. ○ Subass. v. *Dactylis glomerata*, ◐ Typische Subass., ● Subass. v. *Eragrostis multicaulis*.

Die Subass. von *Dactylis glomerata* bevorzugt trockene Standorte, die weniger warm sind als die der Subass. von *Eragrostis multicaulis*. Der Typischen Subassoziation kommt noch ihrem Standort eine Zwischenstellung zu.

Die Verbreitungskarte (Abb. 2) zeigt neben einer großräumigen auch eine vorwiegend edaphisch bedingte lokale Differenzierung.

Die *Matricaria matricarioides*- und die *Juncus tenuis*-*Polygonum aequale*-Ass. unterscheiden sich von anderen Assoziationen durch das Vorkommen von *Taraxacum officinale* und *Dactylis glomerata*.

Abb. 3. Fundorte der *Juncus tenuis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass. ○ Subass. v. *Paspalum thunbergii*, ● Typische Subass., ● Subass. v. *Digitaria violascens*; *Euphorbia makinoi*-*Sporobolus elongatus*-Ass. auf den Ryukyu-Inseln. ○ Subass. v. *Cyperus rotundulus*, ● Typische Subass., ● Subass. v. *Arthraxon hispidus*.

3. *Juncus tenuis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass.: In der Umgebung von Yokohama und an anderen Stellen Honshus, wo entweder der Tongehalt der Böden oder das Microrelief wenigstens zeitweilig eine gewisse Feuchtigkeit des Standortes bedingen, wächst *Juncus tenuis* in größerer Menge und höherer Soziabilität. Zusammen mit *Eragrostis ferruginea* wird die Art deshalb zur Benennung der hier aufgefundenen Trittrasen-Assoziation verwandt, die wiederum in drei Subassoziationen untergliedert werden kann (Tab. 3). Die Subass. von *Paspalum thunbergii* siedelt an Standorten die feuchter, aber weniger nährstoffreich sind als die der Subass. von *Digitaria violascens*. Die Typische Subassoziatioon nimmt eine Zwischenstellung ein. Die Verbreitung der *Juncus tenuis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass. ist erst unvollständig bekannt (Abb. 3). Auch außerhalb der Umgebung von Yokohama dürfte sie vermutlich häufig vorkommen.

4. *Carex incisa*-*Juncus tenuis*-Ass.: Während die bisher behandelten Trittgesellschaften mit *Juncus tenuis* hauptsächlich auf das Tiefland beschränkt sind, kommen auf den Gebirgskämmen z. B. im Nationalpark Hakone (1439 m ü.M.) oder im Quasi-Nationalpark der Tanzawa-Berge (bis 1673 m ü.M.) montane Trittrasen³⁴⁾ vor, die durch *Carex incisa* charakterisiert sind. Auch *Juncus tenuis* ist stets darin enthalten (Tab. 4). Die Gesellschaft findet sich hier an den Wegen, Rastplätzen und Berggipfeln, die täglich von vielen Menschen aus Tokyo, Yokohama und anderen Städten begangen werden. Die Fundorte der nach *Carex incisa* und *Juncus tenuis* benannten Assoziation liegen zwischen 1000 und 1600 m Meereshöhe, also im Bereich der *Fagus crenata*-Wälder, wo Nebel oder Wolken eine hohe Luftfeuchtigkeit bedingen.

Ausgangsmaterial der Bodenbildung sind meist vulkanische Aschen und palaeozoische Gesteine. Der Humushorizont des Bodens wird von Rohhumus gebildet und ist meistens sehr feucht. Stellenweise liegen die Rasen im Schatten der Bäume und Sträucher.

Die *Carex incisa*-*Juncus tenuis*-Ass. wurde untergliedert in die Subass. von *Carex albata*, die Subass. von *Digitaria violascens* oder *Eragrostis ferruginea* und die Typische Subassoziaton. *Carex albata* kommt innerhalb des bisher untersuchten Gebietes nur in den Hakone-Bergen vor. Zu *Digitaria violascens* gesellen sich, vom Tiefland aufsteigend, *Eragrostis ferruginea* und, aus Berg-Wiesen übergreifend, *Agrimonia pilosa*.

Abb. 4 mag die vertikale Verbreitung der drei Subassoziatonen veranschaulichen: Die Subass. von *Carex albata* wächst in den Hakone-Bergen zwischen 1170 und 1340 m ü. M., die Typische Subass. in den Tanzawa-Bergen zwischen 765 und 1670 m und bis 800 m Meereshöhe am Kawaguchi-See, am Nordfuß des Fuji-san. Die Subass. von *Digitaria violascens* findet sich nicht nur von 900 bis 1400 m in den Tanzawa-Bergen, sondern auch auf den Tama-Hügeln im 150 m Meereshöhe. Hier besiedelt sie schattige Wegränder am Waldrand, die

Abb. 4. Verbreitung der *Carex incisa*-*Juncus tenuis*-Ass. nach der Meereshöhe.

1, Subass. von *Carex albata*; 2, Typische Subass.; 3, Subass. von *Digitaria violascens*.

Abb. 5. *Eragrostis multicaulis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass.

○ Subass. v. *Poa pratensis*
◐ Typische Subass.
● Subass. v. *Cynodon dactylon*.

weniger stickstoffreich sind wie die Ackerraine.

Die Verbreitung der *Carex incisa*-*Juncus tenuis*-Ass. auf den Japanischen Inseln bedarf noch der endgültigen Klärung.

5. *Eragrostis multicaulis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass. Yoshioka 1955 em. Miyawaki 1964 (p.p. Syn.: *Eragrostidetum ferrugineae* Yoshioka 1955): Die übrigen Trittrasen Honshus und die von Shikoku und Kyushu werden der *Eragrostis multicaulis*-*E. ferruginea*-Ass. zugeordnet. Die 3 Aufnahmen Yoshiokas³²⁾ aus Sendai in Nord-Honshu, die er *Eragrostidetum ferruginae* genannt hat, gehören zur gleichen Gesellschaft. Da aber nicht nur *Eragrostis ferruginea* die kennzeichnende Art der Gesellschaft ist, sondern diese Art mit *Eragrostis multicaulis* eine bezeichnende Vergesellschaftung eingeht (vgl. Tab. 7), möchte ich als Assoziationsnamen *Eragrostis muticaulis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass. vorschlagen. Neben den namengebenden *Eragrostis*-Arten ist auch *Eleusine indica* ein kennzeichnender Bestandteil ihres Artengefüges (Tab. 5) und unterscheidet die Assoziation von anderen Trittgesellschaften der Inseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu.

Gegenüber der *Juncus tenuis*-*Eragrostis multicaulis*-Ass. unterliegt die *Eragrostis multicaulis*-*E. ferruginea*-Ass. stärkerem menschlichen Einfluß. Sie siedelt in unmittelbarer Nähe der Gehöfte sowie in Gemüsegärten und an anderen nitratreichen, aber verhältnismäßig trockenen Standorten. So findet man diese Gesellschaft als häufigste Trittgesellschaft Japans auf Schulhöfen und an Wegrändern auf Honshu, Shikoku und Kyushu.

Die Artenzahl der *Eragrostis multicaulis*-*E. ferruginea*-Ass. beläuft sich auf 5-11. Auch diese Assoziation gliedert sich in dabei Subassoziationen: Subass. von *Cynodon dactylon*, Subass. von *Poa pratensis* und Typische Subassoziation.

In der Verbreitung der Subassoziationen (Abb. 5) spiegeln sich hauptsächlich großklimatische Unterschiede. Die Subass. von *Poa pratensis* ist vor allem auf N-Honshu, aber auch in höheren Lagen, z. B. in den Becken der Japanischen Alpen (Mittel-Honshu) verbreitet. Die Subass. von *Cynodon dactylon* ist eine ausgesprochen wärmeliebende Gesellschaft, die auf Sandböden meist in Küstennähe vorkommt. Sie findet sich gegen Norden noch in der Umgebung von Tokyo und im Süden bis Süd-Shikoku und Kyushu. Sowohl ökologisch als auch ihrer Verbreitung steht die Typische Subassoziation zwischen den beiden anderen Subassoziationen.

Aus der Übersichtstabelle (Tab. 7) geht hervor, daß in der *Eragrostis multicaulis*-*E. ferruginea*-Ass., besonders in der Typischen und in der Subass. von *Cynodon dactylon*, einige Arten enthalten sind, die ihren Schwerpunkt in den Trittrasen der Ryukyu-Inseln, also ganz im Süden Japans haben.

6. *Euphorbia makinoi*-*Sporobolus elongatus*-Ass.: Wie Tab. 6 erkennen läßt, besitzen die Trittrasen der subtropischen Ryukyu-Inseln, wie Okinawa, Miyako, Ishigaki, Iriomote, Iheya, Kume, Zamami und Okierabu ein Arteninventar, das von dem der bisher besprochenen Gesellschaften völlig verschieden ist. Von den Trittrasen der gemäßigten Gebiete greifen nur *Plantago asiatica*, *Poa annua* und *Digitaria violascens* in die Gesellschaft über, davon nur *Plantago asiatica* mit annähernd gleichbleibender Stetigkeit. *Sporobolus elongatus* verleiht den Trittrasen der subtropischen Inseln schon aspektmäßig einen anderen Charakter. Sie enthalten

außerdem, äußerlich weniger stark hervortretend, *Euphorbia makinoi* und *Panicum repens*, *Cyperus rotundus*, *Eleusine indica* und *Cynodon dactylon*. Die zwei letzten Arten wachsen, wie oben bereits angedeutet, auch in den nördlich angrenzenden Trittrasen der *Eragrostis multicaulis*-*E. ferruginea*-Ass.

Wir unterscheiden auch in der *Euphorbia makinoi*-*Sporobolus elongatus*-Ass. 3 Subassoziationen: Die Subass. von *Cyperus rotundus*, die auch durch *Apium ammi* differenziert wird, wächst an stark betretenen Standorten, z. B. zwischen Pflastersteine, und findet sich auf allen Bodenarten von Ton bis Sand. Die Subass. von *Arthraxon hispidus* unterscheidet sich von der vorigen Untergesellschaft durch das Vorhandensein der Gräser *Arthraxon hispidus*, *Eccoilopus cotulifer* und *Imperata cylindrica*. Sie besiedelt auf Süd-Okinawa die verhältnismäßig wenig trittexponierten Stellen, was in der Artenverbindung dadurch zum Ausdruck kommt, daß die genannten Trennarten aus Kontaktgesellschaften her übergreifen. Die Typische Subassoziatio findet sich auf den meisten der bis heute untersuchten Inseln der Ryukyu-Gruppe dort, wo die Wegränder mäßigem Tritt ausgesetzt sind.

Die *Euphorbia makinoi*-*Sporobolus elongatus*-Ass. läßt in sich keine Unterschiede erkennen, die durch verschiedenes Ausgangsgestein der Bodenbildung hervorgerufen sein könnten, sie findet sich in gleicher Weise über Korallenkalk und palaeozoischem Gestein. Ihre Wuchsorte unterliegen wohl ausschließlich dem Einfluß des Seewindes.

Höhere Einheiten der japanischen Trittgeseellschaften

Schon weiter oben wurde darauf hingewiesen, daß die Trittrasen infolge der großen NO-SW-Erstreckung Japans und der damit verbundenen Unterschiede des Großklimas floristisch verhältnismäßig reich gegliedert sind, zumal, wenn man auch die spärlich vorkommenden Begleiter berücksichtigt.

Die systematische Bearbeitung führte deshalb nicht nur zur Unterscheidung von 6 Assoziationen, die oben beschrieben worden sind, sondern auch zur Verteilung dieser Assoziationen auf die beiden Verbände des *Polygonion avicularis japonicae** und *Euphorbio-Sporobolion elongati*. *Polygonum aviculare*, in Japan als Kennart des *Polygonion*, ist möglicherweise sippensystematisch als Kleinart von der europäischen Pflanze unterscheidbar. *Trifolium repens* wird als Trennart gegen das *Euphorbio-Sporobolion* herausgestellt. Das *Euphorbio-Sporobolion* enthält vorläufig als einzige Assoziation die *Euphorbia makinoi*-*Sporobolus elongatus*-Ass., dessen namengebende Kennarten also zugleich als Verbandskennarten gelten. Als Trennart gegen das *Polygonion avicularis japonicae* kann *Panicum repens* gewertet werden. Die etwaige Verbreitung des Verbandes in weiter südlich gelegenen Gebieten muß noch untersucht werden.

Polygonion avicularis japonicae und *Euphorbio-Sporobolion elongati* werden vorläufig zur oseasiatischen Ordnung der *Plantaginetalia asiatica* zusammengefaßt und *Plantago asiatica*, *Eleusine indica* und *Sagina japonica* als Ordnungskennarten betrachtet. Weil die *Plantaginetalia asiatica* mit der europäischen Ordnung *Plantaginetalia maioris* Tx. 1950 die Klassenkenn-

* Dieser Name ist nur so lange gültig, bis das kollektive *Polygonum aviculare* in Japan wie in Europa in Kleinarten unterteilt worden ist (vgl. Scholz, H. 1959, Ber. d. Dtsch. Bot. Gesell. **71**, 10: 427; *ibid.* **72**, 63, Stuttgart).

arten *Poa annua*, *Cynodon dactylon*, *Juncus tenuis*, *Lepidium virginicum* u. a. gemeinsam haben, kann die ostasiatische Ordnung der Klasse der Plantaginetea maioris Tx. et Prsg. 1950 angeschlossen werden.

Nach unserer Tabelle (7) hat es den Anschein, als ob *Poa annua* unter den Kennarten der in ihrem Inhalt nunmehr erweiterten Klasse weitaus die höchste Stetigkeit besäße, während die namengebende Art *Plantago major* in den Plantaginealia asiaticae überhaupt nicht vorkommt. Man könnte deshalb, einer Anregung von Prof. Tüxen folgend, vielleicht in Erwägung ziehen, die Klasse in Poetea annuae umzubenennen, was jedoch noch reiflicher Überlegung bedarf.

Eine schematische Übersicht soll ermöglichen, die systematische Gliederung der europäischen und japanischen Trittrasen zu vergleichen:

Zusammenfassung

Die Trittgesellschaften der Japanischen Inseln wurden auf ihr Artengefüge, ihre systematische Gliederung und ihre Verwandtschaft mit den Trittgesellschaften Europas untersucht. Außerdem wurden sie, so gut das bisher möglich war, hinsichtlich ihrer Lebensbedingungen und ihrer Verbreitung verglichen.

Es ergaben sich 6 Assoziationen:

1. *Juncus tenuis*-*Polygonum aequale*-Ass. mit der Typischen und der Subass. von *Eragrostis multicaulis* (Tab. 1). Verbreitung: Osten und Süden von Hokkaido, nördlichster Teil Honshu.

2. *Matricaria matricarioides*-*Polygonum aequale*-Ass. mit der subass. von *Dactylis glomerata*, Subass. von *Eragrostis multicaulis* und Typischer Subassoziaton (Tab. 2). Verbreitung: Hokkaido und nördlichster Teil Honshu.

3. *Juncus tenuis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass. mit der Subass. von *Paspalum thunbergii*, Subass. von *Digitaria violascens* und Typischer Subassoziaton (Tab. 3). Verbreitung: Honshu, z. B. Tamagawa-Mündung bei Yokohama.

4. *Carex incisa*-*Juncus tenuis*-Ass. mit der Subass. von *Carex albata*, Subass. von *Digitaria violascens* und Typischer Subassoziaton (Tab. 4). Verbreitung: Vorerst nur aus den Bergen der Umgebung Yokohamas bekannt.

5. *Eragrostis multicaulis*-*Eragrostis ferruginea*-Ass. mit der Subass. von *Poa pratensis*, Subass. von *Cynodon dactylon* und Typischer Subassoziation. In dieser Untergliederung der Assoziation spiegeln sich großklimatische Unterschiede wieder Verbreitung: Honshu, Shikoku und Kyushu.

6. *Euphorbia makinoi*-*Sporobolus elongatus*-Ass. mit der Subass. von *Cyperus rotundus*, Subass. von *Arthraxon hispidus* und Typischer Subassoziation. Verbreitung: Ryukyu-Inseln.

Die beschriebenen Assoziationen verteilen sich auf die Verbände des *Polygonion avicularis japonicae* und des *Euphorbio-Sporobolion elongati*. Diese werden vorläufig in der ostasiatischen Ordnung der *Plantaginetales asiaticae* vereinigt, welche der europäischen Ordnung der *Plantaginetales maioris* Tx. 1950 entspricht und mit dieser den *Plantaginetea maioris* Tx. et Prsg. 1950 angeschlossen werden kann.

Der Verfasser ist Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Reinhold Tüxen zu großem Dank verpflichtet für die immer wieder gewährte freundliche Unterstützung und Beratung. Auch Herr Dr. Ulrich Eskuche sei für seine liebenswürdige Hilfe bei dieser Arbeit herzlich gedankt.

Schriften

- 1) Tüxen, R., Angewandte Pflanzensoziologie **13**: 5 (1956). 2) Adamović, Z. R., Bull. Museum d'Histoire Naturelle, Série B, **13**: 5 (1959). 3) Bates, G. H., Journ. Ecol. **23**: 470 (1935).
- 4) Bates, G. H., *ibid.* **25**: 429 (1937). 5) Braun-Blanquet, J., S. I. G. M. A. Commun. **9**: 35 (1931). 6) Braun-Hool, J., Mitt. Naturforsch. Gesellschaft Luzern **19**: 67 (1962). 7) Diemont, W. H., Sissingh, G. en Westhoff, V., Nederl. Kruidk. Arch. **50**: 215 (1940).
- 8) Ferenczy, L., Botan. Közlemények **47**: 123 (1957). 9) Felföldy, L., Acta Geobot. Hungar. **5**: 87 (1942). 10) Klika, J., Nauka o rostlinných společenstvech (Fytocenologie) (Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha, 1955). 11) Kornaś, J., Acta Societatis Botanicorum Poloniae **21**: 701 (1952). 12) Oberdorfer, E., Pflanzensoziologie **10**: 564 (VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1957).
- 13) Passarge, H., Feddes Report., Beih. **138**: 1 (1959). 14) Pfeiffer, H., Vegetatio **7**: 301 (1957). 15) Pignatti, S., Arch. Bot. **28, 29**: 3 (1954). 16) Rivas Goday, S. y Borja Carbonell, J., An. Inst. Bot. Cavanilles **19**: 3 (1961). 17) Rivas Martínez, S., *ibid.* **21**: 6 (1963). 18) Schwickerath, M., Pflanzensoziologie **6**: 278 (VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1944). 19) Simon, T., Acta Bot. Acad. Sci. Hung. **6**: 1 (1960). 20) Sissingh, G., Onkruid-Associaties in Nederland (Staatsdrukkerij-Uitgeverijbedrijf's Gravenhage, 1950).
- 21) Sissingh, G., Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **6, 7**: 164 (1957). 22) Sougnez, N., Bull. Soc. roy. Bot. Belg. **37**: 172 (1955). 23) Sougnez, N., Carte de la végétation de la Belgique. 5 (Gand, 1957). 24) Sukopp, H., Bot. Jb. **79**: 1 (1959). 25) Tüxen, R., Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **2**: 94 (1950). 26) Tüxen, R., *ibid.* N. F. **5**: 155 (1955). 27) Tüxen, R., *ibid.* N. F. **6, 7**: 164 (1957). 28) Ubrizsy, G., Acta agronomica Acad. Sci. Hung. **1**: 107 (1950). 29) Weber, R., Museumsreihe **21**: 5 (1960). 30) Yoshioka, K., Bull. Soc. Plant Ecol. **2**: 34 (1953). 31) Horikawa, Y. and Miyawaki, A., Sci. Rep. Yokohama Nat. Univ., Sec. II, **3**: 51 (1954). 32) Yoshioka, K., Sci. Rep. Fukushima Univ. **4**: 1 (1955). 33) Ito, K., Jap. Jour. Bot. **39**: 65 (1964). 34) Miyawaki, A., Ohba, T. u. Murase, N., Pflanzensoziologische Studien über die Vegetation im Tanzawa-Gebirge, Provinz Kanagawa-Wissensch. Ber. über die Tanzawa- u. Ooyama-Gebirge 54 (Yokohama, 1964).

摘 要

宮 脇 昭： 日本列島の路上植生

日本列島の路上植生について、その種構成、群落分類およびヨーロッパの路上植生との比較研究を行った。さらに野外調査に際して可能な群落生地の比較と各群落の分布をしらべた。

その結果以下の6群集が確認された。

1. クサイーハイミチヤナギ群集。典型-およびニワホコリ亜群集に下位区分される(第1表)。分布：北海道東部および南部，本州北部。
2. コシカギクーハイミチヤナギ群集。カモガヤ，ニワホコリ-および典型亜群集に下位区分される(第2表)。分布：北海道および本州北部。
3. クサイーカゼクサ群集。スズメノヒエ-，アキメヒシバ-および典型亜群集に下位区分される(第3表)。分布：本州，たとえば多摩川下流附近など。
4. カワラスゲークサイ群集。ミノボロスゲ-，アキメヒシバ-ならびに典型亜群集に下位区分される(第4表)。分布：現在丹沢山塊，箱根山などで知られている。
5. ニワホコリーミチヤナギ群集。ナガハグサ-，ギョウギシバ-および典型亜群集に下位区分される。分布：本州，四国，九州。
6. コバノユシキソウネズミノオ群集。ハマスゲ-，コブナグサ-および典型亜群集に下位区分される。分布：琉球列島。

これらの群集はミチヤナギ群団およびコバノユシキソウネズミノオ群団にまとめられる。両群団は、現在のところ東アジアの路上植生オーダー，オオバコオーダーにまとめられ，ヨーロッパのオーダー，*Plantaginetalia maioris* Tx. 1950 に対応させられる。両オーダーは，オオバコクラス *Plantaginetea maioris* Tx. et Prsg. 1950 に総括される。(横浜国立大学生物学教室)

Tab. 1.

Juncus tenuis-Polygonum aequale-Ass.

	HK	HK								AO
Nr. d. Aufnahme:	90	91	1123	59	847	869	1114	1125	1583	1
Artenzahl	10	12	12	8	11	12	9	10	10	13
<u>Kennarten d. Assoziation:</u>				0.2						
Juncus tenuis Willd.	2.3	1.2	+2	I	+2	+2	1.2	+2	+2	+2
Polygonum aequale Lindm.	.	2.2	3.3	.	3.3	2.2	1.2	3.3	+	3.4
<u>Trennarten d. Subass.:</u>										
Eragrostis multicaulis Steud.	.	.	.	.	+2	+	2.2	1.2	+	+2
<u>Kennarten d. Verbandes:</u>				0.7						
Polygonum aviculare L. coll.	.	+	(+)	v	+	+	+2	.	2.2	.
<u>Kennarten d. Ordnung:</u>										
Plantago asiatica L.	3.4	3.3	2.2	3.1	2.2	1.2	1.2	2.2	3.3	1.2
Sagina japonica Ohwi	.	+2	.	x	.	.	2.2	.	.	.
<u>Kennarten d. Klasse:</u>										
Poa annua L.	1.2	1.2	1.2	1.5	.	+	2.2	+2	2.2	2.2
<u>Begleiter:</u>										
Digitaria violascens Link	2.2	3.3	+	0.3	1.2	1.2	1.2	+2	+	1.2
Trifolium repens L.	3.3	2.3	+2	5.0	+2	+2	.	+2	+2	+2
				x						
Poa pratensis L.	+	.	+	1.8	+2	+2	.	+2	+2	+2
Taraxacum officinale Weber	+2	+	+	VIII	.	+	+	+	.	.
Sonchus oleraceus L.	.	.	+2	.	+	+	.	.	.	.
Phleum pratense L.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.
Agrostis palustris Huds.	+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.
Erigeron canadensis L.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.
Polygonum longisetum De Bruyn	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+

Außerdem je einmal in Aufn.Nr. HK 90: Agrostis hiemalis Britt., Sterns. et Poggenb. +; in 1123: Dactylis glomerata L. +; in 59: Agrostis stolonifera L. 0.2 I; in 847: Setaria autumnalis Ohwi +, Chenopodium album L. +; in 869: Rumex sp. +; in 1583: Eragrostis pilosa P.Beauv. +; in AO 1: Capsella bursa-pastoris Medik. +, Zoizia japonica Steud. +, Rumex acetosella L. +, Hydrocotyle maritima Honda +.

Fundorte: Aufn. Nr. HK 90 u. HK 91: Onnenai in Kushiro, Nr. 1123: Shibechea, Nr. 59: Date, Nr. 847 u. 869: Otofuke bei Obihiro, Nr. 1114: Shibechea, Nr. 1125: Yobito am Abashiri-ko, Nr. 1583: Yasumiya am Towada-ko.

Die älteren Vegetationsaufnahmen geben die durchschnittliche Menge und Frequenz der Pflanzenarten an, erhalten aus je 10 Probeflächen von der Größe 1 m² pro Bestand. Arabische Ziffern = durchschnittliche Menge. Römische Ziffern = mittlere Frequenz.

Tab. 2

Polygonum aequale-Matricaria matricarioides-Ass.

Nr. d. Aufn.:	92	2	155	75	74	72	903	132	66	63	62	61	60	58	1204	1388	1131	1282	925	1031	904	65	153	64	Toy	1	67	1308	1136	905	906	1558	A
Artenzahl:	12	11	9	7	12	6	6	9	9	9	8	7	7	10	14	9	11	10	6	6	8	6	9	8	8	8	11	11	11	10	8	12	8
Kennarten d. Ass.:	2.3	2.3	1.2	0.1	0.3		2.3	4.4	1.2			0.1	0.1		2.2	2.2	3.3	3.3	2.3	1.2	+	0.4	4.4		+2		3.3	2.2	1.1	2.3	3.4	+	
Polygonum aequale Lindm.	+			I	III			+	VIII			I	I		1.2				1.2	1.2		II											
Matricaria matricarioides L.																																	
Trennarten d. Ass.:																																	
Poa pratensis L.			1.2	1.3	0.2	2.2	+2	+2		2.4	27	1.0	0.6		+	+2	1.2	2.2	2.3		1.2	26	1.2	33		0.3	+		+2	2.2	+2	+	
Taraxacum officinale Weber	+	+	+	0.9		0.3		+	0.2	3.7	0.2	0.5		1.2	+2	+2	+	+	+	+	+		3.8		+	0.4	+	+	+				
				IX		II			II	X	II	III		IV									X			II							
Trennarten d. Subass.:																																	
Dactylis glomerata L.	+	+	+2	0.4	0.3	1.3	+	+	0.6	0.2	0.8	0.5	0.2	1.0												0.1							
				III	I	V			III	I	IV	III	I	VI												I							
Eragrostis multicaulis Steud.																									+	0.1		+2	3.3	1.1	+	+2	+
																									I								
Kennarten des Verbandes:																																	
Polygonum aviculare L. coll.	+	(+)	+2		1.3	0.3	1.1	+		3.2		0.6	0.2	0.4			1.2	1.2		+	+	0.2	+	2.1		0.5	+2	1.2			2.2		
Juncus tenuis Willd.	+														+2																		
Eragrostis ferruginea P.Beauv.																									0.2								
																									I								
Trennart des Verbandes:																																	
Trifolium repens L.	1.2	+	+	1.8	0.1	3.0	+		1.5	3.4	1.4	1.7	2.0	1.6	1.2	+2		1.2			1.2	1.8	+2	3.6		3.1		1.2	+2	1.2	+2	1.2	
				X	I	X			IX	X	VIII	X	X	VI								VIII		X		X							
Kennarten d. Ordnung:																																	
Plantago asiatica L.	2.3	2.3	2.2	0.1	1.9	3.5	2.3	+	1.0	1.2	0.9	0.6	1.7	0.7	2.3	3.4	2.2	1.2	2.3	2.2	2.2	3.2	+2	1.7		1.2	4.4	2.2	3.3	2.2	2.3	1.2	3.3
Sagina japonica Ohwi															+2															(+)	+		
Kennart d. Klasse:																																	
Poa annua L.	3.4	3.3	2.2	2.9	0.2			1.2			0.4		1.4	0.8	2.2	1.2	1.2	2.3	2.2	2.3		1.1	1.2		3.3	2.1	+2	+2	1.2	2.2	2.2	2.2	
				IX	II						IV		VIII	V								VII				X							
Begleiter:																																	
Digitaria violascens Link	2.2	+							0.9	0.1	0.2			0.6			+				+2					0.2	+2	+	1.2	+2	1.2	+	
Phleum pratense L.					1.3				VI	I	II			IV		+		+						0.2		+	0.3	+	1.2				
					VIII					0.7														I									
Echinochloa crus-galli P.Beauv.	+	+	+		0.1				0.3		0.1																		+	+			
v.caudata Kitagawa					I				III		I																						
Rumex obtusifolius L.		+			0.1					0.2																						+	
					I					I														+									
Polygonum longisetum De Bruyn	+				0.1										+														+			+	
					I																												
Chenopodium album L.																+	+	+						+				+					
Trifolium pratense L.		+												0.5										0.2									
														III										I									
Plantago lanceolata L.					0.2				0.2					0.3																			
					I				I					III																			
Capsella bursa-pastoris Medik.															+			+	r								0.2						
Agrostis palustris Huds.	+																										I						
Sonchus oleraceus L.															+	+																	
Digitaria adscendens Henr.									0.1																							+	
Amaranthus retroflexus L.									I									r	+														
Erigeron canadensis L.																	+												+				

Außerdem je einmal in Aufn.Nr. HK 132: Sisymbrium officinale Scop. +; in 1204: Geum aleppicum Jacq. +; in 58: Rumex acetosella L. 0.1 I; in 1388: Setaria autumnalis Ohwi +; in 904: Oxalis corniculata L. r; in 1558: Zoizia japonica Steud. +; Hydrocotyle maritima Honda +.

Fundorte: Aufn.Nr. HK 92: Onnenai bei Kushiro, Toyo 2: Toyotomi, 1515: Kamisarebetu, 75: Nayoro, 74: Okoppe, 72: Kitami, 903: Obihiro, HK 132: Akkeshi, 66: Asahigawa, 63: Furano, 62: Sunakaw, 61: derselbe, 60: Kuchan, 58: Date, 1204: Nemuro, 1388: Monbetu, 1131: Abashiri, 1282: Tokoro bei Kitami, 925: Touro, 1031: Nemuro, 904: am Fluß Tokachi bei Obihiro, 65: Asahigawa, 1531: Sapporo, 64: Furano, Toyo 1: Toyotomi, 67: Urakawa, 1308: Rand des Saroma-Sees, 1136: am Rand vom Abashiri-See, 905: Obihiro, 906: derselbe, 1558: Kayanohara in Hakoda, AO 2: Yasumiya am Towada-ko.

Tab. 3

Juncus tenuis-Eragrostis ferruginea-Ass.

Nr. d. Aufn.:	Y 20	Y 21	Y 23	Y 24	Y 17	Y 22	N 49	Y 10	Y 18	Y 19	Y 24	H 54	N 47	Y 1	Y 3	Y 4	Y 6	Y 7	Y 8	Y 9	S 25	N 56
Artenzahl:	7	5	5	7	6	6	7	6	6	5	6	8	5	5	7	7	6	6	6	7	7	9
<u>Kennarten d. Ass.:</u>																						
<u>Juncus tenuis Willd.</u>	3.3	3.3	4.4	+2	4.4	(+)	2.0 IX	1.2	3.4	2.2	4.4	d	3.0 X	3.3	4.4	4.4	4.4	4.4	+2	4.4	0.2 I	0.1 I
<u>Eragrostis ferruginea P.Beauv.</u>	.	.	.	(+)	+	5.4	4.2 X	3.3	+2	.	2.2	r	0.9 IV	1.2	1.2	2.2	2.2	1.2	.	1.2	3.6 X	0.5 II
<u>Trennarten der Subass.:</u>																						
<u>Paspalum thunbergii Kunth</u>	1.2	+	2.2	+2	1.2	+	0.5 III	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<u>Digitaria violascens Link</u>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.2	1.2	1.2	+	1.2	+2	0.7 VI	0.8 IV
<u>Kennarten d. Verbandes:</u>																						
<u>Polygonum aviculare L. coll.</u>	+	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2
<u>Eleusine indica Gaertn.</u>	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
<u>Kennart d. Ordnung:</u>																						
<u>Plantago asiatica L.</u>	3.3	2.3	2.2	4.4	3.3	2.3	2.6 X	2.3	3.3	3.3	2.2	a	4.3 X	2.2	2.2	2.2	1.2	2.2	2.2	3.3	1.6 VIII	3.9 IX
<u>Kennarten d. Klasse:</u>																						
<u>Poa annua L.</u>	1.2	1.2	1.2	2.2	+2	2.2	.	+2	1.2	2.2	+	r	.	1.2	1.2	2.2	+2	2.2	+2	+2	0.1 I	0.7 V
<u>Cynodon dactylon Persoon</u>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8 VI	.
<u>Begleiter:</u>																						
<u>Trifolium repens L.</u>	.	.	1.2	+2	1.2	+2	.	+2	1.2	3.4	+2	d	.	.	2.3	1.2	+2	1.2	+	+2	0.7 IV	1.8 VIII
<u>Pennisetum alopecuroides Spreng.</u>	.	.	.	.	.	.	1:6	.	+2	+2	.	.	.	.	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.
<u>Zoizia japonica Steud.</u>	.	.	.	.	.	.	VI	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.

Außerdem je einmal in Aufn.Nr. Y 20: Rorippa atrovirens Ohwi et Hara +, Rumex conglomeratus Murr. +; in N 49: Hydrocotyle maritima Honda 0.2 II, Kammerovia striata Schindler 1.0 VI; in Y 10: Capsella bursa-pastoris Medik. +; in H 54: Rumex acetosa L. r, Agropyron tukushiense Ohwi var. transiens Ohwi r, Erigeron canadensis L. r; in N 47: Lolium temulentum L. 0.4 II, Elsholtzia ciliata Hylander 0.4 II; in Y 9: Kalimeris pinnatifida Kitam. +; in N 56: Poa pratensis L. 0.4 II, Eragrostis pilosa P.Beauv. 0.1 I.

Fundorte: Aufn.Nr. Y 20, Y 21, Y 24, Y 17, Y 22, Y 10, Y 18, Y 19, Y 1, Y 3, Y 4, Y 6, Y 7, Y 8, Y 9: Futago am Fluß Tamagawa bei Yokohama; Y 23: Kosugi am Fluß Tamagawa bei Yokohama; N 49: Kanazawa; Y 24: Oofuna; H 54: Takasu in Hiroshima (Horikawa u. Miyawaki 1954); N 47: Turuga; 25: Himeji; N 56: Oodate.

Tab. 4

Carex incisa-*Juncus tenuis*-Ass.

	H	H	H	H	H	T	T	T	T	T	T	F	T	T	Yok	T	T	T
Nr. d. Aufnahme:	1	8	9	69	61	211	207	208	204	209	210	27	170	205	15	206	203	202
Meereshöhe in m:	1340	1230	1230	1230	1170	1673	1600	1600	1567	1500	1491	960	764	1394	150	1137	1130	900
Probefläche m ² :	8	5	1.5	2.5	0.3	200	40	40	25	40	40	5	1.5	8	6	8	12	5
Vegetationsbedeckung %:	85	90	100	70	40	40	40	70	60	40	40	40	80	70	80	70	80	60
Artenzahl:	2	4	5	6	6	4	3	5	5	7	6	7	3	4	6	9	7	8
<u>Kennarten d. Ass.:</u>																		
<i>Carex incisa</i> Boott	.	+	1.2	2.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	.	+2	3.3	2.3	1.2	3.3	+	+2	+
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	.	2.3	1.2	2.2	3.3	1.2	2.2	2.2	3.4	+2	1.2	1.2	3.3	3.3	2.2	.	+2	.
<u>Trennarten d. Subass.:</u>																		
<i>Carex albata</i> Boott	2.3	2.3	4.4	2.2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Digitaria violascens</i> Link	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	2.3	4.4	3.3
<i>Eragrostis ferruginea</i> P.Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+	+	1.2
<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	1.2
<u>Kennart d. Verbandes:</u>																		
<i>Polygonum aviculare</i> L.coll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<u>Kennart d. Ordnung:</u>																		
<i>Plantago asiatica</i> L.	4.5	3.3	2.3	3.3	3.3	4.4	3.3	4.4	3.4	3.4	3.3	3.3	2.3	3.4	4.5	3.4	3.3	2.3
<u>Kennart d. Klasse:</u>																		
<i>Poa annua</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	1.2	.	.	.	.	+	.	.
<u>Begleiter:</u>																		
<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb.et Zucc.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.
<i>Artemisia princeps</i> Pampan.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	+	+	.
<i>Geum japonicum</i> Thunb.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
<i>Agrostis clavata</i> Trin.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+
<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.

Außerdem je einmal in Aufn.Nr. H 9: *Rubus illeceborosus* Focke +; H 69: *Cirsium commonsum* Matsum. v. *sawadae* Kitam. +; in H 61: *Oxalis corniculata* L. r; T 209: *Ixeris dentata* Nakai +; T 210: *Polygonum nepalense* Nakai +; in F 27: *Kalimeris pinnatifida* Kitam. +; T 206: *Brachypodium silvaticum* P.Beauv. +, *Poa* sp. +; T 202: *Paspalum thunbergii* Kunth +, *Pennisetum alopecuroides* Spreng. +.

Fundorte: Aufn.Nr. H 1: Spitze des Komagadake im Hakone-Berg; H 8, 9, 69: Sattel zwischen dem Komagadake und Kamiyama im Hakone-Berg; H 61: Yunohanazawa im Hakone-Berg; T 211: Spitze des Hirugadake im Tanzawa-Gebirge; T 207 u. T 208: Tanasawano-Atama im Tanzawa-Gebirge; T 204: Spitze des Tanzawa-san; T 209: Ryugababa im Tanzawa-Gebirge; T 210: Togatake im Tanzawa-Gebirge; F 27: am Kawaguchi-See (Fuß des Fuji-san); T 170: Bodaitoge im Tanzawa-Gebirge (Aufn. v. T. Ohba u. N. Murase); T 205: Kinomata-Dainichi im Tanzawa-Gebirge; Yok 15: auf dem Tama-Hügel (Umgebung von Ikuta); T 206 u. T 203: Karasuoyama im Tanzawa-Gebirge; T 202: Komadome-Goya.

Eragrostis multicaulis-
Eragrostis ferruginea-Ass.

Außerdem je einmal in Aufn.Nr. N 30: *Erigeron linifolius* Willdenow 0.1 I; N 40: *Chenopodium album* L. 0.5 IV, *Stellaria alsine* Grimm var. *undulata* Ohwi 0.1 I; Ys 2: *Sonchus oleraceus* L. +.1; Y 33: *Taraxacum platycarpum* Dahlst. 2.2; S 37: *Eclipta prostrata* L. 0.1 I; S 10: *Amaranthus ascendens* Loisel. 0.1 I; S 3: *Paspalum distichum* L. 0.1 I, *Eragrostis pilosa* P.Beauv. 0.6 IV, *Cyperus microiria* Steud. 0.1 I; Y 30: *Astragalus sinicus* L. +; S 29: *Oxalis corniculata* L. 0.3 I; S 36: *Agropyron tsukushiense* Ohwi var. *transiens* Ohwi 0.1 I; S 33: *Imperata cylindrica* P.Beauv. 0.2 I; S 31: *Euphorbia pseudochamaesyce* Fisch., Mey. et Lallemand. 0.1 I; S 28: *Ranunculus ternatus* Thunb. 0.1 I; S 21: *Centipeda minima* A.Braun et Aschers. 0.1 I; S 60: *Oxalis corniculata* L. +, *Panicum repens* L. +.2, *Zoisa tenuifolia* Willd. +.2; S 12: *Rumex japonicus* Houtt. 0.6 IV, *Polygonum longisetum* De Bruyn 0.1 I, *Isachne globosa* O.Kt. 0.1 I; S 8: *Polygonum conspicuum* Nakai 0.1 I, *Agrimonia pilosa* Ledeb. 0.1 I; S 51: *Mazus japonicus* O.Kuntze +.2, *Scleranthium atlanticum* Bicknell. +, *Cerastium caespitosum* Gilib.var. *ianthes* Hara +.

Fundorte: Aufn.Nr. Ya-b u. Ya-c: Sendai (Aufn. v. Yoshioka,K. 1955); N 54: Mizusawa; N 52: Yuzawa; N 51: Koriyama; Ya-1: Sendai (Aufn. v. Yoshioka,K. 1953); N 46: Takayama; N 44: Iida; N 53: Shinjo; N 45: Iida; N 41: Numata; N 30: Toyohashi; N 40: Utunomiya; Ya-2: Sendai (Aufn. v. Yoshioka,K. 1953); Y 2, Y 12, Y 13 u. Y 14: Kosugi in Kawasaki; Y 22: Hashimoto bei Yokohama; Y 25: Futago am Fluß Tamagawa bei Yokohama; Y 32 u. 33: Oofuna; Y 35: Mutuai in Fusi-gawa; Y 36: Totuka; S 37: Choshi; S 10: Matuyama; S 4 u. S 3: Rityoshi; S 54: Totuka; S 55: Fujisawa; S 15: Inami; Y 30: Noborito in Kawasaki; S 29: Toyohashi; N 48: Takata; S 26: Sakurai; N 22: Numata; Y 29: Noborito; Y 37; Y 38 u. Y 39: Chigasaki; S 36, S 35, S 33, S 32 u. S 31: Oofuna; S 28: Nagoya; S 27: Kyoto; S 21: Hamada; S 20: Hiroshima; S 19: Susa in Yamaguchi-Präfektur; S 9: Kochi; S 60: Miyazaki; S 16 Shingu; S 12: Tokushima; S 8: Uwajima; S 7: Fukuoka; S 51: Ooita; S 53: Chigasaki; S 52: Noborito in Kawasaki; S 6: Isahaya; S 5: Nobeoka.

Juncetum macris Sissingh 1957, Tab.2

Juncetum macrois Sissin^gh 1957, Tab. 2