tenuifolia, Fisch. var. alba, Trautv. et, Mey. ナガホシシロフシモコウ 南野—224. *S. canadensis*, Torr. et Gray. var. media, Max. シロバナトウチサウ 月山、鳥海山—225. *Rosa multiflora*, Th. var. adenophora, F. S. ノイバラ、ノバラ(方言) 観音寺、狩川—226. *R. rugosa*, Th. ハナナス 酒田—227. *Pyrus Torings*, Sieb. ヤシモノ、ズミ 森片—228. *P. Aria*, L. var. kumaonensis, Wall. ウラシロノキ 松嶺、羽黒山—229. *P. Miyabei*, Sarg. (*P. alnifolia*, Koch.) アシキナシ 松嶺、湯田川—230. *P. sambucifolia*, Cham. et Schlecht. みやかなノカサヅキ、シヤマン(方言) 月山、鳥海山—231. *P. aucuparia*, Gaertn. var. japonica, Max. ナノカサヅキ 松嶺—232. *Photinia villosa*, DC. カマンカ、ヤナシ(方言) 観音寺

〔未完〕

黒岩恒氏採集琉球植物 (承第九十七號)

牧野富太郎

Mr. Hisashi Kuroiwa's Collections of Liukiu Plants. (Continued from

No. 97.) By Tomitaro Makino.

(23) *Aspidium* (*Polystichum*) Sp.

やへやまのを(田代安定氏) (した科) 小本ノ一羊齒ニシテ高サ四五寸其葉叢生シ葉軸細長羽片多數全葉ノ狀線形ヲ成ス其形貌頗ル英領印度地方ヨリ臺灣ニ産セル *Aspidium auriculatum* Sw. (四國産たちてんだハ或ハ此品乎) ニ類似ス予ハ不日其詳狀ヲ公布ス可キ期アルヲ信ズ ○入表島仲間村(明治廿五年八月十四日黒岩恒氏採、第一回ノ第廿號)

黑岩恒氏採集琉球植物

(24) *Thuarea sarmentosa* Pers. (= *Thuarea latifolia* R. Br.; *Thuarea media* R. Br.; *Thuarea involuta*R. Br.; *Ornithocephalochloa arenicola* Kunz.)

くろさはち(牧野) (禾本科) 禾本科ノ一族 *Panicaceae* 所屬ノ一植物ニシテ海濱沙丘ノ上ニ長ク匍匐シ節々鬚根ヲ下シ稈ハ瘠長ニシテ毛ヲ帶ビズ葉ハ披針形ニシテ兩面無毛タゞ其邊緣ニ糙澁毛ヲ生ズルノミ又小舌ハ上下ニ狹ク横ニ長クシテ毛多ク鞘ハ其緣邊ヲ除クノ外亦無毛ナリ花穗ハ横臥セル稈節ヨリ生ジテ朝上セル枝梢ニ在リテ穗下ニ佛燄狀ノ一苞ヲ具ヘ花穗ヲ擁セリ苞ノ外面ニハ疎毛ヲ布ケリ花穗ノ梗軸ハ擴張ノ頗ル肥厚トナリ前ハ縱溝ヲ成シ後ハ隆背ヲ成ス全面ニ白色ノ細軟毛ヲ密布シ穗長約ソ三四分アリ小穗ハ縱ニ一列ニ生ジテ梗軸ノ内側内ニ相駢ビ上部ノ四小穗ハ各二個ノ雄花ヨリ成リ最下ノ一小穗ハ雄花一個ト兩全花一個トヨリ成レリ穎ノ外面ニハ細毛ヲ生ジ雄蕊ハ三數ニシテ花絲ハ絲狀、葯ハ線形ナリ花柱ニ數子房ノ頭端ヨリ分出シテ子房ヨリ長ク密毛ヲ攢束シタル柱頭ハ花柱ヨリヤ、長シ穗軸ハ花後漸次ニ増大シ遂ニ中部ヨリ屈折シ全ク密ニ穎果ヲ掩蔽シ一ノ大粒ヲ成ス其狀極メテ奇ニシテ決メ他ノ禾本ニ於テ見ル可カラザル殊態ヲ呈ス

○石垣島四箇村海濱(明治廿五年八月九日黑岩恒氏採、第一回ノ第廿一號) ○琉球産ノ品ハ其葉上無毛ノ點ニ於テ他地方(濠洲、「マダカスカル」島、「ソサエチー」諸島并ニ「ニコバル」諸島)産ノモノト相異ナレリ然レ予ハ此ニ之ヲ一ノ特殊ナル變種ト認ムルノ極メテ早計タルヲ信ズルヲ以テ今之レニ論及スルヲ欲セズ

○此屬ハ單ニ *Thuarea sarmentosa* Pers. ノ一種ヨリ成ルト雖モ亦之ヲ其標徴ノ異同ニ徴シテ四個若クハ五個ノ異品ニ分ツテ得可シ其散布ハ廣ク前記濠洲、「マダカスカル」島、「ソサエチー」諸島并ニ「ニコバル」諸島ノ間ニ跨ガリ延テ我琉球ニ及ベルナリ黑岩恒氏ノ採集ハ始メテ我版圖内ニ之ヲ産スルヲ確

認セシメタルモノト謂フ可キナリ

(25) *Goodyera procera* Hook. (= *Neetia procera* Ker; *Goodyera carnea* A. Rich; *Cionisacrus lanceolatus* Breda; *Cordylestylis foliosa* Falconer; *Goodyera lanceifolia* Franch. et Sav.)

きんざんさう (らん科) 葉ハ有柄、葉面ハ長橢圓形ヲナシテ兩端漸次ニ殺ゲテ末尖レリ予ノ標品ハ花穗ヲ有セザル極メテ不完全ノモノナリ ○入表島仲間村谿間(明治廿五年八月十四日黒岩恒氏採、第一回ノ第廿一號b) ○本種ハ亦英領印度「チャバ」島、支那及ビ臺灣ニ産ス未ダ本邦内地ニ自生アルヲ知ラズ然レモ往々花戸ニ培養セラル、ヲ見ル

(26) *Triumfetta rhomboidea* Jacq. (= *Triumfetta angulata* Lam; *Triumfetta angulata* Lam. var. β . *acuminata* Wall; *Triumfetta Bortanica* Roxb; *Triumfetta trilocularis* Roxb; *Triumfetta vestita* Wall.)

がらのはらせんさう(田代安定氏) (しなのき科) 直立一年生本ニノ莖葉兩ニ粗毛ヲ被ムル葉ハ長柄ヲ有シ澗クノ淺ク三岐ス邊緣ニ鈍鋸齒ヲ駢列シ且ツ鈍頭ナリ而ノ底部ハ圓形ヲ成ス予ノ標品ニハ花ヲ有セズ且ツ極メテ不完全ナリ 石垣島四箇村(明治廿五年八月九日黒岩恒氏採、第一回ノ第廿二號) ○亞細亞、亞非利加及ビ亞米利加ノ熱帶地ニ廣布シ殊ニ亞細亞洲ニ在テハ英領印度、支那ノ東南部地方并ニ臺灣ニ在リ而ノ亦馬來諸島ニ産スルヲ知ル ○Bentham氏曰ク「花ハ細小、黃色ニノ葉腋ニ密集シ萼片殆ンド無毛長サルノ二英分アリ花瓣ハ微ニ萼片ヨリ長ク蒴ハ卵圓形或ハ圓シ凡ソ二英分アリテ滿面ニ生ゼル刺ノ間ニハ軟毛ヲ布ケリ刺ハ時ニ一英分ノ長アリ」ト記ノ以テ參考ニ供フ

(未完)