黑岩恒氏採集琉球植物

黑岩恒氏採集琉球植物 (承前)

牧野富太郎

Mr. Hisashi Kuroiwa's Collections of Liukiu Plants. (Continued from No. 96.)

By Tomitarō Makino.

(19) *Carpesium clossophyllum* Maxim. (Sect. *Conyzoides* DC.)

こやぶたばこ

(アヅ科)

高サ二尺以上ニ達シ本莖ハ直立シ上部ニ枝梗ヲ分チ莖面ニ毛ヲ布ケリ葉

ハ線狀長橢圓形ヲ常トシ有柄、互生、狹底、銳頭、小疎齒緣ニシテ兩面ニ軟毛ヲ被ル小頭花ハ硬直ナル

枝頭ニ頂生、獨在シテ且ツ點頭シ略、圓キ鐘狀ヲ成シ三分許ノ徑アリ花托平區、總苞鱗次シ最外ノ者ハ

葉狀ヲ成シ之ニ次グ者漸ク縮形シテ鱗狀ト成リ内部ノ者ハ鈍頭、篋狀舌形、略、硬質、膜緣、滑澤ニシテ

上部ノ邊緣ニ碎齒痕アリ小花ハ饒多細小ニシテ花冠ハ線形ヲ成セル子房ヨリ短シ兩全小花(♀)ハ其花冠

下部狹窄セル鐘狀ニシテ五裂シ裂片ハ花冠ノ四分一長アリテ稍、長キ三角形ヲ成シ銳頭ニシテ尖端稍、

厚シ而シテ裂片ノ外側面ニハ細微ナル腺粒ヲ附着ス雄蕊五數花冠筒ノ下部ヨリ出デ花絲ハ略、葯ト同長、

葯ハ少シク高ク花冠ヨリ超出ノ所謂聚成葯ヲ成シ葯胞ノ下端ハ菲薄片ト成リテ延出ス花柱、直ニノ直立

シ柱頭兩岐ノ篋狀舌形ヲ成ス而シテ聚成葯ヨリ稍、高シ雌性小花(♀)ノ花冠ハ下部狹窄セル長橢圓狀壺形

ニノ五齒緣ヲ成シ齒外面ニ細腺粒アリ花柱直立シノ狀柱頭ハ花冠ヨリ高シ瘦果ハ線形ニシテ表面縱ニ線條

ヲ引キ上部ハ狹窄ノ嘴狀ト成リ其周圍ニ腺毛ヲ纏フ ○石垣島四箇村(明治廿五年八月九日黑岩恒氏採、

第一回ノ第十六號り) ○該種ハ未ダ帝國版圖ノ外ニ産スルヲ知ラズ内地ニ在テハ九州四國并ニ本州ヲ

通シテ之ヲ見ル

(20) Japonice: Irohanoki.

スノハのゝ (新稱)

(何科ニ屬ス可キ乎)

灌木本ナラン嫩枝ハ圓柱形、瘦長、嫩枝ニハ短軟毛ヲ密

生ス然ル老成セバ直ニ無毛ト成ル葉ハ略ハ對生シテ三分許ノ葉柄ヲ具フ葉面ハ廣キ長楕圓形、全邊、淺

心臟底ニノ頂端ハ短ク狹出シ鈍頭ヲ成ス略ハ硬質ニシテ厚カラズ支脈ハ中脈ノ兩側ニ各ハ六七條ヲ斜出

シ緩ク彎曲シ細脈ハ支脈ノ間隙地ニ網狀ヲ結成ス嫩葉ハ脈上ニ毛ヲ帶ビ殊ニ脈腋ニ在テハ老葉ト雖モ尙

ホ毛ヲ具フ諦視セバ葉ノ表面ニ微細點ヲ滿布シ裏面亦此細點アリ以テ鏡下ニ其粗糙面ヲ窺フ可シ ○石

垣島四箇村 (明治廿五年八月九日黒岩恒氏採、第一回ノ第十七號) ○予ガ眼ニ新シキ本品ハ不幸ニノ

其唯一ノ標品ニ花實ヲ具ヘズ故ニ今其所屬ノ科名ダモ之ヲ知ルニ由ナシ予ハ更ニ完備セル標品ノ到ルヲ

俟ツテ之ヲ檢定センコト期スルナリ田代安定氏該標品ヲ見テ曰ク是レ土名まーやーぎ (猫木ノ義) ナラン

まーやーぎハ大戟科中 Phyllanthus 屬中ノ一植物ナリト姑ク記シテ參考ニ資ス

(21) *Pycnus polystachyus* Beauv. (= *Cyperus polystachyus* L. Br.; *Cyperus odoratus* Linn.; *Cyperus**fascicularis* Lam.; *Cyperus caespitosus*, Poir., *Cyperus subulatus* R. Br., *Cyperus brixæus* Presl; *Cyperus**Sonderi* Schmidt; *Cyperus teretifructus* Steud.; *Cyperus strigosus* Wright; *Cyperus corymbosus* Roxb.;*Cyperus filiformis* Heyne; *Cyperus bicarinatus* Heyne.)

いがいやつり (かやつりぐさ科) 一年生、根ハ鬚狀、莖ハ直立ノ數條科生シ下部ニ三四數ノ葉ヲ

具ヘ高凡ソ四寸ヨリ二尺ニ達シ細長ニノ三稜ヲ有シ稜上滑澤ナリ葉ハ通常莖ヨリ短クノ狹線形ヲ成シ

隆起セル一條ノ背脊ヲ有シ上端ハ長ク尖リ下部ハ長キ鞘ヲ成メ莖ヲ包メリ葉縁滑澤ニモ唯ハ尖端ノ兩邊

黑岩恒氏採集琉球植物

并ニ同部ノ背脊上ニ微齒ヲ疎列スル(即チ糙澁)ヲ認ム可シ苞葉ハ通常五六條ニノ平開シ細線狀ナリ而シテ最外ノ者最モ長ク花序ニ數倍ス纖維ハ數個ニノ短ク短縮シ下方ノ者ハ時ニ往々長ク出デ、此ニ複纖狀ヲ成形スルモノアリ(内地產ノ者此狀態ヲ具スルヲ多シ)梗ノ基脚ニ膜質ノ卷鞘ヲ具フ穗体ハ多數聚合シ相簇テ頭狀ヲ成ス小穗ハ平區、廣線形、鈍頭ニシテ約ソ十四—二十個許ノ小花ヲ有シ小軸ハ直クノ曲折シ稜アリ兩側ニ菲薄ナル狹膜翼ヲ具フ穎ハ兩列シテ相接近シ覆瓦狀ト成リ各片蘖色ニシテ表面紅染ス廣卵形ニシテ微尖頭ヲ有シ兩邊相疊ンデ舟狀ヲ成シ以テ穎果ヲ包ム兩邊薄質ニシテ龍骨部ハ三脈相接シ稍、厚クシテ且ツ綠色ヲ帶ブ雄蕊二數、葯ハ尖頭無ク線狀長橢圓形ニシテ底著シ花絲ハ絲狀ヲナシ上方稍、平區ノ薄ク葯ヨリ長シ子房ハ長橢圓形ニシテ兩側平區略、花柱ト同長ナリ花柱ハ菲弱ナル絲狀ヲ成シ柱頭兩岐シ亦絲狀ニシテ長サ花柱ト相均シ而シテ穎外ニ超出ス穎果ハ穎ノ半長アリテ長橢圓形ヲ成シ兩側面ヨリ壓區シ無柄ニシテ底部狹穿シ頭端ハ平截セラレテ花柱ニ連ル處微ニ突出ス暗質ニシテ表面ハ透明ナル殼質ヲ成シ稍、糙澁ス頭ニハ枯凋セル花柱ヲ戴ケリ ○石垣島四箇村原中(明治廿五年八月九日黑岩恒氏採、第一回ノ第十八號) ○全世界ノ溫熱地方ヲ通シテ沿ク之ヲ產シ殊ニ瀕海ノ地ニ生ズ本邦内地亦之ヲ產スルノ地ニ乏シカラズ ○從來多クノ學者本品ヲ以テ *Christiano Fries Rottböll* 氏著 *Descriptiones et Icones Plantarum*. (西曆一千七百八十六年鏤版) 中ニ圖說セル *Cyperus Polystachyos Rottb.* ニ充テ久シク其名ヲ以テ此植物ヲ呼ビタリキ近日 C. B. Clarke 氏 J. D. Hooker 氏著 *The Flora of British India*. 中ノかやくり科ヲ記述スルニ當リ馴致セル舊套ヲ踏襲セス Rottböll 氏ノ植物ヲ以テ本品ト全ク別ナリト爲シ *Cyperus subcapitatus Clarke*. ヲ以テ或ハ其品ナラント說ケリ Rottböll 氏ハ氏ノ植物ノ形狀ヲ記シテ "STAMINA 3.

(22) **Graminea spec.** Japonice: **Tashiroyoshi.**

黑岩恒氏採集琉球植物

日本藥局方植物篇

ムルニ由ナシ ○田代安定氏先キニ本品ヲ見出シ命ズルニいりおもてたけナル名稱ヲ以テス然レモ此品タル固ト竹類ニ非ズノ其天籍寧ロよし屬等ノ隸セル一族類ニ邇シ故ニ今竹類トノ混淆ヲ避ケンガ爲メニ其名稱ヲ改メ始メテ之ヲ採收セラレタル田代氏ノ姓ヲ冠セシメテ此ニたしろよしナル紀念名ヲ案出シ以テ之レガ呼稱ト爲セリ

(未完)

日本藥局方植物篇(前號ノ續キ)

澤田駒次郎

第九十六號正誤第七十行廿三字目テノ下舊ノ字ヲ脱ス

收穫 第六月開花スルニ方リ華本ヲ採集シ乾燥シテ貯藏ス英國藥局方ニハ新鮮ナルトキ華本ヨリ花ヲ摘取シテ乾燥シ或ハ食鹽ヲ混和シテ貯藏シ接骨木花水ノ製造用ニ供ス醫藥ニハ接骨木花水ノミヲ用フ

接骨木花ヲ醃藏スルニハ桶類ニ花ヲ詰メ其上ニ食鹽ヲ散布シ更ニ花ヲ並べ其上ニ食鹽ヲ散布シ花ノ層ト食鹽ノ層ト交互ニ堆積シテ數層ト爲シ壓チ施シ密閉シテ貯フト又乾燥シテ貯フルニハ華本ヲ採集シ堆積シテ暫時放置シ之ヲ搖動シ或ハ摩擦シ又ハ篩過スレハ花冠熱蒸シテ脆弱ト爲ルニ因リ輒ク脫離ス然ル後速ニ乾燥ス純良ナル接骨木花水ハ清朗ニシテ大氣乾燥ノ日ニ採集シ速ニ乾燥セシ花ヨリ製造スト云フ

性狀 新鮮ナル花ハ細小ニシテ其花冠白色ヲ呈シ一種特異ノ香氣ヲ有シ花ノ基礎部ニ二箇ノ墜落性ノ葉ヲ具ヘ基礎ハ下立性ニシテ三房ヲ有シ各房一箇ノ卵子ヲ懸生シ花柱矮短肥大シ三箇ノ柱頭ヲ有ス雄藥五箇花冠ニ附若シ葯ハ外向ニシテ上下凹陷シ其背部ノ中央ニ於テ花絲ノ頂端ニ附若ス乾燥ノ花ハ皺紋ヲ有シ濃褐黃色ヲ呈シ一種ノ香氣ヲ有スト雖モ生鮮ナル花ニ比スレバ稍々異ナリ味ハ苦クシテ稍々護謨ニ類似ス舊日本藥局方