植物學雜誌第九卷第九十七號

明治廿八年三月二十日

THE BOTANICAL MAGAZINE.

[Vol. IX.

March 20, 1895.

No. 97.]

神保氏採集ノ西伯利亞植物 (承前)

松村 任三

Verzeichniss der durch K. Jimbo in Siberien
gesammelten Pflanzen.

bestimmt

von

J. Matsumura.

Aceraceae.

Acer tegmentosum Maxim.

Hab. Im Süd-Ussuri Gebiet: bei Sspasskaja. Sterilis.

ウリハダカヘデ」ニ近似ノ品ナリ恨ラシハ其果實チ欠クナ

Acer tataricum L. var. *Ginnala Maxim.* = *A. Ginnala Maxim.*

神保氏採集ノ西伯利亞植物

Hab. Im Süd-Ussuri Gebiet: bei Spasskaja. *Surenlis sterilis*.

日本名カラコギカヘデ 本邦ニハ北海道岩代等
之ヲ産ス亦果實ヲ欠ク

Acer Mono Maxim. = *A. pictum Thunb.* var. *Mono Maxim.*

Hab. Bei Chabarowsk. *Sterilis*.

日本名イタヤカヘデ 本邦ノ山中隨處之アル
ノ品ナリ亦果實ヲ欠ク

Geraniaceae.

Geranium sibiricum L.

Hab. Chabarowsk. *Fructus maturus*. 22 Sept. 1894.

日本名イチゲフサロ 本邦ニハ北海道ニアリ

Geranium Wlassowianum Fisch.

Hab. An der untern Schilka: bei Tschassowaja; am obern Amur: unterhalb der Station Amasar. 31 Sept.

1894.

Florif. et fructif.

本邦ニ之ナシ實ハ熟シテ梗屈曲スルノ特徴アリ

Geranium eriostemon Fisch.

Hab. Am obern Amur: unterhalb der Station Amasar. *Specimen unicum floriferum*. 31 Sept. 1894.

日本名グンナイフサロ

Celastraceae.

Euonymus pauciflorus Maxim.

Hab. Im Süd-Ussuri Gebiet: Spasskaja. Fructus maturus. 31 Sept. 1894.

ニシキギ」ノ一種ナレモ外貌之ニ似ズ唯其實狀之ニ近キノミ此種枝ニ褐色ノ小突起ヲ滿布スルノ特徴アリ

Rhamnaceae.

Rhamnus davurica Pall.

Hab. Chabarowsk. Sarculus sterilis.

ナスカウジ」ノ一種ナリ葉狀邦産ニ異ナルコナシ

Leguminosae.

Melilotus suaveolens Ledeb.

Hab. An der unteren Schilka: Serebrianskaja. Fl. et fr. 4 Sept. 1894.

日本名シナガハハギ 本邦武相、埼玉等海邊ニ産スルノ品ナリ

Trifolium Lupinaster L.

Hab. Transbaikalien; Süd-Ussuri Gebiet; am oberen Amur; an der Schilka. Fl. Aug.-Sept.

日本名シヤジクサウ 本邦ニハ北海道、信州等之ヲ産ス

Trifolium repens L.

Hab. Chabarowsk.

日本名シロツメシサ

Astragalus sp. indetermin.

Hab. Transbaikalien; an der Schilka.

碧紫色ノ花數多相聚テ穗チナス美麗ノ品ナリ

A. versicolor Pall. ニ近似スルカ如シ

Oxytropis oxyphyllus DC.

Hab. Transbaikalien: Station Domnokijschewskaja. Fl. et fr. 15 Aug. 1894.

白質ニ紫斑アル花チ開シ美麗ノ小草ナリ

Vicia pallida Turcz.

Hab. An der unteren Schilka: bei Akina. Fl. et fr. 1 Sept. 1894.

日本名ヒロハノシサフヂ

Vicia Cracca L. var. *canescens* Maxim.

Hab. Am oberen Amur. Fl. 3 Sept. 1894.

日本名シサフヂ

本邦産ニ異ナル所ハ
葉ニ白毛アルナリ

Lespedeza bicolor Turcz.

Hab. Chabarowsk. Sterilis.

日本名 ハギ

花ナキノ標品ナレ
此物タルヤ明ナリ

Maackia amurensis Rupr. et Maxim. = Cladrastis amurensis B. et H.

Hab. Im Süd-Ussuri Gebiet; Chabarowsk. Fr. 31 Sept. 1894.

日本名 イヌエンシ

Rosaceae.

Prunus Padus L.

Hab. An der untern Schilka; am oberen Amur. Sterilis.

Spiraea sorbifolia L.

Hab. An der Schilka; bei Sstjetjensk. Fl. 22 Aug. 1894.

日本名 ホザギナノカヤド 本邦北海道ニ産ス

Spiraea salicifolia L. var. lanceolata Torr. et Gray.

Hab. An der Schilka; am Obern Amur. Fl. et fr. Aug-Sept.

日本名 ホザギシモツケ 本邦ニハ北海道・日光等ニ産ス

Spiraea media Schindl.?

Hab. An der Schilka; im Süd-Ussuri Gebiet.

Geum strictum Mil.

Hab. Chabarowsk; im Süd-Ussuri Gebiet. Fl. et fr. Sept.

日本名オホダイロムサウ

Sanguisorba officinalis L.

Hab. Transbaikalien; am oberen Amur: Omutrakai; im Süd-Ussuri. Fl. Sept.

日本名ワレモカウ

Sanguisorba tenuifolia Fisch.

Hab. Am oberen Amur: an der Schilka, Fl. Aug-Sept.

日本名シロワレモカウ

Agrimonia pilosa Led.

Hab. An der Schilka: bei Sstretjensk. Fl. et fr. 22 Aug. 1894.

日本名キンシビキ

Potentilla fruticosa L.

Hab. Transbaikalien: Station Dornokjutscheskaja. Fl.

日本名キンラウバイ

Potentilla chinensis Sieb.

Hab. An der Schilka; im Süd-Ussuri; am oberen Amur; Transbaikalien. Fl. Aug-Sept.

日本名カハラサトコ

Rubus Idaeus L.

Hab. An der untern Schilka: Karaganskaja. Sterilis.

日本名 ヲソイチロ

Rosa cinnamomea L.

Hab. An der untern Schilka. Fr. 2 Sept. 1894.

タカチハラ」ニ略々似タル所アリ

Crataegus sanguinea Mill.

Hab. An der Schilka; im Süd-Ussuri; Chabarowsk. Sterilis.

日本名 オホサンザシ

Crataegus pinnatifida Bge.

Hab. Im Süd-Ussuri Gebiet; Chabarowsk. Sterilis.

Pyrus baccata L.

Hab. Im Süd-Ussuri Gebiet. Sterilis.

妙高山植物採集紀

松田 定久

昨明治二十七年ノ夏此山ニ採集ヲ試ム別段珍ラシキコトアルニアラスト雖他日同山ニ登リテ植物ヲ集メ
ラレントスル人ニ便スルコトアランカト思惟シ其紀行ヲ草ス

妙高山一ニ妙香山ト稱ス越後國中頸城郡ニアリテ信濃ノ國境ニ接近シ其飯繩黒媛戸隠等ノ諸山ト相對峙シテ