特別講演 II

尿路結石と Ca 代謝

東京大学医学部泌尿器科学教室

東 原 英 二 奴田原 紀久雄

カルシウム (Ca) 含有尿路結石患者の Ca 代謝を検討した。講演は三部より構成され, (1) Ca 含有結石患者の尿中 Ca, 尿酸, クエン酸, 尿酸などを外来的に検査し, リスク・ファクターを検討した, (2) Ca と Na の一定食下に, Ca 負荷テストを行い, 血中イオン化 Ca を測定することにより, 糸球体濾過 Ca, 尿細管 Ca 再吸収率を計算し, 高 Ca 尿症の分類を腎に於ける Ca 動態より分析した, (3) クエン酸製剤の投与により腎に於ける Ca 代謝がどう変化するかを検討した。

I) Ca 含有尿路結石患者の Ca 動態の外來に於ける検討

Ca 含有尿路結石患者のうち, 単発者 (SSF, N=115), 多発又は再発者 (MSF, N=175) と尿路結石を有しない対照者38名を対象とした。自由食の状態を外來にて24時間蓄尿を行い, 蓄尿の翌日朝, 空腹時の採尿と採血を行った。動脈血のイオン化 Ca (Ca^{++}) も測定した。対照群と比して尿中 Ca は MSF で高かったが, SSF では有意差はなかった (図1)。尿中尿酸は男性結石患者では有意に高かったが, 女性患者ではそうでなかった。尿中クエン酸は女性の MSF のみ有意

に低値であった。尿中の尿酸・マグネシウム・リンは有意差がなかった。有意差のあった, Ca, 尿酸, クエン酸を用いて判別分析を行ったところ, 結石の多発者は判別分析得点は低かった (図2)。尿酸 Ca 結石の危険性を尿中物質の組成より計算した Tiselius の式¹⁾によって尿中・尿酸 Ca 活動積を計算した結果も同様であった。すなわち, Ca 含有結石の危険性の高い者は尿中物質より計算される尿酸 Ca 形成の危険性も高いことが示された。

以上より, 高 Ca 尿症は Ca 含有尿路結石患者でリスク要因になっていることが確かめられたので, 患者を高 Ca 尿症 (尿中 $\text{Ca} \geq 4\text{mg}/\text{日} \cdot \text{kg}$) を示す群と, 正 Ca 尿症に分けて検討した (表1)。SSF より MSF 群に有意に多くの高 Ca 尿症の患者が含まれていた。高 Ca 尿症群では, 有意に糸球体で濾過される Ca^{++} が高く尿細管で再吸収される Ca が低下していた。血中 Ca^{++} 値には有意差がなく, クレアチニン・クリアランス (Ccr) が高 Ca 尿症群で有意に高かったため, 糸球体で濾過される Ca^{++} が高 Ca 尿症群で高かったのは, 高い Ccr の為であると考えられた。一方, 尿中 Na 排泄量は高

図1 尿中 Ca 排泄量。SSF=単発結石, MSF=多発結石。

図2 尿中Ca, 尿酸, クエン酸を独立変数として判別分析を行い, 得られた判別式による各群のスコア.

表1 Comparison of various parameters between normocalciuria and hypercalciuria

	Normocalciuria	Hypercalciuria	P
Patients number Men/Women	115/48	98/29	NS
Age (years)	48.5±14.0	46.4±11.2	NS
Creatinine clearance (ml/min・1.73m ²)	88.9±22.0	103.3±22.3	p<0.01
Arterial blood calcium (mg/dl)	4.25±0.39	4.30±0.47	NS
Filtered calcium (mg/min・1.73m ²)	3.75±0.91	4.49±1.12	p<0.01
Tubular reabsorption of calcium(%)	98.1±1.1	97.2±1.3	p<0.01
Urine calcium (mg/day・kg)	2.71±0.80	5.44±1.41	p<0.01
Plasma m-PTH (pg/ml)	367±175	355±138	NS
Nephrogenous c-AMP (nmol/dl GF)	1.98±0.82	1.89±0.70	NS
Urine sodium (mEq/day)	190±74	249±80	p<0.01

Normocalciuria: Urine calcium<4mg/kg/day, Hypercalciuria: Urine calcium≥4mg/kg/day, Filtered calcium: Filtered ionized calcium, Tubular reabsorption of calcium: Fractional tubular reabsorption rate of filtered ionized calcium, Ca⁺⁺: Ionized calcium, m-PTH: Mid portion of parathyroid hormone.

Ca 尿症群で有意に高く, Na 過剰摂取による体液拡張とその為の Ccr の上昇が高 Ca 尿症群でおきていることが考えられた. 尿細管の Na 負荷が増えれば, 尿細管

での Ca 再吸収が抑制を受けることは知られているので, そのために高 Ca 尿症群では腎尿細管に於ける Ca 再吸収率が低下していることが考えられる. 尿中 NaCl 排泄量と尿中 Ca 排泄量には有意の相関があり (p<0.05), 食塩摂取の過剰は Ca 含有結石の危険因子の一つになることが示された.

II) 入院下低 Ca, 低 Na 食摂取後に行った Ca 負荷テストの結果

対象としたのは, Ca 含有尿路結石患者72名と原発性副甲状腺機能亢進症患者 (PHP) 9 名の81名. PHP 以外で Ca 代謝に障害のあることが知られている疾患や, 薬剤服用者及び Ccr≤70ml/min・1.73m²以下の者は除外した. 3 日間低 Ca(300mg/日)低 Na(100mEq/日)をとらせた後, 24時間蓄尿を行い, 4 日目朝に空腹時尿を採取した後, Ca 経口負荷テストを行った.

図3に示した分類で患者を分類した. 外來自由食下で尿中 Ca が4mg/日・kg 以上で, なおかつ低 Ca 食低 Na 食下で尿中 Ca>170mg/日を腎性高 Ca 尿症とした. 更に, 腎性高 Ca 尿症を示す者のうち, 空腹時の腎尿細管 Ca 再吸収率が97%以下の者を Tubular Type の Renal Hypercalciuria とした. 97%を超える者を Tubular Type でない Renal Hypercalciuria であると考え, Glomerular Type とした. 腎性高 Ca 尿症に該当しない者で, 経口 Ca 負荷後の尿中 Ca 排泄量が 0.250Ca/Cr 以上の者を Absorptive hypercalciuria

図3 結石患者のCa代謝の分類。本文参照。

とした。自由食下で尿中Caが4mg/日を超えていて、低Ca食下では尿中Ca $\leq$ 170mg/日で、Ca負荷後の尿中Caが0.250Ca/Cr未満の者は、Dietary Hypercalciuriaとした。以上の様に分類した結果、

Normocalciuria (NC)	16名
Dietary Hypercalciuria (DH)	16名
Absorptive Hypercalciuria (AH)	23名
Glomerular type renal hypercalciuria (RH)	11名
Tubular type renal hypercalciuria (RH)	6名

となり、それに9名のPHP患者に分類出来た。これらの6群間のCcrに有意差はなかった。このように分類した所、

結果-1 DHとAHは

a. NCに比して外來自由食下での食塩摂取量は高いが、血中Ca⁺⁺、糸球体濾過したCa⁺⁺及び尿細管Ca再吸収率には有意差がなかった。

b. 低Ca食下で尿中Ca量は低下し、NCとの間に差はなくなった。

結果-2 Glomerular Type RHでは、

a. NCに比して血中Ca⁺⁺と糸球体で濾過したCa⁺⁺量が高く、尿細管Ca再吸収率とTmPO₄は低下していた。

b. 低Ca食下で上記の有意差は消失したが、尿中Ca量は高かった。

結果-3 Tubular Type RHでは、

a. NCに比して、濾過したCa⁺⁺値は有意差はないが、尿細管Ca再吸収率とTmPO₄が有意に低く、

b. 低Ca食下でも尿細管Ca再吸収率は低く、尿中Ca量は高かった。

結果-4 PHPのCa代謝、PTH、nephrogenous

c-AMP、及びplasma Caが高いことを除いて、Glomerular Type RHと近似していた。

結果-5 PTHとnephrogenous c-AMPはPHP患者以外では有意な差はなかった。

それらを要約すると、

① RHはGlomerular TypeとTubular Typeに分けることができる。

Glomerular Type RHは血中Ca⁺⁺が高く、PHPのCa動態と近似しており、Tubular Type RHは尿細管Ca再吸収率が低下しており、尿細管でのCa再吸収障害が考えられる。

② Glomerular Type RHでは、病態生理学上、二次性副甲状腺機能亢進症は考えられず、又Tubular Type RHでは尿細管でのPTHに対する反応性の低下も考えられ、nephrogenous c-AMPは必ずしも上昇する必要がないことが考えられる。我々のdataではnephrogenous c-AMPは上昇しておらず、この結果は、RHでnephrogenous c-AMPが上昇しているのか、いないのかについての議論の解決に一つの示唆を与えるものと考えられる。

③ 低Ca食下の空腹時尿中Ca排泄率で、AHとRHを区別することが行われているが、多くの批判があるように、空腹時尿中Ca排泄率で両者を区別することは困難である。両者のfasting urinary Caに差のないことが今回の結果でも示された。tubular type RHの原因について、HypophosphatemiaとMetabolic acidosisが大きな原因として考えられる。これ以外に尿細管とりわけ接合尿細管のPTHに反応して上昇するCa再吸収が障害を受けている可能性も考えられる。この可能性については、現在検討中である。

III) クエン酸投与の効果

我々は、腎性高Ca尿症には酸塩基障害があること²⁾、及び、ダイアモックスを服用している緑内障患者は代謝性酸血症に陥っているが、それらの患者には尿細管でのCa再吸収低下があることを示し、かつクエン酸製剤がCa代謝異常を補正するのに有効であることを発表した³⁾。そこで、今回はCa含有尿路結石患者63名に約1カ月間クエン酸製剤を投与し、Ca代謝動態に与える影響をみた。

結果-1

1. クエン酸の投与によって、血液上の酸塩基平衡には影響を与えなかった。

2. 尿中クエン酸排泄量には上昇傾向があったが有意な変化はなかった。

以上は、クエン酸投与量が3.0g と少量であるためであると考えられるが、この投与量で、次の結果が得られた。

結果-2

Ccr は変化しなかったが、血中 Ca^{++} と濾過 Ca^{++} は低下し、尿細管での Ca 再吸収は上昇した結果、尿中 Ca は低下した。

結 論

クエン酸製剤は、濾過する Ca 量を低下させるので、Glomerular Type、又、尿細管での Ca 再吸収を上昇させるので Tubular Type にも有効であることが考えられた。アルカリ化作用により、イオン化 Ca を低下させ濾過 Ca 値を減少させること、近位尿細管での Intraluminal HCO_3 を増加させ Ca 再吸収を上昇させ

ること、接合尿細管の Ca 再吸収を上昇させること、などが考えられ、Thiazide よりも作用機序が多いといえる。

文 献

- 1) Tiselius, H.-G.: An improved method for the routine biochemical evaluation of patients with recurrent calcium oxalate stone disease. Clin. Chim. Acta, 122, 409, 1982.
- 2) Nutahara, K., et al.: Renal hypercalciuria and acidification defect in kidney stone patients. J. Urol., 141, 813, 1989.
- 3) Higashihara, E., et al.: Calcium metabolism in acidotic patients induced by carbonic anhydrase inhibitors: Responses to citrate. J. Urol., 145, 942, 1991.