P-329 糖尿病および利尿誘発性ラット膀胱体部muscarinic receptor変化の可逆性について

熊本大学¹⁾, Yale University²⁾

福本裕二¹⁾, 吉田正貴¹⁾, 釜井隆男, Robert M. Weiss²⁾,
Jamshid Latifpour²⁾, 上田昭一¹⁾

【目的】8週間のstreptozotocin(STZ)誘発性糖尿病および蔗糖水飲水による利尿はラット膀胱体部muscarinic receptorのupregulationを起こす事が報告されている。今回、一旦糖尿病および利尿誘発によって変化を来したラット膀胱muscarinic receptorが可逆的に回復するかどうかを検討した。【方法】雄SDラットを次の5群に分けた。1)糖尿病群(D群):STZ65mg/kgを静注。2)インスリン投与群(DI群):糖尿病誘発8週後より連日5~8単位のインスリンを皮下注。3)蔗糖水飲水群(S+群):5%蔗糖水を飲水。4)蔗糖水除去群(S-群):8週間蔗糖水を飲水させ、その後除去。5)対照群(C群)。16週間飼育後、膀胱を摘出し、^[3H]quinuclidinyl benzilate(QNB)をligandとして結合実験を行った。【結果】D群、S+群では多飲多尿、膀胱重量の増加を示し、^[3H]QNBの最大結合部位数(B_{max})は、それぞれ81%,34%の増加を認めた。S-群では、膀胱重量、B_{max}ともにC群とほぼ同等であった。一方DI群では、膀胱重量、B_{max}はD群より有意に低下したが、C群よりも依然高値であった。解離定数(K_D)は5群で有意差はなかった。活性薬carbacholによる^[3H]QNBの結合抑制実験で、すべての群においてcarbacholに対する高親和性および低親和性の2種類の結合部位を認めた。GTPγSの存在下でD群、S+群では、全結合部位に対する高親和性結合部位の割合はC群より有意に低下した。選択性ムスカリン拮抗薬pirenzepine, methoctramine, 4-DAMPの^[3H]QNB結合に対する抑制定数(K_i)は、それぞれ5群で有意差を認めなかった。【結論】16週間のSTZ誘発糖尿病および蔗糖水飲水による多尿はラット膀胱体部muscarinic receptorのupregulationを起こした。この変化は利尿を改善させる事により可逆的に回復したが、晩期インスリン投与では不完全であった。また糖尿病および多尿は、muscarinic receptor subtype特異性には影響しないが、受容体-G蛋白共役に変化を来す事が示唆された。

P-330 糖尿病および多尿ラット膀胱におけるムスカリニックレセプターの分布に関する研究

鳥取大学¹⁾ 鳥取県立中央病院²⁾ Yale University³⁾

斎藤源頭^{1,3)}, 中村勇夫²⁾, 宮川征男¹⁾, Jamshid Latifpour³⁾, Robert M. Weiss³⁾

【目的】STZにより誘発された糖尿病および多尿ラット膀胱においてムスカリニック受容体はアップグレージョンを示し、早期インシュリン治療ではこれが予防され、後期インシュリン治療では改善されることが知られているが、局在についてはほとんど知られていない。そこで糖尿病ラット膀胱の受容体分布を調べるためオートラジオグラフィーを用いて解析した。

【対象】ラットを16週間以下の群にて飼育した。1)STZにより誘発された糖尿病群 2)インシュリン治療群(発症後8週より開始) 3)シュクロース飲水による多尿群 4)シュクロース除去群(8週後除去) 5)コントロール群

【方法】各群のラット全膀胱を摘出し20μmの凍結連続切片を作成し、^[3H]QNBによる飽和結合実験pirenzepine, methoctramine, 4-DAMP, atropineの^[3H]QNBに対する結合抑制実験、およびオートラジオグラフィーを施行した。

【結果および結論】糖尿病群、多尿群ではムスカリニック受容体のアップレギュレーションを示したが、インシュリン治療群、シュクロース除去群ではこれの改善が見られた。また結合抑制実験では各群ともM2サブタイプが優位だった。オートラジオグラフィーより各群とも膀胱平滑筋層にムスカリニック受容体が存在するが、移行上皮、粘膜固有層、漿膜および結合組織には存在しなかった。また膀胱頂部は、膀胱三角部に比べ高濃度のムスカリニックレセプターが存在した。