P-461 頭蓋内hemangiopericytomaの両側腎転移の一例

国立仙台病院 泌尿器科¹⁾ 国立仙台病院 臨床検査科病理²⁾

武弓 俊一¹⁾ 大山 力¹⁾ 金藤 博行¹⁾ 吉川 和行¹⁾ 鈴木 博義²⁾
手塚 文明²⁾

hemangiopericytomaが頭蓋内に発生することは少なく、これからの腎転移はきわめて稀である。今回脳硬膜原発のhemangiopericytomaが両側の腎転移をきたした症例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。症例は57歳、男性。既往歴では47歳から脳腫瘍(血管成分に富むmalignant meningioma)として3回の摘出術と放射線治療を受けている。平成11年2月、血便が見られたため当院消化器科受診、出血は内痔核からと判明したが、腹部超音波検査、CTにて両側腎腫瘍、肝腫瘍を指摘され、当科に入院となった。腎動脈造影では、左腎中央外側、右腎上極および下極に遷延、遅延して濃染するhypervascular tumorを認めた。また腹腔動脈造影で肝に3カ所と十二指腸付近にも同様のtumor stainが認められた。両側の腎生検、肝生検を行い、脳腫瘍の標本と合わせて検討した結果、脳腫瘍は1993年のWHO分類のhemangiopericytomaで、その転移と診断された。右腎腫瘍に対してエタノールによる塞栓術を2回行い、左腎腫瘍に対して左腎部分切除術を行った。肝転移巣に対しては高周波熱凝固療法(RFA)を2回行ったが、CT上腫瘍の再増殖を認めたので、肝後区域切除、十二指腸壁腫瘍切除、根治的右腎摘除術を行った。

頭蓋内hemangiopericytoma 転移性腎腫瘍

P-462 遠隔転移を来したにも関わらず免疫療法が有用と思われた腎平滑筋肉腫の1例

東京都国民健康保険団体連合会 福生病院 泌尿器科¹⁾ 浜松赤十字病院 泌尿器科²⁾ けいゆう病院³⁾ 福生病院 外科⁴⁾ 慶應義塾大学 病理診断科⁵⁾

加藤 忍¹⁾ 石黒 幸一²⁾ 田野口 仁³⁾ 諸角 強英⁴⁾ 入久 巳⁵⁾

【症例】症例は59歳女性。平成8年11月12日人間ドックでの腹部超音波検査で偶然に左腎腫瘍を指摘され、精査加療目的で当科を紹介受診した。腹部CTでは、左腎上極に径7cmで、被膜が造影され内部に壊死を伴う腫瘍を認めた。腎悪性腫瘍を疑い12月5日根治的左腎摘出術を施行した。病理診断は腎平滑筋肉腫、pT2,N0,M0であった。以後遠隔転移を認め、当院外科で肝転移に対し、平成9年5月28日肝外側区域切除術を施行。同年6月IFN- α 500万単位を週3回より開始したが、肺転移をきたし、7月28日肺下葉部分切除術を施行した。肺転移の再燃を認め、9月よりIFN- α 500万単位週6回、IFN- γ 50万単位週3回の併用療法を開始した。IFN- γ を100万単位に増量したが、肺転移巣は、緩徐に増大し、平成11年6月よりテセロイキン 70万単位を8週間使用した。一時的に治療効果を認めたが、現在転移巣は増大し、患者はIFN- α の腫瘍内局注療法を行い経過観察中である。【考察】腎臓原発の平滑筋肉腫は希な疾患であり、予後不良とされている。術後遠隔転移を来したにも関わらず、免疫療法で約2年6ヶ月間生存している症例は、他に報告されていない。その治療経過について報告する。

腎平滑筋肉腫 免疫療法

P-463 経カテーテル的塞栓術を施行した腎血管筋脂肪腫の臨床的検討

防衛医大 泌尿器科¹⁾

朝隈 純一¹⁾ 水口 靖規¹⁾ 望月 勉¹⁾ 瀬口 健至¹⁾ 伊藤 敬一¹⁾ 宮嶋 哲¹⁾
吉村 一良¹⁾ 辻 明¹⁾ 小田島 邦男¹⁾ 浅野 友彦¹⁾ 早川 正道¹⁾

【目的】腎血管筋脂肪腫(以下AML)は、腎保存的に治療される例が増加してきている。我々は、経カテーテル的塞栓術で治療を行った腫瘍径4cm以上のAMLについて、臨床的検討を加えたので報告する。【対象と方法】対象は1995年以降当科で経験したAML7例(9腎)を対象とした。全例腫瘍径4cm以上。破裂をきたした2例は出血コントロール目的で金属コイルを用いて塞栓術を施行した。非破裂例の5例に対しては、エタノール、もしくはivaronを用いて予防的塞栓術を施行した。また両側のAMLは2例とも結節性硬化症を有していた。【結果】全例ともに良好に腫瘍血管は塞栓され、現在のところ再破裂、再出血等は認めていない。【考察】腫瘍径が4cm以上あるものは、破裂の危険性が高いため何らかの予防的処置が必要であると思われる。今回の検討でも2例は破裂を来してから治療を行っており、その場合には止血作用の強力な金属コイルが有効であった。非破裂症例でも塞栓術は、低侵襲でありその効果に関しても短期的には有用であると考えられるが、塞栓後の画像での経過観察、特に血管造影による評価が必要であると思われる。

腎血管筋脂肪腫 経カテーテル的塞栓術 腫瘍径4cm以上

P-464 透析腎に発生した腎毛細血管腫の1例

黒部市民病院 泌尿器科¹⁾

小泉 久志¹⁾ 野田 透¹⁾

症例は44歳女性で平成8年11月から慢性腎不全にて腹膜透析を受けていた。これまでに腹膜炎を2回発症しており、平成11年5月15日腹膜炎を発症し、内科に入院した。入院時のCT,MRI,USGにて右腎に腫瘍を指摘された。腎血管造影では下極にpooling像が認められ、血管腫が疑われたが、腎癌も否定できないため手術目的に泌尿器科に転科した。6月30日全身麻酔下にて経腰的に右腎摘出術を施行した。摘出標本の病理結果では下極付近に最大径1.0 x 0.8 cm大の境界明瞭な暗赤色充実性の腫瘍が認められた。組織学的に腫瘍は、内皮細胞と不規則な血管腔の集簇からなる血管腫様の病変であり、細胞の異型性は軽度であり、核分裂像も殆ど見られなかった。腎血管腫は比較的まれな疾患で本邦においては60数例の報告がこれまでになされている。その中でも毛細血管腫は数例にすぎない。若干の文献的考察を加えて報告する。

腎血管腫 透析腎