日本
泌尿器科學會雜誌
第十八卷
第一號

原 著

腎筋膜、腎脂肪囊ノ神經

(腎被膜ノ神經支配ノ續稿)

Dr. T. Ikeda : On the nerve supply of Fascia renalis and Capula adiposa renalis.

大阪華陽堂病院神戸診療所(院長井尻博士)

醫學士 池 田 統 治 郎

本 編 ノ 大 意

1
余ハ曩ニ、日本泌尿器科學會雜誌第十七卷第三號誌上、「腎被膜ノ神經支配」ナル管見ヲ公ニセシガ、以來該方面ノ研究續行中腎筋膜並ニ腎脂肪囊ノ神經ニ關スル短見ヲ得タルヲ以テ之ヲ客年十一月開催第一回近畿皮膚科泌尿器科學會席上ニ於テ標本ヲ供覽シツ、所見ヲ口述セリ。其後研究續行ノ結果ニヨリテ増補訂正ス可キ點多々アルヲ以テ茲ニ稿ヲ起シ、前記「腎被膜ノ神經支配」ニ對スル續編トナス。蓋シ、腎、腎被膜ノ神經支配ニ關シテハ前編ニ於テ其ノ大要ヲ盡セシヲ以テ此所ニハ其ノ補遺ニ價スルモノ、外、主トシテ腎筋膜、腎脂肪囊及ビ之ニ附隨スル密接ノ事項ニノミ與ル事トセリ。

目次

〔一〕、緒言

〔一〕、腎筋膜、脂肪囊ニ關スル解剖的事項ノ要約

(一)、後腹膜腔ノ概観

(二)、後腹膜腔ノ境界及ビ擴面

(三)、後腹膜腔内ノ血管、神經、淋巴管ノ概略

(四)、腎ノ周圍器官ニ對スル關係

(五)、腎ノ被膜

(六)、腎ノ繫定

〔三〕、自家所見

(一)、材料

(二)、材料採取

(三)、固定

(四)、裁斷

(五)、染色法

(六)、檢鏡所見ノ大要

〔四〕、内臓器官ノ疼痛發生、就中其ノ刺激傳達徑路

(一)、腦脊髓神經知覺纖維説

(二)、交感神經纖維説

(三)、副交感神經纖維説

(四)、内臓感覺ノ原因

(五)、内臓反射

〔一〕、緒言

腎ノ纖維性被膜ハ只腎ノ容積、内壓ノ保持調節ヲナスモノナリト云フ從來ノ見解以外ニ、又獨自ノ交感神經系ノ支配下ニアル器

官ナル事ハ曩ニ余ノ研究ニヨリテ明ニセラレタル所ナリ(日本泌尿器科學會雜誌第十七卷第三號參照)。從來僅ニ腎ノ繫定ヲナスモノト思惟セラレタル腎筋膜並ニ脂肪囊ガ近時、腎ノ種々ノ要約ノ下ニ於ケル自發疼痛、壓痛、觸覺ニ關聯シ重要ナル楔機ヲ司ルモ

イ、運動反射

ロ、感覺反射

ハ、營養反射

〔五〕、腎筋膜、脂肪囊ニ見出セル交感神經ノ臨床的意義

(一)、腎ノ疼痛ハ實在ス

(二)、腎ノ疼痛ノ原因

(三)、腎臟基因性内臓運動反射

(四)、感覺

(五)、營養

(六)、症候ヨリ見タル類症群

一、腹部全般ニ亘ル強烈ナル汎發性疼痛

二、痙攣様心窩部疼痛

三、慢性持續性心窩部疼痛

四、右側季肋部痙攣様疼痛

五、左側腸骨部疼痛

六、右側腸骨部疼痛

七、腰部並ニ側腹部疼痛

〔六〕、結論

〔七〕、文獻

〔八〕、英文抄録

〔九〕、附圖

ノナリトノ見解唱導セラレ、殊ニ内臟諸器官ノ自發疼痛ヲ觀察鑑別シ以テ臨床上ニ資セムトスル傾向著シキ今日、進歩セル神經學的研究方法ヲ以テ該部ノ神經支配ノ狀況ヲ闡明シ上述ノ見解ニ對スル解剖學の基礎ヲ確立シ置クハ泌尿器科學上重要ナル事ニ屬スルコト勿論ナリ。即チ本研究ノ目的ハ解剖學の根據ヲ求メテ臨床上ノ問題ニ資セムトスルニアリ。依リテ肉眼の解剖ノ大要ヲ明ニシ、次ニ自家研究ノ所見ヲ詳述シ之ヲ以テ生理學的、臨床の事項懸案ヲ考證シツ、結論ニ達セムトス。但シ本編ニ於テハ前編記載事項ト重複スル事項ハ一切之ヲ省略ス。

〔二〕、腎筋膜、腎脂肪囊ニ關スル解剖的事項ノ要約

一、後腹膜腔ノ概観

後腹膜腔 *Cavum retroperitoneale* ハ腹膜腔 *Cavum peritoneale* ノ外、後腹壁ニ沿ヒテ擴ガレル所、換言スレバ後腹壁ト腹膜囊 *Peritonealsack* トノ間ニアル場所ヲ云フ。此所ニ見出サル、臟器々官ニ種々アリテ、最初ヨリ存在スルモノトシテ腎、副腎、輸尿管、大動脈、下空靜脈、淋巴管、交感神經幹、二次的ニ見出サル、ニ至ル器官トシテ上行結腸、下行結腸、十二指腸、脾等ヲ認ム。

二、後腹膜腔ノ境界及ビ擴面。

後方ノ境界ハ後腹壁ニシテ其ノ正中ニ腰椎立チ、其ノ兩側ニ腰筋、方形腰筋、尙ホ横腹筋ノ起始部(腰脊筋膜ノ深葉)モ見出サル。腰椎ノ前面ニ横隔膜ノ腰部起始脚走リ、之ニ亞ギテ外側ニハ同ジク横隔膜起始ノ内側及ビ外側、兩個ノ腰肋弓ガ腰筋及ビ方形腰筋ヲ越エ張レルヲ認ム。其他、大動脈裂口、腰肋三角ヲモ認ム。前方ノ境界ハ、腹膜囊ノ背側板ナリ。其ノ擴面ハ上方ハ丁度腹膜ガ肝、胃、脾ノ方ヘノ移行部迄ヲ限界シ、下方ハ薦骨岬ニ至ル、此所ニ於テ後腹膜腔ノ結締組織ハ腸骨窩ノ結締組織ニ連絡シ、尙ホ側方ハ内腹筋膜ニ移行ス。

三、後腹膜腔内ノ血管、神經、淋巴管ノ概略。

大動脈ハ大體眞直ニ走リ、横隔膜ノ大動脈裂口ヨリ姿ヲ現シ、腰椎ノ前ヲ下降ス。腹部大動脈ヨリ發生スル動脈ヲ一括スレバ、下横隔膜動脈、腹腔動脈、上腸間膜動脈、下腸間膜動脈、腎動脈、内精系動脈、腰動脈等ナリ。次ニ下空靜脈ニ入ル靜脈ヲ一括ス

レバ、腰靜脈、内精系靜脈、腎靜脈、肝靜脈等ナリ。淋巴管ハ大動脈及ビ下空靜脈ニ沿テ進ミ、茲ニ多數ノモノハ錯走シ、且ツ其ノ間ニ淋巴腺ヲ交ヘテ腰部淋巴管叢 Plexis lymphaticus lumbalis ヲ作り、上方腹腔動脈ノ根元ニ至リ三ツノ大ナル本幹即チ左右二本ノ腰部淋巴管幹 Truncus lymphaticus lumbalis 及ビ一本ノ腸淋巴管幹 Truncus lymphaticus intestinalis ニ整理セラル。要スルニ此ノ部ニ流入スル淋巴管系ヲ一括スレバ、下肢及ビ骨盤腔器官ヨリノ淋巴管、腹壁深部大部分ノ淋巴管、腸ノ淋巴管、腎、副腎、横隔膜下面ノ淋巴管、胃、脾、肝、脾ノ淋巴管等ナリ。此部ニ見ラル、神經幹ト神經叢ハ大約次ノ如ク區分シテ觀察スル事ヲ得、即チ、交感神經幹(二本、腰椎ノ前ヲ走ル)、大ナル血管ニ沿ヘル神經叢、腹腔神經叢ニ入り來レル迷走神經ノ枝及ビ内臟神經、腰部ノ脊髄神經(第十二肋間神經、腸骨鼠蹊神經、腰鼠蹊神經、外精系神經)、交感神經幹ハ横隔膜腰部起始タル外側脚ト中間脚ノ間ヲ貫キテ下降シ、大内臟神經(第五乃至第八、若クハ第九胸部交感神經節ヨリ起ル)及ビ小内臟神經(第九若クハ第十乃至第十二胸部交感神經節ヨリ起ル)ハ上行腰靜脈ト共ニ中間脚ト内側脚トノ間ヲ通ル。大動脈ノ周邊ニハ全徑ニ亘リ交感神經叢 Plexus sympathicus aorticus ヲ作ル。此ノ神經叢ノ分枝ハ大動脈ヨリ發スル動脈ニ沿ヒ更ニ交感神經叢ヲ作り、是等ハ夫レ夫レノ器官ニマデ及ブ。其中最大ノ神經叢ハ腹腔動脈ニ沿フ腹腔神經叢 Plexus coeliacus ニシテ其中ノ腹腔神經節 Ganglion coeliacus ハ最大ナルモノナリ。

四、腎ノ周圍器官ニ對スル關係。

後側ノ關係ニ於テ、上方ハ横隔膜ニ下方ハ腰筋、方形腰筋、横腹筋ニ接シ、殊ニ腎ト方形腰筋トノ間ニ第十二肋間神經、腸骨下腹神經、腸骨鼠蹊神經走行ス。

又横隔膜ニ接セル部ノ彼方ニハ肋膜アリ。方形腰筋ノ上ヲ渡架シ臍弓ノ上方ニ位スル腰肋三角ナル部ハ抵抗弱ク腎膿腫等ガ肋膜腔内ニ破レ込ムニ際シ選マル、道ヲナス。腎ヲ前面ヨリ觀察スレバ左右兩者ニテ相違アリ。右腎ニ於テハ其ノ上端ニ副腎帽子狀ヲナス。コノ副腎ノ前面及ビ腎前面ノ上外側ノ大部分ハ肝ニ接ス。下端ニ近キ部ハ右結腸屈曲部ニ接觸シ、又内側ノ腎門ハ十二指腸ニ密接ス。更ニ上端及ビ副腎ノ前内側ニ沿ヒ下空靜脈走ル。左腎ニ於テハ其ノ上端内側ニ廣キ半月形ヲ呈セル副腎附着ス。左側副腎

前面ヨリ上端前面ニ涉リ、胃底部横ハル。腎門ノ附近ハ臍ノ尾部ト接ス。ソノ外側ニハ脾存シ、又下端前面ハ横行結腸終端ニ密接ス。上述ノ如キ關係ニ於テ腎ト他ノ器官ガ直接シタルモアリ、又腹膜ニ被ハレタルモノガ互ニ接セルモアリ。其レニ依テ腎ト他ノ器官トノ間ニ腹腔腔有無ノ關係ヲ生ズ。一般ニ腎ノ前面ハ腹膜ニ被ハルト云フヲ得可キモ又種々ノ腹膜葉ノ移行線アルヲ認ム。即チ右腎面ニ於テ上ニハ肝冠狀靱帶ヘ、内側ニハ十二指腸被膜ヘ、下ニハ横行結腸間膜ヘノ移行線ヲ認メ、左腎ノ上ニテハ横行結腸間膜ヘノ移行線横ニ走り、脾間膜ヘノ移行線上方ヨリ縦ニ走ルヲ認ム。

五、腎ノ被膜。

腎ノ直接表面ヲ覆フ腎包膜 *Capsula fibrosa renis* ハ二葉ヨリ成立シ外ニ在ルモノヲ纖維膜 *Tunica fibrosa* 内ニ在ルモノヲ筋膜 *Tunic muscularis* ト云ヒ纖維膜ハ強キ結締織性纖維膜ニシテ少量ノ彈力纖維ヲ含ム。腎門ニ入り込ミ、其所ノ血管周圍ノ結締織膜ニ移行ス。筋膜ハソノ結締織纖維中ニ多クノ細キ平滑筋纖維ヲ交ヘ、外ノ纖維膜トノ結合ハ極メテ緩徐ナルモ腎實質トハ強ク連結ス。腎門ヨリ腎竇ニ入り込ミ腎盂ノ外壁ニ連ル。

腎ノ周圍ニハ脂肪囊 *Capsula adiposa* アリテ腎及ビ副腎ヲ共ニ包被ス。該脂肪ハ後側ニ厚ク發育シ、前面ニ於テ發育弱ク、往々之ヲ見出ササルコトアリ。腎ノ外側縁及ビ内側縁ニヨク發育シ附近ノ脂肪層ト連絡ス。又腎門ノ所ヨリ此ノ脂肪ノ連續者ハ腎竇内ニ入り其所ヲ充ス。

腎脂肪囊ハ初生當時ニ於テハ孤在性脂肪塊トシテ存スルモ約十歳ニシテ脂肪囊ヲ完成ス。成人ニ於テハ淡黃色ノ濾胞性網狀 (*Lamellöse Geflecht*) ヲナシ脂肪ヲ以テ充サル。腎脂肪囊ハ多數ノ血管ヲ有シ腎ノ周圍ニ動脈及ビ靜脈ノ二層ノ血管叢ヲ形成ス。腎脂肪囊ニ供給セラレ從ツテ腎ヲ外部ヨリ圍繞スル動脈ハ上及ビ下副腎動脈、輸尿管動脈、精糸動脈、腰動脈ヨリ分岐シ來ル。靜脈ハ其ノ走行ニ於テ動脈ニ相似シ、下腔及ビ上腔靜脈及ビ門脈系統ニ屬シ、相互間ニ大ナル紛合ヲ形成ス。

腎筋膜 *Fascia renalis* ハ前記脂肪囊ノ上ヲ被覆スルモノニシテ前後ノ兩葉ヨリ成立ス。前腎筋膜ハ左右ノモノ、背柱前面ノ大血管ノ前ニテ互ニ連係ス。筋膜ハ此ノ内側ノ方ヨリ血管、輸尿管ノ前ヲ通り外側ノ方ニ擴リ、腎ノ前面ヲ斯基、其ノ外側縁ニ於テ後腎

筋膜ニ移行ス。後腎筋膜ハ腎ノ後側、方形腰筋膜、大腰筋膜ノ前ニ沿テ内側ニ行キ再ビ脊柱ノ前面ニ歸ル。腎筋膜兩葉ハ合シテ、外側ニテハ腹膜下筋膜ニ移行シ、上方ハ横隔膜下際ニ、下方ハ腸骨窩ノ腹膜下組織ニ連續ス。尙ホ此ノ腎筋膜ノ後側或ハ外側ニ周圍脂肪層有ルヲ認ム。以上ノ脂肪囊及ビ腎筋膜ハ副腎ヲモ包圍ス。以上腎ノ被膜ノ位置的關係其他ハ挿圖ニヨリテ大體ヲ知ル事ヲ得(第一圖)。

六、腎ノ繫定。

以上ノ事項ヨリシテ、腎ガ一定位ニ繫定セラル、ニハ何レノモノガ役立ツヤ自ラ明カナルモ亦茲ニ之ヲ要約ス。腎ノ前面ヲ被フ腹膜ハ腎ノ繫定ニ與リ、又腎ノ血管ガ腎ヲシテ相當ノ所ニ停マラシムルニ役立ツコトモ明カナリ。而シテ腎ノ位置固定ニ最も重要ナルモノハ腎筋膜ニシテ此レニヨリテ腎及ビ副腎ハ横隔膜及ビ腰椎ニ能ク繫定セラル。又副腎ノ被囊ガ内腹筋膜或ハ大動脈並ニ下空靜脈ノ周圍組織ト連結シ以テ副腎ノ繫定ニ役立つハ勿論、腎ノ繫定ニモ與ル。脂肪囊ハ直接腎ノ繫定ニ與ラザレドモ、急ニ脂肪ノ減却スル事アレバ腎ノ居所ニ弛緩ヲ來サシメ腎ハ自己ノ重量ノ爲ニ移動ヲ初ム。終ニ腹腔内壓ガ腎位固定ニ役立つ事モ事實ニシテ妊婦ガ出産後腹壁ニ弛緩ヲ來シ、腎ノ移動ヲ來ス如キ好例ナリ(第一圖参照)。

〔三〕、自家所見

一、材料。主トシテ動物就中、家兎、犬、鼠ヲ用ヒタリ。前編記載ノ所見ガ主ニ家兎ヲ材料トシタルモノナリシ關係上、且ツハ實際研究ノ際ノ便宜上、當編記載ノ所見ハ家兎ヲ材料トシテ檢索シタルモノナリ。

二、材料採取。前記解剖的概略ノ關係ヲ知悉シタル上ニテ着手ス可キハ勿論ナリ。即チ腹膜、腸管、脾、脊髓、筋膜並ニ腎ヨリ所要材料ヲ剝離スルニ際シ原形ヲ破損セザル様留意スルコト勿論ナリ。最も便利ナルハ腎ヲ被膜(腎筋膜、脂肪囊)ヲモ含ムト共ニ剔出シ其儘固定液中ニ投入シ、固定完了後所要材料ノミヲ採取スルナリ。

三、固定。フオルマリン固定法ニヨル。腎筋膜ハ大ナル犬ニテハ稍々強靱、小犬、家兎、鼠ノ順ニ次第ニ菲薄トナル。脂肪囊モ同様ナル關係アル外ニ該動物個々ノ榮養狀態ニヨリ甚敷懸隔アリ。從テ固定ニ要スル時日等一定スルヲ得ズ。經驗ニ徴シ成果ヲ

得ルノ外ナシ。

四、裁斷。固定終了セバ所要材料ヲ爾後ノ操作並ニ標本作製ニ適スル大サノ細片トナス。蓋シ腎筋膜ト腎脂肪囊ヲ別々ニ染色シ又ハ脂肪囊ノ如キハミクロトームヲ用ヒテ染色ヲ試ミタル際ニ、此ノ間ニ最モ有意義ニシテ、目的ニ適スル方法ヲ發見セリ、即脂肪囊ノ周邊部即脂肪塊ノ最モ非薄トナリテ腎筋膜ニ移行セムトスル部ヲ選ブ時ハ之ヲ染色シテ兩者ヲ兼有スル原形ノ標本ヲ得ルコトナリ。ミクロトームヲ用フレバ染色ニ便ナレドモ原形ヲ失シ、自然ノ所見ヲ得ルニハ幾多ノ困難ヲ生ズ。カクテ兩者即チ腎筋膜、脂肪囊ヲ同一標本内ニ檢シ得ルヲ以テ同時ニ兩者ノ神經支配の關係ヲモ一目ノ下ニ自然ノ態ニ檢シ得。脂肪囊ノ周邊ヲ選メバ腎筋膜ハ元來菲薄ノモノナルヲ以テ固定ニ長時日ヲ要セズ操作ハ比較的の便利ニ遂行セラル。菲薄ナル部分ニ於テ固定ノ度ヲスゴセバ往々皺襞ヲ生ジテ爾後ノ操作ヲ不便ニ陷ラシムル事アリ。脂肪囊ノ末端即脂肪ト其ノ支柱組織ト腎筋膜ノ三者兼有ノ材料ヲ同時ニ銀染法ニ供スト雖モ決シテ支障ヲ來スモノニ非ズ。銀ハ撰擇的ニ神經要素ノミヲ染出スルモノナリ。挿圖第二ニ就テ見ルモ明カナリ。

五、染 法。

大體ニ於テ前編同様ノ法ヲ用ヒタリ。腎筋膜、腎脂肪囊ノ神經ニ關シテハ記載セラレタルコト極メテ少ク、余ノ寡聞ナル其ノ文獻ヲ見出サズ。依テ神經要素ノ有無並ニ其ノ概略ヲ染出スルニ適セリトセラレタルグロス氏法ヲモ兼ネ行ヒ、然モ此ノ目的ニヨク適ヒタルヲ以テ左ニ該法ヲ詳記ス(爾餘ノ方法ニ關スル記載ハ前編ニアリ)。

(イ)、固定材料ヲ二〇%ノ硝酸銀液ニ一時間。

(ロ)、二〇%ノフォルマリンニ數回通ス。(フォルマリン液ヲ取換ユルヲヨシトス。又沈降炭酸カルテウムヲ加ヘ中性ニナシタルモノヲ用フレバ良果ヲ得トセラレタルモ著シキ差アルモノニアラズ。

(ハ)、次ノ液ニ持チ來リ絶エズ顯微鏡下ニ神經要素ノ顯出ヲ注視ス。二〇%ノ硝酸銀液ニ數滴ノ強アンモニアヲ加フ。(ビルシヨウスキー氏アムモニア銀ヲ作ル際ニ同ジ)此際黑變スル迄染メヨト云フ者アレドモ當ヲ得タル言ニ非ズ。顯微鏡下ニ於テ注視

シツ、調節スルヲヨシトス。是レ創始者グロス氏ノ指示スル所ナリ。

(ニ)、二〇％ノアンモニアニ移ス。一分間。蒸餾水洗。

(ホ)、蒸餾水一〇ccニ水醋酸一二滴ヲ加ヘシモノニ投入ス。半時間内外、數時間ニ渉ルモ支障ナシ。

(ヘ)、蒸餾水一〇ccニ一％鹽化金液五滴ヲ加ヘシ液ニ移ス。

(ト)、五％ノ固定ナトロン(Fixation)ニ約一二分間。

(チ)、蒸餾水洗(甚敷汚染セル水ニアラザル限り、水道水若クハ井水ニテ却ツテ良果ヲ得ル事アリ。)

(リ)、酒精ニテ完全ニ脱水。

(ヌ)、カルボールキシロールニテ透明ニス。

(ル)、キシロールバルサムニテ包埋ス。

本法ノ骨子トスルハ(一)、切片ノ薄キコト。(二)、反之シ硝酸銀液ノ濃厚ナルコト。(三)、從ツテ他ノ藥液モ濃厚ナルコト。

(四)、所要時間ノ短キ事、固定材料ヲ得タル後三時間若クハ四時間ニテ標本完成ス。但シ各要素ノ微細構造ヲ示サズ。故ニ目的材料中ニ神經要素ヲ含メリヤ否ヤ又其ノ大樣ヲ探究スルニハ好適ノ方法ナリ。以下ニ記述スル所見ハ該染法ニヨリテ豫備的概略所見ヲ得更ニカハール氏染法ニヨリテ微細構造ヲ追及シテ得タルモノナリ。

六、檢鏡所見ノ大要。

(一)、腎筋膜ニ於テ染出セラル、モノハ之ヲ構成スル結締組織層及ビ之ニ分布セル動脈及ビ靜脈、神經要素ナリ。脂肪囊ニ於テハ銀ハ撰擇的ニ脂肪其物ヲ染色セズ濾狀ニ脂肪細胞被膜ヲ鮮明ニシ且ツ之ニ分布セル血管並ニ神經要素等須要ノモノハ完全ニ染出セリ。但シ厚キ脂肪層ヲ材料ニ供シタル時ハ細胞被膜ノ厚キ層ヲ得ル故ニ視野ノ暗化スルハ勿論ナリ。故ニ余ハ前記ノ如ク脂肪層ノ周邊部ノ極メテ菲薄ナル部ガ筋膜ニ移行スル部ヲ撰ミタルヲ以テ如上ノ所見ヲ一枚ノ標本中ニ纏メ得タリ(第二圖參照)。

(二)、右ノ中血管ニツキテノ所見ハ Voelcker-Wossidlo 兩氏共著 Urologische Operationslehreニ記載圖示スル所ト全然一致スル

ヲ以テ省略ス。

(三)、腎筋膜、腎脂肪囊ノ兩者ハ一言ニシテ云ヘバ豊富ナル神經ノ供給ヲ受ク。

(四)、神經ハ之ヲ血管ニ隨伴スルモノト全然獨立走行ヲナスモノトノ二種ニ區別スルヲ得。

(五)、血管ニ隨伴スルモノハ走行徑路、分岐、幅員ノ變遷等ニ至ル迄全然血管ト相一致平行シ其狀恰モ影ノ形ニ添フガ如シ(第二圖參照)。

(六)、其ノ組織單純平滑ナル腎筋膜ニ於テ血管ニ隨伴セザル神經ハ恰モ腸管ニ於ケルアウエルバツハ氏叢、マイスネル氏叢狀ニ排列セラル(第三圖參照)。血管ニ乏シキ部ニ於テハ從ツテ血管ニ隨伴スル神經ノ爲ニ混亂セザル爲ニ特ニ明瞭ニ之ヲ認メ得。脂肪囊ニ於テモ同様ノ關係ニアレドモ其ノ層ニ厚味アルヲ以テ血管ニ隨伴スル神經ノ間ニ介在シ、血管ニ隨伴セザル神經ハ籠ノ目狀ニ排列セラル。

(七)、血管ニ隨伴スル神經ニ就キテノ所見ハ一般ノ血管隨伴神經ニ於ケルト同様ナリ。故ニ之ヲ省略シ以下血管ニ隨伴セザル神經ニツキテ、腎筋膜、腎脂肪囊ニ共通的ニ叙述スルコト次ノ如シ。

(八)、神經纖維束ハ其ノ大小廣狹ニ無數ノ階段アリ且ツ之等ヲ構成セル神經纖維其物ニ就キテモ形態、數、走行樣式、分岐方法ニ多種多樣ヲ示ス。

(九)、纖維束ハ所々ニ於テ即チ斷續的ニ極メテ菲薄ナル被膜ヲ有ス。

(十)、殆ンド總テレマーク氏纖維ヨリ成リ稀ニ有髓纖維ヲ含ム纖維束アリ(第五圖參照)。

(十一)、レマーク氏纖維ハ普通種々ノ厚味ヲ有シ、又一見菲薄ノ被膜ニ被ハレタルガ如ク見ユ、其ノ被膜ハ被膜細胞核ノ散見ニヨリテ知ラル。

(十二)、レマーク氏纖維ハ全ク平滑ナルコト稀ニシテ多クハ瘤狀膨大部ニヨリテ點綴セラル、該點ハ恰モ有髓纖維ノ髓鞘ヲ失ヘルモノ及ビ之ヨリ分岐セルモノト辨別シ得ル特徵ナリ。

(十三)、有髓神經纖維ノ獨立シテ存在スルモノナク必ズレマーク氏纖維ト共ニ一ツノ纖維束中ニ含マル。其ノ軸索ハ比較的偉大ナルモノニシテ蜿々トシテ走行スレドモ次第ニ分歧シ纖維化シ腎筋膜結構組織若クハ脂肪細胞被膜間ノ結構組織ニ終末ス(第五圖参照)。

(十四)、相當ニ大ナル神經纖維束ニシテ分歧シテ個々ノ纖維束トナリ暫時走行シテ再ビ相接近シ遂ニ相重ナリ交錯スルモノヲ見ル(第四圖参照)。

(十五)、有髓神經纖維ニ於テモランビエ氏絞窄ノ規則正シキ存在ハ認メ難シ。中樞性ノモノナリヤ否ヤハ急ニ決定シ難シ、何トナレバ交感神經纖維ニシテ有髓ノモノアリ又中樞性ニシテ無髓ニ變化スルモノアルヲ以テナリ。

(十六)、其ノ走行中ニ瘤狀膨大部ヲ有スルモノハ明ニ交感神經性ノモノナルガ、此ノ膨大部ノ點綴ハ其ノ纖維ノ終末直前迄襲踏シ來ル事アリ(第六圖参照)。

(十七)、已述アウエルバツハ氏叢、マイスネル氏叢狀排列ヲナセル纖維束ノ分歧點ハ恰モアウエルバツハ氏叢等ノ網目即チ Plexus ニ相當スルモノ、如ク、小型細胞ノ密集並ニ纖維ノ分裂交錯ニ富ミ、一見小型細胞密集團ハ一ツノ Plexus ニシテ之ヨリ無數ノ神經纖維ヲ派セルノ觀アリ(第六圖参照)。此所ニ云フ小型細胞ナルモノハ前項所記ノ瘤狀膨大部ノ稍々大ナルモノニ相似ナル點ヨリシテ是等ハ神經纖維走行中ニ介在セルミクロガングリアト謂フ可キモノト思考ス。(此ノ所見ニ附キテハアウエルバツハ氏叢ノ排列並ニ神經細胞ノ微細構造ニ關スル業績中ニ余等ノ考究セシ所ナリ(東京醫事新誌第二四一四號参照)。

(十八)、已述ノモノ、外、此ノ部ニ特有ナリト思ハル、神經纖維終末裝置ヲ見出サズ。

如上腎筋膜、腎脂肪囊ニ就テ肉眼的解剖學的已知ノ事實ト此所ニ存在アル神經要素ニ關スル神經組織學的新知見ノ大要ヲ略述シタルヲ以テ次ニ該器官ニ懸レル臨床上ノ諸問題ノ考證ニ論及スルニ先チ内臟ト交感神經トノ間ニ起ル生理的機能並ニ現象ヲ吟味スルノ必要アリ。其ノ中茲ニ最モ緊要ナルハ、

〔四〕、内臟器官ノ疼痛發生、就中其ノ刺戟傳達徑路

ノ問題ナリ。一般ニ或ル刺激ガ知覺神經ヲ興奮セシメ之ヲ上行性ニ腦ニ傳達シ茲ニ疼痛ナル感覺ヲ發生スルモノナリ。胸部並ニ腹部ノ内臟諸器官ガ切斷、切開、縫合、燒灼等ノ刺激ニ對シ鈍感ナルコト古來周知ノ事ニシテ之ヲ實驗的研究ニヨリ證明シタル者ニ Haller (一七五三)、Bichat (一八〇一) 等。Reid (一八一) 氏ハ該事實ヲ説明シテ、交感神經節ノ有スル感覺衝動抑制機能ニヨリ其ノ感覺ノ一部ヲノミ傳達スル爲ナリト云フ。吾人ハ日常臨床上内臟疼痛ヲ起ス疾患ハ多數存スルコトヲ經驗スルヲ以テ、是等ノ器官ニ疼痛ヲ感ズル神經ノ存在スルコトヲ承認スト雖、今日迄ノ解剖學的所見ヲ以テスレバ、内臟ニハ腦脊髓神經ノ分布ヲ認め難シト云ヘバ、如何ナル徑路ヲ以テ内臟刺激ガ腦ニ達セラル、ヤノ問題ヲ生ズ。コレニ關シ最近迄ノ進歩ヲ以テシテ大凡三ツノ見解アリ。

(一)、レンナンデル (Lennander) 氏、ウィルムス (Wilms) 氏ノ研究ニヨレバ内臟知覺ハ腦脊髓神經ニヨリテ傳達セラル、モノニシテ内臟外科家ガ日常經驗スルガ如ク腹部内臟及ビ臟器腹膜ハ局所麻醉ノ下ニ器械的溫熱的電氣的刺激ニ對シ全く無感覺ナルモ、體壁腹膜ハ腦脊髓神經支配ノ下ニアリテ皮膚ニ於ケルト同様ノ疼痛覺ヲ有ス。從テ内臟疾患ノ疼痛ハ内臟自身ノ刺激ヲ以テ内臟自身ヨリ發セラル、モノニ非ズシテ内臟ト密接ノ關係ニ立テル内臟外組織ニ刺激ヲ及ボスガ故ニ疼痛ヲ發スルモノナリ。即チ體壁腹膜及ビ腹膜上層ノ弛緩性結締組織或ハ體壁胸膜等ハ腦脊髓知覺神經ヲ有スルガ故ニ、同時的ニ此部ニ刺激及ビテ疼痛ヲ感ズルモノナリトノ結論ヲ下セリ。同氏等ハ腹痛ノ原因トシテ體壁腹膜ノ移動、伸展、壓迫ヲ舉ゲ、急性及ビ慢性炎衝ニ於テハ淋巴管炎ニヨリテ腹膜ノ感覺ハ鋭敏化シ、胃腸ノ強直ニヨリテハ反射的ニ腹壁ガ強直ヲ起シテ疼痛覺ノ原因トナルト云フ。次ニウィルムス (Wilms) 氏ハ人間及ビ動物ノ小腸間膜ニ於テ胃腸ノ近接部ニ腦脊髓知覺纖維ヲ證明シ此部ヲ伸張スレバ疼痛ヲ起ス事ヲ實驗シ内臟疼痛ハ總テ腦脊髓知覺神經ニヨリテ傳達スルモノナリト云ヘリ。然ルニ鉛毒症性痙攣ハ全ク腸強直ヲ起サズ腸間膜ノ與ラザルコト、又ハ腸間膜動脈ノ血量不足ノ爲ニ起ル腹部劇痛ノ際ニ知覺神經ヲ刺激スルガ如キ變化ヲ伴ハザル事等、腦脊髓神經說ノミヲ以テハ説明シ盡サル事項ノ存スルアリテ、他ニ内臟刺激ヲ腦ニ傳達スルノ徑路ヲ設定セザル可カラザルニ至レリ。

(二)、交感神經刺激說。

マッケンジー(Mackenzie, 1911)氏、ヘッド(Head, 1898)氏、ミューラー(R. L. Müller, 1920)氏ノ三者ニヨリテ開拓セラレタル說ニシテ、交感神經ノ知覺纖維ガ刺戟ヲ受ケ脊髄ノ神經細胞ニ達シ、其所ヨリ腦脊髄知覺神經ヲ傳ハリ、腦ヲ刺戟シ疼痛感覺ヲ起サシムト云フ。蓋シ舊來、カスト(Kast, 1909)氏、メルツェル(Melzer, 1909)氏、リッテル(Ritter, 1908—1909)氏等ニヨリテナサレタル實驗即チ、内臓ニ器械的若クハ其他ノ刺戟ヲ加フルモ疼痛ヲ感ゼズト云フハ交感神經ノ事ヲ念頭ニ置カズ從ツテ開腹後是レヲ傷ケタルガ爲ニ陰性ノ結果ヲ得タルナリト云フ。其後此說ヲ贊同肯定スル多數ノ實驗成績發表セラレ、内臓交感神經ガ刺戟ヲ求心性ニ傳導スルモノナルコトヲ確定セリ。ブリュニング(Bruning)氏ハ腹腔神經ヲニコチンヲ以テ麻痺セシメタル後腸粘膜ヲ鹽化バリウムヲ以テ刺戟シ強直ヲ起サシムルモ疼痛ヲ感ゼザルニ、此際腸間膜ヲ牽引シテ脊髄神經ヲ刺戟スレバ痛覺ヲ起ス事ヲ認メタリ。ブラウン氏及ビカツピス氏ノ方法ニ從ヘバ大内臓神經ヲ、レーヴェン氏ニ從ヘバ交通枝ノ浸潤麻醉ヲ施セバ吾人ハ胃腸ヲ全然無感覺ニナス事ヲ得。ミューラー氏ハ交感神經ノ刺戟ハ皮膚ノ知覺過敏ヲ起セ共、腦脊髄神經ノ直接刺戟ニヨリテハ之ヲ起サズト云フ。内臓疼痛ノ交感神經傳導說ニ對スル適例ヲ舉グレバ腎結石疼痛ガ交感神經刺戟ニヨルモノナル證トシテ、イ、痛痛發作時ニ惡心、嘔吐、顔面蒼白(表在性血管ノ收縮)、流汗、膀胱收縮、尿意頻數ヲ伴フハ其部ノ交感神經ニ激シキ興奮ヲ與フルノ證ニシテ、單ニ腦脊髄神經ノミノ刺戟ニヨリテ起ル事ナシ。

ロ、疼痛ガ後背下部(腸骨上部)及ビ側腹部ニ來ルノミナラズ膀胱、睪丸、陰莖(婦人ハ大陰唇)等ニ波及スル事モ交感神經刺戟ニヨルモノナルコトヲ證ス。

(ハ)、腎石疼痛ノ時、睪丸皮膚ニ何等ノ病變ナキニカ、ハラズ睪丸莖膜(Tunica vaginalis)ニハ著シキ痛覺過敏ヲ示ス。元來莖膜ハL₁—L₂ヨリ來レル陰股神經ノ陰部枝ヲ受ク。他方腎、腎盂、輸尿管モL₁—L₂ノ脊髄斷面ニ屬スルヲ以テ腎盂ヨリノ刺戟ハ交感神經ヲ通過シテL₁—L₂ニ入り其部ノ後角知覺神經細胞ヲ興奮セシムルガ故ニ其ノ後角知覺神經細胞ノ末梢分布區域即睪丸莖膜ニ痛覺過敏ヲ示ス。

(ニ)、最近腎石疼痛發作ニ伴ヒ下腹部ニ帶狀ヘルペスノ現レシ症例報告多シ。コレハ交感神經營養反射ニヨルモノニシテ從テ逆ニ

腎石疼痛ハ交感神經刺戟ニヨリテ起リタルモノナリト云フヲ得。

以上ニヨリテ交感神經ガ内臟刺戟ヲ傳達スル作用ヲ有スルコト明ナリ。而シテ其刺戟ハ交通枝ヲ經テ脊髓側角ニ達スルモノナルガ其際前根ヲ通過スト云フ説アレドモ、後根ヲ經テ脊髓内ニ入ルトノ説重キヲナス。

(三)、副交感神經刺戟説。

シルグマン (G. V. Bergmann, 1922) 氏ハ交感神經モ副交感神經モ共ニ内臟刺戟ヲ脊髓ニ及ボシ、腦脊髓神經ヲ刺戟シ其腦脊髓神經分布區域ニ痛覺ヲ發生スト稱シ皮膚知覺過敏ノ發生ヲ説明シ同時ニ副交感神經ノ刺戟傳達ヲ認メ、又他方迷走神經ヨリ分岐セル上喉頭神經 (N. Laryngeus sup.) (一部ノ交感神經ト大部分ノ迷走神經ヨリナル) ガ主トシテ喉頭及ビ其附近ノ知覺ヲ司リ又迷走神經ノ分岐ナル心臟ノ抑壓神經 (N. depressor) ガ上行性刺戟傳達ヲナス事ハ現今多クノ學者ノ承認スル所、カクノ如ク支線ニ於テ然ルガ故ニ本來ノ迷走神經ガ知覺ヲ司ル事想像ニ難カラズトナス。且ツ交感神經ト副交感神經トハ器官ニ對シ殆ンド同様ノ關係ニ立チ諸處ニ於テ共同ニ走ルヲ以テ恐ラク副交感神經モ内臟疼痛ヲ傳達スルモノト思惟ス。該説ノ支持者ニハウエンケバツハ (Wenckebach) 氏、エツピングエル (Eppinger) 氏、ホーフェル (Hofer) 氏 (狹心症ノ劇痛ハ N. depressor ニヨリテ傳達スルコトヲ承認スル人々ナリ) アリ。然レ共該副交感神經刺戟傳達説ハ尙ホ判然タラズト云フヲ至當トセム。

以上ニヨリ内臟刺戟傳達ニ關スル大體ノ概念ヲ把握シ得可シトスルモ、然ラバ内臟感覺ノ第一次の要素タル、
(四)、内臟感覺ノ原因。

ハ如何ノ問題ヲ生ズ。總テ疼痛トハ末梢神經知覺終器、若クハ上行性神經纖維ガ或ル刺戟ヲ感受シ是レヲ腦ニ傳達シ此所ニ構成セラレタル感覺ヲ指スモノナル故、疼痛ノ原因ハ即チ刺戟ナリ。今内臟疼痛傳達徑路ガ前述第一説ノ腦脊髓神經知覺纖維ノミナリトスレバ此ノ際ノ疼痛原因即チ刺戟ハ皮膚疼痛ヲ惹起スル原因ト同様、器械的、溫熱的、化學的、電氣的刺戟ニ外ナラザル可キニ、内臟ハ是等ノ刺戟ニ對シ無感覺ナル事實ヨリシテ自然第二説ノ交感神經刺戟徑路ヲ是認セザル可カラザル關係上、交感神經ト中樞神經系トハ疼痛ヲ起サシムル刺戟ノ種類ニ自ラ相違ノ點アルヤ必セリ。サテ交感神經系知覺纖維ノ刺戟ノ種類ヲ決定ス可ク遂行セラ

レタル實驗ハ比較的少ク、從テ主トシテ臨床上ノ經驗ニ徴シ次ノ數種ヲ列擧シ得。今之ヲ頻度並ニ強度順ニ擧グレバ、

一、空洞臟器ノ壁ノ痙攣性收縮及ビ過度ノ擴張。

二、炎衝及ビ炎衝性產物。

三、血液ノ不足及ビ過多。

四、化學的刺戟。

五、潰瘍。

六、異物、毒物。

七、排泄物分泌物ノ蓄積、停滯。

八、所謂精神の原因(皮膚ノ疼痛癢痒ト同様相當重要也)。

右ノ原因ト雖モ疼痛ヲ起スコトアリ起サルコトアリ、又疼痛ノ度合ニモ甚敷懸隔アリ。恐ラク刺戟ノ分量、強度當時ニ於ケル臟器ノ生理的並ニ病的狀態、身體他部ノ狀況、精神狀態ニ多少若クハ甚敷左右セラル、事ニ依ルヤ必セリ。次ニ如上ノ第一次的要因タル刺戟ナル原因アリテ疼痛ナル感覺ヲ惹起セバ第二次のニ如何ナル餘波ヲ出現スルヤト云フニ其ノ最も重要ナルモノニ、

(五)、内臟反射 Viscerale Reflex.

ナル現象アリ。已述ノ如ク内臟ノ疼痛刺戟ハ該部ノ植物性神經ヲ刺戟シ之ニ依リテ脊髓内若クハ延髓内ノ植物性神經細胞ヲ興奮セシメ次ニ此ノ細胞ニ隣接セル神經細胞及ビ直接若クハ間接ニ是レト連絡ヲ有スル總テノ神經細胞ハイヅレモ多少共餘波ヲ受ケ第二次の興奮狀態ニ導カル。此ノ第二次の興奮ガ一定ノ強サ以上ナル時ハ其ノ神經細胞ハ各自個有ノ作用ヲ起ス。是レヲ内臟反射ト云フ。而シテ初メ興奮シタル神經ニヨリテ交感ト副交感神經性ヲ區別シ、更ニ第二次のニ興奮シタル神經細胞ノ種類ニヨリテ知覺反射、運動反射、營養反射ヲ區別ス。

以上ノ中、交感神經性内臟反射ノ三樣式ノ概略ヲ説明ス可クマツケンジ―氏ハ臨床症例ヲ示シテ曰ク「三十六ノ女、數年前下腹

部ニ堪ヘ難キ疼痛發作頻回、每發作後右腸骨窩ハ筋肉緊張ノ爲ニ強直シ、輕ク觸ル、モ痛覺過敏ナケレドモ多少壓ヲ加フレバ疼痛ヲ訴ヘ、大腿ハ弱角度ニ屈シ、腰筋強直ノ爲ニ大腿伸展ニ困難ヲ感ズ、小距離ノ歩行ヲスルモ腰ヲ屈ス。其他脊柱ニ沿ヒ伸展筋ヲ輕ク壓スレバ右側ニ劇痛アリ、尙ホ尿意頻數アリシモ尿ハ常ニ少量且ツ異常成分ナシ。開腹手術ニヨリ腸、膀胱、腹膜ハ健常、蟲樣突起ハ炎衝發亦シ盲腸ト癒着ス。手術ニヨリテ全治ス。今該症例ノ兆候ヲ吟味シテ

(a)、内臟運動反射ニ屬スルモノニ腹筋緊張即筋肉防禦(Defence muscularis)及ビ腰筋收縮。

(b)、内臟知覺反射ニ屬スルモノニ腸骨窩ト背面脊柱右側ノ壓痛。

(c)、膀胱知覺過敏ニ屬スルモノニ尿意頻數。

今は等ノ部分ニ至ル神經ヲ檢スルニ、中樞性運動神經、筋、皮膚ニ行ク中樞性知覺神經、膀胱ニ至ル交感神經等總テ第十二胸髓節乃至第一第二腰髓節ヨリ來ル。又蟲樣突起ノ交感神經モ是等ノ脊髓節ニ入ル。從テ(a)、(b)、(c)等ハ蟲樣突起炎ヨリ起リシ内臟反射ナリ。

〔五〕、腎筋膜、脂肪囊ニ於ケル交感神經ノ臨床的意義

余ガ腎筋膜、脂肪囊ニ於テ檢出セシ交感神經ノ解剖學的所見並ニ其ノ生理學的機態ガ大樣如上ノ如キモノトスレバ、從テ之等交感神經ハ病的狀態ニ於テ即チ臨床上如何ナル意義ヲ有スルモノナリヤヲ考證セザル可カラズ。此ノ項ニ於テ最初ニ論斷ス可キハ

(一)、腎ノ疼痛ハ實在ス。

ト云フ問題ナリ。腎臟實質及ビ其ノ結締組織性被膜ハ他ノ内臟諸器官同様外來ノ刺激ニ對シ全然無感覺ナルコト外科手術の經驗ガ日常吾人ニ示ス事實ナリ。レンナンデル氏ハ腎實質ガ健ナルト病的ナルトヲ問ハズ手術ニ際シ、脂肪性被膜ヲ結締組織性被膜ヨリ剝離スレバ其ノ後ノ手術ニハ何等ノ疼痛ヲ訴ヘズト云フ。然レドモ内科の經驗ニヨレバ、腎ノ炎症並ニ變性疾患、血行障碍等多クノ腎患者ハ現在若クハ既往經過中、腎部ニ輕若クハ重ノ疼痛ヲ有スルコトヲ知ル。マツケンジー氏ハ急性慢性腎炎ノ無數ノ自家臨床例中薦骨部疼痛ガ腎ヨリ發セラレタリト云フ證明ヲ見出シタルコトナキヲ以テ腎疾患ニ疼痛ノ伴フコトヲ信ゼズト唱フレドモ、

マンナベルグ(Mannaberg)氏ハ四十三例ノ腎炎中ニ九例、ストラウス(Straus)ハ夫レ以上ノ例ヲ經驗セリト云フ。又事實疼痛性腎炎(Nephritis dolorosa)ナルモノ存スルニ徴スルモ腎疼痛ナルモノ、存スルヤ明ナリ。然ラバ外科的處置ニ對シ無感覺ナルモノガ或ル病的狀態ニ於テハ疼痛ヲ起スト云フ其ノ間ノ要約ニ就キテハ疼痛ノ第一次の要素ナル

(II)、腎疼痛ノ原因。

ナルモノヲ考察セザル可カラズ。多クノ大家ハ急性腎臟疾患例ヘバ急性腎炎ノ如キ疾患ニ際シテハ、腎ノ内壓亢進シ爲ニ結締組織性被膜ハ過度ニ緊張セラレテ此所ニ疼痛ヲ發スルモノナリト説明スルモ、ミユレル氏ハカ、ル場合腎被膜ヲ切斷スレバ勿論腎臟實質ノ膨脹ト同時ニ被膜ハ直ニ自ラ剝離ス、サレドカ、ル疼痛ハ萎縮腎ニ際シテモ現ハル、ガ故ニ被膜ノ緊張ノミニ歸スルコトヲ得ルヤ疑問ナキ能ハズ。ズーテル(Suter, 1918)氏ハ尿ノ流出障礙ニ基キ腎ノ内容増加、惹イテハ被膜ノ緊張ヲ來シテ疼痛ヲ發シ、高度ノ場合ニ於テハ尿ノ鬱滯トナリ腎疝痛ヲ起スト稱セリ。ワットソン(Watson)氏ハ腎疝痛ノ一例ニ於テ腎石ヲ證明セズ、被膜ノ高度ノ肥厚ヲ認メ手術(被膜切開)ニヨリテ完全ニ治癒セシ例ヲ報告セリ。以上諸家ノ云フ腎容積増加ニヨル被膜緊張ガ疼痛ノ原因ナル事ハ首肯シ得ラルトセムモ然ラバ此ノ疼痛ハ如何ナル神經ヲ刺戟シ如何ナル傳導徑路ニヨリテ疼痛感覺ニ導カレタルヤノ問題ハ從來被膜ノ神經ニ關スル記載ニ乏シク確ナル推論ヲナス能ハザリキ。然シ腎疼痛ハ多クハ反射性疼痛ニシテ D_9 、 D_{12} 及 L_1 ノ部ニ知覺過敏帶ヲ現ハスコトハヘッド氏ノミニ非ズ他ノ多クノ學者之ヲ例フレババン氏、ストラウス氏等モ皆反射性疼痛ナル事ヲ認メタリ。カクテ腎ノ疼痛ハ植物性神經系、就中交感神經刺戟ニヨルモノナリト云フ斷定的想定ニ達セリ。本編ハ此ノ想定ヲ確定ニ導クモノニシテ結論ニ於テ詳述スル事トス。却說、交感神經刺戟ニヨリテ想起サレタル疼痛ガ第二次のニ如何ノ餘波ヲ顯現スルヤ、是レ吾人泌尿器科醫ガ日常遭遇スル重要ナル事項ニシテ千態萬容ノ顯現ヲ吟味鑑別シテ臨床上ノ指針ヲ把握ス可ク努力ス可キモノナルガ、餘波ノ顯現即チ兆候ニヨル類症鑑別ノ資料ヲ記載スルニ先チ、兆候群ノ根本的基調ヲ司ル原則的事項ヲ如上ノ學理ニ立脚シテ叙述シ置クノ必要アリ。

(III)、腎臟基因性内臟運動反射。

腎炎ノ際ニハ必發的ニ腰部諸筋ノ緊張ヲ來ス。之ヲ證明スル爲ニハ患者ヲ椅子ニ腰掛ケシメ其ノ足ヲ床ニ屈カシメ腰部諸筋ヲ弛緩セシメタル後觸診スルニ運動反射ヲ起ス諸筋ノ緊張ヲ知ル。此ノ筋肉緊張増加ナル症候ハ腎結核ノ際患側ヲ切除スルニ當リ他側ノ狀態ヲ知ル上ニ甚ダ重要ナル楔機ヲナスモノナリ。此ノ腰部諸筋ノ緊張増加ハ眞ニ腎臟疼痛ノ運動反射ニシテ所謂腎臟性疼痛ノ際ニ現ハル、腎ノ緊張増加ト同一ノモノニ非ズ、即チ所謂腎臟性疼痛ハ腎臟ノ爲ニ起ル反射ニ非ズシテ輸尿管ノ爲ニ起ルモノナレバナリ。腎結石ガ腎盂ニ殘留セル間ハ筋肉ノ緊張増加及ビ疼痛共ニ顯著ナラザルモ該結石ガ輸尿管ノ方ニ下降スル時劇痛ヲ誘起シ且ツ筋肉強直ヲ現ハス。因ニ腎臟基因性運動反射ニ與ル筋肉ハ脊柱伸筋、橫腹筋、内及ビ外斜腹筋ナリ。

(四)、腎臟基因性感覺反射、腎ノ内臟感覺反射ハ一般ニ只疼痛ト云フニ非ズシテ「ずきんずきん」痛ニシテ第六胸部セグメントカラ第一腰部セグメントノ間ノ何レノ感覺帶ニモ表ハル、モノナリ。サレバ輸尿管ノ疼痛即チ一般ニ腰部及ビ腸骨窩ノ邊ヨリ腹部ノ前面、下方ハ陰囊ニ及ブモノト異ル。即チ腎臟基因性感覺反射ノ體前面ニ現ハル、ハ臍部ヨリ下方、大腿ノ内外面及ビ陰囊ニ至ル。就中甚シキハ第十胸部感覺帶ニシテ臍部ノ下方ニ相當ス。體ノ後面ニハ腰部全體、下方ハ大腿ノ外側等ノ何處ニモ疼痛ヲ覺ユ。

(五)、腎臟基因性内臟營養反射。

腎臟疾患ニヨリテ起ル運動並ニ感覺反射ヲ表ハス筋肉、皮膚及ビ皮下組織ハ其ノ疾患ガ慢性化スルニ從ヒ退行變性ヲ示スニ至ル。該事實ハ腎臟ノ結核性疾患又ハ其他慢性疾患ノ診斷ニ重要ナル症候ナリトス。

以上腎疼痛ノ内臟反射三者ヲ基本トシテ類症鑑別診斷ニ資スルハ實際上極メテ重要ノ事項ニシテ、此見地ニ立脚シ、

(六)、症候ヨリ見タル類症群(Möglichkeiten)

ヲ羅列スレバ次ノ如シ。

一、腹部全般ニ亘ル強烈ナル汎發性疼痛。

A、シヨツク並ニ吐糞症ヲ伴フモノ。腹壁、腹膜、胃、腸、肝、脾、腹部血管、生殖器疾患、中毒症、及ビ腎結石、腎穿孔、游走腎ノ軸樞轉換、腎溢血(Apoplexie des Nierenlagers)、急性腎周圍炎、腎梗塞、腎血管硬化ニヨル腰筋内出血等。

B、右ト同症狀ニシテ只吐糞症ヲ缺グモノ。腹壁、腹膜、胃、腸、肝、脾、中毒、循環器並ニ呼吸器疾患、脊髓癆ノ腹部痛(Abdominalkrisis)ノ外ニ腎溢血、腎破裂、急性腎周圍結締組織炎、輸尿管周圍炎、アヂソン氏病、副腎靜脈ノ急激閉塞、副腎出血性梗塞、副腎出血、急性副腎機能不全等ナリ。

C、右同様ノ症狀ニシテシヨック並ニ吐糞症ヲ缺グモノ。腹壁、腹膜、胃、腸、肝、脾、呼吸並ニ循環器疾患、傳染病、ノイローゼ及ビ腎臟梗塞、急性腎臟周圍炎、急性輸尿管炎、アヂソン氏病、副腎出血等。

二、疝痛様心窩部疼痛ヲ起スモノニ、胸部内臟疾患ノ外ニ腎結石、腎盂炎、輸尿管炎、游走腎、アヂソン氏病副腎機能不全等。

三、慢性持續性心窩部疼痛ヲ起スモノニ胸部内臟疾患ノ他ニ副腎囊腫アリ。

四、右側季肋部ニ疝痛様疼痛ヲ來スモノ。肝、膽囊、膽道疾患、胃、腸、脾、腹膜疾患、並ニ游走腎、腎結石、前部腎臟周圍結締組織炎、前部腎臟外膜炎、腎臟水腫、副腎腫アリ。同ジク右側季肋部急性持續性疼痛ヲ來スモノニ、肝、膽囊、膽管、胃、腸疾患ノ外ニ急性腎臟周圍結締組織炎、游走腎、腎盂炎、腎梗塞、腎臟溢血、マラリヤ、回歸熱アリ。

右側季肋部慢性持續性疼痛ヲ來スモノニ肝、膽囊、膽道、胃腸疾患ノ外ニ腎臟水腫、腎臟膿瘍アリ。

左側季肋部疼痛ハ右側ト大差ナキモ多クノ場合肝、膽囊、膽道疾患ヲ除外シ得可シ。

五、左側腸骨部疼痛。

(A)、突發性疝痛様疼痛

一、腸疾患

二、腎疾患

イ、左側腎結石

ロ、左側輸尿管結石

ハ、其他

(B)、急性持續性疼痛

一、腸疾患

二、血管疾患

三、胃疾患

四、腎疾患

イ、急性輸尿管周圍炎

ロ、其他

五、生殖器疾患

(C)、慢性併發性疼痛

一、腸疾患

二、腎及ビ輸尿管疾患

イ、左側腎並ニ輸尿管疝痛

ロ、左側腎及ビ輸尿管結石

ハ、腎實質内出血(腎盂乳嘴腫出血)

ニ、腎盂炎

六、右側腸骨部疼痛

(A)、疝疼樣疼痛

一、腸疾患

二、腎及ビ輸尿管疾患

イ、腎及ビ輸尿管結石

ロ、急性腎盂炎

ハ、急性腎盂腎炎

ニ、腎結核

ホ、輸尿管結核

ヘ、急性化膿性腎臟周圍結締組織炎

ト、腎臟溢血

チ、腎臟周圍血腫

(B)、急性持續性疼痛

 α 、著明ノ腫起アルモノ

一、腸疾患

二、大網膜疾患

三、腸膜疾患

四、男女生殖器疾患

五、脾疾患

六、血管疾患

七、腎及ビ輸尿管疾患

イ、腎膿腫

ロ、腎上方ノ化膿

ハ、游走腎

ニ、急性輸尿管周圍炎

ホ、急性輸尿管炎

ヘ、急性輸尿管水腫

 β 、著明ノ腫起ナキモノ

一、腸疾患

二、胃疾患

三、腹膜疾患

四、男女生殖器疾患

五、腎臟及ビ輸尿管疾患

イ、出血性梗塞

ロ、其他

六、其他ノ疾患

(C)、慢性再發性疼痛

腎臟下垂症

(D)、慢性持續性疼痛

一、腎疾患

二、腎盂疾患

三、輸尿管疾患

七、腰部並ニ側腹部疼痛

A、狹義ノ腰痛

(a)、突發性疝痛樣疼痛

(二)、腎臟及ビ輸尿管疾患

1、腎臟結石及輸尿管結石

イ、燐酸鹽結石(最劇烈)

ロ、蓆酸鹽結石(多ク持續性、稀ニ劇痛)

ハ、尿酸鹽結石(比較的輕痛)

2、腎及ビ輸尿管結核

3、急性出血腎炎

4、疼痛性腎炎(Nephritis dolorosa)

5、慢性疝痛腎炎(Koliknephritis 前項ノ一種)

6、急性腎臟充血

7、チフスニヨル急性出血性腎炎(Renotyphus)

8、一般大腸菌傳染ニヨル出血性腎炎(Reno-coli-hazillase)

9、先天性囊狀腎

10、腎臟新生物

11、急性腎盂腎炎

12、輸尿管内異物

イ、膿尿ノ膿球塊

ロ、腎出血ノ凝結物

ハ、外傷

ニ、腫瘍ノ血管内破裂

ホ、腎臟動脈瘤ノ破裂

ヘ、腎臟靜脈瘤

ト、腎靜脈血栓

チ、腎盂乳頭結核

リ、腎包囊蟲症ノ壞胞

ヌ、腫瘍ノ粒子

13、輸尿管壓迫或ハ屈曲

イ、子宮癌

ロ、膀胱癌

ハ、輸尿管周圍炎ニヨル肝脰

ニ、淋巴腺腫瘍

ホ、大動脈動脈瘤

ヘ、骨疾患

14、輸尿管捻轉

15、纖維性腎周圍炎及ビ腎周圍結締組織炎

16、義膜性輸尿管炎

17、義膜性腎盂炎

18、腎盂白斑

19、腎臟水腫及ビ膿腫

(一)、腸疾患

(三)、肝疾患

(四)、膀胱疾患

原著 池田||腎筋膜、腎脂肪囊ノ神經

(五)、チフス及ビマラリヤ

(六)、神經系統疾患及神經性疾患

(七)、其他痛風、鉛中毒

(b)、突發性持續性劇痛

(一)、腎疾患

1、腎臟梗塞

2、急性腎炎

3、慢性腎炎ノ急性増悪

4、外傷後ノ急性腎膿瘍

5、化膿セル腎臟水腫

6、腎臟膿瘍

7、急性腎盂炎

8、能動性腎充血

イ、急性傳染病

ロ、慢性傳染病ノ急性増悪

9、腎臟水腫ノ破裂

10、腎盂破裂

11、急性腎周圍結締組織炎

12、尿鬱滯

13、腎臓溢血

(二)、其他尿ノ異常ヲ起ス疾患

1、血色素尿症

2、發作性血色素尿症

3、血ボルフィン尿症

4、乳糜尿

(三)、副腎疾患

1、副腎ノ急性疾患

2、副腎ノ急性機能不全

イ、副腎靜脈閉塞

ロ、出血性梗塞

ハ、出血等

(四)、腸疾患

(五)、肝疾患

(六)、脾疾患

(七)、脾疾患

(八)、膀胱疾患

(九)、生殖器疾患

(十)、呼吸器疾患

(十一)、循環器疾患

(十二)、筋肉疾患、傳染病、ルムバールゴ等

(c)、慢性反覆性疝痛様疼痛

(一)、腎臓及ビ輸尿管疾患

(1)、輸尿管狹窄又ハ閉塞

イ、結石

ロ、凝血

ハ、腫瘍片

ニ、嚢包蟲症嚢胞

ホ、膜塊

ヘ、莖轉振

ト、外側ヨリノ壓迫及ビ屈折

(2)、反覆性腎盂炎

(3)、反覆性輸尿管炎

(4)、反覆性腎炎

(二)、副腎疾患

1、アヂソン氏病

2、副腎機能不全

(三)、腸疾患

(四)、胃疾患

(五)、月經

(d)、慢性持續性腰痛

(一)、腎臟及ビ輸尿管疾患

(1)、慢性腎炎

(2)、腎性腎化膿

(3)、慢性纖維性腎臟周圍結締組織炎

(4)、腎結核

(5)、慢性放線菌性腎臟周圍結締組織炎

(6)、腎結石症

(7)、腎水腫及ビ膿腫

(8)、囊狀腎

(9)、腎腫瘍

(10)、腎臟囊包蟲症

(11)、直立性蛋白尿

(12)、游走腎

(13)、腎盂炎

(14)、後部輸尿管炎

(15)、輸尿管閉塞

(二)、副腎疾患

(三)、膀胱疾患

(四)、尿道疾患

(五)、腸疾患

(六)、肝、膽囊、膽管疾患

(七)、脾、脾、疾患

(八)、呼吸器、循環器、疾患

(九)、ノイローゼ

(十)、皮膚疾患

(十一)、筋肉疾患

(十二)、腰神經疾患

(十三)、骨疾患

(十四)、其他

B、側腹部疼痛

(一)、腎臟及ビ輸尿管疾患

1、輸尿管疾患

イ、輸尿管閉塞

ロ、輸尿管周圍炎

2、腎盂疾患

3、腎臟肥大

(一)、腸疾患

(二)、腹膜疾患

(四)、肝、膽囊、膽管疾患

(五)、脾疾患

(六)、筋肉疾患

(七)、神經疾患

(八)、骨疾患

(九)、脊髓關節疾患

〔六〕、結 論

最モ進歩セル鍍銀染法ヲ以テ腎筋膜並ニ脂肪囊ニツキ神經組織學的檢索ヲ遂ゲ大凡

一、血管ニ隨伴シテ走行スル神經以外ニ之ト全ク獨立セル豐富ナル神經ノ供給ヲ受ク。

二、血管ニ隨伴セザル神經ハ殆ンド全部交感神經性ノモノニシテ腸管ニ於ケルアウエルバツハ氏叢狀ニ排列分布セラル。

三、神經纖維ハ主トシテレマーク氏纖維ヨリ成リ稀ニ有髓纖維ヲ交ユ。

四、神經纖維ノ走行經過中ニハ數多ノ小型神經細胞ノ點綴スルヲ隨所ニ見レドモ神經節ヲ發見セザリキ。

五、前記ノ神經纖維ノ大部ハ此所ニ終末ス(血管隨伴神經纖維ハ然ラズ)、但シ特別ノ終末裝置ヲ見出サズ。

ノ結果ヲ得タリ。以上ノ事項ハ舊來ノ記載ニ漏レタルモノ、如ク、從ツテ「腎ノ内臓疼痛」ナル問題ニ對シテハ只ダ生理的實驗、臨床上ノ經驗ヨリ推論シテ「交感神經刺激ノ傳導ニヨルモノ」トノ假定的結論ヲ歸納スルニ過ギザリシヲ余ハ茲ニ之ニ對シ確乎タル神經組織學的成績ヲ以テ肯定シ得タルモノナリ。之レヲ以テ前編ト相待チテ腎實質ノ周圍ヲカコム被膜ノ三者ニ懸リシ重大ニシテ難解ナル諸問題ヲ解決ニ導キ得タリト信ズ。

稿ヲ終ルニ臨ミ徹頭徹尾指導鞭撻ヲ賜ハリシ院長井尻辰之助先生ニ滿腔ノ感謝ヲ捧ゲ、種々ノ便宜ヲ賜ハリシ副院長阪上虎彌太先生其他華陽堂病院醫局諸先生ニ厚ク謝意ヲ表ス(昭和三年十月四日脱稿)。

附 圖 說 明

第一圖 腎筋膜、脂肪囊ノ解剖學的略圖、位置的關係、周圍ノ器官ニ對スル狀態ヲ示ス (nach Alborran)。

第二圖 腎脂肪囊ノ周邊部ガ腎筋膜ニ移行スル部

血管ニ隨伴セル神經ノ網目狀排列ヲ示ス。血管ニ紛合枝アルト同様ニ神經纖維ニ紛合枝アルヲ示ス (二十五倍、顯微鏡寫眞)。

第三圖 血管トハ全然獨立ニ腎筋膜ニ存スル交感神經纖維束ニシテアウエルバツハ氏叢狀ノ排列ヲ示スモノ (百二十倍、顯微鏡寫眞)。

第四圖 血管ニ隨伴セザル腎筋膜ノ交感神經纖維束ガ分岐ヲ繰返シツ、(直角的ニ分岐シテ終末スルモノモ見ユ)再ビ其走行中ニ重疊交錯スルヲ示ス (百二十倍、顯微鏡寫眞)。

第五圖 有髓無髓兩種ノ神經纖維ノ混成セル神經纖維束、個々ノ分岐ガ原纖維トナリテ終末スルノ狀、纖維走行中ニ介在スル小型神經細胞ヲ見ル (三百五十四倍、顯微鏡寫眞)。

第六圖 第四圖ノ分岐部ノ一ツヲ擴大セルモノナリ。レマーク氏纖維ノシヨリナル神經纖維束ガ小型神經細胞ヲ介在シツ、次第ニ分岐シ遂ニ痛狀膨大部ニヨリテ點綴セラル、原纖維トナリテ腎筋膜結締組織纖維ニ終末スルヲ示ス (三百五十四倍、顯微鏡寫眞)。

Literatur

1. 岩永仁雄、腹痛及び其隨伴症狀。グレンツグベート第二卷第二號。

2. 池田統治郎、「腎被膜ノ神經支配」(附腎被膜剝離術ニ關スル知見補遺)、日本泌尿器科學會雜誌第十七卷、第三號。

3. 藤田卯二六、交感神經系統ノ解剖、實地醫科ト臨床第三卷、第五號。

4. 眞鍋嘉一郎、内科領域ヨリ見たル一二泌尿器疾患、日本泌尿器科

學會雜誌、第一七卷、第六號。

5. 後崎哲四郎、大森靜樹、內臟疾患ニ因スル疼痛ノ發生、診斷、治療、實地醫科ト臨床、第二卷二號、第三卷三、四、六、七、八、十、十二號、第四卷、一、三、四號、第五卷、三、四號。

6. 松岡文七、內臟疾患ノ症候 (Symptoms of visceral diseases. By E. M. Pottinger)、實地醫科ト臨床、第二卷、六、七、八、九、十號、第三卷、四、五、六、七、八、九、十、十一號、第四卷、一、二、三、四、六、七、九、十、十一號、第五卷、六、七號。

7. 進藤篤一, 泌尿生殖器ノ臨床解剖學. 福岡醫科大學雜誌出版「泌尿生殖器疾患」
8. C. Adrian-Strassburg. Hyperalgetische Zonen und Herpes Zoster bei Nierenkrankungen. Zeitschr. f. Urol. 8, 1914.
9. Albarrañ, J. Operative Chirurgie der Hiranwege. 1910.
10. Brauer, W. Der strukturelle Teil des Vegetativen Nervensystems und seine klinisch-chirurgische Bedeutung. Ref. in Zentbl. f. ges. N. u. Psychiat. Bd. 50. H. 3/4 1928.
11. Cortes, Mariano R., und Armando f. Camaner. Hautreflex in der Klinik des Sympathicus. Ref. in Zentbl. f. ges. N. u. Psychiat. Bd. 4, H. 10/11 1928.
12. Garnett, John Berton. Acute and recurrent pseudospondylitis due to intercostal neuralgia. Americ. Journ. of the medical sciences. Bd. 174, Nr. 6, 1927.
13. Condorelli, Luigi. Morphologische Untersuchungen ueber den Einfluss der Nerven auf die Nierensekretion. Ref. in Zentbl. f. ges. N. u. Psychiat. Bd. 40 H. 1/2 1928.
14. Duncan, Donald. On the possible presence of vagus fibers in the Splanchnic nerves: Results of the examination of the splanchnic nerves in cats, dogs and rabbits after section of the right vagus. Journ. of comparative neurol. Bd. 45. No. 1. 1928.
15. Eppinger, Hans. Ueber Nierenstörungen bei halbseitiger Sympathicuslähmung. Zeitschr. f. Urol. Chirurg. Bd. 8, 1922.
16. Funakura, Seigo. Die Untersuchungen ueber den Verlauf der Nervensystem XXII. Kiga, Tokuzo. Ueber den Verlauf der markhaltige Nervenfasern im Halssympathicus. Acta scholae med. Univ. Kioto. Bd. 9, H. 3. 1927.
17. Gagel, U. Zur Histologie und Topographie der vegetativen Zentren in Rückenmark. Ref. in Zentbl. f. ges. N. u. Psychiat. Bd. 50 H. 1/2 1928.
18. Gayet, G. Die eigentliche Behandlung der langdauernden Nierenkoliken. Zeitschr. f. Urolog. Chirurg. Bd. 16. 1924 S. 229.
19. Hess, I. und Jos, Falteschek. Ueber Störungen nervöser Reflexe beim ulcus duodeni (Ein Beitrag zur Pathologie des visceralen Nervensystems). Ref. in Zentbl. f. ges. Neurol. u. Psychiat. Bd. 50 1928.
20. Head. An disturbances of sensation, with especial reference to the pain of visceral disease. Brain Vol. XVI 1893.
21. Head and Campbell. The pathology of Herpes Zoster and its bearing on sensory localisation. Brain Vol. XXIII 1900.
22. Heymann, Arnold. Degenerative Nephrose als Ursache der sog. idiopathischen renalen Neuralgie. Zeitschr. f. Urol. Bd. 15 H. 10 1921.
23. Hirt, August. Zur Analyse des Spinalganglion (Der Anteil des Spinal ganglions an der Innervation der Niere) Ref. in Zentbl. f. Ges. Neurol. u. Psychiat. Bd. 50 1928.
24. Hirt, August. Vergleichend-Anatomische Untersuchungen ueber die Innervation der Niere. Zeitschr. f. Urol. Chirurg. Bd. 17 1925.
25. Israel, Wilhelm. Beiträge zur Pathologie der Nephritis dolorosa sowie der Anuris Calculoso. Zeitschr. f. Urol. Chirurg. 1923.
26. Keller A. und F. Rost. Ueber den Einfluss von Entkapselung und Entfernung der Niere auf Vergiftung dieses Organs

Zeitschr. f. Urol. Chirurg. Bd. 17. 1925.

27. Lapinsky Michael. Ueber die Deutung einzelner klinischer Symptome mit Hilfe der Prinzipien der zentripetalen Innervation innerer Organe. Zeitsch f. gest. Neurol. u. Psychiat Bd. 111 H. 1/2.

28. Lapinsky, Michael. Ueber Schmerzen visceralen Ursprungs. Arch. f. Psychiat. u. Nervenkrh. Bd. 82. H. 1. 1927.

29. Leibson, I. Ueber die Nervenregulation der Nierentätigkeit. Der Einfluss der einseitigen Durchschneidung des N. splanchnicus auf die Tätigkeit der entsprechenden Niere bei einem Hunde mit getrennt ausgeheilten Ureteren. Zentbl f. die ges. Neurol u. Psychiat Bd. 49 H. 10/11.

30. Maass, Hugo. Zur Kasuistik der genuinen Eiterungen der Nierenfistelpsel. Zeitschr. f. Urol. Chirurg 1923 S 90.

31. Nekrassov, P. Zur Frage ueber die sympathische Innervation der quergestreiften Muskulatur. Zentbl f. ges. Neurol u. Psychiat Bd. 49 H. 10/11.

32. Pappin, Ueber die Resektion der Nierenerven bei den schmerzhaften Affektionen dieses Organe. Zeitschr. f. Urol Chirurg. Bd. 8. 1922. S.-376.

33. Percy, J. Frank, and Thomas Dyer Allen. Studies on the visceral nervous system. Reflexes from the gastrointestinal tract to the eye. Americ. Journ. of physiol. Bd. 82. Nr. 1 1927. Ref. in Zentbl f. ges N. u. Psychiat Bd. 49 H. 1/2 1-28.

34. Kraus, Walter M. and Orman C. Perkins. A syndrome of the cerebral origins of the visceral nervous system. The question of somatic and visceral atrophy and a review of the reported cases of unilateral atrophy. Arch. of Neurol and

Psychiat Bd. 18 Nr. 2 1927.

35. Pette, H. Das Problem der wechselseitigen Beziehungen zwischen Symplicus und Sensibiltet. Deutsch. Zeitschr f. Nervenheilkunde Bd. 100 1927.

36. Rosenberg, Albert. Ueber das sog. essentielle extracapsulare perirenale Haematom. Zeitschr f. Urol Chirurg Bd. 16 1924. S 165.

37. Rothe, Hildegrad. Ueber den Einfluss der sensiblen Nerven auf das Hauterythem nach Bestrahlung mit ultraviolettem Licht. Zentbl f. ges. N. u. Psychiat Bd. 49 H 10/18.

38. Ruhnann, Walter. Ueber viscerele Reflexe auf Locale von der Haut zum Eingeweide. IV. Mit. Viscerale Schmerzleitung durch warme als Segmentreflex. Zentbl f. ges. Neur. u. Psychiat Bd. 49 H. 14 1928.

39. Frohlich, Alfred. Viscerale Schmerzempfindung. Zeitschr f. Urol. Chirurg Bd. 15 1924 S 11.

40. Santesson, C. G. Wie werden Nervenreize auf die Tierischen Koeperorgan uebertragen. Zentbl. f. ges. Neurol u. Psychiat Bd. 49 H 1/2.

41. Schafer E. Scharpey. Recovery after severance of cutaneous nerves. Brain Bd. 50 Nr. 3/4 1927.

42. Spiro. K. Zur Physiologie der Schmerzempfindung(Schmerz. Bd. 1 H 1/2 1925). Zentbl f. ges. N. u. Psychiat Bd. 50 H1/2 43. Szondil. Die Beziehungen der Ueberempfindlichkeit der Haut zu dem Anomalien des vegetativen Nervensystems. Archiv. f. Dermatologie und Syphilis. Bd. 154 H. 1.

44. Szenzo Georg. Der Schmerz als fuehrendes Symptom. Theoretische Ueberlegungen und praktische Beobachtungen zum

- Schmerzproblem (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 106, 1927) Ref. in Zentbl. f. ges. Neurol. u. Psychiat. Bd. 49 H. 15 1928.
45. Tetiaeva, M. Ueber die Innervation der Harnblase beim Irtrosch im Zusammenhang mit der Frage über die Kreuzung der Nervenfasern der sympathischen Systems. Ref. in Zentbl. f. ges. Neurol. u. Psychiat. Bd. 49 1928.

46. Wassilio-Voelcker. Urologische Operationenlehre. 1924.
47. Zondek, S. G. Das vegetative System und seine klinische Bedeutung. Organophologische und funktionelle Krankheitsbetrachtung (klin. Wochenschr. J. G. 17. Nr. 5 1458). Ref. in Zentbl. f. ges. Neurol. u. Psychiat. Bd. 49. H. 15. 1928.

(From the Kobe branch of Kwayodo Hospital, Osaka, Japan.
Director, Prof. Dr. Tatsunosuke Ijiri.)

ON THE NERVE SUPPLY OF FASCIA RENALIS AND CAPSULA ADIPOSA RENIS.

By Dr. Med. Tojino Ikeda.

I have already described (Journ. of Japan Urolog. Vol. XVII. H. 3) on the Innervation of ren capsule (then meant capsula fibrosa renis), thenceforth I have been studying the nerve supply of Fascia renalis and Capsula adiposa renis, and obtained many valuable contributions to these views concerning it, that these have only functions to carry the blood and lymphatic vessels and to make immovable the kidney in its location. I used the materials pulled (not cut by microtome) from the peripheral parts of capsula adiposa renis with some width of Fascia renalis of rabbits, dogs and rats, and succeeded to stain with Gross' silver-impregnations method and that of Cajal's. Referring to the nerve supply, the Fascia renalis and Capsula adiposa renis stand under the identical conditions, so it may be described with same articles as follows:—

- (1) Excepting the nerve fibres running along (from the route to its smallest endbranches) the blood vessels, there are many nerve fibres supplying there self-supportingly (independent from the course of blood vessels).
- (2) The latter consists of Remark's nerve fibres in generally with few or without myelinated nerve fibres together in its trunk.
- (3) The nerve fibre trunk so arranged there, as it may be, reminded of Auerbach's or Meissner's Plexus in the intes-

tines, and on or in the neighbourhood of the ramific point of nerve fibre trunk so arranged as above stand many small type nerve cells.

- (4) The nerve fibres above mentioned branched off repeatedly in their course becoming smaller and smaller and, "Neuro-fibrillen" at last and ending in the connective tissue fibres.
- (5) Remark's nerve fibres have many small size nerve cells along or in their course one after another in chains.

- (6) Special form of nerve fibre ending: ganglion, nerve fibre of central nervous system was never visible elsewhere.

On the other hand, as far as symptoms of visceral diseases are concerned, the painful sensation of kidney under many sorts of pathological circumstances was thought to be conducted by sympathetic nerves on the Fascia renalis and capsula adiposa renis and Capsula fibrosa renis, that is to say, the impulses aroused by mechanical, chemical, thermic, electric stimulation or inflammation or pathological products were conducted by sympathetic nerves on the capsules towards the centres. When the impulses reached spinal cord, the nerve cells which situated in the neighborhood of the sympathetic nerve cells receiving now impulses from the periphery simultaneously irritated to such a degree that those former are also thrown into activity. Reno-viscero motor and Reno-viscero sensory and Reno-viscero trophic Reflex happen in these way, as the case may be. The theory above mentioned was constructively constructed by clinical experiences and physiological experiments, but requires yet anatomical and histological facts (proofs), that is to say, morphological describing of sympathetic nerves to the kidney

capsules were insufficient. I made just good this defect, and solidified the foundation for this theory. Combined with my former essay on the innervation of renal capsule, I finished the description of nerve supply, especially the sympathetic nerve

supply of kidney capsules and made clinical and theoretical problems, which belong to the Capsul nerve and being thought to be yet insolvable without some more fundamental facts (proofs), easily understand.

第一圖

(Nach J. Albarran)

第二圖

第三圖

第四圖

第五圖

第六圖