日本泌尿器科學會雜誌 第二十卷 第一號

原 著

根治的切除術ニヨリテ治癒セル眞性膀胱憩室ノ一例
附眞性膀胱憩室ノ統計的觀察

M. Kitagawa and H. Nose: A case of the genuine vesical diverticulum, healing with the complete excision. (Appendix: The statistic view of the genuine diverticulum)

慶應義塾大學醫學部皮膚科泌尿器科教室
(泌尿器科主任 北川教授)

醫學博士

北 川 正 惇
能 勢 博 之

目 次

緒 言
文献ノ梗概
手術例
爾余ノ膀胱憩室例
膀胱憩室ノ發生原因
性及年齡

膀胱憩室開口部ノ形態
膀胱憩室ノ數及位置
膀胱憩室ノ大サ
膀胱憩室壁ノ變化
膀胱憩室ト其周圍臟器トノ關係
膀胱憩室ト合併症
膀胱憩室ノ呈スル症狀

膀胱憩室ノ診斷

膀胱憩室患者ノ豫後

膀胱憩室ノ治療法

考察及結論

緒 言

膀胱憩室ハ吾々臨床醫ガ極メテ罕ニ排尿困難尿意頻數等ヲ主訴トシテ來レル患者ニ於テ膀胱鏡検査ヲ行ヒテ初テ偶然ニ發見スルモノニシテ其等ノ殆ド全テハ何等カノ合併症ヲ有シテ最初ヨリ膀胱憩室ナラントノ豫想的診斷ヲ附スル事ハ至難事ナリサレド憩室ノ偉大ナル物ハ時トシテ尿蓄積甚シク患者自身ニヨリテ下腹部ニ腫瘍物トシテ之ヲ觸レ此事實ヲ訴フル者ナシトセズ、又其治療法方面ニ於テモ尙本邦ニ在リテハ遺憾ナガラ未ダ單ニ膀胱洗滌等ノ姑息的對症療法ヲ行フニ過ギズシテ現今歐米ニ於テ頻リニ行ハル、所ノ根治的憩室切除術ハ余等ノ寡聞ナル未ダ本邦ニ其報告アルヲ聞カズ。本手術ハ一八八九年 Osney 氏ガ始メテ之ヲ行ヒ其後 Young, Lerche, Blum 氏等相次デ之ヲ行ヒ最モ理想ニ近キ治療法トシテ推賞セラル、所ナリ、本教室ニ於テ偶々根治的切除術ニ成功セル一例ヲ得タレバ加フルニ數例ノ膀胱憩室ノ症例ヲ添ヘテ左ニ略述報告セント欲ス。

文 獻 ノ 梗 概

膀胱憩室ニ關スル文献及報告例ハ本邦ニ在リテハ未ダ其數十指ヲ出ズル事僅少ナリ翻ツテ歐米ノ文献ヲ繙クニ其數ハ餘リニ多クシテ一々枚舉ニ遑アラズ、是レ要スルニ未ダ歐米ニ比シテ本邦ニ於ケル吾々専門家ガ膀胱鏡検査及膀胱レントゲン寫眞撮影等ヲ行フ機會ニ乏シク、從テ膀胱憩室ヲ有スル患者モ當然見逃サレ、單ナル膀胱炎トシテ姑息的治療ヲノミ行フ内患者ハ其治療ニ倦キ、來院ヲ中止シ終ニハ續發セル合併症ノ爲メニ倒レ、有邪無邪ノ内ニ葬ラル、物ノ數ハ相當ニ多カルベケン、故ニ吾々ハ須ク膀胱疾患ニ遭遇シタル場合ニ其治療ト同時ニ膀胱鏡ヲモ併用シテ其診斷ヲシテ一層學術的ニ正確ナラシメ此ガ根治的治療マデ進マン事ヲ務ムベキナリ。

以下膀胱憩室ニ關スル文献中、根治的切除術ニ關スルモノ及特ニ興味アル報告ヲ年ヲ追フテ列舉セン。

一' Czerny 氏(一八九六年)ハ膀胱憩室切除例ノ世界第一例ヲ報告セリ。

二' Young 氏(一九〇六年)ハ膀胱憩室根治の切除術ヲ行ヘル五例ニ自身ノ經驗セル三例ヲ加ヘテ詳細ニ報告ス。

三' Lerche 氏(一九一二年)ハ根治の切除術ヲ施セル一四例ヲ蒐メ、之レニ自己ノ一例ヲ加ヘテ報告ス。

四' Genghty 氏(一九二二年)ハ外科の手術ヲ行ヘル大ナル膀胱憩室例ヲ發表セリ。

五' Goly 氏(一九二三年)ハ自己ノ經驗セル一四例ヲ舉ゲテ、膀胱憩室ノ手術の治療法及其豫備的膀胱切開ノ價值ニ就テ論ズ。

六' Cathoun 氏(一九二六年)膀胱憩室ノ診斷ニハ膀胱鏡トレントゲン線トノ併用ガ必要缺クベカラザルモノナリト論ジ、同時ニ嚙鈴狀結石ヲ有セル所謂潜伏性膀胱憩室ニ就テ報告ス。

七' Toulson 氏(一九二七年)ハ一五例ノ膀胱憩室ノ患者中ニ三例ノ攝護腺疾患ヲ有セシ事ヲ報告ス。

八' Davis 氏(一九二七年)ハ豫備的膀胱切開ガ憩室手術ニ必要ナル事ヲ自己ノ例ヲ舉ゲテ論ズ。

九' Lower and Higgins 氏(一九二八年)ハ膀胱憩室ノ一一〇例ヲ舉ゲ、其内四二例ノ多數ナル根治の切除術ヲ行ヒ、其等ニ就キテ詳細ナル論文ヲ發表セリ。

一〇' Plum 氏(一九二九年)ハ一九一九年ニ發表セル論文ニ其後自己ノ經驗セル根治の手術例三〇例ヲ加ヘテ其改版ヲ發表セリ。

一一' Rosenthal 氏(一九二九年)ハ輸尿管口部ニ發生セル所謂後天性ト思ハル、膀胱憩室ノ手術二例ヲ報告セリ。

手術例

患者 濱井某男 六十一歳 製茶業 初診昭和三年二月十日 即
日入院。

主訴 會陰部手術後瘻孔形成、會陰部腫脹及排尿困難。

家族史 特記スベキ事ナシ。

既往史 生來健康ナリ、唯青年時代ヨリ時々尿意頻數ナルコトアリ

シモ特ニ排尿困難等ノ苦痛ハ之ヲ感ゼザリシト三十年前ニ會陰部ニ外

傷ヲ受ケ一回ノ血尿ヲ呈セルモ其後自然尿ノ排出アリ、治療ヲ受ケズ
シテ治癒シ爾來平常ト變ラザリシト、花柳病ハ之ヲ否定ス。

現病歴 昭和二年三月突然排尿困難ヲ伴ハズシテ會陰部ニ疼痛ヲ訴

ヘ醫治ヲ乞ヒシニ、ブージー挿入檢索ノ結果結石ノ存在ヲ認メタリト

テ會陰部切開術ヲ受ケ、四月下旬ニ治癒セシモ數日後再び手術部ニ瘻
孔形成ヲ來シ排尿時數滴ノ尿ヲ漏スニ至レリ、次デ九月ニ瘻孔手術ヲ

受ケ約二十日間程ニテ治療セシモ、三度前同様ノ瘻孔形成ヲ來シ、大デ此瘻ガ甚シク腫脹化膿シ切開手術ヲ受ケ、其後今日マデ再三ノ腫脹化膿ヲ繰リ返シ常ニ瘻孔ハ完全閉鎖ヲナサズ、排尿困難ト共ニ甚シキ時ハ多量ノ尿漏出ヲ見ル事アリトイフ。

現 症 體格中等、榮養稍々佳良、顔貌ハ輕キ貧血ヲ呈シ、神經系統及内臟諸器關ニハ別ニ異常ヲ認メズ、ワ氏反應陰性、糞便中蠅蟲卵(卅)

陰部ノ視診及觸診ハ陰莖ニ特別ノ變化ナキモ、陰囊ニハ皮角血管腫ヲ存シ、左側陰囊ニハ輕キ陰囊水腫ヲ有ス、尙會陰部ニ於テ肛門ニ近ク瘻痕及瘻孔形成アリテ消息子ヲ約〇・五センチ挿入シ得タリ。兩腎共ニ觸知シ得ズ又腰痛ヲ訴ヘズ、膀胱部ニモ何等病狀ヲ認メズ、攝護腺ハ殆ド正常ナルモ多少ノ腫脹アルヲ感アリ。

尿所見ハ兩杯中等度ニ濁濁惡臭ヲ有シ、反應酸性、蛋白、糖共ニ陰性、顯微鏡の所見ハ尿圓塊(一)白血球(卅)上皮細胞(十)連鎖狀球菌(卅)

膀胱鏡所見 (第一回二月二十日) 膀胱容量一六〇cc以上、膀胱壁ハ一般ニ充血シ、浮腫狀ニ腫脹ス、只血管像ハ右側壁ニ於テ中等度ニ見ラル、ノミ、兩側輸尿管口ハ正常位ニ存シ結石、潰瘍及異物等ヲ認メズ、左側輸尿管口ノ外後方ニ於テ、其底面ヲ認メ得ザル、放射狀皺壁ヲ有スル約鳩卵大ノ膀胱憩室開口部ヲ發見シ、右側ニ於テモ之ト對稱ノ位置ニ深ク陷凹セル部ヲ見タリ、着色膀胱鏡検査、即チ一%インデゴカルミン五cc靜脈内注射後右側輸尿管口ヨリ四分十二秒、左側ヨリハ六分四十秒ニテ青色尿ノ週期的ニ排出スルヲ認メタリ。

一例眞性膀胱瘤室ノ統計的觀察 第二十卷 第一號 四
以上ノ所見ヲ綜合シ左ノ如キ診斷ヲ下セリ。

診斷 膀胱憩室、慢性膀胱炎、會陰部尿瘻、陰囊皮角血管腫及左側陰囊水腫。

入院後ニ行ヘル諸検査ノ成績。

一、血液學的検査

赤血球數 五三六〇、〇〇〇 白血球數 一、一五〇〇

血色素(ザリー氏) 五四% 血色素指數 〇・六三

白血球ノ種類 中性多核白血球 五五・二%

淋巴細胞 二九%(大淋巴球二・三%、

中淋巴球 五・二%、小淋巴球 二一・五%)

エオジン嗜好細胞 一三・三%

移行型 一・四% 大單核細胞 一・一%

二、腎臟機能検査(フェノールズルフォフタレイン法)

フェノールズルフォフタレイン一〇ccヲ法ノ如キ處置ヲ行ヒタル後正中靜脈内ニ注射シタルニ

注射後尿中出現開始時間 四分三十秒

第一時間 尿量三二〇cc フェノールズルフォフタレイン排出量

四〇%

第二時間 尿量一九五cc フェノールズルフォフタレイン排出量

一五%

三、チストグラフィー(二月二十一日)

一五%沃度ナトリウム液一二〇cc注入、透視及撮影、膀胱ニ像影ヲ注入シツ、透視スルニ膀胱影ガ次第ニ擴大スルト間モナク、耻骨

縫隙上縁ニ於テ膀胱ノ稍々左側ニ偏シテ鶏卵大以上ノ腫瘍ヲ生ジ、其増大セルト共ニ膀胱ハ右方ニ壓セラレテ正中線ヨリ稍々右側ニ偏シテ存シ、膀胱ノ右側ニハ何等ノ變化ヲ認メズ、此時患者ガ尿意ヲ訴ヘ努責シタルタメ膀胱内容ノ造影劑ハ流出シ、憩室内ニノミ液ノ殘留セル狀態ヲ撮影シ得タリ。

第一圖

膀胱及憩室ニ造影劑ヲ注入シテ撮影セルレントゲン像
(撮影時膀胱内容ハ尿意ニヨリテ自然ニ排泄セラレ造
影劑ガ主トシテ憩室内ニ殘レルコトニ注意)

視及撮影。

膀胱ニ空氣ノ注入ヲ行ヒツ、透視スルニ耻骨縫隙上縁ニ於テ殆ド同時ニ二ヶ所ニ透明ナル部ヲ呈ス、其一ハ其右方ニ於テカテーテルノ影ヲ見出シ正ニ膀胱ナル事ヲ認ム、左側ノ物ハ憩室ニシテ、尙一層ノ空氣ヲ注入スルモ其レ以上ニ増大セズ、之ニ反シテ膀胱ハ益々擴大スルヲ認メタリ、膀胱右側ニ於テハ憩室像ヲ認メ得ザリキ、尙寫眞像ニ於テネラトン氏カテーテルヲ以ツテ耻骨縫隙下ニ蠶豆大橢圓形結石陰影ヲ認ム。

此際ニ興味アル事ハ空氣注入後、起立セシメテ透視スルニ憩室及膀胱内ノ空氣ト著留セル尿トハ明カナル層ヲナシテ境シ而モ憩室内ニ於ケル空氣ト尿トノ境界線ハ膀胱内ノ其レヨリモ、高位ニ存スル事ナリ、而シテ此等二個ノ膨隆内ノ境界線ハ腹部ヲ壓スル時ニ於テ明カナル波動ヲ證明シ得タリ、附圖寫眞像ニ於テ明カニ之ヲ認メ得ベシ。(附圖第一)

入院後ノ處置

排尿困難及殘留尿多キト瘻孔形成アル爲メ入院ト同時ニ尿道ニ留置カテーテルヲ置キ、毎日膀胱洗滌及硝酸銀液ノ注入ヲ行ヒ、尿所見ノ稍々佳良ニ趣クテ手術ヲ施行セリ。

手術 (三月十五日) 腰椎麻酔ノ下ニ手術時間二時間三十分ヲ費セリ、豫メ手術前ニ丁寧ニ膀胱洗滌ヲ行ヒ、注入液ノ透明トオリシ後膀胱

内ニ約二〇〇ccノ滅菌硼酸水ヲ充シ置キ型ノ如ク高位切開ヲ下腹部ニ行ヘリ、即チ正中線ニ於テ約一〇cmノ皮膚切開ヲ行ヒ切開創ノ下方約三分ノ一ノ部ヨリ左方ニ向ヒテ約三cmノ筋層ヲ横ニ切開シ、レントゲ

四、ブノイモチストグラフィー(三月九日)空氣二四〇cc注入、透

原 著 北川、能勢 根治的切除術ニヨリテ治療セル眞性膀胱憩室ノ一例

第二十卷 第一號 六

ン寫眞ヲ参照シツ、強キ癒着ヲ念入リニ剝離シ、終ニ膀胱憩室外壁ニ達スルヲ得タリ、次デ憩室ト膀胱トノ連結部ヲ見出シ、憩室ノ後面ヲ剝離セントシテ容易ニ之ヲ剝離シ得ズ、止ムヲ得ズ前面ノ連結部ヲ剪刀ヲ以ツテ切離シ、後面ノ連結部ヲ殘シ、詳シク該部ヲ觀察スルニ、左側輸尿管ハ憩室ノ後面ニ於テ宛モ其壁中ヲ貫通セルヲ認メタレバ憩室壁後面ノ一部ヲ輸尿管ト共ニ之ヲ殘シテ憩室後壁ノ大部分ヲ切除シ膀胱壁トノ連結部ノ縫合ヲ行ヒタル後排膿管ヲ手術創内ニ挿入シテ筋層及皮膚縫合ヲ行ヒ、膀胱内ニハ留置カテーテルヲ挿入シテ手術ヲ了レリ。

第二圖 剔出セル膀胱憩室

手術後ノ經過 手術後約五日間ハ三八度位マデノ熱發アリテ、腹壁手術創ヨリノ尿排出多量ニシテ、甚シキ惡臭ヲ放チタルモ、毎日膀胱洗滌ヲ行ヒ、注入ヲナセルニ、次第ニ清潔トナリ、四月九日ニハ全ク手術創ハ癒着シ漏尿全クナクナルト同時ニ創面ハ非常ナル速度ヲ以ツテ治癒ニ向ヒ、四月二十日ニハ留置カテーテルヲ除去スル事ヲ得ルニ到レリ、同日再度ブノイモチストグラフイーヲ行ヘルニ空氣ノ増量ト共ニ擴張スル膀胱ノ影像ヲ得テ同時ニ右側ヲ下ニセル側臥位ト立位ニ於ケルレントゲン寫眞像ニ於テ可動性ナル蠶豆大橢圓形結石ヲ認メタリ、(附圖參照) 四月二十一日ニヤング氏手術用膀胱鏡ニテ結石ヲ摘出シテ膀胱鏡検査ヲ行ヘルニ、左側膀胱憩室ノ存セシ部ハ瘢痕狀トナリテ完全ニ治癒セルヲ認メタリ。

爾余ノ膀胱憩室例

第一例 荻澤某男 六十七歲 職業機關手 初診大正十二年一月二十七日 即日入院。

主 訴 排尿困難尿意頻數。

既往症 生來健康ニシニ著患ヲ知ラズ花柳病ヲ否定ス、

現病歴 發病ハ大正十一年十一月ニ輕キ排尿困難ヲ訴ヘ其後次第ニ増惡シ、特ニ苦痛ハ夜間ニ甚シク、大正十二年一月中旬ニハ尿閉ヲ起シ、終ニ就床スルノ止ナキニ到レリ、毎日導尿ニヨツテ排尿シ、甚シキ時ハ膀胱穿刺ヲ受ケシ事モ三回ニ及ビシト、大正十二年一月二十一日濟生會病院ニ入院シ一日一回ノ尿道擴張(ブーゾールンク)ヲ受ケタルニ排尿ハ困難ナルモ尿閉ハ起サザル程度ニナレリ、一月二十七日ニ攝護腺摘出術ヲ受クル目的ニテ當院ニ轉ジテ入院セリ。

現 症 體格稍大榮養中等、顔貌正常ニシテ内臟諸臟器及神經系統ニ異常ヲ認メズ、ワ氏反應陰性。

泌尿器系統 兩腎共觸知スルコトヲ得ズ又壓痛ヲ缺グ、攝護腺ハ約鷄卵大ニ腫脹シ、右葉ハ左葉ニ比シテ大ニシテ、硬度稍硬ク表面平滑壓痛ナシ。

尿所見 全尿稍、濁濁、比重一〇〇四、反應弱酸性、蛋白、糖、膽汁色素等共ニ陰性、尿圓嚢、赤血球(一)膿球及上皮細胞(十)葡萄狀球菌(十)。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ一般ニ輕度ニ發赤シ、肉柱形成中等度ナルモ、膀胱血管像ハ相當明瞭ナリ、兩側輸尿管口ハ正位ニ存シ異常ヲ認メズ、結石、潰瘍及異物等ヲ見ズ。

憩室 一、位置 左側輸尿管口ノ外側後上方

二、開口部 示指頭大ニシテ、放射狀皺襞ヲ有シ、其底部ハ暗黒ニシテ内壁ノ狀態不明ナリ。

合併症 攝護腺肥大症兼輕度ノ膀胱炎。

療法 攝護腺摘出術ヲ行ヒシノミニテ、特別ニ憩室ニ對ス治療ハ之ヲ行ハザリキ。

第二例 陳某男 六十五歳 無職 初診大正十二年十月十六日 即日入院。

主 訴 尿意頻數、會陰部疼痛及殘尿感。

既往症 生來健康ニシテ、三十年程前淋疾ニ罹患セル以外著患ヲ知ラズ。

現病歴 發病ハ約二年前血尿ト尿意頻數、放尿終末痛ニ始リ次第ニ

増惡シ、醫治ヲ乞ヘルニ、膀胱炎ノ診斷ノ下ニ、膀胱洗滌ヲ受ケ一時ハ症狀減退セルモ、治療ヲ止ムル時ハ直ニ症狀ノ増惡ヲ來ス。

現 症 體格強大榮養頗ル佳良、顔貌正常、内臟諸臟器及神經系統ニ異常ヲ認メズ。

泌尿器系統 兩腎ハ之ヲ觸知シ得ズ又壓痛ヲ缺グ。

攝護腺ハ約鷄卵大ニ腫大シ、表面平滑、硬クシテ、壓痛ナシ。

尿所見 全尿強度濁濁、反應酸性、蛋白(廿)糖(一)尿圓嚢(一)膿球(卅)赤血球(一)上皮細胞(十)大腸菌(廿)。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ一般ニ發赤腫脹シ、特ニ兩側輸尿管口部ニ於テ甚シ、結石、潰瘍、腫瘍及異物等ヲ見ズ。

憩室 一、位置 膀胱其底部ニシテ、兩側輸尿管口ノ中間ノ後方。

二、開口部 小指頭大ニシテ放射狀皺襞ヲ有ス。

合併症 攝護腺肥大症兼慢性大腸菌性膀胱炎。

療法 入院後膀胱洗滌ヲ行ヒ、膀胱ノ諸症狀ノ減退ヲ待テ尙進ンデ治療ヲナスベク豫定セルモ、患者家事ノ都合上事故退院ヲナセリ。

第三例 矢島某女 五十七歳 職業ナシ 初診大正十三年七月十八日、外來患者。

主 訴 血尿、放尿終末疼痛、尿失禁。

既往症 十三年前ニ膀胱結石ニテ結石除去術ヲ受ク、其他ニ著患ヲ知ラズ。

現病歴 約二ヶ年程前ヨリ上記ノ症狀ヲ訴ヘ其後醫治ヲ受クルモ、回復セズ今日ニ到ル。

現 症 尿ハ血性強濁、蛋白(十)糖(一)膿球(廿)赤血球(卅)上皮細胞

原 著 北川、能勢 根治の切除術ニヨリテ治療セル眞性膀胱憩室ノ一例

第二十卷 第二號 八

胞(十)連鎖狀球菌(廿)尿圓嚙(一)、放尿數晝間五回夜間二回位(外來患者ニテ全身所見等ノ記載ヲ缺ク)

膀胱鏡の所見 膀胱粘膜ハ一般ニ充血發赤甚シク、血管像ハ全ク不明、處々ニ粘膜剝離片及血痂片ヲ見ル、兩側輸尿管口ハ正常位ニ哆開シ、結石、潰瘍、異物等ヲ認メズ。

憩室 一、位置 左側輸尿管口ノ後内方。

二、開口部 拇指頭大ニシテ、放射狀皺襞ヲ有シ、底面暗黒。

合併症 連鎖狀球菌性膀胱炎。

療法 膀胱炎ニ對スル局所的治療ヲ施シタルノミニテ、憩室ニ對スル特別ナル治療ヲ行ハズ。

第四例 小池某男 十八歳 職業銀行重役 初診昭和二年十一月二十三日、即日入院。

主 訴 尿閉、尿意頻數。

既往症 生來健康ナリシモ、約二十年前糖尿病ニ、又十年前腎臓炎ニ罹患セル以外著患ヲ知ラズ、花柳病ヲ否定ス。

現病歴 發病ハ約二十年程前ヨリ排尿困難及尿意頻數ヲ訴ヘ、昭和二年春ニ突然尿閉ヲ起セシコトアリ、其後時々尿閉ヲ來シ、其度毎ニ醫治ヲ受ケタリト。

現 症 體格中等大榮養佳良。内臟諸臟器及神經系統ニハ異常ヲ認ズ、血液及骨髓液ワ氏反應陰性。

泌尿器系統 腎臟ハ兩側共觸知シ得ズ、又壓痛ヲ缺ク。

攝護腺ハ小鶏卵大、弾力性ニシテ柔軟、壓痛ナク、表面平滑ナリ。

舉丸、副舉丸、精系等ニ異常ナシ。

尿所見 全尿強度潤濁、反應弱酸性、蛋白(十)糖(一)膿球(卅)上皮細胞(十)グラム氏陰性桿菌(廿)尿圓嚙(一)。

腎臟機能検査ハ入院中三回之ヲ行ヒシニ留置カテーテル及膀胱洗滌ニヨリテ次第ニ良好トナレルヲ認メタリ。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ中等度ニ充血スルモ血管像ハ中等度ニ認めラル、一般ニ肉柱形成著シク、兩側輸尿管口ハ明ニ見ラレ正常位ニ哆開ス。

憩室 一、位置 兩側輸尿管口ノ中間後方稍々右方ニ偏シテ在ス。

二、開口部 豌豆大ニシテ、放射狀皺襞ヲ有シ、底面ハ暗黒ナリ。

合併症 攝護腺肥大症及慢性膀胱炎。

療法 患者ハ初メヨリ、手術ヲ欲セズ、攝護腺肥大ニハ、レントゲン深部療法ヲ、憩室ニ對シテハ留置カテーテルヲナシテ、膀胱洗滌ヲ行ヘル以外特別ナル療法ヲ行ハザリキ。

第五例 箱根某男 五十四歳 職業農 初診昭和二年十二月二十六日、外來患者。

主 訴 殘尿感尿意頻數。

既往症 生來健康、著患ヲ知ラズ、花柳病ヲ否定ス。

現病歴 發病ハ約一年程前ニシテ、醫治ヲ受クルモ増悪スルノミニテ回復セズ今日ニ到ルト。

現 症 體格中等大、榮養稍々不良、其他不詳。

泌尿器系統 腎臟ハ兩側共觸知シ得ズ、壓痛ヲ缺ク。

攝護腺ハ非常ニ肥大シ、彈力性ニシテ硬ク腰痛ナク、表面平滑ナリ
上端界ハ辛フジテ指端ヲ達スルコトヲ得タル程ナリ。

尿所見 殆ド清澄、反應酸性、蛋白(+)糖(一)、膿球(+)上皮細胞
(+)桿菌少數、放尿回数ハ晝間一時間一回、夜間二回位。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ正常ナルモ一般ニ肉柱形成著シク、輸尿管
口間隆起甚シク突隆シ、兩側輸尿管口ハ明ニ見ルコトヲ得ズ。

憩室 一、位 置 右側輸尿管口ノ後下方。

二、開口部 大豆大ニシテ、放射狀皺襞ヲ有シ、底面暗黒

ナリ。

合併症 攝護腺肥大症兼輕度ナル膀胱炎。

本患者ハ入院詳細検査ヲ勸メタルモ再來セズ。

第六例 町村某男 六十一歳 職業農 初診昭和三年二月一日外來
患者。

主 訴 排尿困難、尿失禁。

既往症 生來健康、三十五歳ノ時淋疾ニ罹レル以外著患ヲ知ラズ。

現病歴 約十年程前ヨリ排尿困難ヲ訴へ、醫師ニ導尿ヲ受ケシコト
再三ナラズ、約一年程前ヨリ症状益々増惡シテ今日ニ到ル。

現 症 體格中等大、營養佳良、血液ワ氏反應陰性。

泌尿器系統 腎臟ハ兩側共觸知スル事ヲ得ズ、腰痛ヲ缺グ、攝護腺
舉丸、副舉丸及精系等ニハ異常ヲ認メズ。

尿所見 全尿中等度濁濁、反應酸性、蛋白(±)糖(一)膿球(±)上皮
細胞(+)桿菌(+)、放尿回数晝間約二十回、夜間約十回。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ一般ニ充血シ、肉柱形成著シク、血管像ハ

原 著 北川、能勢、根治の切除術ニヨリテ治療セル眞性膀胱憩室ノ一例眞性膀胱憩室ノ統計的觀察 第二十卷 第一號 九

明カナラザルモ、側壁ニ散見セラル、兩側輸尿管口ハ正常位ニ明ニ見
ラル、結石、潰瘍、異物等ヲ認メズ。

憩室 一、位 置 膀胱前壁ノ殆ド中央。

二、開口部

約拇指頭大ニシテ、放射狀皺襞ヲ有ス只異ナル
ハ膀胱内溶液ヲ増加シテ見ルト其憩室ハ單一ナ
ラズ二段トナリテ第一段ノ陷凹部ニハ肉柱形成
アルヲ見ル其奥ニ底面暗黒ナル尙一層陷凹セル
部分アルヲ見タリ。

チストグラフィー。

(一) 三〇%臭素ナトリウム液一六〇cc注入、前上方及後下方ヨリ
ノ放射ニテ撮影ス。

(二) 一〇%沃度ナトリウム液一六〇cc注入前上方ヨリノ放射ニテ
撮影ス。

兩者共憩室ガ前壁ニ存スルタメ明カナル像影ヲ得ザリシモ憩室ト思
ハル、陰影ヲ得タリ。

合併症 慢性膀胱炎。

此患者ハ憩室ノ位置ヨリシテ、最モ切除手術ニ適セルヲ以テ入院手
術ヲ再三勸告シタルモ聽カズ、一週間程通院膀胱洗滌ヲナセルノミニ
シテ來院ヲ中止セリ。

第七例 深町某男 三十四歳 職業官吏 初診昭和三年八月四日外
患者。

主 訴 尿意頻數、放尿終末疼痛、尿濁濁。

既往症 生來健康ニシテ八年前ニ淋疾ニ罹患セシ以外ニ著患ヲ知ラ

原 著 北川、能勢 根治的切除術ニヨリテ治療セル眞性膀胱憩室ノ一例

第二十卷 第一號 一〇

ズ。

現病歴 發病ハ約二ヶ月前ヨリ前記ノ如キ症狀ヲ來シ、次第ニ増惡スルノミナリト。

現 症 體格中等榮養稍々不良。

泌尿器系統 腎臓ハ兩側共觸知シ得ズ該部ノ壓痛ヲ缺グ、膀胱部ハ輕キ壓痛ヲ訴フ、攝護腺、睪丸、副睪丸、及精系等ニハ異常ヲ認メズ。

尿所見 全尿中等度濁濁、反應酸性、蛋白(+)糖(+)膿球(++)結核菌(++)、放尿回数晝夜共二時間ニ一回位。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ一般ニ充血スルモ、前及側壁ニハ血管像ヲ認メ、膀胱底部ニハ多數ノ結核性結節及潰瘍ヲ存シ、其等ノ間ニ輸尿管口ヲ明ニ見ル事ヲ得タリ。

憩室 一、位 置 膀胱前壁及左側輸尿管口ノ後上方。

二、開口部 膀胱前壁ノモノハ拇指頭大他ノモノハ小豆大ニ

シテ、何レモ放射狀皺襞ヲ存ス。

着色膀胱鏡 インデゴカルミン靜脈注射後兩側共八分ニ及ブモ着色

尿ノ排泄ヲ見ズ。

合併症 兩側結核性腎臓炎兼膀胱炎。

本患者ハ左記ノ如キ合併症アルタメ如何トモナシ難ク、轉地療養ヲ勸メタリ。

第八例 金森某男 七十六歳 職業骨董商 初診昭和三年三月二十六日、外來患者。

主 訴 排尿困難、尿濁濁、放尿痛、尿意頻數。

既往症 生來健康ニシテ、著患ヲ知ラズ、花柳病ヲ否定ス。

現病歴 發病ハ約二十年程前ニシテ、放尿後直ニ尿意ヲ催シ相當量ノ排尿アル事ニ氣付ケリ、約十年前ニ突然排尿困難ヲ訴ヘ、終ニハ尿閉ヲ起シテ導尿ヲ受ケタリト、其後ハ一進一退ニテ、自分デ導尿ヲナシ居タルニ約三年程以前ヨリ主訴ノ如キ諸症狀増惡セリト。

現 症 體格大、榮養不良、顔面蒼白ニシテ常ニ苦惱ノ表情ヲ現ス。

泌尿器系統 右腎ハ其下極ヲ明ニ觸知セラレ、輕キ壓痛ヲ訴フ、左腎ハ觸知セズ又壓痛ヲ缺グ、膀胱部ハ壓痛ヲ訴フ、攝護腺、睪丸、副睪丸及系精等ニハ異常ヲ認メズ。

尿所見 前後尿共ニ濁濁シ、特ニ後尿濁濁ハ強ク、惡臭ヲ放ツコト甚シ、蛋白(++)糖(+)膿球(++)上皮細胞(+)桿菌、球菌共(++)、放尿回数晝間五―六回夜間三―四回。

膀胱鏡所見 膀胱粘膜ハ一般ニ灰白色ヲ呈シ、血管像ハ全ク不明、肉柱形成著シク處々ニ相當深キ、一見憩室カト思ハル、深キ陷凹部ヲ見ル、兩側輸尿管口ハ肉柱間ニ存スルタメカ明ニ見出スコトヲ得ズ。

憩室 一、位 置 右側輸尿管口後上方。

二、開口 輸尿管口部ノ物ハ指示頭大他ノ物ハ小指頭大ニ

シテ、此二者ハ明ニ放射狀皺襞ヲ有スルモ、他ノ多數ノ陷凹セル部ハ、所謂假性憩室ト稱スベク括約筋樣皺襞ヲ見ザリキ。

着色膀胱鏡 インデゴカルミン靜脈内注射後右側ハ憩室開口部ヨリ五分七秒ニテ着色尿ノ排出ヲ見タルモ左側ハ着色尿ノ排出ヲ明ニ見ルコトヲ得ザリキ。

合併症 高度ナル膀胱炎。

本患者ハ入院ヲ勸ムルモ聴カズ、當分外來ニテ膀胱洗滌後回復ヲ待
テチストグラフィー等詳細ナル検査ヲナスコトヲ約セルモ其後再來中
止セリ。

第九例 伊藤某女 三十四歳 職業勤人家族 初診昭和五年十一月
五日。

主訴 尿意頻數、尿濁濁。

現症歴 一昨年尿意頻數尿濁濁アリ本年春血尿ヲ見タリ症狀ハ次第
ニ増惡シテ本年八月ヨリハ醫治ヲ受クルモ輕快セズ。

現症 體格中等、榮養良。

泌尿器系統 腎ハ兩側共ニ壓痛ナク觸診ニテ之ヲ觸レズ、膀胱部ヲ

壓シテ尿意ヲ催フス、下肢ニ浮腫ヲ認メズ、

尿所見 全尿灰白黃褐色ヲ呈シテ一般ニ弱濁濁、反應酸性、蛋白(+)、
膿球(+)、赤色球(+)、桿菌(++)

膀胱鏡所見 膀胱ニ約一四〇ノ液ヲ充シテ檢スルニ膀胱底、後壁
及三角部ハ充血スルモ兩側輸尿管口ハ容易ニ發見セラレテ異常ナク潰
瘍、結石腫瘍等ヲ認メズ一個ノ憩室ヲ認ム。

憩室 一、位置 膀胱頂嶺ヨリ後壁ニ跨リテ存ス。

二、開口部 周圍ニ輕度ノ放射狀皺襞アリテ小動脈血管ニ富
ム開口部ハ五十錢銀貨ノ大サヲ超クルモ圓形ニ
シテ底面ノ陥沒ハ輕度ナリ、憩室粘膜ハ暗黒ナ
ラズシテ血管像ヲ認メ輕度ニ肉柱狀ヲ呈シ氣泡
ヲ此内ニ認ム。

姓名	年齢	主訴	尿所見	膀胱鏡所見	膀胱憩室ノ位置	膀胱憩室ノ數	合併症	治療法
荻澤	六七 合	排尿困難 尿意頻數	稍濁濁、蛋白、糖 膿球、上皮 細菌(+)、 圓嚢、赤血球	一般ニ輕ク發赤充血 肉柱形成中等度 血管像中等度明瞭	左側輸 尿管口ノ外 側後上方	1 示指頭	膀胱炎 攝護腺肥大	攝護腺摘出術ヲ行ヘル ノミニテ憩室ノ治療ハ 特別ニナサズ
陳	六五 合	排尿困難 會陰部疼痛 尿意頻數	中等度濁濁 膿球++、 細菌++、 上皮+	一般ニ發赤充血 結石潰瘍及腫瘍ナシ 血管像殆ド不明	膀胱基 底部兩 側輸尿 管口ノ 中間後	1 不明	膀胱炎 攝護腺肥大症	外來患ニテ特別ナル治 療ヲ行ハズ
矢島	五七 早	血尿、放尿 終末疼痛 尿失禁	血性強濁濁、膿 球(++)、 赤血球 菌(++)、 上皮(+)、 細菌	一般ニ強ク發赤ス、血 管像全ク不明、粘膜 離片及血痂片ヲ所々ニ 見ル、結石(一)	左側輸 尿管口 後内方	1 大指頭	膀胱炎	同上

膀胱憩室ノ發生原因

膀胱憩室ノ發生原因ニ就テハ世界各國ニ於ケル專門諸大家ノ説區々ニシテ或者ハ後天性ニ生ズト言ヒ他ノ者ハ先天性ニ存スルモノナリト論ジ其一致ヲ見出ス事ヲ得ズ。

Targett 氏(一八九三年)ハ膀胱憩室ノ發生ニ關シテ次ノ如キ説ヲ述ブ、即チ膀胱憩室ハ其等ノ區域ニ大ナル膀胱動脈ガ浸入セル膀胱基底部分ノ筋纖維ノ傷害ニ因リテ來ルモノニシテ又多數ノ例ニ於テ憩室ノ伸展擴張ハ膀胱ノ出口ニ於ケル障礙ニ原因スルモノナラント、Howard 氏ハ此説ニ賛成スルモ此等ノ事實ハ實際的ニハ男性ニハ當テ缺ルモ女性ノ症例ニ於テハ其當ヲ得ザル説ナルベシト述ベタリ。

Thomas 氏(一九一六年)ハ先天性ノ不完全若クハ小憩室ガ後天性ニ廓大スルタメニハ後天的ニ何等カノ排尿障害ヲ來シ、臨床的ノ種々ナル症狀ヲ伴フ事ガ憩室ノ發生上必要缺グベカラザル條件ナリトセリ。

Gudd 氏(一九一八年)ハ確實ニ憩室ガ先天性ニ小兒や嬰兒ノ時期ニ於テ既ニ存スルモノニシテ第一ノ原因トシテ膀胱ニ先天的ニ何等カノ缺陷ガアラネバナラスト論ズ。

Aschoff 氏(一九一三年)ハ膀胱憩室ヲ大別シテ眞性憩室ト假性憩室トノ二ツトシ、前者ハ膀胱壁全層ガ憩室壁ヲ形成シ一種ノ先天性畸形ト見做スベキモノトシ後者ハ肉柱ノ間ヲ膀胱粘膜層ノミガ囊狀ニ脱出セル狀態ヲ指スモノニシテ後天性ニ起レル排尿障害等ガ原因ヲナシテ膀胱内壓ヲ亢進セシメタル結果發生スルモノナリトナセリ此説ニハ諸大家ノ賛成スル者多シ。

Rose 氏(一九一七年)ハ膀胱ノ組織學的研究ヲ基礎トシ、膀胱憩室ノ成因ハ要スルニ先天的素因ト後天的原因ト相待ツテ生ズルモノナリトシ、膀胱三角部ノ境界ニ於テ最多ク發生スト稱ス Day, Martin, Hinman, Young 氏等モ亦之ニ賛成ス。

Blum 氏(一九二九年)ハ憩室ヲ眞性憩室ト假性憩室トノ二ツニ區別シ、尙前者ノ發生スル場所ニヨツテ種々ナル理由ヲ附シテ論ズ同氏ハ又先天性憩室ヲ有スル患者ニ於テ其他ノ臟器ニ先天性畸形例ヘバ兔唇、口蓋破裂、先天性心臟疾患、四肢畸形、脊柱破裂症等アリ又特ニ生殖器ニ於テ多ク見ラル、ハ男性ニテハ尿道下裂症、重複尿道、半陰陽等女性ニ於テハ兩角形子宮膣性尿道、等ヲ

同時ニ有スルコトアリト。

吾々ハ先天的素因ヲ有スル者ガ後天的原因ノタメニ膀胱ノ伸展擴張ヲ來シ、其ガタメニ臨床的症狀ヲ來スモノノミヲ通常膀胱鏡検査等ノ場合ニ偶然發見スルモノニシテ病理解剖學者等ノ如ク死體解剖ニヨリテ發見スルモノニ比スレバ其觀察ハ餘リニ表面的ナル、現今マデニ報告セラレタル憩室例中ニ於テモ單ニ Aschoff 氏ノ述ベタル所謂假性膀胱憩室ノ内ニ含有セラルベキ肉柱間ノ比較的深ク陷凹セル物モ亦相當ニ多カラント思ハル。

尙 Howard 氏ガ Targett 氏ノ說ハ男性ニ於テノミ當テ嵌リテ女性ニ於テハ其ノ當ヲ得ズトナセルモ Lower u. Higgin 氏ノ報告例中ノ一女性ニ於テハ尿道ニ甚シキ疼痛ヲ訴フルカルンクルスヲ有セシタメ常ニ膀胱ヲ完全ニ空虚ニスルコトヲ得ズ即チ排尿痛ノタメノ排尿困難ヲ有セシ一例アリ、又吾々ノ症例中ノ一例ノ女性ニ於テモ以前ニ膀胱結石ヲ有シ永ク排尿困難ヲ訴ヘシ例アリ此等二例ハ明ニ憩室ノ伸展擴張ニ大ナル誘因トナルモノト思ハル、而シテ吾々ハ先天的膀胱憩室ノ存在ヲ認ムルト同時ニ又後天的原因ニ因テ膀胱内壓ノ亢進ヲ來シテ膀胱ノ先天的ニ憩室ヲ形成シ易キ素質ヲ有スル部位ガ伸展擴大シテ憩室形成ヲナスモノ、存スルコトヲモ承認ス。

性 及 年 齡

報 告 者	男	女
Hinman	195	10
Legueu, Papin	138	38
Durrieux	118	9
Toulson	14	1
Jodd	131	2
Lower, Higgin	108	2
Blum	33	1
檜原(本邦)	9	2
著 者	8	2
合 計	756	67

膀胱憩室ト性トノ關係ハ内外ノ文献ニ徴スルニ何レモ其數ハ女性ハ男性ニ比シテ遙ニ稀ナリ、表示スレバ次ノ如シ、吾々ノ症例ニ於テモ男性八例ニ對シテ女性ハ二例ナリ。

年齡的關係ハ吾々臨床家ニ於テハ排尿困難等ノ症狀ヲ呈シテ後來院檢案ノ結果診定セラル、者多キガ故ニ病理解剖學者ノ報告ニアルガ如キ幼年又ハ少年期ノ憩室ヲ見出スコトハ皆無ニ近シトイフモ過言ニアラズ。

外國文献ニ於テハ或者ハ胎子ノ膀胱憩室ヲ又生後數日ノ嬰子ニ於テノ報告アルモ、本邦ニ於テハ杉村氏ノ報告例ヲ以テ最年少者トス。

吾々ノ症例中ニテハ、三十四歳ヲ以テ最年少者トシ最高年者ハ七十六歳ナリ。

内外ノ文献ニ現ハレタル年齢關係ヲ表示スレバ上ノ如シ、此表ニ於テ見ルニ其頻發スル年齢ハ五十歳ヨリ七十歳ノ間ニ多キ事ヲ知ル。

吾々ノ症例十例中六十一歳ヨリ七十歳マデガ五例ニシテ半数ヲ占ム。

膀胱憩室開口部ノ形態

膀胱憩室開口部ノ状態ハ圓形又ハ橢圓形ヲナスモノニシテ其憩室壁ノ組織學的構造及位置ニ因テ其形ヲ變ズ眞性憩室ニ於テハ筋組織ヲ有スルガ故ニ其開口部ハ宛モ括約筋ヲ存スルガ如キ放射狀皺襞ヲ有ス、假性憩室ノ如ク單ニ粘膜層ノミノ伸展擴張セル物ハ其開口部ガ前述ノ如キ皺襞ヲ有セズシテ、單ナル孔トシテ認メラレ開口部ノ形狀ハ多ク不正形ナリ吾々ハ此處ニハ眞性憩室ト思ハル、物ノミヲ報告スルニ止メタリ、假性憩室ニ屬スル物ハ憩室ト云ハンヨリモ寧

報告者 年齢	Judd	Lower Higgia	Blum	橋原	著者
10—20	1	1	0	1	0
21—30	4	4	3	2	0
31—40	9	4	2	0	2
41—50	14	13	10	2	0
51—60	44	16	7	5	2
61—70	48	33	9	1	5
71—80	13	20	2	0	1
81—90	0	2	1	0	0
不明	0	17	0	0	0

口肉柱間陷凹部ト稱スベキモノ多ケレバナリ。

膀胱憩室ノ數及位置

膀胱憩室ノ數ハ單發性ナルモノ最モ多シ左右對稱性ニ生ズルモノ及不規則ニ數多ノ憩室ヲ形成スルモノアリ。

其數ノ多キ物ニ到ツテハ English 氏ノ報告セル四〇個ニ及ベル物スラアリ此ノ如キ物ヲレントゲン寫眞撮影ヲナス時ハ宛然葡萄

萄ノ如キ状態ヲ呈ス、此ヲ Blum 氏ハ葡萄狀膀胱 (Traubenblase) ト稱セリ、本邦ニテハ井尻氏ノ報告セル五個ヲ以テ最モ多キ

例トス。

Casper 氏ハ先天性ノ物ハ後天性ノ物ニ比シテ其數ガ少シト言ヘル如ク多數ニ生ゼル物ハ假性憩室ニ屬スベキ肉柱間陷凹ナラント思ハル。

原 著 北川、能勢、根治の切除術ニモリテ治療セル眞性膀胱憩室ノ一例 附眞性膀胱憩室ノ統計的觀察 第二十卷 第一號 一六

吾々ノ眞性膀胱憩室ト思ハル、症例一〇例中七例ハ單發性ニシテ左右對稱性ノモノ一例及不規則ニ二個存セシモノ二例ナリ。

膀胱憩室ノ位置ハ、全膀胱到ル所ニ生ズルモ最モ多キハ膀胱基底、兩側輸尿管口附近ニシテ、此等ハ内外ノ文献ニ徴スルニ其大多數ハ前述ノ部位ノ物多シ。

吾々ノ症例ニ於ケル憩室數ハ一〇例ニテ一三個ヲ算シ、表示スレバ上ノ如シ。

左側輸尿管口附近	五
右側輸尿管口附近	二
基底部中間	二
右側輸尿管憩室	一
膀胱前壁	二
膀胱頂嶺	一

左側ハ右側ニ比シテ多キモ、此レハ何等意義アルモノニアラズシテ單ニ偶然ナルモノナラン。
尙憩室ノ位置ハ切除手術ヲ行フ場合ニ非常ニ關係ヲ有シ、解剖學上前壁ノ者ハ易ク上壁、側壁、後壁ノ順序ニテ其手術ヲシテ益々困難ナラシム。

膀胱憩室ノ大サ

憩室ノ大サハ區々ニシテ、小ナル物ハ小指頭大ノ物ヨリ大ナル物ハ Porthers 氏ノ五・五立
ノ液ヲ注入シ得タル例アリ本邦ニ於テハ井上氏ノ報告セル一六〇ccノ容積ヲ有セル物ヲ最大ト
ス、偉大ナル憩室ハ腹腔ノ殆ド全帶ニ涉テ擴張シ時ニ他ノ囊腫性疾患ト誤ラル、事アリト。

吾々ノ症例中根治的切除術ヲ施セル實驗例ハ六〇ccノ内容ヲ入ル、事ヲ得タリ他ノ症例ニ於テハ檢スルコトヲ得ザリシ事ヲ遺憾
トス。

膀胱憩室壁ノ變化

一般ニ憩室壁ハ肥厚ヲ呈ス、此ハ主トシテ慢性炎症ノタメニ來ルモノナルモ、然シ憩室ガ異常ノ大サニ伸展擴張ヲナス場合ハ却
テ其壁ハ菲薄トナル。

其他憩室壁ノ構造ニ就テハ種々ナル報告アリ。

Hinman 氏ハ上皮ノ切除セル憩室ヲ報告シ、傳染セル憩室ハ甚シキ漿液膜ノ變化ヲ呈ス、例ヘバ血管ノ充血ヲ有スル慢性炎症ノ
場合又潰瘍形成壞疽等ノ時ニ然リト。

Mitchel 氏ハ憩室壁ノ層ヲ次ノ如ク區別セリ。

一、粘膜層ハ一般ニ稀薄ナリ。

二、筋層ハ一般ニ肥厚シ筋纖維ハ常存シ、主トシテ括約筋様部即チ憩室開口部ノ附近ニ多ク存スト。

Blum 氏ハ憩室壁ニ於ケル粘膜ヲ多數ノ例ヲ檢索シテ次ノ如キ事ヲ述ブ、即チ、炎症ヲ有スル部ハ粘膜ヲ缺ギ、炎症ヲ起サ
バリシ部ハ粘膜ヲ有スト。

余等ノ切除セル憩室ハ其大サ約小兒手掌大ニシテ肉眼の所見ハ外面ハ一般ニ變化ナキモ、癒着セシ部分ハ漿液膜ハ殆ド缺損セル
ガ如シ、又内面ニハ肉眼のニハ粘膜層ヲ存セス輕キ肉柱形成ヲ見ル、憩室壁ハ膀胱壁ニ比シテ甚シキ肥厚ハナク、唯其壁ハ膀胱ト
ノ結合部厚ク之ニ遠カルニ隨テ厚サヲ減ズ。

切除セル憩室ヲ五ヶ所ニ於テ、切片製作ヲナシテ檢スルニ。

憩室ハ全體トシテハ殆ド粘膜層ヲ缺損シ、所々ニ島嶼狀ニ粘膜上皮層ヲ存ス、粘膜下組織ハ一般ニ充血シ、血管ノ擴張及新生ヲ
見其間ニ壞疽ニ傾ケル部分ヲ介在ス然シ小圓形細胞ノ滲潤ハ粘膜下層ヨリ筋層ニ到ル全層ニ存ス、即チ、憩室炎ノアリシ事ヲ證明
ス、又漿液膜ノ癒着セル部分ニ於テハ炎症現象甚シク殆ド全層ニ涉テ小圓形細胞ノ滲潤セルヲ認ム、筋層ハ膀胱壁ニ比シテ其分布
狀態ハ稍々少クシテ而モ多少萎縮ノ狀態ヲ呈ス。

膀胱憩室ト其周圍臟器トノ關係

憩室ノ位置ニヨツテ近接セル周圍臟器ト種々ナル關係ヲ生ズルモノニシテ此タメニ現ル、諸症狀ハ往々他ノ臟器ノ疾患トシテ取
扱ハル、例モ亦少カラザルベシ。

前壁ノ物ハ罕レナルモ上壁ニ生ゼル憩室ハ腹膜ト癒着シ憩室炎ニ引キ續イテ、腹膜炎ヲ惹起スル事アリ、側及後側ノ物ハ輸尿管
トノ癒着又ハ包埋等ヲ來シテ、輸尿管炎症惹テハ腎盂炎、輸尿管腎盂擴張、腎水腫、腎膿腫等ヲ惹起スルコトアリ。

後面及底部ニ生ゼル物ハ直腸、攝護腺、精囊等ト又ハ女性ニ於テハ子宮、卵巢、輸卵管及膈等ト癒着シテ種々ナル症狀ヲ呈ス、

尙膀胱頸口部附近ノ物ハ往々尿道ヲ壓迫シテ爲メニ尿閉ヲ起スコトアリ。

吾々ノ手術例ニ於テハ輸尿管ガ憩室後面中ニ殆ド包埋セラレタルガ如ク強キ癒着ヲ見タリ。

膀胱憩室ノ合併症

膀胱憩室患者ニ於ケル合併症ハ臨床上患者ガ來院スル主訴ヲ惹起スルモノニシテ、最モ多キハ膀胱炎即チ膀胱粘膜ノ細菌性感染ニシテ、次デ結石形成、腫瘍等ナリ、次ニ特別ニ憩室ト關係ヲ有シ、又多ク合併スルモノハ攝護腺肥大症ナリ。

膀胱炎ヲ併發スルハ臨床例ノ殆ド全部ト云フモ過言ニアラズ從テ輸尿管炎腎盂炎尿毒症等ヲ招來ス。

結石形成ハ憩室内ノミノ物、又ハ膀胱内ノミノ物、又ハ兩者ニ共存スル物、兩者ニ股ガリテ亞鈴狀ヲナシテ存スル物等ニシテ、外國文献ニハ憩室患者ノ一〇—二〇%ニ達スルモ本邦ニ於テハ井尻氏ノ報告セル一例ノミニシテ、余等ノ十例中二例ニ於テ以前ニ結石ノ手術ヲ受ケタリトイフ既往ヲ有スル者ノミニシテ憩室内ニ現存セル例ヲ見ズ。

腫瘍ハ合併症トシテ來ルコトハ罕ナリ其種類ハ癌腫惡性上皮細胞腫等ニシテ、外國文献中ニ散見スルモ本邦ニ於テハ之ヲ見ズ。攝護腺肥大症ハ憩室患者ニ合併スルコト多クシテ、表示スレバ次ノ如シ。

報 告 者	憩室患者數	攝護腺肥大症ヲ合併セル例數	%
Legler u. Papin	一八五例	七一例	三八%
Güdd u. Scholl	一三三例	八一例	六〇%
Blum	三四例	一七例	五〇%
著 者	八例	四例	五〇%

而シテ憩室ト合併セル攝護腺肥大症ノ諸症狀ハ其増惡速ニシテ、直ニ第二期ノ症狀ヲ呈シ、尙腎臟機能ノ障碍サル、事モ亦比較的早期ニ來ル。

膀胱憩室ノ呈スル症狀

膀胱憩室ノミニテ其他ノ合併症ナキ場合ニハ何等認ムベキ症狀ヲ呈セズシテ經過スルモノアルベケレド、二次的ニ來ル併發症ニヨリテ始メテ種々ナル訴ヘヲナスモノナルコトハ前述ノ如シ、但シ其憩室ガ異常ニ大ナル時又ハ膀胱頸部ニ近ク存スル場合等ニハ他ノ合併症ヲ伴ハズシテ尙排尿困難ヲ訴フルコトアリ。

一般ニ憩室患者ハ排尿困難、尿意頻數、尿失禁、尿閉等ヲ訴ヘ結石形成、腫瘍發生、攝護腺肥大症及高度ノ膀胱炎等ヲ合併スル場合ニハ血尿ヲ招來スルコトアリ。

尙膀胱炎ト同時ニ憩室炎ヲ惹起シ、次デ膀胱周圍炎ヲ伴ヒ周圍ノ臟器ニモ炎症ノ蔓延ト癒着トヲ招來スルノミナラズ憩室ノ壞疽ヨリ穿孔シ、腹腔内ニ傳染ヲ來シ腹膜炎ヲ惹起セシムルニ到ル事アリ。

其他ノ症狀トシテハ常ニ認メラ、モノハ殘留尿ニシテ此ハ攝護腺肥大症、尿道狹窄症及憩室ノ異常ニ大ナル場合等ニ來ル。

尿所見トシテハ全々清澄ニシテ變化ナキ場合アルモ、通常細菌感染ノタメ濁濁ヲ呈シ、尙高度ノ憩室ニ於テハ排出尿ノ初メハ濁少ク、次デ排出スル尿ハ甚シキ濁濁ト惡臭トヲ有スルモノアリ、又此等ノ患者ヲ導尿スルニ、最後ニ膀胱部ヲ壓シテ排出セシムル尿ハ全ク膿性ナル例ヲモ經驗セリ、蓋シ此ハ憩室内ニ停留セル尿ガ有形成分ヲ沈澱シテ甚シク膿性トナレル爲メナリ。

尙憩室ノ大サニヨリテハ、排尿時ニ初メノ第一回ノ排尿後間モナク尿意ヲ催シテ次デ相當量ノ排尿ヲナスモノアリ、此ノ如キ二段の排尿ハ憩室及攝護腺肥大症患者ニ特有ナル症狀ノ一ナリ、吾々ノ症例ニ於テハ排尿困難ヲ訴フル者五例尿意頻數九例尿閉一例尿失禁二例、放尿終末疼痛二例、殘尿感一例血尿一例等ナリ。

膀胱憩室ノ診斷

膀胱憩室ノ診斷ニハ膀胱鏡検査トチストグラフィートノ缺グベカラザルハ論ヲ待タズ、前者ニヨツテ其開口部ノ位置及狀態其他ノ合併症ヲ檢スベク後者ニヨツテ、憩室ノ形狀大サ及其周圍トノ關係ヲ詳細ニ知り得ベシ。

又膀胱鏡検査ヲナスト同時ニ、最モ簡單ニ行ヒ得ラル、着色膀胱鏡検査ヲ併用シテ、腎臟機能ノ狀態ヲ見ルコトハ手術ニ向テ最モ必要ナリトス。

原 著 北川、能勢—根治的切除術ニヨリテ治愈セル眞性膀胱憩室ノ一例附眞性膀胱憩室ノ統計的觀察 第二十卷 第一號 二〇

チストグラフィーニハ現今種々ナル造影劑ヲ用フ、例ヘバコラルゴール溶液、ブローム加里液、ブロームナトリウム液、沃度ナトリウム液、リビオドル等はナリ。

吾々ハ常ニ一五—二〇沃度ナトリウム溶液ヲ用ヒタリ、而シテ寫眞撮影ヲ行フ場合ハ豫メ先ヅ造影劑ヲ注入シツ、其量ニヨリテ現ハル、膀胱像ヲ螢光板ヲ用ヒテ詳シク觀察スルノ必要缺クベカラザルハ論ナキ所ナリ。

吾々ハ特ニブノイモチストラヂオスコピー及ブノイモチストグラフィーヲ賞用ス、此方法ハ、膀胱内容ヲ充分ニ排出セシメタル後其量ヲ量リツ、空氣ヲ徐々ニ膀胱内ニ注入スルモノニシテ此際モ、吾々ハチストラヂオスコピーヲ行ヒ、充分ナル觀察ヲナシテ其後寫眞撮影ヲナスヲ常トス。

此方法ハ他ノ造影劑ニ比シテ簡單ニシテ、何等藥物的刺激症狀ヲ呈セズ、又後發ノ苦痛ヲモ與ヘズ、容易ニ行ヒ得ルノミナラズ結石ヲ合併スル場合ニハ結石ノ像影ヲ明ニスルコト他ノ方法ニ比シテ優ルコト數等ナリ、此外尙室憩患者ノ場合ニ興味アルコトハレントゲン寫眞上ニ於テ其憩室内ニ殘留セル尿ノ水面ト、膀胱内ノ水面トガ其高サヲ異ニスルコトヲ認メ得ルコトナリ。

鑑別診斷 膀胱憩室ト其他ノ膀胱疾患トノ鑑別ハ膀胱鏡ヲ用フル時ハ殆ド其必要ナキガ如キモ、往々ニシテ高度ナル肉柱膀胱ニ於テハ其肉柱間陷凹部ヲ眞ノ膀胱憩室ト誤ルコトアリ此ハ已ニ詳述セル其開口部ノ狀態等ヲ觀察シテ知り得ベシ、尙異常ニ哆開セル輸尿管口ヲ憩室ト誤ルコトハ着色膀胱鏡ニヨリテ區別シ得ベシ。

其他膀胱壁ガ周圍臟器ト膀胱壁トノ癒着ノタメニ強ク牽引セラレシ爲メニ宛モ憩室様ノ狀態ヲ呈スルモノアルハ注意セザルベカラズ次ノ二例ハ吾々ガ經驗セルモノナリ。

第一例 高田某女 二十五歲 職業ナシ 初診昭和二年三月四日 外來患者。

主訴 排尿困難、排尿時不快感、尿量減少。

診斷 慢性膀胱炎。

家族歴 不明。

既往症 大正十五年一月中旬蟲様突起炎ノ診斷ニテ、對症療法ヲ受ク同年七月中旬腸出血アリタリト。

現病歴 發病ハ昭和二年二月下旬頃ニシテ、主訴ノ如キ症狀益々増悪スルノミニシテ今日ニ到ル。

現症 體格中等大榮養不良胸腔臟器ニハ異常ナク、兩腎ハ充分ニ觸知シ得ザルモ右腎部ハ甚シキ壓痛ヲ訴ヘ、左腎モ亦下端ニ壓痛アリ、膀胱部ハ特ニ右側ニ偏シテ輕キ壓痛ヲ訴フ、腹部ハ一般ニ膨隆ヲ呈ス。

尿所見 全尿稍々濁濁、反應酸性、蛋白痕跡陽性、糖(一)、膿球(卅)、小球菌(十)、結核菌(一)、尿圓嚢(一)ナリ。

膀胱鏡所見 膀胱壁ハ一般ニ充血シ、一部ニ輕度ノ肉柱形成ヲ見ル、血管像ハ中等度ニ著明、兩側輸尿管口ハ殆ド正常位ニ明瞭ニ存ス、膀胱後壁ニ於テ稍々右側ニ偏シタル部ニ於テ宛モ膀胱憩室開口部ニ潰瘍ヲ有スルガ如キ狀態ヲ呈セル陷凹部ヲ存シ、其底面ハ全ク暗黒ナリ蓋シ此レハ眞性憩室ノ如キ開口部ノ放射狀皺襞ヲ缺グ點及既往症等ヨリ觀察スルニ以前罹患セル蟲様突起炎ノ際ニ腸管ノ一部ト膀胱壁トノ癒着ヲ生ゼルタメ強ク牽引セラレタル結果トシテ生ゼシモノナラン。

本患者ハ全身症狀惡ク、一時歸宅セシメタルニ、其後再來セズ詳細ナル検査ヲナスコトヲ得ザリシヲ遺憾トス。

第二例 磯某男 七十八歲 職業ナシ 初診昭和二年七月二十八日。

本患者ハ攝護腺肥大症及膀胱結石ノ診斷ノ下ニ入院シ、膀胱鏡検査及チストグラフィー等ヲ行ヘルモ、憩室ヲ認メザリシニ、高位切開術ニテ膀胱結石除去ヲ行ヒ治療後膀胱鏡検査ヲナセルニ切開ヲナセル膀胱前壁ニ於テ放射狀皺襞ヲ有セル小指頭大ノ開口部ヲ有スル眞性憩室ト殆ド同様ナル陷凹部ヲ見タリ、此ハ其部位ヨリシテ、前回ノ膀胱鏡検査ニテ見落シタリトハ考ヘラレズ、蓋シ高位切開術後續發セル癒着牽引ノ爲メニ生ジタルモノタルヤ論ヲ待タズ。

膀胱憩室患者ノ豫後

膀胱憩室ハ自然ニ治癒スルコトナキモ、其患者ノ豫後ハ憩室ノ大小位置等ニヨリテ一定セズ、小ナル物ハ何等障礙ヲ來サズシテ過グルモノモアルベク、又位置ノ關係等ニテ合併症ヲ來サル場合ニハ其豫後モ亦良好ナルコトモアルベシ、然レ共一度攝護腺肥大症、尿道狹窄、膀胱頸部ノ種々ナル障礙及細菌感染等ヲ伴フ時ニハ次ノ如キ危險ナル症狀ヲ惹起シ終ニハ一命ニモ及ブモノナリ。

原 著 北川、能勢 根治的切除術ニヨリテ治愈セル眞性膀胱憩室ノ一例 眞性膀胱憩室ノ統計的觀察

第二十卷 第一號 二二

一、慢性ナル尿蓄積ニ因ル膀胱及憩室ノ擴張伸展。

二、膀胱及憩室内結石形成。

三、憩室内新生物形成。

四、慢性敗血症ヲ伴フ憩室炎次デ上行性ニ膀胱炎輕尿管炎腎盂炎及腎臟炎ヲモ惹起スルニ到ル。

五、憩室炎膀胱周圍炎及憩室壞疽等ニ因テ來ル穿孔ヨリ腹膜炎及周圍臟器ヘノ感染炎症ヲ起サシム。

要スルニ憩室患者ノ豫後ハ其治療法ノ如何ニ據ルモノニシテ、姑息の對症療法ハ之ヲ全治セシムルコト能ハズ唯根治的切除術ニヨツテノミ完全治癒ヲ期待シ得ルナリ。然シ此方法ニ於テモ其豫後ハ年齡全身狀態、特ニ腎臟機能及憩室ノ大サ及位置及合併症等ノ如何ニ因テ一定セズ、特ニ攝護腺肥大症ノ場合ニハ腎臟機能ガ障礙セラル、事多キガ故ニ豫メ充分ナル注意ト檢索トヲ要ス、Blum 氏ハ攝護腺肥大症ヲ合併スル時ニハ先ヅ攝護腺剝出術後憩室切除術ヲ二次的ニ行フベキコトヲ多クノ例ヲ舉ゲテ報告セリ。

Blum 氏ハ膀胱憩室ノ豫後ニ關シテ次ノ如ク述ブ即チ、

一、膀胱憩室ハ排尿困難、殘尿、出血等重大ナル障礙ヲ起サルカ或ハ結石形成新生物細菌感染等複雑ナル合併症ヲ惹キ起サル時ハ多クノ場合比較的障礙ナキ微候ヲ呈スルモ然シ其ハ遅カレ早カレ殆ド例外ナク重篤ナル危險多キ微候ヲ伴ヒ來ルガ故ニ特ニ顧慮スベキ惡性疾患トシテ考フベキモノナリト。

二、合併症トシテ來ルベキ諸疾患末ダ起ラザルニ先チテハ出來ルダケ早期ニ憩室囊ノ根本的切除術ヲ行フ事ヲ理想トスト。

三、又此手術ノ豫後ハ全身狀態特ニ腎臟機能ノ良好ナル時ニハ何等危險ヲ伴ハザルモノナリト。

四、若シ根本的手術ノ不適當ナル場合ニハ姑息のナル手段ヲ行ヒツ、其回復ヲ待ツテ後ニ二次的ニ根本的手術ヲ行フベキデアルト。

五、外科的手術ヲ應用シ得ザル場合ハ全テ其患者ノ豫後ハ全々不良ナルモノト考フベキナリ。

六、要スルニ膀胱憩室ノ豫後ハ次ノ諸事項ニ關係ス。

イ、輸尿管及腎臓ノ状態

ロ、膀胱及憩室ノ感染程度

ハ、憩室ノ場所形態及憩室開口部ノ位置

ニ、結石及腫瘍等合併症ノ有無

膀胱憩室患者ノ豫後ハ要スルニ根本的切除術ヲ行ヘル場合ニ於テ良好ナラシムル事ヲ得ベク、單ナル姑息的治療法ニ因テハ其豫後ヲ良好ナラシムコトハ得ザルナリ。

膀胱憩室ノ治療

憩室ノ治療法トシテハ多々アルモ、現今歐米ニ於テ盛ニ行ハレツ、アル根治的切除術ヲ以テ、其理想的ノモノトス、此切除方法ニモ術式ニヨリテ左ノ五ツニ區別ス。

一、豫備的膀胱切開ヲ行ハザル高位腹膜外憩室切除術 (Suprapubische extraperitoneale Divertikelexzision ohne vorhergehende Eröffnung der Blase)

二、豫備的膀胱切開ヲ行フ高位腹膜外憩室切除術 (Suprapubische extraperitoneale Divertikelexzision nach vorhergehender Eröffnung der Blase)

三、高位經腹膜の憩室切除術 (Transperitoneale, suprapubische Divertikelexstirpation)

四、薦骨部腹膜外憩室切除術 (Sakrale, extraperitoneale Divertikelexstirpation)

五、會陰部憩室切除術 (Perineale Exstirpation des Divertikels)

以上ノ術式ハ合併症、憩室ノ大サ、位置及附近ノ臓器等トノ關係ニヨリテ定メラル、モノナリ。最モ理想的ナル方法ハ第一ノ方法ナルモ多ク用ヒラル、方法ハ第二ノ術式ニシテ此ハ合併症トシテ、攝護腺肥大症、結石形成等ノ場合ニ其等ノ手術ヲモ兼ね行フ事ヲ得ルノミナラズ、又腎臟機能障礙ノ存スル時ニハ其回復ヲ待テ切除術ヲ行ヒ得ルノ利アリ。根治的切除術ニ不適應ナルハ結核性

膀胱炎惡性腫瘍等ノ場合ニシテ其他輸尿管ヲ憩室壁内ニ包埋セル時モ亦之ヲ行フ事ヲ得ズ。

余等ノ用ヒタル方法ハ第一ノ方法ニシテ、其部位ガ左側壁ニ存シ而モ輸尿管ト憩室後壁ト確ク癒着セルタメ一部分ノ憩室壁ヲ殘シテ切除スルノ止ムナキニ至レルモ其結果ハ良好ナリキ。

之ヲ要スルニ憩室患者ニ遭遇シタル時ハ全身狀態、腎臟機能等ヲ充分檢索シテ、適應ナリト認メタル場合ハ進ンデ根治的切除術ヲ行フベキナリ。

考察及結論

余等ハ根治的剔出術ニ成功セル一例ト眞性膀胱憩室ト思ハル、九例ヲ舉ゲテ左ニ考察シ結論ヲ下サントス。

一、膀胱憩室ノ發生原因ノ根本ニ就キテハ先天的畸形ト、素質ニ加フルニ後天的(即チ第二次的)誘因ガ伴フコトガ必要ナル條件ナルベシ。

二、性及年齡 男性ハ女性ニ比シテ、攝護腺尿道等解剖學的關係上其症例甚ダ多シ、但シ先天的畸形及素質ニ於テハ異ナル管ハナキモ、所謂第二次的誘因ノ關係スルコト多キハ論ナカルベシ。

三、眞性憩室開口部ハ多ク放射狀皺襞ヲ存スルガ如ク、又其部ヨリ底面ヲ見ルニ多クハ暗黒ナリ、假性ノモノハ皺襞少キカ又ハ之ヲ缺ギテ底面ハ明ニ見ルコトヲ得ベシ。

四、余等眞性憩室ハ單發ヲ最多トシ、(余等ノ症例中七例)左右相對性ノモノ一例、不規則ニ二個存セシモノ二例ニシテ眞性ト認ムベキ多發性ノモノヲ見ズ多發性ノ物ハ恐ラク、所謂假性憩室ト稱スベキモノナラン。

五、憩室ノ位置ハ、畸形ハ別トシテ、先天的素因ヨリ考フルニ膀胱内壓ニ對スル抵抗ノ最モ弱カルベキ構造ノ部ニ多キガ如シ、膀胱基底部及輸尿管口附近ニ多シ、此レハ内外文獻ノ一致スル所ナリ、蓋シ此等ノ部ハ排尿時最後マデ膀胱全壓ヲ受ケ、且其後面ハ直腸ニシテ、此ヲ支フルニ余リニ、弱キニ失スルコトヲ考フル必要アルベシ、尙此位置ハ手術的治療ニ際シテ、非常ナル關係ア

ル前述ノ如シ。

六、膀胱憩室ノ大サ、先天性眞性憩室ハ其大ナルモノハ全腹腔内ヲ充ス程ノ物ヨリ小ナルモノハ小指頭大ナル物アリ、余等ハ遺憾ナガラ只手術例ノ約六〇〇ノ内容ヲ入ル、ニ足ルコトヲ知レルノミ。

七、眞性膀胱憩室壁ハ余等ノ檢セル結果ヨリ見ルニ、單ニ膀胱壁ノ全層ノ擴張伸展ニシテ、其他ニハ全層ニ渉ル第二次的ニ招來セル炎症所見ヲ見ルノミ。

八、周圍ノ臟器トノ關係ハ余等ノ手術例ニ於テハ左側輸尿管ガ憩室後壁ニ於テ殆ド包埋セラレタルガ如ク強キ癒着ヲ見ル。

九、合併症ハ膀胱内壓ヲ充ムル尿路疾患ヲ第一トシ、次デ周圍臟器ノ影響ヲ考フベク、余等ノ一〇例中合併症ノ最多ハ膀胱炎ナリ次デハ攝護腺肥大症ニシテ男子八例中四例ヲ算シ憩室内ニ結石及腫瘍ノ現存セルヲ見ザリキ。

十、症狀、合併症ノ如何ニ因ルモ、小ナル物ニ於テハ何等二次的變化ヲ招來セザル先天性眞性憩室ニ於テハ自覺的ニ症狀ヲ呈セズシテ經過スルモノアルベシ、一度前述ノ如キ合併症ヲ伴フ時ハ其等ニ應ジテ種々ナル症狀ヲ呈スベシ、特筆スベキ症狀ハ大ナル憩室所有者ニ於テハ攝護腺肥大症ヲ合併セザル場合ニモ尙二段の排尿アリ。

十一、診斷ニ缺クベカラザルモノハ膀胱鏡の檢索ト此ニ附隨シテ行フベキ諸檢査及チストグラフィーナリ、尙余等ハ持ニ憩室患者ニ於テプノイモチストスコビー及フノイモチストグラフィーヲ推賞シテ止マズ。

十二、鑑別診斷、前述ノ方法ヲ用フル時明カナルベケレド、只余等ハ、周圍臟器ノ炎症等ニヨリ來ル膀胱壁ノ癒着牽引ニヨル陷沒憩室ト混同スベカラズ。

十三、豫後、何等ノ合併症ヲモ招來セズシテ幸運ナル經過ヲ採ル者アルベキモ其ハ甚ダ少數ニシテ第二次的ニ來ル合併症及之ニ次デ來ル第三次的、例バ腎機能障礙惹テハ全身の疾患ニヨリテ斃ル、モノ多シ。

十四、治療法、總テノ條件良キ時ハ須ク根治的切除術ヲ行フベシ。

原 著 北川、能勢 根治的切除術ニヨリテ治愈セル眞性膀胱憩室ノ一例 附眞性膀胱憩室ノ統計的觀察 第二十卷 第一號 二六

附 圖 說 明 (手術例)

附圖第一圖 膀胱憩室內ニ空氣ヲ注入シテ撮影セルレントゲン像(膀胱ト憩室トノ尿ノ水平線ノ高サノ異ナルニ注意)

附圖第二圖 手術後膀胱ニ空氣ヲ注入シ右側臥位ニテ撮影セルレントゲン像(膀胱尿中ニ沈メル可動性結石ノ像ニ注意)

附圖第三圖 手術後膀胱ニ空氣ヲ注入シ立位ニテ撮影セルレントゲン像(膀胱尿中ニ沈メル可動性結石ノ像ニ注意)

圖 附 文 論 勢 能， 川 北

圖 一 第

圖 三 第

圖 二 第

Dernato-urological Department, Keio University, Tokio, Japan

(Director of urology: Prof. Dr. M. Kitagawa)

A case of the genuine vesical diverticulum, healing with the complete excision.

(Appendix: The statistic view of the genuine diverticulum)

Prof. Dr. M. Kitagawa

Dr. H. Nose

The authors reported a case of the genuine diverticulum of the urinary bladder, healing with the complete excision and in addition made statistic observation on ten cases (male 8, female 2) of the genuine vesical diverticulum.

From Dermato-urologic Institute, Keio University, Tokio, Japan.

(Director of the urological clinic: Prof. Dr. M. Kitagawa)

Urethral stricture in the female

K. Sakaguchi

Dr. Earle had read paper concerning stricture of the female urethra in 1828. From that time little attention has been paid to that problem as a rare condition of small importance, but most authors agree that its occurrence is very rare as compared with urethral stricture in the male. And as a further contribution to the study of the subject, I propose to describe nine cases of our clinic, which in respect to symptomatology and pathology are of interest.

Case. I. The patient, a widow, age 50. She complained of the pain on the both region and the turbidity of urine. On examination of the urethra there was definite contraction of urethra at the anterior third of it which admitted a No. 15 bougie with some difficulty.

Case. 2, The patient, age 42. She was attacked by frequent urination, retention of urine and the pain before and after urination. Upon the examination of the urethra, there was a stricture at 0.5-1.0 cm. above the external orifice, which permitted the passage of a N. 15 bougie.

Case. 3. The patient, age 69. She was suffered from the retention of urine.