原發性「陰莖デフテリー」ノ1例

Dr. K. Miyauchi:

Über die Primäre Penisdiphtherie.

慶應義塾大學醫學部皮膚科泌尿器科教室（泌尿器科主任 北川教授）

醫學士 宮 内 憲 一

1, 緒 言

「デフテリー」ノ最モ普通ナル罹患部位ハ呼吸氣道ニシテ其ノ大多數ハ上氣道ニ來ルモノナリ。「デフテリー」ノ皮膚ニ來ル事ハ稍稀有ニシテ皮膚ハ寧ロ「デフテリー」ノ異常罹患部位ト見ルヲ得可シ。「皮膚デフテリー」ハ全身殆ド至ル所ニ於テ發シ得ルモ其ノ最モ屢々見ラルル部位ハ顔面、耳殻後部、身體皺襞部等ニシテ女子外陰部ニ來ル事多キハ從來ヨリ注意セラレタリ。之ニ反シテ男子外陰部ノ「デフテリー」ニ侵サルル事ハ女子ニ比スレバ遙ニ少シトセラレタルモノナレドモ、余ガ最近十餘年間ノ文献ヲ涉獵シタル範圍ニ於テハ男子陰莖ニ來レル「デフテリー」13例ヲ得、之ヲ女子ノ陰唇又ハ陰莖ニ來レルモノノ14例ニ比スルニ必ズシモ稀ナリト云フ可カラズ。然ルニ「デフテリー」性包皮龜頭炎又ハ尿道炎ノ記載ハ之ヲ成書ニ見ルモ詳細ナルモノ無シ、由テ此ニ上記12例ト著者ノ經驗セル1例ニツキテ少シク臨床的觀察ヲ試ミントス。

2, 症 例

松○種○。生後24日、男子
初診。昭和7年4月20日
入院。同年同月28日
主訴。包皮ノ腫脹發赤並ニ潰瘍形成
家族歴。父母健在、父ハ幼少時ニ「デフテリー」
ニ罹患セル外著患ヲ知ラズ。同胞1名健在
現症歴並ニ現症。3月27日某病院ニテ出生、分娩經過ハ正規産ニシテ平易ナリキ。生後ノ發育順調ニシテ體重増加、營養狀態等正常ナリ。4月10日（生後15日目）包皮尖端ニ輕度ノ發赤腫脹アルニ氣付キ亞鉛華澱粉ノ撒布及ビ硼酸水濕布等ヲナシ4月12日退院セリ。本腫脹發赤ハ退院後モ減退ノ傾向無ク益々増惡シ4月19日ニハ37.6°Cノ發熱アリ

4月20日遂ニ當外來ヲ訪レタリ。之ヲ見ルニ包皮尖端ハ示指頭大ニ腫脹發赤シ、其ノ周圍ニハ浸潤アリ。當日ハ「亞鉛華オレーフ油」ヲ塗布シテ歸宅セシメ、4月22日再來セルヲ見ルニ包皮尖端ハ壞疽狀トナリテ僅少ノ微ニ黑色ヲ帶ビタル膿ヲ出セリ。「リバノール濕布」ヲナシタルモ4月25日ニハ包皮壞疽ハ更ニ擴大シテ大豆大トナリ、益々増大ノ傾向アリ。右側鼠蹊腺ハ2、3大豆大ニ腫脹セルヲ認メ之ヲ壓スルニ號泣ス。4月28日ニ至リテハ包皮ノ尖端部ハ脱落シ龜頭ノ一部ハ露出セリ。龜頭表面ニハ淡黃灰白色ノ薄キ苔アリ、下層トハ比較的密ニ接着ス。包皮ノ脱落端及ビ陰莖尖端部ニハ諸所ニ扁豆大ノ潰瘍散在シ表面ニハ灰白黃色

ノ義膜ヲ被ル。膿性分泌物ハ比較的少ク包皮囊ノ残留スル部位ニモ膿様物ノ滞留無シ。陰莖、陰阜ヨリ陰囊ニ亘リテ瀰漫性ノ稍々紫色ヲ帶ビタル發赤アリ浮腫狀ニ腫張ス。之ヲ入院セシメテ觀察スルニ壞疽ノ進行ハ益々速カニシテ陰莖根部ニ於テモ何等分界線ト認ム可キモノヲ形成セズ。龜頭ハ其ノ大半ヲ露出セリ。陰囊ハ腫張シテ遂ニ皺壁ヲ見ザルニ至レリ。(第1圖)

尿道口ニ於ケル義膜ニ因リテ尿線ハ尿道外口ニ於テ四散シテ放射セラル。

此ノ義膜様附着物ノ一部ヲ剝離シテ鏡檢スルニ「グラム氏染色法」陽性ノ桿菌多數及ビ球菌、多核白血球少數ヲ認メタリ。更ニ「ナイセル氏染色法」ヲナスニ該桿菌ハ兩端ニ異染色體ヲ有シ典型的ナル「ダフテリー菌」ノ形態ヲナセリ。(第2圖)

更ニ「レフレル氏培養基」上ニ菌培養ヲ試ミタルニ多數ノ黃白色浸潤セル「ダフテリー菌」様聚落ヲ生ジタリ。而シテ本菌ハ海狼ニ對スル毒性ヲ證明シ得タリ。

患者ノ口腔粘膜、咽喉粘膜、眼球結膜等ハ全ク正常ニシテ、口腔、咽喉ヨリ菌培養ヲ試ミタルモ陰性ニ終レリ。尿ハ清澄、蛋白無ク之ヲ培養スルモ細菌ヲ證明セザリキ。

診斷。原發性「陰莖ダフテリー」

治療並ニ経過。此ニ於テ4月30日「ダフテリー」血清2500單位ヲ大腿内側ニ注射シ、局所ニハ「リバノールガーゼ」ニテ濕布ヲ施セリ。24時間後ニ至リテハ未ダ著變ヲ認メザリシモ龜頭表面ノ義膜ハ稍々菲薄トナリ下層ニ微ニ紅色ノ色調ヲ透見シ包皮脱落端ノ義膜モ亦少シク鬆粗トナリ2、3紅色ノ小潰瘍面ヲ露出セル部分ヲ出現スルニ至レリ。

病變ノ進行ハ全ク停止シタルガ如シ。局所ハ朝夕實扶の里血清ニテ濕シタル「ガーゼ」ヲ以テ濕布セリ。血清注射後48時間後ニハ義膜ハ既ニ著シク鬆粗トナリ、濕布「ガーゼ」交換ノ毎ニ少量宛剝離シ紅色ノ潰瘍面ハ次第ニ廣クナレリ。外陰部ノ發赤ハ消褪シ、陰囊ノ浮腫狀腫張モ亦減退セリ。尿ハ再ビ太キ一條ノ尿線トシテ排泄セラルルニ至ル。5月3日ニ至リテハ龜頭面ニ於テモ義膜ハ次第ニ脱落ヲ始メ數ヶ所ニ小ナル淺キ潰瘍面ヲ露出セリ。包皮潰瘍部モ義膜殆ド剝離シ、包皮ノ半島狀ニ突出シテ殘ニセル部位ハ其ノ基底ニ於テ明瞭ナル分界線ノ形成セラレタルヲ認ム。

5月4日ニ至リテハ包皮ノ潰瘍面ハ鮮紅色ノ肉芽ヲ認ムルニ至リ、龜頭ニ於テモ冠狀部ニ於テハ全ク義膜脱落シ比較的清潔ナル淺キ糜爛面ヲ露出ス陰囊ハ尙暗赤色ヲ呈スルモ腫張ハ顯著ニ減退シ陰囊皺襞ヲ現スニ至レリ。5月5日龜頭全面ノ義膜全ク脱落シ、6日ニ至リテハ龜頭冠部ヨリ次第ニ表皮形成ヲ見ルニ至リ右側鼠蹊腺腫張モ亦消失セリ。タゞ繫帶部ニ於テノミハ5月8日ニ至ルモ義膜ヲ殘シ此ノ部ヨリ菌培養ナスニ尙陽性成績ヲ得タリ。患部全面ニハ硼酸亞鉛華軟膏ヲ貼用シ置キタルニ繫帶ニ於ケル義膜モ稍々遅レテ17日ニ至リテ全ク脱落シ、20日ニハ全患部全ク表皮形成ヲ了リ龜頭ニハ纖細ナル皺襞ヲモ認ムルニ至レリ。包皮ハ全ク脱落シ包皮脱落端ハ龜頭冠狀部ノ僅カニ後方ニ於テ平坦ニ治癒シ、龜頭ハ冠狀部迄露出セルモ瘢痕等ヲ認メズ、外形ハ全ク正常ノ儘ニ治癒シ、5月21日全治退院セリ。(第3圖)

退院時尿並ニ患部ニツキテ菌培養ヲ行ヒタルモ陰性ニ終レリ。

第 1 表

	著者	年齢	原因	罹患部位	他部位「ダフテリー」	合併症	療法	備考
1	Peiper (1919)	初生兒	原發性	陰莖	臍「ダフテリー」鼻咽 喉ニ菌證明			母ハ鼠蹊部皮膚「ダフテリー」
2	Polland (1921)	1年6月	〃	龜頭炎				

3	Paul (1921)	6年	續發性	龜頭炎 (外尿道口)	咽喉「デフ テリー」			
4	Cochrane (1921)	3年6月	原發性	龜頭包皮 炎				3年前腸管 環狀切除術 ヲナス
5	Mogilnicki (1925)	1年3月	續發性	龜頭包皮炎 (外尿道口)	「鼻腔デフ テリー」?		8000單位血 清 1週後治 癒	
6	Schreus (1926)	成人	原發性	陰莖潰瘍			5000單位 血清	治癒後 3週 間ニシテ後 麻痺ヲ發ス 感染機轉ハ 不潔ノ性交 ?
7	Saynisch u Goergen (1927)	成人	〃	尿道「デフ テリー」			3000單位血 清 2回ニテ 急速ニ治癒 ス	性交?
8	Bailey (1928)	26年	〃	龜頭包皮炎		鼠蹊腺腫 張	20000單位 血清數日後 淋巴腺腫張 去ル	
9	Vasil (1928)	1年4月	〃	包皮炎		發熱, 鼠 蹊腺腫張		
10	Prinzing (1928)	28年	〃	包皮龜頭炎		鼠蹊腺腫 張	20000單位 血清局所ニ モ1000單位 血清塗布	妻ノ膀胱, 子ノ咽喉ニ 菌ヲ證明ス
11	Schmidt (1929)	30年	〃	包皮壞疽			20000單位 血清「カメ レオン」水 浴, 「ソーダ 浴」2ヶ月後 瘢痕治癒	
12	Mrongo- vius (1929)	23年	續發性	陰莖皮膚壞 瘍	顔面, 下肢, 腸骨部皮膚 「デフテリ ー」	多發性淋 巴腺腫張		
13	池 田 (1930)	22年	〃	龜頭炎, 尿 道炎	咽喉, 結膜 「デフテリ ー」	尿閉	10000單位 血清治療	
14	宮 内 (1932)	1月	原發性	龜頭包皮炎		鼠蹊腺腫 張	2500單位血 清 3週後全 治	近接者ニ臍 「デフテリ ー」アリ

3, 文 獻 考 察

既往10餘年間ニ於ケル文献ヲ涉獵シ散在セル「陰莖デフテリー」ノ症例ヲ集メタルニ次ノ13
例ヲ得タリ。即チ第1表ノ如シ。

本表ニ就キテ觀察スルニ男子外陰部ニ來ル「デフテリー」ハ原發性ノモノ比較的多ク他部位例ヘバ「氣道デフテリー」等ヨリ續發スルモノハ寧ロ尠シ。罹患部位ハ龜頭及ビ包皮ヲ侵サルル事最モ多ク、尿道ノミヲ侵スモノハ稀ナリ。陰莖皮膚ニ發スル「デフテリー」ハ會陰、鼠蹊部、臍部等近接部位ノ「皮膚デフテリー」ヨリ續發スル場合多シ。罹患年齡ハ一般ニ小兒殊ニ2歳未滿ノ乳兒ニ多ク、症例ノ約半數ヲ占メ殘餘ノ半數ハ20歳乃至30歳ノ壯年者ニ來ルモノナリ。一般ニ「デフテリー」ハ2歳未滿ノ小兒ニ最モ多ク年齡ト共ニ減少スルモノニシテ、「陰莖デフテリー」モ亦此ノ法則ニ適合スルモノナリ。

合併症トシテハ約半數ニ於テ鼠蹊腺腫張ヲ見ル可ク、義膜ニヨリ尿道口ヲ閉鎖スレバ排尿障礙又ハ尿閉ヲ起ス可ク、相當ノ發熱ヲ見ル事アリ。

續發性「陰莖デフテリー」ノ原發病竈ハ咽喉ヲ以テ最モ多シトナス。次デハ鼻腔、眼結膜ノ「デフテリー」、他部位ノ「皮膚デフテリー」等ナリ。尙咽喉、鼻腔等ニ病變ヲ認メズシテ「デフテリー」菌ヲ證明スル事アリ。

感染機轉ニ關シテハ全ク知ル事ヲ得ザル事多キモ、父母、同胞、友人等ノ近接者ニ「デフテリー」患者又ハ保菌者ヲ發見スル事アリ。病院内ニ於テ汎發性ニ傳染ヲ起スモノアリ。特ニ「陰莖デフテリー」ニ於テハ腔内ニ「デフテリー」菌ヲ有スル婦人トノ性交ニヨリテモ傳染シ得ル事アリ。

療法ハ本病ノ診斷確定セルモノニハ殆ト常ニ「デフテリー血清」ノ注射ヲ試ミラル。注射量ハ2500單位乃至20000單位ニテ奏効シ何レモ急速ニ治癒ニ赴クモノナリ。潰瘍甚シキモノハ瘢痕ヲ以テ治癒ス。

「デフテリー」後麻痺ハ「陰莖デフテリー」ニ於テモ起リ得ルモノニシテ1例ニ於テハ血清注射後3週間ニシテ外膊皮神經麻痺ヲ來セリ。

4, 症 狀

「皮膚デフテリー」ノ男子外陰部ニ於テ發生スル時ハ大多數ハ包皮龜頭炎ノ形ヲトル。初發部位ハ先ヅ包皮炎ヲ起シテ二次的ニ龜頭ヲ侵スモノト、尿道又ハ外尿道口ノ周圍ヲ侵シ次デ龜頭ニ炎症ヲ及ボスモノトニ大別ス。汎發性ニ「皮膚デフテリー」ヲ發シタル時ハ其ノ一部トシテ陰莖皮膚ヲ侵ス事アリ。

包皮炎症ノ形ヲトルモノハ平常包莖ヲ有スルモノニ來リ、先ヅ包皮ノ紫赤色ノ腫張ニ氣付ク。本腫張ハ日ト共ニ益々顯著トナリ多クハ疼痛ヲ伴フ。包皮外口ヨリハ極メテ僅少ノ分泌物ヲ出シ、始メハ粘液様、間モナク膿様ヲ呈ス。包皮ノ發赤腫張ヲ示セル後4—5日ニシテ義膜ヲ生ズルモ、包皮囊内ニ於テ發生セル時ハ之ヲ認メ得ザル事アリ。平常ハ非癰腫性ナリシ包莖モ包皮ノ腫張ニヨリテ包皮ヲ後退セシメ得ズ包皮囊内面ノ觀察ヲ困難ナラシム。10日乃至數日ニシテ

包皮ノ壞疽ヲ生ジ、灰白黃色ノ義膜ヲ附着シ僅少ノ分泌物ヲ出ス。陰阜、陰囊ヨリ會陰部ニ亙リ稍紫色ヲ帶ビタル瀰漫性發赤並ニ浸潤ヲ生ズ。局所淋巴腺ハ發病後10日乃至2週間ニシテ腫張ヲ認ムル事アリ、壓痛ヲ訴フルモ化膿、自潰等ニ至ル事ハ稀ナルガ如シ。包皮壞疽ハ包皮外口部ヨリ包皮内面ニ擴大シ更ニ進メバ包皮ノ内外面ニ穿孔ヲ起ス事アリ。壞疽ニ陷レル包皮尖端部ハ次第ニ脱落シ龜頭ヲ露出ス可シ。龜頭ハ發赤腫張シ多クハ全面ニ亙リテ義膜ヲ被リ甚シキ時ニハ義膜ハ外尿道口ヲ被ヒテ排尿ヲ妨ゲ、尿線ハ散亂シ、又ハ全ク尿道口ヲ閉鎖ス。包皮、龜頭ヨリ次第ニ其ノ隣接部ニ擴リ、陰莖、陰囊、ニ潰瘍ヲ多發スル事アリ。即チ本症狀ノ特徴ト認ム可キモノハ比較的分泌物少ナキ乾燥セル壞疽又ハ潰瘍ガ絶ヘズ進行性ニ擴大スルモノニシテ壞疽又ハ潰瘍ノ表面ニハ灰白黃色ノ下底ニ強ク附着セル義膜ヲ被リ、周圍ハ暗紫赤色ノ發赤浸潤アリ。

「尿道デフテリー」ハ外尿道口ニ近キモノト尿道深部ニ來ルモノトアリ。尿道深部ニ來レルモノニ於テハ初期ニ於テハ唯排尿時疼痛ヲ訴ヘ同時ニ粘液様分泌物ヲ出シ、一般尿道炎ノ症狀ト異ナルコトナシ。尿道炎ニ對スル一般治療ニハ頑強ニ抵抗シ數ヶ月ニ亙リ治癒セズ、排尿障礙又ハ尿道異物介在ノ感ヲ訴フ。尿道鏡ヲ以テ之ヲ見レバ尿道内ハ強度ノ炎症アリ、尿道粘膜ニハ種々ナル大サヲナセル境界明瞭ニシテ灰白色ノ義膜ヲ附着セル病竈アリ出血シ易シ。尿道内部ニ發生セルモノモ次第ニ尿道口ニ近ク擴大シ、遂ニハ外部ヨリ之ヲ認メ得ルニ至ル可シ。初メヨリ尿道外口ニ發生セルモノハ比較的早期ニ於テ其ノ病變ヲ認メ得ク龜頭ノ發赤腫張ト共ニ灰黃白色ノ義膜ヲ有スル潰瘍ノ形成ヲ見ルモノナリ。潰瘍ハ進行性ニシテ龜頭全面乃至尿道内ニ及ビ得ク、義膜ハ厚サヲ増シ、全ク尿道口ヲ被ヒテ排尿ヲ不能ナラシム。尿道内部ニ於ケル義膜モ亦尿閉ノ因トナル可シ。義膜ハ強ヒテ之ヲ剝離スレバ潰瘍面ヲ露出シ容易ニ出血ス。

全身狀態ハ侵サレザル事多キモ尙時ニ40°Cニ達スル熱發ヲ起シ、著シキ病感ヲ訴フル事アリ。初發ノ數日後ニ一時輕熱ヲ發スルハ屢々見ル所ニシテ淋巴腺腫張又ハ「呼吸氣道デフテリー」ヲ併有スル時ハ發熱ス可シ。

一般ニ「デフテリー菌」ト他ノ細菌、例ヘバ葡萄狀球菌、連鎖狀球菌等トノ混合感染ニヨリテ症狀ヲ甚シク重篤ナラシムル事ハRitter, Neisser, Gins等ニヨリテ説ヘラルル所ニシテ、連鎖狀球菌トノ共存ニヨリテ「デフテリー菌」ノ毒性(Roux u. Yersin, Funck, Bloch u. Sommerfeld), 發育(Bernheim), 毒素形成(Hilbert, Valagussa-Ranelletti)等ハ著シク強大トナル事ハ幾多ノ實驗的證明アリ。Biebersteinハ毒性ヲ有セザル「デフテリー菌」ノ附着セル浴盤ヲ用ヒテ入浴セル多數ノ入院患者中連鎖狀球菌ニ感染セル創面ヲ有シタル一患者ノミ「創面デフテリー」ヲ發シタルヲ記載ス。著者ノ經驗セル症例ニ於テモ亦「デフテリー菌」ト共ニ連鎖狀球菌及ビ葡萄狀球菌ヲ證明セリ。本症例ガ發病後數日ニシテ症狀急激ニ惡化シタルハ或ハ此ノ

際ニ於ケル混合感染ニヨルモノカ。

5, 感 染 機 轉

「陰莖デフテリー」ノ感染機轉ハ一般「皮膚デフテリー」ノ感染機轉ニ異ル所無シ。即チ之ヲ大別シテ自家傳染ト他家傳染トニ分チ得可シ。

自家傳染ノ因トナルモノハ即チ他部位ニ於ケル「デフテリー」病變ノ存在ナリ。「咽喉デフテリー」ヲ有スルモノ (Paul, 池田), 「鼻腔デフテリー」ヲ有スルモノ (Mogilnicki), 「眼結膜デフテリー」ヲ有スルモノ (池田), 「皮膚デフテリー」ヲ有スルモノ『Mrongovius, Peiper (「臍デフテリー」)』等アリ。更ニ他部位ニ菌ノミヲ保有シテ病變ヲ示サルモノモ亦自家傳染ノ因トナリ得可ク, Peiper ノ症例ハ鼻腔, 咽喉ニ何等病變ヲ認メザリシモ「デフテリー菌」ヲ培養シ得タルヲ記載ス。自家傳染ニヨリ「陰莖デフテリー」ヲ發スル機轉ニ關シテハ原患部ヨリ手指其他ヲ以テスル接觸接種ノ他, 「陰莖デフテリー」ニ於テハ特ニ「デフテリー菌」ノ經腎臟排泄ニヨル尿中「デフテリー菌」ノ存在ガ其ノ因ヲ爲ス事アリト想像セラル。Conradi u. Bierast ハ155例ノ検査中54例ニ尿中「デフテリー菌」ヲ證明シ, 同ジク Bayer ハ19例中全部, Freifeld ハ10例中4例ソノ尿中ニ「デフテリー菌」ヲ證明セリ。

此ノ如キ場合ニ於テ尿道, 龜頭, 包皮等ニ於テ僅少ナル損傷, 炎症等アル時ハ「デフテリー菌」ノ感染ヲ起ス事ハ容易ニ想像シ得ル所ナリ。

他家傳染ノ因トナルモノハ近接セル「デフテリー」患者ヨリノ直接傳染ヲ以テ最多トナシ。Peiper ハ患兒ノ母ニ「皮膚デフテリー」ヲ有シタルモノヲ報告ス。「デフテリー菌」保菌者ヨリ傳染スル事アルハ勿論ニシテ Prinzig ハ患者ノ妻ノ腔腔, 子ノ咽喉ヨリ「デフテリー菌」ヲ證明セリ。特ニ「陰莖デフテリー」ニ於テハ患者ト交渉アル婦人ノ腔内ニ於ケル「デフテリー」菌ノ存在ハ甚ダ密接ナル關係ヲ有スルモノニシテ Prinzig ノ症例ニ於テハ確實ニ之ヲ證明シ, Saynisch u. Goerger, Schreus ノ症例ニ於テモ「デフテリー菌」ノ腔内存在ヲ想像セリ。初生兒「陰莖デフテリー」ニ於テモ一般「皮膚デフテリー」ト同様母體ノ腔腔ニ存在スル「デフテリー」菌ニヨル事アリ。褥婦ノ腔内ニ於ケル「デフテリー菌」ノ陽性率ニ就キテハ, Broer 23.3%, Litx 14.2%, Wauschkuhn 5.5%, Lönne u. Meyringh, Lönne u. Schucht, 塚原ハ0%ヲ記載ス。

他家傳染ニ於テハ更ニ「デフテリー」患者ノ周圍ニ存在スル物品ヲ介スル間接傳染モ亦想像シ得ル所ニシテ著者ノ症例ニ於テモ本例患者ノ出生時入院シ居タル病院ニ「臍デフテリー」患者ノ存在セル事實アルヲ以テ之レヨリ浴盤洗濯盥其他何等カノ物體ヲ通ジテ感染セルモノニ非ズヤト推察スルモノナリ。

Cochrane ノ報告セル1例ハ其ノ感染機轉ニ就キテハ3年前生後數ヶ月ニシテ行ヒタル腸管

環狀切除術ノ際ニ接種セラレタルモノニ非ズヤトナセリ。手術創ヨリ感染シ得ル事ハ勿論ナレドモ其ノ發生迄ニ本例ノ如キハ餘リニ長日月ヲ要シ過ギタル感アリ。

6, 診 斷

「デフテリー菌」性疾患ノ特徴ハ皮膚表面ノ潰瘍及ビ灰黃白色ノ義膜形成ナリ。然レドモ稀ニハ義膜ヲ剝除スル事アリ。又本症ノ如ク包皮囊内又ハ尿道内ニ潰瘍ヲ形成シタル時ハ外部ヨリハ其ノ形成ヲ認メ得ザル事アリ。

潰瘍面ノ分泌物ハ稍特異ナリ。分泌物ハ比較的僅少ニシテ膿性ナルヨリハ寧ロ粘液性ヲ呈シ血液ヲ混ズル事多シ。尿道内ニ發生セル時ハ多量ノ膿性分泌物ヲ出シ、他ノ原因ニヨリテ來ル尿道炎ト異ナル所無キ事アリ。

包皮及龜頭ニ發生セルモノハ陰莖ヨリ陰阜、陰囊、會陰等ニ亙リテ稍廣汎ナル浸潤ヲ呈シ、表面ノ皮膚ハ暗紫赤色ニ著色シ陰囊ハ顯著ナル浮腫ヲ呈シ陰囊皺襞ハ全ク消失スルモノアリ。

局部淋巴腺ノ有痛性腫脹、潰瘍面ノ疼痛、體溫上昇等ヲ伴フモノアリ。

非特異療法ニ對スル頑強ナル抵抗ハ屢々本症ニ對スル診斷ニ根據ヲ與フルモノニシテ單純性包皮龜頭炎又ハ尿道炎ノ療法ハ本症ニ對シテ殆ド効果ヲ示サズ、之ヲ見テ初メテ本症ノ疑ヲ懷クニ至ル事多シ。

患者ノ他部位ニ於ケル「デフテリー」性疾患ノ既往又ハ存在、患者ノ近接者ニ於ケル「デフテリー」ノ存在等ヲ確メ得タル時モ亦診斷ノ一助タリ得可シ。

本症ト類症鑑別ヲナス可キ疾患ヲ列舉スレバ軟性下疳、淋菌性尿道炎、淋菌性潰瘍、潰瘍性梅毒初期硬結、陰莖結核、異型の陰部疱疹、特發性壞疽、凍傷等ナリ。感染機轉、發生原因、罹患年齡等ハ鑑別ノ參考トナリ得可シト雖モ其ノ決定的所見ヲ與フルモノハ細菌學的檢索ナリ

塗擦染色標本、一般ニ「皮膚デフテリー」ニ於ケル病竈部位ヨリスル塗擦染色標本ニ「デフテリー菌」ヲ證明スル事ハ尠シト記載セラルルモ「陰莖デフテリー」ニ於テハ比較的容易ニ塗擦標本中ニ菌ヲ見出シ得ルモノニシテ本14例ニ於テモ其ノ大部分ハ塗擦標本ヲ以テ既ニ「デフテリー菌」ヲ證明セリ。「グラム氏」陽性ノ桿菌ヲ見出セル時ハ先ヅ疑フ「デフテリー菌」ニ置ク可ク、更ニ「ナイセル氏染色法」ヲ試ム。本染色法ニ於テ特有ナル異染性小體ヲ見出セル時ハ其ノ診斷ハ益々確實ナリ。然レドモ異染性小體ヲ有スル桿菌ハ「デフテリー菌」ノ他所謂假性「デフテリヤ」菌、Rohde ニヨリテ稱ヘラルル *Bac. dermatophilus* ニ屬スルモノアリ。之等ノ鑑別ハ染色標本ノミヲ以テナス事ハ困難ニシテ培養、免疫、毒力試験、特異療法等ヲ試ミテ決定ス可キモノナリ。

培養；「レフレル氏培養基」ニ培養スレバ表面濕潤セル聚落ヲ形成ス。Radice ハ10%「オレイン酸ナトリウム寒天培養基」ニ培養スレバ假性「デフテリヤ菌」ハ良ク發育スルモ眞正「デ

フテリー菌」ハ發育セズトイフ。「假性デフテリヤ菌」ト「眞正デフテリー菌」トノ鑑別ニハ此ノ他糖分解試験ヲ行フ。即チ「デフテリー」菌ハ多數ノ糖ヲ分解スルモ Saccharose ヲ分解セズ、「假性デフテリー菌」ハ糖分解ヲナス事ナシトイフ。

免疫試験ニテ最モ廣ク行ハルル方法ハ即チSchickノ反應ナリ。之亦診斷ノ一助タリ得可シ。

鼠又ハ海狸ニ對スル毒性ノ有無ヲ以テ「デフテリー菌」,「假性デフテリー菌」ノ鑑別ニ決定の診斷ヲ與フルモノトナスモノアリ。(Adler, Bieberstein, Sachs, Radice) 一部ノ論者ハ動物ニ對スル毒性ト人體ニ對スル毒性トハ必ズシモ並行セザル事ヲ主張ス。(Neisser und Ging etc)

特異療法ニ對スル治療結果モ亦診斷の價値アリ。然レドモ「デフテリー」血清ハ非特異性蛋白體療法ノ意味ニ於テ作用スル事アリ。丹毒其他非「デフテリー」性疾患ニ於ケル奏効例ノ報告アリ (Koller, Pollak), 一方疑ヲ入レザル「デフテリー」性疾患ニシテ「デフテリー」血清療法ノ何等奏効ヲ示サザル事アルヲ見レバ特異療法ニヨル診斷モ亦稀ニ例外アルヲ思ハザル可ラス。

7, 療 法

特異療法, 診斷確定セル後ニ於テハ免疫血清ハ療法ノ第1線ニ立ツモノナリ。「陰莖デフテリー」ニ於テモ他部位「デフテリー」ト同ジク免疫血清ノ臀筋内注射ヲ行フ。注射量ハ成人5000單位以上 20000單位ノ程度ヲ以テ標準トナシ顯著ナル奏効ヲ見ルモノナリ。小兒ニ於テハ2500單位乃至 10000單位ヲ以テ適量トナス。尙局部ニ於ケル免疫血清ノ塗布, 免疫血清粉末ノ撒布等モ治癒ヲ促進スト言フ。

局所療法トシテハ特ニ行フ可キモノ無キモ「リバノール」濕布,「カメレオン水浴」,「プロタールゴール」塗布, 其他ノ殺菌の處置ヲナシテ混合感染ヲ防ギ, 肉芽發生セル時ハ軟膏ヲ貼布スベシ。

一般血清療法ニ於テ見ラル、副作用ハ「デフテリー」血清ニ於テモ同様ニ起リ得ルモノニシテ注射ニヨル過敏症, 注射部位ノ膿瘍形成, 皮膚炎ノ發生等アリ。

血清注射ニヨリテ大多數ノ症例ハ急造ナル治癒ヲナシ數日ニシテ病竈部ノ所見良好トナリ, 早キハ 1週, 遅キモ月餘ニシテ全治ニ至ル可シ。「デフテリー」後麻痺ハ「陰莖デフテリー」ニ於テモ來ル事アリ。Schreus ノ症例ハ治癒後3週間ニシテ外膊皮神經麻痺ヲ來セリ。而シテ本例ハ成人ニシテ血清注射量5000單位ヲ用ヒタリ。後麻痺ハ血清注射量ノ不足ナル際ニ起ル事多シト說フル者アルヲ思ヘバ本例ノ後麻痺發生ハ血清注射量ノ過少モ其ノ一因ヲナセルニ非ズヤト思考ス。

8, 結 論

- 1, 著者ハ生後20日餘ノ初生兒ニ來レル陰莖「デフテリー」ノ1例ニ遭遇シ, 其ノ臨床的觀察ヲナセリ。發病當初ニ於テハ小兒ニ普通ニ見ル所ノ龜頭包皮皮炎ト異ル所無キモ治療ニ對シテ抵抗シ, 旬日ニシテ包皮ノ壞疽ヲ來シ包皮並ニ龜頭ノ潰瘍面ニハ灰白黃色ノ義膜ヲ附着ス。病竈ノ周圍ニハ廣汎ナル浸潤, 發赤アリ, 鼠蹊腺腫張, 輕熱ヲ伴フ。義膜ニヨリ尿道口ヲ被ヒ尿線ノ散亂ヲ來セリ。局所ヨリ容易ニ「デフテリー菌」ヲ證明シ, 更ニ海猿ニ對スル毒性ヲ證明シ得タリ。發病後20日目ニ「デフテリー」血清2500單位ノ筋肉内注射ヲナシ翌日ヨリ症状ノ輕快ヲ認メ, 注射後20日ニシテ全治セリ。
- 2, 文献ヲ涉獵シテ陰莖「デフテリー」ノ13例ヲ得タリ。之等ト本例トヲ合シテ考察スルニ原發性ノモノ10例, 續發性ノモノ4例, 罹患年齡ハ2歳未滿ノ乳兒, 20歳—30歳ノ成年ガ各々其ノ半バヲ占メ, 殘餘ノ年齡ハ6歳ノ1例ヲ見タルノミナリ。陰莖「デフテリー」ノ症状ハ主トシテ龜頭包皮皮炎ノ形ヲトルモノト, 尿道炎ノ形ヲトルモノトヲ區別シ, 尙陰莖皮膚ヲ侵スモノヲ見ル。尿道炎ノ形ヲトルモノハ稀ニシテ多クハ龜頭包皮皮炎トシテ來リ, 包皮壞疽ヲ來ス。「デフテリー」壞疽ノ特徴ハ比較的乾燥セル進行性ノ壞疽ニシテ表面ニハ「デフテリー」特有ノ義膜ヲ附着シ, 非特異性療法ニヨリテハ殆ド影響セラルル所無ク, 其ノ義膜ヨリスル塗擦標本ヲ以テ比較的容易ニ「デフテリー菌」ヲ見出し得ル事多シ。

稿ヲ終ルニ臨ミ, 終始御懇篤ナル御指導ヲ賜リ尙本稿御校閲ノ勞ヲ賜リタル北川教授並ニ横山助教ニ感謝ノ意ヲ表シ, 本例ノ細菌學的檢索ニ對シ多大ノ御助力ヲ賜リタル本大學臨床細菌研究室井上學士ニ深謝ス。

附 圖 說 明

(Tafelerklärung)

- 第1圖, 發病約20日後ノ所見 (Abb. I: Photographiert am 30/III, 20 Tage nach dem Auftreten der Rötung)
- 第2圖, 病竈部位ヨリスル塗擦標本中ニ於ケル「デフテリー菌」 (Abb. II: Die Strichpräparat aus dem Belag an der glans)
- 第3圖, 血清注射後20日目全治退院當時ノ所見 (Abb. III: Photographiert am 20/III, 20 Tage nach der Seraminjektion)

Literatur

- 1) Adler: Wien. med. Wschft. 1904.
- 2) Bailey: Urol. Rev. Vol. 32, 1928,
- 3) Bayer:

宮 內 論 文 附 圖

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

- Jb. Kinderheilk. Bd. 110 III 1925. 4) **Bernheim**: Vgl. Bieberstein. 5) **Bieberstein**: Handbuch d. H. u. G. IX/1. 6) **Bloch u. Sommerfeld**: Arch. f. Kinderheilk. Bd. 28 1900. 7) **Broer**: Zblatt. Gyn. 1919. 8) **Cochrane**: British J. of Child. Diseases. Vol. 18, 1920. 9) **Conradi**: Dtsch. med. Wschft. 1912 Nr. 34. 10) **Freifeld**: Berl. kl. Wschft. 1913 Nr. 38. 11) **Funk**: Z. Hyg. Bd. 17 1894. 12) **Gins**: Vgl. Bieberstein. 13) **Hilbert**: Z. Hyg. Bd. 19 1898. 14) **池田**: 日泌尿會誌, 第18卷, 1930. 15) **Koller**: Ref. Derm. Zschft. Bd. 32 1930. 16) **Litz**: Mschft. Geburt. Bd. 52 1920. 17) **Lönne u. Meyring**: Zbltt. Gyn. 1920. 18) **Lönne u. Schucht**: Zbltt. Gyn. 1922. 19) **Mogilnicki**: Derm. Zschft. Bd. 20 1925. 20) **Mrongovius**: Arch. f. Derm. Bd. 157 1929. 21) **Neisser**: Vgl. Bieberstein. 22) **Paul**: Arch. f. Kinderheilk. Bd. 70, 1921. 23) **Peiper**: Deutsch. med. Wschft. 1919 Nr. 37. 24) **Pollak**: Derm. Zschft. Bd. 32 1930. 25) **Polland**: Derm. Zschft. Bd. 34, 1921. 26) **Prinzing**: J. of Amer. Med. Assoc. 1928 Vol. 90. 27) **Radice**: Zbltt. Bakt. Bd. 91, 1924. 28) **Ritter**: Berl. kl. Wschft. 1909. 29) **Rohde**: Münch. med. Wschft. 1909. 30) **Roux u. Yersin**: Vgl. Bieberstein. 31) **Sachs**: Med. Kl. 1924. 32) **Saynisch v. Goergen**: Zschft. Urol. Bd. 21 1927. 33) **Schmidt**: Deutsch. Zschft. Ch. Bd. 215 1929. 34) **Schreus**: Derm. Zschft. Bd. 46 1926. 35) **塚原**: Zblatt. Bakt. Bd. 88 1923. 36) **Valagussa-Ranelletti**: Vgl. Bieberstein. 37) **Vasil**: Ref. Derm. Zschft. Bd. 29. 38) **Wauschkuhn**: Zbltt. Gyn. 1920.
-

Aus der dermato-urologischen Klinik der Medizinischen Fakultät Keio-Gijuku
Universität zu Tokio (Vorstand der urologischen Abteilung: Prof. Dr. M. Kitagawa.)

Über die primäre Penisdiphtherie.

von

Dr. K. Miyauchi.

Patint: ein 1-monatiger Säugling: (am 27/III 1932 im Hospital geboren) Am 10/III bemerkte die Mutter ganz leichte Rötung und Anschwellung der Präputialmündung. Trotz der sofortigen ärztlichen Behandlung, nahm das Symptom immer zu und fieberte am 19/III bis 39°C. Der Patient trat in unsere Behandlung am 20/III. Der damalige Befund war wie folgender: mässige Rötung und Anschwellung der Vorhaut, fast kein Sekret aus dem Preputialsack. Behandlung: Zinkölbepinselung und feuchte Umschläge. Am 22/III trat eine kleine Nekrose an der Vorhautspitze mit geringem schmutzigen Ausfluss auf. Am 25/III einige von den rechten Inguinaldrüsen bohnergross angeschwollen, das Zentrum der Nekrose ausgefallen und die dunkelrötliche leichte Induration am Penis, Schamberg und Hodensack aufgetreten. Am 28/III die Vorhautspitze ganz abgestossen, der Ulcus an der Vorhaut und der Glans mit dem grauweisslichen Belag fest bedeckt. Am 30/III der geschwürige Zerfall der Vorhaut fortgeschritten, die Harnstrahlen zerspaltet, aber die Temperatur herabgefallen, und das allgemeine Befinden, das vom Beginn an nicht gestört war, hatte noch immer keine Veränderung gezeigt. Die bakteriologische Untersuchung ergab sowohl mikroskopisch, als auch kulturell Diphtheriebacillen. Im Ausstrichpräparat wurden auch Diphtheriebacillen und die staphylo- und streptoartige Kokken nachgewiesen. Im Rachen und Harn Di-bac. negativ. Die Behandlung: Diphtherieserum 2500 I. E. und Rivanol-umschläge.

24 Stunden nach der Seruminjektion ist der Belag etwas locker geworden und in 4 Tagen-war der Belag der Glans ganz abgestossen, die Besserung immer fortgeschritten und nach 20 Tagen am 21/III konnte der Patient entlassen werden.

Die Infektionsquelle: wahrscheinlich die gemeinsame Bade- oder Waschwanne des Hospitals, denn damals war in diesem Hospital ein Patient mit Nabeldiphtherie.