日本泌尿器科學會雜誌

第二十二卷 第八號

昭和八年八月

原 著

尿路結石ノ「レントゲン」診斷ニ關スル實驗的研究

Prof. Dr. Ak. Shiga. Dr. S. Inamoto. u. Dr N. Hirose:

Experimentelle Untersuchung über die Röntgendiagnose der Harnwegekonkremente.

北海道帝國大學醫學部皮膚泌尿器科教室

教授 醫學博士 志 賀 亮
助手 醫 醫 士 稻 本 三 郎
副手 醫 學 士 廣 瀬 永 子

緒 言

尿路結石ヲ診斷スルニハ、ソノ臨牀的症狀ト内科的診斷法ノミデハ充分ナ結果ヲ得ル事難ク、確實ナル診斷ハ「レントゲン」診斷ニ依ツテ決定サレル事ハ今日デハ周知ノ事實デアル。

「レントゲン」診斷法ハ結石像ヲ描出シテ尿路結石ノ診斷ヲ確定スルノミカ、影像ニ依ツテ結石ノ形狀、大サ、位置等ヲ熟知シ、之レニ依ツテ治療法ヲ決定スル指針トモナル。

然シコノ診斷法ニ於テモ尙ホ且ツ解決ス可キ幾多ノ要項ガ存在シ、ソレニ就イテ諸家ノ間ニ論議サレタ。今ソレヲ綜合スレバ次ノ事項トナル。

1) 「レントゲン」撮影ニテ描出シ得タ結石像ガ尿路結石ナルヤ、又ハ尿路外ノ類似結石像(irrtümliche Steinschatten)ナルカヲ區別スル必要アリ、且ツ之レガ屢々困難ナル場合ガアル。

2) 尿路結石ノ疑問アル症例ニ於テ、「レントゲン」撮影ニテ結石像ヲ映出シ得ナカツタ場合ニ、結石症ヲ除外シ得ラルルヤ否ヤ、換言スレバ此ノ場合ニ「レントゲン」撮影ニテ影像ヲ現出セヌ所謂「レントゲン」陰性結石(unsichtbare, oder röntgen-negative Stein)ヲ除外シ得ラルルヤ否ヤトノ問題ノ解決デアル。

爾來之レ等ノ諸問題ヲ解決スルタメニ、臨牀的「レントゲン」診斷法トシテ多數ノ鑑別診斷法ガ實行サレ、又多數ノ諸家ニ依ツテ實驗サレ又論議サレタ。

今 Gottstein ノ所説ヲ借リレバ、ソノ鑑別法トシテハ次ノ論法ガ施行サレル。

- 1, 單純撮影法デハ、同一撮影方向デ日ヲ違ヘテ度々撮影スルカ、又ハ撮影方向ヲ變ジテ再撮影ヲ行フカ、或ハ又 Sgalitzer 氏ノ側方撮影(seitliche oder frontale Aufnahme)ヲナス。
- 2, 「レ」線陽性ノ對照輸尿管「カテーテル」挿入撮影法, 3, Kontrast Pyelographie 又ハ Pneumopyelographie 4, 立體寫眞撮影法 (Braasch-Kretschmer) 5, Pneumoren (Rosenstein-Carelli) 法

之レ等ノ諸鑑別法ハ既往ニ於テ多數ノ臨牀診斷ニ應用サレテ相當ニソノ効果ヲ擧ゲテ居ルガ又然ラザル場合モ尠クナイ。而モ是等ノ諸法ガ應用サレルノハ多少ノ理論的根據ニ立脚シテハ居ルケレドモ、何レモ臨牀的應用デアツテ、多クノモノハ確固トシタ實驗的實證ヲ經テ居ナイ。又是等ノ鑑別法ニ關シテ多少ハ實驗的研究モアルガ、ソノ多クハ結石ノ化學的性質ト造影能力ニ關スルモノデアツテ、ソノ他ノ鑑別法ノ診斷的價值ニ關スル實驗的研究ハ極メテ尠ナイ。

茲ニ於テ著者ハ是等ノ鑑別法中ノ 2, 3, 就中單純撮影法中ノ Sgalitzer 氏ノ側方撮影法、造影輸尿管「カテーテル」挿入法、Pyelographie 等ノ診斷法ガ、「レントゲン」撮影ニテ現ハレタル結石像ノ診斷ニ關シテ何レ程ノ鑑別診斷的價值アルモノナルヤニ就テ實驗的研究ヲ行ツテ多少ノ結論ヲ得タノデ、茲ニ報告スル次第デアル。

I, 單純撮影法 (Einfache Aufnahme)

臨牀上廣ク應用サレル「レントゲン」撮影法ハ單純撮影法デアリ、而モ之ハ主トシテ腹脊方向(ventro-dorsal)ニ撮影サレル正面撮影法(Sagittale Aufnahme)デアツテ、之ニテ映出サレタ結石像ニ依ツテ診斷ヲ下スノデアル。

a) 腎臟影像ガ明瞭ナル場合:- コノ時ハ、腎影ト結石像トノ相互關係ヲ觀テソレガ尿路結

石ナルヤ否ヤガ判定サレ、且ツ又結石ノ位置の診斷モ出來テ、診斷ハ比較的容易デアル。

Schlecht ハコノ場合ニ、腎盂結石ナレバ腎影中ニ現ハレ、腎盂結石ナレバ腎門トカ腎盂及ビ輸尿管起始部ニ相當シタ處ニ顯出スルノデアルガ、腎臟結石時ニハ屢々腎盂擴張ヲ伴フカラ、ソノタメニ多少ハ上下位置ノ變動アリト云ヒ、Zondeck ハ腎盂ガ輸尿管ニ移行スル部分ガ上下極ヨリノ距離ノ比ハ平均 5:4 ダカラ、結石像ガ腎影長軸ノ中央ヨリ下方ニアル時ニハ之ハ腎盂腔内ニ在ル結石デアル。又腎盂ガ腎臟兩極ヨリノ距離ハ大體圖ニ示ス如ク、 $a:b:c=8:5:4$ ノ割合ニアルカラ、コノ三角形ニ對比シテ結石像ノ位置ノ判定ガ出來ル。又結石

像ガ腎盂内ニ在ルヤ否ヲ知ルニハ腎影ノ横軸トノ關係ヲ見レバヨイ、ソレハ腎盂ニハ實質内腎盂 (intrarenales Nierenbecken) ト實質外腎盂 (extrarenales Nierenbecken) 及ビ兩者ノ合併シタモノトアツテ、結石像ガ腎影ノ内側 (neben) ニ在レバ實質外腎盂結石デアリ、ソノ1部位ガ腎影中ニ入ツテキテモ同様デアツテ、是等ノ結石ハ腎盂切開法デ摘出サレルガ、結石像ガ全部腎影像内ニ在リ、而モ「レントゲン」撮影方向ヲ變更シテ撮影スルトソレガ腎影外ニ出ル様ナ時ハ腎盂結石デアルシ、種々ニ撮影方向ヲ變更シテ撮影シテモ結石像ガ常ニ腎影内ニ在ル時ニハ小形腎臟實質内結石デアルト云フ。

一方又腎影ガ描出サレテ、ソノ影像中ニ結石像ガ現ハレタトシテモ、ソレハ必ズシモ腎臟、腎盂結石トハ限ラズ、腎臟外ノ結石デモ偶々「レントゲン」線ノ投射方向 (Projectionsrichtung) ニ依ツテソノ影像ガ腎臟内ニ顯ハレル事ガアル。是等ヲ區別スルタメニハ「レントゲン」管球ノ位置ヲ更ヘテ異ツタ投射方向ヨリ再撮影ヲナスカ、或ハ Sgalitzer 氏ノ側方撮影ヲ行フ必要アリトハ、諸家ノ所説ガ一致スル處デアル。

b) 腎臟影像ガ不明瞭ナル場合：— 上記ノ如ク腎臟影像ガ明瞭ニ描出サレタ時ナラバ結石像ノ判定ハ左シテ困難デハナイガ、惜ムラクハ腎影ハ毎常明瞭ニハ描出サレルモノデハナイ、(Arcelin 70%, Pasteau, Cole, Belot 75%, Köhler 90%, Hoffmann, Gottstein 90%), 殊ニ腎臟上極部ハ描出困難デアル。コノ時デモ臨床的ニハ前者ノ場合ト同ジニ腎臟外結石ヲ除外スル事ト、腎臟結石ナリスレバソノ位置的診断ヲ決定スル事ガ重要事項デアルシ、且ツソレガ前者ノ場合ヨリモ一層難シク成ル。ソレニハ次ノ如キ鑑別法ガ擧ゲラレル、

I) 結石像ノ大サ及ビ形狀ニ依ツテ大體的ノ判斷ガ出來ル：—

腎盂内ニ發生スル結石ハ好ンデ腎盂腔ノ形狀ニ適合スルカラ、類三角形ヲ成ス棘狀結石 (Spornstein-Legueu) 殊ニ輸尿管ノ方ニ突起ヲ出シテ三角形ヲ成スモノ (Israel, Schlecht) ハ腎盂結石ノ定型的形狀ナリト云ハル、又腎盂結石ニハ屢々鑄形結石 (Ausgussstein) ガアルカラ、腎臟腎盂ヲ充スモノハ鹿角狀 (hirschgeweichartig), 腎盂結石ハ大白齒形 (Molarzahnform), 腎盂結石ハ三角形又ハ心臟形ヲ成スト云ヒ (Kairis u. Zeiss), 又腎盂結石ハ多クハ小圓形, 「レンズ」豆大ヲナスガ、乳頭ニ直接スルモノデハ鞍狀ノ凹陷ガ出來タリ (Schlecht u. Gottstein), 尙増大シテ腎盂ノ方ニモ及ンダモノハ分枝狀, 鹿角狀ヲ成ス事ガアリ, 殊ニ樹枝狀, 珊瑚樹狀結石 (Kollarenstein) ハ腎盂腎盂結石ニ定型的ナリト云フ。

斯様ニ形狀ニ依ツテ結石位ヲ判定スル事モ出來ルガ、之ハ只ダ定型的形狀ヲ呈シタモノニ於テノミ診斷的根據ヲ得ル丈デアツテ、必ズシモ決定的デハナク、且ツ之丈デハ腎外結石トノ鑑別トナラズ。

II) 結石像ノ位置ニ依ル診斷：—

腎臟結石ノ影像ハ主トシテI—II腰椎, 又ハXII肋骨ノ近所ニ出現スルモノデ、ソノ中腎盂結

石ハ脊柱ニ近接シタリ, 又ハ脊椎横突起ト重ナツテ現ハレ, 實質内結石ハ脊柱ヨリ2—3横指離レタ距離ニ現ハレルモノデアルト云ハレル(Albers-Schönberg, Schlecht, Gottstein)。然シ之ハ大體的ノ目標デアツテ, 腎盂ガ擴張スレバ結石像ノ位置ガ之ト異ルノハ當然デアルシ, 又結石像ガ脊柱トカ肋骨トカト重ツタ時ニハソノ影像ガ不明瞭トナツテ區別ガ困難ト成ルト云フ。

Gottstein ガ引用スル處ニ據レバ, Bazy ハ結石像ノ内縁ガ脊柱ヨリ $5\frac{1}{2}$ cm 以内ニアル時ニハ腎盂結石ナリト云ヒ, Bazy-Moyrand ハ「レントゲンフィルム」上ニテ I—II 腰椎ノ中央ヨリ2本ノ水平線ヲ引キ, 脊柱ノ中央線ト, 及ビ之ヨリ 5cm 離レタ處ニ之ニ平行ナル垂直線ヲ引キ, 是等4線ノ圍ム四角形内ニ現ハレタ結石像ハ腎盂結石ナリト云フ, (Bazy-Moyrand'sche Viereck)

c) 撮影手技ニヨル鑑別法 :— 單純撮影法ニテ描出シタ結石像ヲ, 尿路外結石ナルヤ又ハ腎臓結石ナルヤヲ鑑別スルタメニ, 2—3ノ撮影方法ガ唱ヘラレテ居ル。

I) 異ツタ撮影方向ヨリ數回撮影スル事 (Gottstein) :—

結石像ガ腎影ト重ツタリ, 又腎臓ガ現ハレナクモ腎臓領域内ニ結石像ガ現ハレテ腎臓結石ナラント推定サレタ時ニ, 之ヲ腎外結石ト鑑別スルニハ, 「レントゲン」線ノ投射方向ヲ更ヘテ數回撮影ヲ試ミル必要ガアル。若シ腎臓結石ナレバ之ニ依ツテモソノ位置ノ移動ハ尠ク, 殊ニ腎影トノ關係ハ不變デアルガ, 腎外結石ナレバソノ影像ハ或ハ腎影外ニ飛出スカ, 又ハ腎影ガ不明ノ時デモ結石像ノ位置ガ變更スルノデ區別サレルト云フ。

II) Sgalitzer 氏ノ側方撮影法 :—

Sgalitzer ハ腹脊撮影デ腎臓領域ニ描出サレタ結石像ヲ, 腎外結石ナルカ, 腎臓結石ナルカト鑑別スルニハ, モ一度 Lilienfeld ノ軀幹ノ側方撮影ト同様ナル側方撮影(seitliche oder frontale Aufnahme)ヲ行フガヨイ, スクスレバ腎臓領域(Nierenfelder)ハ I—III 腰椎體ニ重ナルカラ, 腎臓結石ナラバ此ノ範圍ニ現ハレ, 腎外結石ナラバ脊椎體ヨリモ腹方(ventral)ニ現ハレルノデ區別サレルト云フ。

Israel ハコノ撮影方法ハ腹腔内容ノ類似結石, 膽嚢結石, 脾臓結石等ノ鑑別ニ役立ツト云ヒ, Gottstein モ膽嚢結石トノ鑑別2例ヲ報ジ, Brecher モ同様ニ腹脊撮影デハ腎臓結石ニ酷似シタ結石像ヲ得タガ, 側方撮影デハソレガ脊椎體ノ腹方ニ現ハレタノデ膽嚢結石ナリト診斷シ得タ症例ヲ報ジ, ソノ他多數ノ追試者ガ何レモソノ診斷價值ヲ認メテ居ル。

只ダ Palugay (1929) ハ Sgalitzer 氏ノ側方撮影ヲ行ツタ時ニ脊椎體ヨリ3横指モ腹方ニ現ハレタ結石ガ, 腎臓結石ダツタ症例ヲ報ジテ反對シタガ, Sgalitzer ハソレハ寧ロ稀ナル症例デアツテ, 大抵ノ場合ハ同氏ノ法則ガ適用出來ルト辯護シテ居ル。只ダ此ノ方法デハ腎臓影像ハ勿論, 結石影像ヤソノ他ノ影像ガ多少模糊不明瞭ト成ル嫌ガアルガ, 腹脊撮影ノ90%ハ明瞭影像ガ撮影サレルト云フ。

著者等ノ實驗 其ノ I

1) Bazy, Bazy-Moyrand 等ノ所説ニ就テ

Gottstein ガ引用シタ Bazy 氏等ノ所説ニ就テ其眞價ヲ知ラント欲シタ。即チ Bazy ハ「レントゲンフィルム」ニ現ハレタ結石像ノ内縁ガ脊柱ヨリ 5.5c.m 以内ノ距離ニアル時ニハ腎盂結石ナリト云ヒ、Bazy-Moyrand ハ「レントゲンフィルム」上ニテ、I—II 腰椎ノ2等分點ヨリ脊柱正中線ニ垂直ニ2本ノ水平線ヲ引キ、一方ハ脊椎ノ中央線ト、他方ハコレヨリ 5c.m 距レタ處

腎盂上極及下極ノ高サ

		男		子		女		子	
上	Ⅲ 腰椎 2 等分 横斷線 ヨリノ 高サ	右側	8.45cm Max. 12.8—Min. 5.6		8.77cm Max. 12—Min. 4.65				
		左側	9.81cm Max. 15.4—Min. 5.5		9.16cm Max. 11.7—Min. 5.3				
	Ⅺ 肋骨 ニ對ス ル關係	右側	下緣上 0.57cm Max. 下緣上 5. —Min. 下緣下 2.5		下緣上 0.5cm Max. 下緣上 3.5 —Min. 下緣下 3.1				
		左側	下緣上 1.34cm Max. 下緣上 6.0 —Min. 下緣下 3.0		下緣上 1.24cm Max. 下緣上 5.1 —Min. 下緣下 2.8				
盞	Ⅰ 腰椎 2 等分 横斷線 ヨリノ 距離	右側	1.12cm Max. 5.0—Min. (—2.0)		1.45cm Max. 4.0—Min. (—2.5)				
		左側	2.03cm Max. 4.8—Min. (—1.3)		1.62cm Max. 3.5—Min. (—1.7)				
下	Ⅲ 腰椎 2 等分 横斷線 ヨリノ 高サ	右側	1.85cm Max. 5.8—Min. (—1.7)		1.37cm Max. 6.0—Min. (—2.7)				
		左側	2.94cm Max. 6.85—Min. (—2.2)		1.67cm Max. 3.9—Min. (—1.8)				
	極 腎	腸骨櫛 ヨリノ 距離	右側	7.84cm Max. 12.1—Min. 2.65		7.96cm Max. 12.15—Min. 4.0			
			左側	8.7cm Max. 11.9—Min. 3.5		8.58cm Max. 10.8—Min. 4.5			
盞	Ⅱ 腰椎 2 等分 横斷線 ヨリノ 距離	右側	1.87cm Max. 6.3—Min. (—0.8)		2.18cm Max. 5.0—Min. (—0.8)				
		左側	1.75cm Max. 5.9—Min. (—1.0)		2.3cm Max. 5.3—Min. 0.3				
腎盂内縁ガ 脊柱正中線 ヨリノ距離		右側	4.2cm (平均)		2.4cm (平均)				
		左側	4.5cm (平均)		3.5cm (平均)				
腎盂外縁ガ 脊柱正中線 ヨリノ距離		右側	8.6cm (平均)		7.7cm (平均)				
		左側	9.3cm (平均)		7.9cm (平均)				

ニ引イタ垂直線トノ4線ノ
圍ム四角形内ニ現ハレタ結
石像ハ腎盂結石ナリト云フ
(Bazy-Moyrand'sche
Viereck)。

コノ兩説ガ何ノ程度迄適
用シ得ルモノカヲ決定スル
タメニ著者等ハ男女患者ノ
健康腎盂像ニ就テ腎盂ノ位
置ヲ計測シテ左表ノ如キ數
値ヲ得タ。

左表中腎盂ノ高サヲ知ル
タメニハ、上極デハI腰椎、
II腰椎ノ2等分線、XII肋骨、脊
柱中央ヨリノ距離ヲ測リ、
下極デハII、III腰椎ノ2等
分線、腸骨櫛、脊柱中央ヨ
リノ距離ヲ見タ。尙ソノ外
ニ腎盂像ノ最内縁ト最外縁
トカ、脊柱中央線ヨリノ距
離ヲモ計測シ、是等ノ平均
ヲ左表中ニ現ハシタ。
而シテ左表ノ平均數値ヲ基
本トシテ、男女左右ノ健康
腎盂像ヲ、健康男女ニ於テ
腹脊方向ニ撮影シタ體軀幹

第 1 圖 健康腎盂像ノ位置

(斑點ハ著者等ノ言フ四角形, 斜線ハ Bazy-Moyrand ノ四角形)

ノ「レントゲン」像ニ當嵌メテ描寫シタ結果ハ第1圖ニ示ス如キ模型圖ヲ得タ。

此第1圖ヨリ觀レバ男女・左右側ニ於テノ健康腎盂像ハ何レモ Bazy ノ限定シタル直線(脊柱中央線ヨリ 5.5cm 距テ之ニ平行ニ引イタ線)ト Bazy-Moyrand 氏ノ云フ四角形ヨリハ遙カニ外方ニ描出サレル事ヲ知ツタ。然シ之ヲ以ツテ著者等ハ Bazy 等ノ所説ガ全ク不適合ナリト反對スルノデハナイ。腎盂結石, 殊ニソ

レガ腎門ノ方ニ寄ツタ腎盂結石ナレバ確カニ彼等ノ所説ニ一致シタ位置ノ關係ヲ明示スルグラウ, 然シ腎盂像ノ大部分ハヨリ以上外側方ニ位置スルカラ, 此ノ邊ニ在ル結石ハ, 殊ニソレガ小形結石デアル時ニハ, Bazy 氏等ガ言フヨリモ遙カニ外側方ニ現出スルグラウ事ハ, 此ノ圖ヲ觀テモ明瞭デアル。

即チ腎盂結石ノ位置ノ診斷ヲ決定スルニハ, Bazy 等ノ所説ハ必ズシモ適切デナイシ, 又之デハ餘リニ脊柱ノ方ニ片寄り過ギルト思フ。(上圖斜線ノ四角形)

其處デ著者等ハ上述ノ腎盂像位ノ平均數値ト假定圖カラ歸納シテ, 腎盂結石ハ好ンデ下記ノ四角形内ニ現ハレト云ヘルト思フ。即チ「レントゲン」撮影「フィルム」上ニ於テ

(1) 男子デハ:— I 腰椎體ノ上縁ト, II 腰椎體ノ下縁ヨリ脊柱正中線ニ垂直ニ左右ニ引イタ 2 線ト, 脊柱正中線ヨリ 4.5cm (4.2cm ノ概略)ト, 9.0cm (8.6—9.3cm ノ概略)ノ距離ニ於テ之ニ平行ニ引イタ 2 線トガ成ス四角形。

2, 女子デハ:— 前同様ニ I 腰椎ノ上縁II腰椎體ノ下縁ヨリ脊柱正中央線ニ垂直ニ引イタ 2 線ト, 脊柱正中線ヨリ 3.5cm (3.4—3.5cm ノ概略)ト, 8.0cm (7.7—7.9cm ノ概略)ノ距離ニ於テ之ニ平行ニ引イタ 2 線トガ成ス四角形。

勿論コノ假定ハ腎盂結石ノ全部ニ適合スルモノデハナイ, 腎盂結石デモコノ四角形外ニ現ハル事モアルグラウシ, 又反對ニ實質内結石デモ四角形内ニ現ハレストモ限ラズ。殊ニコノ四角形ハ多數ノ健康腎盂像ニ就イテ計測シタ位置的數値ノ平均數値ヨリ算出シタモノデ, 腎盂像位ノ

概略的位置ヲ示スモノデアルカラ、前述ノ如キ「レントゲンフィルム」上ニ描出シタ腎臟結石像ガ腎盂結石ナルカ、又ハ實質内結石ナルカヲ一殊ニ腎影ガ描サレヌ場合ニ一判定スル目標トシテハ少々大キ過ギル處モアルカト思フ、ガ然シ彼ノ Bazy-Moyrand 等ノ言フ假定四角形ヨリモコノ著者等ノ四角形ノ方ガ合理的ダト確信スル。勿論之ハ概略的ノ判定目標ダカラ、尙ホ除外例モアルグラウシ、殊ニ腎位ノ異變・腎盂擴張・結石ニヨル各種ノ二次的腎臟病變等アレバ適用サレヌ事モアルグラウ。多少ノ訂正ハ後日ニ保留シテ置ク。

2, Zondek ノ所説ニ就テノ研究

前述ノ如ク Zondek ガ腎盂・輸尿管移行部ヨリ腎上下極迄ノ距離ノ比ヲ5:4ナリトシ、又之ニ腎長軸ノ長サヲ較ベテ $a:b:c=8:5:4$ ナリト計上シテ、腎影内ニ描出シタ結石像ヲバ、

第 2 圖

此ノ對比數ト比較シテ腎盂結石ナルカ、腎實質内結石ナルカノ判定ニ資セント考ヘタ。然シソノ鑑別診斷的價值ハ頗ル微々タルモノダト思フ。

第一コノ場合ニ於テ腎影ガ明瞭ニ描出サレナケレバナナイ。若シ腎影ガ描出サレタナラバ、斯様ナ幾何學的比數ヤ三角形ヲ用キズトモ結石位ノ判定ガ出來ルグラウシ、又上記ノ三角形、即チ腎盂・輸尿管移行部ト腎臟兩極トヲ連結シタ三角形ハ必ズシモソノ中ニ腎盂ヲ含ムトハ限ラナイ。著者等ノ内ノ志賀・廣瀬ガ健康腎ノ「ビエログラム」ニ於テ腎影ガ明示サレタルモノノ53例ニ就テ腎盂・輸尿管移行部ト腎臟兩極、及ビ膀胱像ノ兩極トヲ連結シタ時ニ出來タ2個ノ三角形ノ位置ト、各邊ノ長サトヲ計算シタ結果ハ第2

圖ト下表ニ示ス通りト成ツタ。

		A	B	C	a	b	c
♂	左側	2.5 10.0	1.7 6.8	1.0 4.0	2.1 8.4	2.0 8.0	1.0 4.0
	右側	2.0 8.0	1.5 6.0	1.0 4.0	2.2 8.8	1.8 7.2	1.0 4.0
♀	左側	2.6 10.4	1.8 7.2	1.0 4.0	2.3 9.2	2.0 8.0	1.0 4.0
	右側	2.6 10.4	1.8 7.2	1.0 4.0	2.2 8.8	1.8 7.2	1.0 4.0
總比		2.4 9.7	1.7 6.8	1.0 4.0	2.2 8.8	1.9 7.6	1.0 4.0

普通數字ハC.cヲ1.0トシタ比數

「イタリック」ハC.cヲ4.0トシタ比數

コレニ據ルト、 $A:B:C=9.7:6.8:4.0$ ト成リZondekノ $8:5:4$ ヨリハA,Bガ多少長イ。且ツ腎盂像ノ長軸ト腎影ノ長軸トハ平行スルケレドモ必ズシモ一致セズ、而モ前者ハ必ズ後者ヨリモ外方ニ在ル事、從ツテ腎盂ノ大部分ハ三角形ABC以外ニアル事等ガ立證サレタ。コレカラ觀レバZondekノ所説ガ左程ノ診斷的價值ノナイ事ガ分ツタ。

著者等ノ實驗其ノⅡ

實驗材料 北大解剖學教室ノ兒玉教授ノ好意ニ依ツテ數個ノ屍體ノ提供ヲ受ケタノデ此ノ實驗ヲ遂行スル事ガ出來タ、茲ニ同教授ニ對シテ深謝ス。

コノ屍體ヲ上方ハIX—X胸椎間、下方ハ兩側大腿上部デ切斷シテ胴體ノミトシ、腎臟・輸尿管・膀胱等ノ尿路臟器丈ヲ元位置ニ殘シテ腹腔内諸臟器全部ヲ摘出シテ、人體模型トシタ。

結石模型トシテハ、石膏ヲ各種ノ大キサニ固メテ、ソレニ細イ竹軸ヲ附シテ人體模型ノ隨處ニ挿置スルニ便ニシ、且ツ石膏ノ「レントゲン」造影能力ヲ增強サス目的ニテ、之ニ臭素「ナトリウム」ノ「アラビヤゴム」液(30%)ヲ浸潤サシタ後乾燥シタモノヲ用ヒタ。

斯クテ此ノ結石模型(以後單ニ結石ト略ス)ヲ尿路ト種々ナル關係ニ裝置シタル人體模型ニ就テ、各種ノ撮影方法、即チ單純撮影法・Sgalitzer氏側方撮影法・造影「カテーテル」挿入法・Pyelographie等ノ鑑別診斷法ヲ應用シテソノ診斷的効果ヲ研究シタ。

著者ハ茲ニハ「レントゲン」陽性結石ノ診斷ニ關スル實驗成績ノミニ就キ述ベン。

I, 單純撮影法

A) 腎臟外結石ヲ各種ノ方向ヨリ撮影シタ場合。

前記ノ人體標本ニ於テ圖ノ如ク腎臟表面ヨリ約1.0cm、ノ距離ニテ腎上極・中央・下極ノ處ニ腎外結石ヲ裝置シテ「レントゲン」管球ヲ腎臟直上ニ(60cm)置テ腹背方向ニ撮影スル時ハ、ソノ結石像ハ腎影ト重ナツテ腎臟結石像ニ酷似セル所見ヲ現ハシタ。此ノ時ニ「レ」線管球焦點ノ位置ヲⅡ—Ⅲ脊椎直上・腹側縁直上等ニ移變シテ撮影スレバ、上・下極ニ近キ結石ハ撮影方向ニ依ツテハ腎影外ニ投影サレテ腎外結石ナル事ヲ鑑別シ得レドモ、腎中央部上方ニ在ル腎外結石ハ常ニ腎影内ニ現ハレ依然トシテ腎臟結石ヲ思ハセル、然シ此ノ場合ニ腎影内デ結石像ノ位置ガ多少、變動ヲ示スノデ腎外結石ノ疑問ヲ殘ス。

即チ腎外結石デモ腎影内ニ投影サレテ腎臟結石ニ類似ノ影像ヲ現ハス事ガアルガ、之ハ諸家ノ説ク様ニ「レ」線投射方向ヲ變更シテ撮影スレバ結石像ガ腎影外ニ投影サレルノデ診斷サレル然シ結石ガ腎影ノ中央部ニ相當スルモノデハ結石像ガ依然トシテ腎影内ニ現ハレテ鑑別困難ナ場合モ有リ得ルガ、コノ時デモ腎外結石ナラバ撮影ノ度ニソノ影像ノ位置ガ多少移動シテ現ハレルノデ疑問ノ餘地ヲ殘ス。

B) Sgalitzer氏側方撮影ニ依ル鑑別法

次ニ著者ハSgalitzerノfrontale Aufnahmeガ腎外結石ノ鑑別ニ何ノ位ニ役立つカニ就テ追試シタ。

a) 腎表面ヨリ1.0cmノ距離ニアル腎外結石ノ診斷 前述ノ實驗ト同様ニ腎臟上・下兩極及中央部ノ表面ヨリ約1.0cmノ距離ニ結石ヲ裝置シ、管球焦點ヲⅡ腰椎直上60cmニ置イテ腹背方向撮影ヲ行フト、3個ノ結石像ハ何レモ腎影内ニ現ハレテ腎臟結石ニ類似シタ所見ヲ呈シタ。

之レニ Sgalitzer ノ側方撮影法ヲ行フト、結石像ハ何レモ腎表面ヨリ約 2.0cm ノ距離ニ於テ、且ツ I—III 腰椎體ヨリモ腹側ニ於テ出現シテ、腎外結石ナル事ガ確メラレタ。(只ダ側方撮影デハ影像ガ稍々混亂不明瞭ナノガ缺點デアル。)

第 3 圖

b. 腎表面ニ直接スル腎外結石ノ診斷 3 個ノ結石ヲソノ位置ハ前實驗ト同様ニテ只腎臟表面上ニ直接ニ裝置シタ。(第4圖 A)

管球焦點ヲ I—II 腰椎ノ垂直上 60cm ニ置イテ腹脊方向ニ撮影シタモノデハ、上極ノ結石丈ガ腎影ノ周縁部ニ現ハレタガ、他ノ 2 個ノ結石ハ何レモ腎影内ニ描出サレテ恰モ腎臟結石ノ如キ所見ヲ呈シタ。(第4圖 B)

次イデ Sgalitzer ノ側方撮影ヲ行フト、3 個ノ結石像ハ何レモ腎臟周縁ニ直接シ、而モ腰椎體ノ前 $\frac{1}{3}$ 部内ニ現ハレタ。(第4圖 C)

第 4 圖

c, 腎表面=直接シ腎盂及ビ實質内結石=相當スル腎外結石ノ診斷 腎表面=直接スル腎外結石ノ鑑別=就テ Sgalitzer 氏ノ側方撮影ノ効果ヲ一層確メタルメニ, 結石ヲ第5圖ニ示ス如ク腎盂=相當スル處(a)ト實質=相當スル處(b)=於テ腎表面=直接シテ裝置シタ。

腹背方向ノ單純撮影(管球焦點ヲⅡ腰椎上60cmノ距離):— ニテハ兩結石ノ影像ハ何レモ腎影内ニ現ハレ, 結石(a)ノ影像ハ脊柱正中線ヨリ約5.5cmノ距離ニ於テ腎盂=相當シタ處ニ現ハレテ恰モ腎盂結石ノ如ク, 結石(b)ノ影像ハ腎影周縁部ニテ脊柱正中線ヨリ約9.7cmノ距離ニ現ハレテ恰モ腎實質内結石ノ狀ヲ呈ス。

Sgalitzer 氏ノ側方撮影ヲ行フト, 兩結石共何レモ腰椎體上ニ描出サレ, 結石(a)ノ影像ハ腎表面=直接シテ現ハレタガ, 實質内結石=凝シタ結石(b)ハ完全ニ腎影内ニ描出サレタ。

第 5 圖

之ヲ以ツテ觀ルト, 腎臟表面ヨリ相當ノ距離ニアル腎外結石デモ若シソレガ腎臟上ニ在ルモノデハ腹背方向ニ「レントゲン」撮影ヲ行ツタ時ニ, ソノ結石像ガ腎影内ニ現ハレテ腎臟結石ニ酷似シタ所見ヲ呈スル事ガアル, 然シ之ハ投射方向ヲ變更スルニ事ニ依ツテ鑑別サレル。然ラザル時デモSgalitzerノ側方撮影ヲ行ヘバ結石像ガ腎影ト離間スルハ勿論, 腰椎體トモ離レテ現出スルノデ腎外結石ナル事ガ明瞭ニ鑑別

出來ル。然シ腎表面=直接スル腎外結石デハ腎臟結石トノ鑑別ガ頗ル困難トナル, 即チ此ノ際Sgalitzer 氏側方撮影ヲ行ツテモ, 腎臟影像ガ明示サレナイ時ハ結石像ガ腰椎體上ニ重ナツテ現ハレルタメニ Sgalitzer ノ所説デハ腎臟結石ト殆ンド區別シ難ク, 又此ノ際腎影ガ描出サレテモ結石像ガ腎影内ニ現ハレルカラ尙且ツ鑑別シ難キ場合ガアル事ガ立證サレル。

d, 腎盂・腎實質内結石ノ診斷 前述ノ腎外結石ノ鑑別診斷ニ對比ス可ク, 今度ハ腎臟外縁ニ添ヒ腎長軸ニ走ル切開ニ依ツテ腎臟ヲ開キ, 腎盂内ト實質内ニ結石ヲ裝置シタ後再ビ腎臟ヲ縫合シ, 尙輸尿管ヨリハ造影輸尿管「カテーテル」ヲ腎盂内迄挿入シタ後ニ「レ」線撮影ヲ行フ。

腹背方向撮影:— ニテ管球焦點ヲⅡ腰椎直上ニ置イタ時ハ, 結石像ハ自然的位置ヨリ稍々外側出ニ映出スルガ, 管球焦點ヲ腎臟直上ニ移ス時ハ結石像ハ裝填位ト一致シテ現ハレタ。而モ之レ等ノ結石像ハ腎影トノ關係ニ於テ腎盂・腎實質結石ナリトノ診斷ハ容易デアルシ, 尙ホ且ツ前者影像(a)ハ造影輸尿管「カテーテル」トノ關係ニ依ツテ腎盂結石ナル事ガ益々明確ニ診斷サル。

之ヲ單純腹背方向撮影ニテ腎影ガ明瞭ニ映出シナカツタト假定シテ、彼ノ Bazy 及 Bazy-Moyrand ノ法則ヲ適用シテ見ルノニ、腎實質結石像(b)ハ脊柱ヨリ遠距離ニ現ハレタメニ、腎盂結石トハ明ラカニ區別スル事ガ出來ルガ、腎盂結石像(a)ハ、ソノ内端ハ脊柱正中線ヨリ 5.4cmノ距離ニアルカラ前述ノ Bazy ノ說ニハ一致スルガ、Bazy-Moyrand ノ四角形ヨリモ遙カニ外側方ニアリ。

側方撮影：— 次ニ腎外結石ト鑑別スルタメニ側方撮影ヲ行フ。兩結石像ハ何レモ腎影内ニ現ハレ、腎盂結石(a)ハ腎實質結石(b)ヨリモ稍々下腹方ニテⅡ腰椎體ノ内方 $\frac{1}{3}$ ノ處ニ、腎實質(b)ハⅡ腰椎體ノ下内隅ニ出現シ、兩者共脊椎體ニ對スル位置ヨリ觀テ Sgalitzer ノ所說ニ依ツ

第 6 圖

テ腎臟内結石ナル事ガ確メラレ、同所說ガ適應サレル。

即チ之ニ依ツテ觀レバ腎臟結石ナレバ Sgalitzer ノ說ク如ク側方撮影ヲ行ヘバ、ソノ結石像ガ腰椎體像ニ重ナツテ現ハレル事ハ確カデアル、然シ乍ラソノ逆說即チ“側方撮影デ腰椎體ト重ナツテ描出サレタ結石像ノ凡テガ腎臟結石ナリ”トハ必ズシモ斷定サレ得ザル事ハ前述ノ諸實驗成績ヨリ歸納シテ明カナリ。

II, Pyelographie ニ依ル鑑別法

Voelcker u. Joseph ノ創案ニ成ル Pyelographie ガ益々廣ク應用實施サレルニ至ツテヨリ、之ガ尿路結石殊ニ腎臟・輸尿管結石ノ發見ト、ソノ位置的診斷、乃至ハ尿路外結石トノ鑑別等ヲ遂行スルニ就テ重要ナル診斷法ナル事ハ諸家ノ等シク認メル處デアツテ、今更ラ説明ノ限リニ非ズ。

而シテ Pyelographie ガ尿路結石ノ診斷ニ應用サレル効用ヲ大別スルト次ノ如シ。

1, 「レ」線陰性尿路結石ノ診斷。 尿路内ニ所謂「レ」線陰性結石ガ存在スル場合ニ、之ノ結石ハ單純撮影法デハ影像ガ描出サレヌタメニ、ソノ診斷ニ頗ル困難ヲ感ズル事ガアル。コノ時 Pyelographie ヲ行ツテ尿路腔内ニ造影劑ヲ送入スレバ、結石ノ個處丈ガ造影劑ノ充滿ガ僅少ト成ツテ所謂餘地像(Aussparungsbild)ヲ生ジテ結石ノ存在ガ立證サレ、尿路結石ノ診斷ニ役立つ事モ周知ナリ(Haenisch, Joseph, Blum, Hohlweg, Chute, Boehminghaus, Kairis u. Zeiss, Garry u. Druckmann, Fillenzen, Haas, Weiss, Schlecht, Gottstein u. a.), 之ノ Aussparungsbild ハ腎盂結石ノ時ニ最も明瞭ニ現ハレルモノナレドモ、又輸尿管結石ノ

場合ニテモ描出シ得ラレル、後者ノ場合萬一造影劑ガ結石ノ個處ヨリ上方部ニ送入サレヌ時ニハ、結石個處ニ相當シテ上方ニ向ケタル凹陷狀限界ヲ生ズルノデメル(Boehminghaus)トモ云ハレテ居ル。

又 Kümmell, Mezö 等ガ唱導スル所ノ Kollargol-Pyelographie ヲ施行シテ陰性結石ニ「コラルゴール」ヲ浸潤サンテ、ソノ影像ヲ描出サセル「コラルゴール」浸潤法(Kollargol-Impregnation)ニ依ツテモ結石像ヲ描出シ得ル事アリ、之ニモ相當ノ賛成者アリ、(Haenisch, Joseph, Schlecht, Gottstein)

又 Pneumopyelographie ニ依ツテ結石周圍ニ氣體「メヂウム」ガ出來ルタメニ「レ」線陰性結石ノ影像ガ描出サレテ診斷ガ決定スル事モ周知ナリ。(略)

2, 「レ」線陽性結石ノ診斷。 Pyelographie ハ「レ」線陽性ニ描出サレタ結石像ガ尿路外結石ナルカ又ハ尿路結石ナルカヲ鑑別スルニモ用ヒラレ、且ツ尿路結石ナレバソノ尿路内ノ位置的診斷ニ役立つモノニシテ、本法ガ結石診斷ニ必須ノモノナル事ニ就テハ異論ナシ。

コノ鑑別ヲ行フニハ造影劑ヲ充滿シタル腎盂・輸尿管像ト描出結石像トノ關係ヲ觀察シテ判定スルモノデアツテ、尿路外結石ナレバソノ結石像ハ「ピエログラム」以外ニ現ハレ、尿路結石ナレバ「ピエログラム」ノ影像内ニ隱沒スル事ニ依ツテ決定ス。斯クノ如ク「ピエログラフイー」ハ「レ」線寫眞ニ現ハレル結石像ガ尿路結石ナルカ尿路外結石ナルカヲ鑑別スルノミナラズ、尿路結石ノ場合ニハソノ位置的診斷ヲ確定シ、尙ホ結石症ニ續發シタル尿路ノ病變所見ヲモ理解シ得ル最良診斷ナル事ハ、先人諸家ノ等シク認メル處ナリ。

殊ニ本法ニ依ル尿路結石ノ位置的診斷法ハ腎臟結石ノ場合ニ之ガ腎盂結石ナルカ腎實質内結石ナルカヲ判定スル事ニ於テ最要デアル、即チコノ診斷ハ結石ヲ手術的ニ摘出スルニ當ツテ腎盂切開ニテ摘出シ得ルカ、或ハ又危險ナル腎臟切開ヲ必要トスルカノ分岐點ヲ解決スルモノデアルシ(Joseph, Schlecht, Gottstein u. a), 又腎臟内ノ結石位ヲ熟知スル事ハ”手術的ニ露出シタ病腎内ニ最モ正確ニ結石ヲ發見シ、而モ最小限ノ腎切開ノ下ニ之ヲ摘出シ得ラレルヤウニ診斷ヲ下シ得ルモノニシテ、之ハ臨床上ノ重要事項デアル”(Blum)

即チ腹背方向及ビ側方ヨリノ單純撮影ニテ腎臟結石ナル事ガ確證サレタ後ニ(Blum)「ピエログラフイー」診斷ヲ行フト、結石ガ腎盂結石ナレバ、ソノ影像ハ「ピエログラム」内ニ隱沒シテ消失スルカ、又ハ其處ニ幽カニ指示サレルニ反シ、實質内結石ナレバ、「ピエログラム」以外ニ現ハレルニ依ツテ位置的診斷ガ決定サレ、腎盂結石ト腎實質内結石トガ鑑別サレルノデアル。

然シ Joseph ハ實質結石ナリトテモ必ズシモ「ピエログラム」以外ニ現ハレルトハ限ラズ、結石ガ造影劑層ト共ニ「レ」線ノ同一投射方向内ニアル時ニハソノ結石像ガ「ピエログラム」ト重疊シテ腎盂結石ト間違フ事モ有り得ル事ヲ注意シ居リ、又反對ニ Garry u. Druckmann ハ「ピエログラム」外ニ結石像ガ出現シテモ、之ガ腎盂結石ノ事ガアル、ソレハ例ヘバ重複腎盂ノ一

方ノ腎盂ニ結石が存在シ、而モ「ピエログラフイー」時ニソノ腎盂内ニ造影劑ガ充滿シナイ時ニハ其處ニ在ル結石ガ、モーツノ腎盂ノ「ピエログラム」以外ニ現ハル事トナル、故ニ「ピエログラフイー」ニ依ツテ腎臟結石ノ位置的診斷ヲ決定シ得ルノハ腎臟畸形ノ場合ヲ除外ス可シト云フ。

又 Kontrastpyelographie ヲ行フ時ニ稀薄造影劑ヲ使用スレバ、尿路結石像ハ「ピエログラム」内ニ明示サレル事モアルシ、殊ニ Pneumopyelographie ヲ以ツテスレバ「ピエログラム」中ニ結石像ガ明瞭ニ描出サレルガ故ニ効果的診斷ガ得ラレル事ニ於テ諸說一致ス (Kairis u. Zeiss, Garry u. Druckmann, Schlecht, Gottstein, Casper u. a.)。

著 者 ノ 實 驗

著者ハ腎臟結石ノ診斷ニ對スル「ピエログラフイー」診斷法ノ効用範圍及ビソノ價值等ニ關スル上述ノ所論ニ就テ實驗的ニ比較研究ヲ行ハント欲シタガ、人體標本ニ就テ腎臟腎盂内ニ結石ヲ裝置シテ之ニ「ピエログラフイー」ヲ施行スル事ガ非常ノ難事ナノデ遂ニ成功セズ、只ダ僅カニ腎外結石ノ鑑別ニ對スル「ピエログラフイー」診斷法ノ疑點ニ就テ實驗スル事ヲ得タ。

a) 腎表面ヨリ 1.0cm ノ距離ニ在ル腎外結石ノ診斷 輸尿管ニ小切開ヲ施シテ挿入シタ輸尿管「カテーテル」ニ依ツテ腎盂内ニ 25% 臭素「ナトリウム」液 5.0cc ヲ送入シタ後、腎盂ニ相當スル處ト、腎實質ニ相當スル處デ腎表面ヨリ約 1.0cm ノ距離ニ各々 1 個ノ結石ヲ裝置シタ後ニ「レ」線撮影ヲ行フ。(管球焦點ハⅡ腰椎上 60cm)

腹背方向撮影デハ：— 兩結石共腎影内ニテ、上方結石ハ「ピエログラム」中央ノ外縁ニ直接シ、下方結石ハ下極ノ腎影内ニ現ハレタ。(實ハ上方結石像ハ「ピエログラム」内ニ現ハレル様ニ裝置シタノダガ、影像デハ「ピエログラム」ノ外縁ニ接シテ現ハレタ。)

第 7 圖

側方撮影デハ：— 腎影ガ明瞭ニ現ハレ、結石像ハ 2 個共ニ腎表面及ビ腎盂像トハ相當ニ遠隔シテ描寫サレテ、腎外結石ナル事ハ容易ニ診斷サレタ、然シ此ノ時若シ腎影ガ不明瞭ナリト

假定セバ、上方結石ハ腰椎體像ヨリモ腹方ニ在ルカラ Sgalitzer ノ説ニ依ツテ腎外結石ト診斷サレルトシテモ、下方結石ハ腰椎體內ニ現出シ得ルガタメニ腎臟結石ナリト診斷サレル可シ。

b) 腎表面ニ直接スル腎外結石ノ診斷 結石ヲ前同様ノ位置ニテ腎表面ニ直接シテ裝置シ、尙ホ前回ノ造影劑送入後多少時間ガ經過シタノデ或ハ造影劑ガ流出シタカモ知レストノ懸念ガアツタノデ、更ラニ造影劑 1. cc ヲ送入シタ。カクテ「レ」線撮影ヲ行ツタ處、送入造影劑過量ナルト前回送入後多少時間ガ經過シタノデ、造影劑ガ腎盂壁外ニ溢流浸潤シタタメニ、腎盂像ガ非常ニ模糊ト成ツタ。

腹背撮影：— 上方結石ハ「ピエログラム」中ニ隱沒シテソノ影像ハ殆ンド消失シテ恰モ腎盂結石ノ如キ所見ヲ呈シ、下方結石ハ腎影下端内ニテ腎盂像外ニ現ハレテ腎實質結石ノ所見ヲ呈ス。

側方撮影：— 腎影ハ稍々明瞭ニ現ハレ、上方結石ハ腎影中央部ノ外縁部ニ、下方結石ハⅡ—Ⅲ 腰椎體間ニ於テ腎影ノ外縁ニ近キ處ニ出現シ、兩者共ニ殆ンド腎臟結石ナルヲ思ハシム。殊ニ此ノ際腎影ガ不明瞭ナリト假定スレバ、兩結石像ハ何レモ腰椎體內ニ描出サレルカラ、Sgalitzer ノ所説ニ從ヘバコノ所見デハ腎臟結石ト診斷シテモ差支ヘナイ事ト成ル。

第 8 圖

要之「ピエログラフイー」診斷法ハ尿路結石ノ證明及ビソノ位置的診斷ニハ必須的ノモノナル事ハ先人諸家ノ證認セル定則デアツテ、著者モ亦ソレニ賛成スルガ、只ダ Joseph, Garry u. Druckmann ノ説ク如クニ、尿路結石殊ニ腎臟結石ノ診斷ニ、Pyelographie ヲ應用スルニ當ツテ、結石像ガ「ピエログラム」中ニ一致スルカ又ハ隱沒スルカ否カニ依ツテ腎盂結石ト腎實質結石トヲ鑑別スル事ハ、稀レニ腎外結石ヲモ混同スル場合ガアルト思フ。

即チ腎外結石デモ「レ」線投射方向ニ一致スルモノハ腹背方向ニ撮影シタ時ニソノ結石像ガ腎影中ニ現ハレタリ「ピエログラム」中ニ隱沒シテ腎實質内結石及ビ腎盂結石ノ疑似像ヲ呈スル事

ガアル。此ノ時ニハ Sgalitzer 氏ノ側方撮影ヲ行フト、結石像ト「ビエログラム」又ハ腎影トノ位置ノ關係デ腎外結石ナル事ガ鑑別サレル。

然シ此ノ方法デモ腎影ガ不明瞭ナ時ニハ、「ビエログラム」トノ關係ニテ腎盂結石ナルヤ否ヤノ鑑別ハ出來ルガ、腎臟結石カ腎外結石トカノ區別ハ困難デアル。ソレハ側方撮影法デハ腎影ヤ腎盂像ノ描寫ガ非常ニ不鮮明トナツテ之レ等ト結石像ト關係ヲ熟知シ得ラレス嫌アリ、從ツテ此ノ場合 Sgalitzer ノ所説ニ從ツテ結石ト腰椎體トノ關係ニ依ツテ腎臟結石ナルヤ否ヤヲ決定セントスルナラバ、腎臟表面ヨリ多少距離ガアル腎外結石デモソノ結石像ガ腰椎體ト重ナツテ出現スル事ガアリ、殊ニ腎表面ニ直接シタ腎外結石デハ尙更ラソノ傾向ガアル故ニ、腎臟結石ト腎外結石トノ區別ハ益々困難トナル。

III, 輸尿管結石ノ鑑別, 殊ニ造影「カテーテル」挿入ニ依ル鑑別

「レ」線寫眞ニ陽性ニ描出サレタ輸尿管結石ヲ他ノ類似結石像カラ鑑別スル必要アル事ハ早クカラ唱導サレ、且ツ臨床「レントゲン」寫眞ニテ輸尿管結石ニ酷似スル輸尿管以外ノ類似結石像(irrtümliche Steinschatten, Pseudoureteral Stein)ナルモノガアツテ、輸尿管結石ノ診斷ニ尠カラズ煩累ヲ及ボス事ハ既ニ多數ノ報告例アリ、從ツテコノ鑑別ニ就テハ夙クヨリ識者間ノ問題トナツタ。

既ニ Israel ハコノ鑑別ニハ「レントゲン」線ニ陽性ナル輸尿管「カテーテル」ヲ挿入シテ「レ」線撮影ヲナスガ最良ナル事ヲ唱導シ、續イテ未ダ今日ノ如キ優秀ナ造影「カテーテル」ガ製出サレナカツタ時代デモ鉛製「ブデー」(Reichmann¹⁹⁰⁵), 金屬デ被包シタ「カテーテル」(Eisendraht¹⁹⁰⁵)「マドリシカテーテル」(Zuckerkandl¹⁹⁰⁸, Casper¹⁹¹¹), 金屬「ブデー」(Voelcker¹⁹⁰⁸)等ガコノ目的ノタメニ用ヒラレタ。ソノ後優良ナ造影輸尿管「カテーテル」ガ製造サレルヤウニ成ツテカラ、益々汎クコノ鑑別法ガ應用サレルニ至ツタ。

コノ輸尿管「カテーテル」ニ依ル鑑別法ニ關スル周知ノ所説ヲ綜合スレバ次ノ如シ。

1) 造影輸尿管「カテーテル」ガ結石ノ傍ヲ通過シテ上方輸尿管又ハ腎盂迄モ挿入サレタ場合ノ「レ」線寫眞デハ、輸尿管結石ナレバソノ結石像ハ「カテーテル」像ト一致スルカ又ハ重層シテ現ハレ、尿路外結石ナレバ兩者ガ離間スル。

2) 挿入シタ輸尿管「カテーテル」ガ結石等ノタメニ停止サレテソレ以上ハ挿入不能ノ時ノ「レ」線寫眞ニテハ、輸尿管結石ナレバソノ影像ハ「カテーテル」尖端ニ直接シテ現ハレルガ、尿路外結石ナレバ「カテーテル」又ハソノ尖端カラ相當離レタ處ニ現ハレル。

3) 然シ尿路外結石デモ「レ」線放射方向内ニテ輸尿管ト一致シテ存在スル時ニハ、ソノ影像ガ輸尿管「カテーテル」又ハ造影輸尿管像ト重層シテ現ハレル事ガアル。此ノ時ニハ立體寫眞撮影ニ據ルカ、又ハ管球焦點ノ位置ヲ變更シテ再撮影ヲ行フ可シ、トノ説ガ古クヨリ唱ヘラレ (Israel, Albers-Schönberg, Voelcker, Casper), ソノ後多數ノ識者モ之ニ同意シタ。

又 Kretschmer¹⁹¹⁸ ハ簡便ノタメニコノ2回ノ撮影ヲ1枚ノ「フィルム」上ニテ行ツテ重複撮影 (double exposure) ヲ行フ事ヲ唱ヘ、Majanz 等モ之ニ賛成シタガ、只ダ同法ハ二重寫シナルタメニ影像ガ不明瞭トナル缺點ガアルト云フ (Alexander, Dourmaschkin)。

又 Lewis ハ骨盤腔内ノモノデハコレデモ鑑別ガ困難ノモノガアルカラ、此ノ時ニハ「カテーテル」ノ代リニ金屬性輸尿管擴張器ヲ挿入スルト、ソノタメニ輸尿管ガ強直シテ輸尿管走行ガ變ルカラ、尿路外結石ナレバ兩者ノ影像ガ離間スルシ、輸尿管結石ナレバ擴張器ニ隨伴シテ移動スルノデ區別サレルト云フ。然シ之ハ骨盤腔内結石ノミニ應用サレルモノデアル。

又 Cabot ハ患者ノ深呼吸氣時ト深吸氣時ニ各々一枚ヲ撮影スレバ尿路結石ナレバ呼吸運動ノタメニ多少變位シテ現ハレルト云フガ、之ハ凡テノ場合ニ適用サレズ賛成者ガ少ナイ (Braynt, Majanz)。

4) 又「カテーテル」像ノ先端ニ結石像ガ現ハレタカラトテ、之ハ必ズシモ輸尿管結石デナク、輸尿管ノ直前直後ニアル尿路外結石 (Kümmell, Cabot, Joseph, Seelig, Gottstein) ダトカ、又ハ輸尿管結核時ニ管壁ノ結核竈ニ石灰化竈ヲ生ジタ場合モアリ得可ク (Schönfeld¹⁹¹⁹)、又 Boeminghaus ハ「カテーテル」ヲ挿入シテ、ソノ先端ガ結石ノタメニ停止シタと思ツタ時ニソレガ輸尿管ノ粘膜等ニ引懸ツタモノダツタリ、或ハ實際結石ノタメニ停止シタモノデモ「レ」線撮影迄ニ「カテーテル」ガ滑動スルタメニ、ソノ時ノ「レントゲン」像ニハ「カテーテル」ノ先端ト結石像トガ離間シテ現ハレルヤウナ場合モアリ得ベシト云フ。

故ニ Dourmaschkin¹⁹²⁸ ハ先端ニ小形「ゴム」囊ヲ附帶シタ「カテーテル」ヲ結石直下迄挿入シタ後、「ゴム」囊ヲ氣充スルト、箝頓性ノ輸尿管結石ナレバ、「ゴム」囊先端ガ結石迄到達シ而モ結石ガ不動性ダカラソノ影像位ガ不變ダガ、可動性輸尿管結石ナレバ「ゴム」囊ノタメニ多少上方ニ舉上サレテ現ハレル。反之尿路外結石ナレバ斯カル變動ヲ起サヌノミカ「カテーテル」ト離間シテ現ハレルト云フ、然シ之トテモ重複輸尿管等ノ畸型ヤ輸尿管擴張等アル場合ニハ適合セズ、且ツ又特種ノ「カテーテル」ヲ要スル不便アリ。

著 者 ノ 實 驗

著者ハ造影「カテーテル」挿入法ニテ輸尿管外結石ト輸尿管結石トヲ鑑別診斷スル時ニ起ル上述ノ如キ疑問ノ場合ヲ模倣シテ實驗シタ。

1, 輸尿管壁ヨリ約 1.0cm ノ距離ニアル類似結石ノ診斷 先ズ輸尿管内ニ造影「カテーテル」ヲⅢ腰椎ノ高サ迄挿入シタ。結石ヲ輸尿管壁ヨリ 1.0cm ノ距離ニ、一ツハⅢ腰椎ノ高サニアル輸尿管「カテーテル」ノ先端ノ處ニ、他ハⅢ腰椎ノ高サデ輸尿管壁上ニテ、且ツ兩者共最初ノ「レ」線撮影ノ放射方向ト一致スル様ニ裝置シタ後、腹背方向ニ撮影シタ。

a, 撮影「レ」線ノ投射方向内ニ結石ト輸尿管ガ一致スル様ニ撮影シタ場合 (管球焦點ハⅢ腰椎直上ニ在リ):— ニハ上方結石ハ「カテーテル」先端ニ密接シ、下方結石ハ「カテーテル」影像

重疊シテ、描出サレ何レモ輸尿管結石ニ似タル所見ヲ現ハシタ。(第9圖 B)

b, 管球焦點ヲ變位シテ再撮影ヲ行フ時:— コノ標本ニテ管球焦點ヲ輸尿管ヨリ外側方(Ⅲ,Ⅳ腰椎横突起尖端ノ間)ニ移シテ撮影スルト、兩結石像ハ何レモ「カテーテル」影像ヨリモ内方ニ移動シ且ツ、之ト離間シテ現レ、殊ニ上方結石デソレガ明瞭示サレテ、兩者共輸尿管外結石ナル事ガ診斷サレル。(第9圖 C)

c, Kretschmer 氏重複撮影:— Kretschmer ノ唱導ニ從ツテ前記兩撮影法ヲ同一「フィルム」上ニ重複撮影ヲ行フト、第1回撮影ニテ「カテーテル」像ト重層シタ結石像ガ、第2回撮影デ之ト離間スル所見ガ明示サレル、然シ此ノ撮影デハ凡テノ影像ガ稍々不鮮明トナル嫌アリ。

第 9 圖

2, 輸尿管壁ニ直接スル輸尿管外結石ノ診斷 輸尿管外結石ノ位置ハ全ク前實驗ト同様デ、只ダ今回ハ結石ヲ輸尿管壁ニ密接シテ裝置シタ。

第 10 圖

a) 管球焦點ヲⅢ腰椎直上ニ置イテ撮影スルト:— 結石像ハ前回同様ニ「カテーテル」尖端

ト密接シ、又ハ影像ト重複シテ現ハレル。(第10圖 B)

b) 管球焦點ヲ輸尿管外側方ニ移動シテ撮影シテモ、結石像ト「カテーテル」像トノ關係ハ依然トシテ同様デアツテ兩者間ハ離間セズ。(第10圖 C)

c) Kretschmer 氏ノ重複撮影ヲ行ツテモ、同様ノ關係ガ明示サレタ。

3. 骨盤無名線附近ノ輸尿管ニ就テノ實驗 輸尿管ガ骨盤骨上ヲ走行スル處ニアル輸尿管結石ノ「レ」線診斷ハ、結石像ガ骨盤影像上ニ現ハレルタメニ屢々ソノ影像ガ不明瞭ト成ツテ診斷不充分ナル場合アリト云ハレ (Cabot u. Dodd, Schlecht, Gottstein, Boehminghaus u. a) ルノミカ、此處デハ類似結石ガ最も多ク存在スル處デカラ、此ノ部分ニ於テ前同様ノ實驗ヲ行フ事モ無意義デハナイト思フ。

a) 先ヅ輸尿管壁上 1.0cm ノ距離ニ結石ヲ裝置シテ、前回同様ニ始メハ、結石ト輸尿管トガ同一「レ」線投射方向内ニ在ルヤウニ撮影シ、次イデ異ツタ方向ヨリノ再撮影ト Kretschmer 氏ノ重複撮影トヲ行ツタ。(第11圖)

第 11 圖

b) 次ニ結石ヲ輸尿管壁ニ直接ニ裝置シテ、同様ノ3種ノ撮影法ヲ行ツタ。(第12圖)

然ル處前者デハ撮影方向ニ依ツテハ結石像ガ輸尿管「カテーテル」像ト重疊シテ現ハレルガ、撮影方向ガ異ルト兩者ガ離間スルノデ輸尿管外結石ノ診斷ヲ下シ得ルガ、後者(b)ノ場合デハ結石ガ輸尿管壁ト密接スルタメニ、撮影方向ヲ變更シテモ兩者影像關係ニ相異ヲ現ハサズ、從ツテ輸尿管外結石ナル事ヲ診斷シ得ズ。

要之輸尿管外結石ト輸尿管結石トノ鑑別診斷ニハ造影「カテーテル」ヲ挿入シテ「レ」線診斷ヲ行フガ最良ナル診斷法ナル事ハ諸家ノ説ク處ト一致スルガ、又輸尿管外結石ナリトテモソレガ「レ」線投射方向内ニ於テ輸尿管「カテーテル」ト一致シテ存在スレバ、ソノ影像ガ「カテーテル」像ト重疊シテ恰モ輸尿管結石時ニ於ケル「カテーテル」ト結石像トノ關係ニ酷似シタ影像ヲ現ハ

第 12 圖

ス事ガアル。此ノ時ハ撮影方向ヲ變ジテ再撮影ヲナセバ、輸尿管外結石ナレバ結石像ト「カテーテル」トガ離間スルノデ容易ニ區別サレ得ル事ハ先人諸家ノ所説ト全ク一致ス。又此ノ場合 Kretschmer 氏ノ重複撮影デモ同様ニ鑑別出來ルガ、只ダ影像ガ稍々不明瞭トナル缺點アリ。

處ガ輸尿管外結石デモソレガ輸尿管壁ニ直接シタモノデハ如上ノ方法デモ之レヲ輸尿管結石ト明瞭ニ區別スル事ガ困難デアル。カウシタ場合ガ臨床上デモ遭遇サレ得可キ事ハ Kümmell, Cabot, Joseph 等ガ注意シテキタ處デアツテ(前述), 著者ハ實驗的ニ之ヲ立證シタノデアル。

結 論

I, 實驗方法

本學解剖學教室兒玉教授ノ御好意ニ依ツテ胴體丈ノ屍體材料ヲ得、ソレノ腎臟及ビ尿路ヲ殘シテ腹部内臓器ノ全體ヲ摘出シテ人體標本トシタ。又結石標本トシテハ石膏ヲ種々ノ大サニ固メ、尙ソノ造影能力ヲ増強スルタメニ之ニ 30% 臭素「ナトリウム」ノ「アラビヤゴム」液ヲ漬シテ乾燥シ、ソレニ細イ竹軸ヲ付ケタ。

コノ結石標本ヲ人體標本ニテ尿路ノ内外ノ隨處ニ裝置シテ、之ニ單純撮影法, Sgalitzer 氏ノ側方撮影法, 造影輸尿「カテーテル」挿入法, 輸尿管性「ピエログラフイー」診斷法, 等ノ諸法ヲ施シテ、是等ノ諸法ガ尿路内外ノ結石ノ鑑別診斷ニ何ノ位役立ツカニ就イテ實驗的研究ヲ行ツタ。

II, 單純撮影法

- 1) 腹背方向撮影ニ依ツテ結石像ノ位置の診斷ヲ確定セントスルナラバ、結石ト「レントゲン」管球及ビ「レントゲン」投射方向等ノ相互關係ヲ限定スル必要ガアル。即チ「レントゲン」線ノ投射方向ハ必ズ結石ノ直上ヨリ之ニ垂直ナル事ガ必要ニシテ、若シ斜傾スレバ結石影像ハソノ解剖的位置ヨリ變位シテ現ハレル。

- 2) 腹背方向撮影ニテ描出サレタ結石像ニ就イテ、之ガ腎盂結石ナルカ又ハ腎實質内結石ナルカヲ決定スルタメニハ Bazy, Bazy-Moyrand 等ガ限定シタ劃線範圍ハ稍々脊柱ニ接近シ過ギテ適用シ難シ。ソレヨリモ著者等ガ先ニ健康腎盂ノ平均位置ヲ限定シタ四角形ノ方ガヨリ合理的ナリ。
- 3) 腹背方向撮影ニテ腎影内ニ結石像ガ現ハレタカラトテ、ソレハ必ズシモ腎臟結石像ナラズ。腎臟以外ノ結石(腎臟表面ヨリ約 1.0cmノ距離ニ裝置シタ結石)デモ「レントゲン」投射方向内ニ在ル時ニハソノ影像ガ腎影内ニ描出サレテ、恰モ腎臟結石ノ如キ所見ノ呈スル事アリ。
- 4) コノ時ニハ「レントゲン」管球ノ位置ヲ移動シテ異ツタ投射方向ヨリ撮影スレバ、腎臟外結石ナレバソノ影像ガ腎影外ニ描出サレル、又結石位ニ依ツテハ投射方向ヲ變更シテモ腎影外ニ描出セスモノガアルガ、ソレハ腎影内デノ位置ガ移動スルノデ判斷サレル。又此ノ時ニ Sgalitzer 氏ノ側方撮影ヲ行ヘバ腎外結石ナレバソノ影像ガ腰椎體ヨリ腹方ニ描出サレルノデ鑑別出來ル。
- 5) 然シ腎臟ニ直接スル腎外結石デハ、上記ノ方法ヲ以ツテシテモ腎影ニ對シテ結石像ノ移動ガ少ク、又 Sgalitzer 氏側方撮影ヲ行ツテモ結石像ガ腰椎體ト重層スルシ、コノ時假令ヘ好都合ニ腎影ガ明示サレテモ、結石像ハ腎影周縁内外ニ現ハルガタメニ、腎外結石ナルヤ否ヤヲ鑑別スル事ハ困難ナリ。
- 6) Sgalitzer ガ説ク如ク”腎臟結石ナレバ側方撮影ヲ行フト、ソノ影像ガ腰椎體ト重疊シ、腎外結石ナレバ腰椎體ヨリモ腹方ニ現ハレル”ガ、コノ逆説即チ”側方撮影ニテ腰椎體ト重ナツテ現ハレタル結石像ナレバ腎臟結石ナリ”トハ斷定サレズ、コノ時腎外結石デモ腰椎體ニ重ナツテ描出サレルモノアリ。

Ⅲ、輸尿管性「ピエログラフイー」ニ依ル鑑別法

同法ノ診斷的價值ニ就イテ實驗的研究ヲ行フノハ稍々困難ニシテ僅カニ腎外結石ニ就イテノミ遂行シ得タリ。

- 1) 腎臟結石ニテ結石ガ腎盂結石ナルカ又ハ實質内結石ナルカヲ鑑別診斷スルニハ Pyelographie ガ最良ニシテ、此ノ際結石像ガ「ピエログラム」中ニ隱沒スルカ否カニ依ツテ鑑別スル事ニ就テハ著者モ同感ナリ。然シ又稀レニ同法ニテモ腎外結石ヲ混同スル事アリ。即チ腎外結石ニテモソレガ「レ」線投射方向ニ一致スルヤウニ存在スル時ニハ「ピエログラム」ト重ナツテソノ中ニ隱沒サレル事アリ。
- 2) 此ノ時 Sgalitzer 氏側方撮影ハ行ヘバ腎外結石ヲ區別スル事ガ出來ル。
- 3) 然シ腎表面ニ直接スル腎外結石ナレバ此ノ兩者ノ方法ヲ以ツテシテモ腎臟結石ト全ク同一條件ノ影像ヲ呈シテ區別シ難キ事アリ。

Ⅲ、造影輸尿管「カテーテル」挿入法

- 1) 同法ガ輸尿管結石ノ鑑別診断ニ資スル處ハ非常ニ多イ。
- 2) 輸尿管結石ナレバ結石像ト「カテーテル」像トガ重ナルカ、又ハ「カテーテル」尖端ニ密接シテ結石像ガ現ハレル。
- 3) 然シ輸尿管外結石デモ「レンゲトン」主線ノ投射方向ニ一致シテ存在スル時ニハ、前同様ノ所見ヲ現ハシテ輸尿管内結石ト混同サレ易イ。
- 4) 此ノ時ニハ「レントゲン」投射方向ヲ變更シテ第2回ノ撮影ヲ行ヘバ、輸尿管結石ナレバソノ影像ガ「カテーテル」像ト離間スルカラ鑑別サレル。
- 5) コノ前後2回ノ撮影ヲ Kretschmer 氏ノ方法ニ從ツテ一枚ノ「フィルム」ニ重複撮影(Doppelaufnahme)ヲ行ツテモ同様ノ成績ヲ得ラレルガ、只ダコレハ「フィルム」影像ガ稍々不鮮明トナル嫌アリ。
- 6) 然シ輸尿管壁ニ直接スル輸尿管外結石デハ、上記ノ方法デモ、「カテーテル」像ト離間セズニ鑑別困難ナル事アリ。

Literatur.

- 1) **Albers u. Schönberg**: Ueber den Nachweis von kleinen Nierenstein mittels Röntgenstrahlen. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 4, S. 118, 1900. 2) **Albers u. Schönberg**: Zur Differentialdiagnose der Harnleitersteine und d. sog. "Beckenflecke". F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 9, S. 255, 1905. 3) **Bach u. Egan**: Extraureteral gelegener Ureterstein. Röntgenpraxis. S. 137, 1930. 4) **Baetjer**: X-ray diagnosis of renal calculi. Ref. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 11, S. 299, 1907. 5) **Bazy**: Nierensteine. Berl. kl. w. Nr. 47, S. 2172, 1910. 6) **Bedrna**: Ueber die Ureterographie mit besonderer Berücksichtigung der Harnleiterstein. Verhandlung d. D. Ges. f. Ur. IX. Kongress in München. S. 380, 1931. 7) **Beensch**: Zur Röntgendiagnostik der Harnkonkremente. Ref. Z. f. ur. Ch. Bd. 28, S. 21, 1929. 8) **Béla u. Mazó**: Verfeinerung d. Nieren- und Uretersteindiagnose. D. m. w. N. 45, S. 1359, 1921. 9) **Bloch**: Zur Diagnostik kleiner Konkreme in Nierenbecken und Harnleiter. Z. f. ur. Ch. Bd. 10, 1922. 10) **Blum**: Pyelographie zum Zwecke der Lagebestimmung kleiner Konkreme innerhalb d. Niere. Z. f. ur. Ch. Bd. 8, 1921. 11) **Blum**: Zur Diagnostik kleiner Konkreme im Nierenbecken u. Harnleiter. Z. f. ur. Ch. Bd. 10, S. 528, 1922. 12) **Boeminghaus**: Die Bedeutung der Röntgenstrahlgn für die Diagnose der Nieren-, Ureter-, Harnblasen- und Gallenblasenstein. Z. ärztl. Fortbildg. 27, S. 590, 1930. 13) **Boeminghaus**: Zur Diagnostik der Harnleitersteine. Arch. kl. Chir. Bd. 151, S. 566, 1928. 14) **Brecker**: Zur Röntgendiagnose der Nierensteine. Z. f. ur. Ch. Bd. 28, S. 481, 1929. 15) **Cabot**: Errors in diagnosis of renal and ureteral calculus. Surg. gyn. and Obstetr. Vol. 21, N. 4, 1915. 16) **Cabot u. Dodd**: The diagnosis of stone in the pelvic portion of ureter. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 17, S. 252, 1910. 17) **Casper**: Zur Diagnostik der Uretersteine. W. med. W. Nr. 37, 1911. 18) **Casper**: Nieren und Uretersteine. Med. Kl. S. 1611, 1912. 19) **Chute**: The difficulty in distinguishing between the radiographic appearance of urinary stones and calcified abdominal glands. J. of Ur. Bd. 14, N. 5, S. 489, 1925. 20) **Cumming**: Recent advances in the diagnosis and treat-

- ment of urinary lithiasis J. of Ur. Vol. 12, S. 383, 1924. 21) **Dohan**: Zur Differentialdiagnose zw. Harnleiterstein und verkalkter Lymphdrüse. F. a. d. G. d. Röntstr. Vol. 17, S. 165, 1911. 22) **Dourmashkin**: A new procedure in the diagnosis of ureteral calculi. Surg. gyn. and Obst. Bd. 47, N. 1, S. 105, 1928. 23) **Fillenz u. Haas**: Beiträge zur Diagnose und Therapie des Uretersteins. Z. f. Ur. Bd. 24, S. 161, 1930. 24) **Garry u. Druckmann**: Die Urolithiasis in Palästina. Z. f. Ur. S. 200, 1930. 25) **Gellmann**: Die Bedeutung der Pyelographie für die Indikationsstellung bei Nierensteinen. Z. f. Ur. Bd. 23, S. 727, 1929. 26) **Glaß**: Nierensteine und Pyelographie. w. m. w. N. 39/40, 1921. 27) **Goldenberg**: Zur Röntgendiagnostik der Nierensteine. M. m. w. S. 772, 1929. 28) **Gottlieb**: Ueber Fehlerquellen d. Röntgendiagnostik von Nierensteinen. F. a. d. G. d. Röntstr. N. 35, S. 1256, 1927. 29) **Gottstein**: Nephrolithiasis. Handbuch d. Urologie Lichtenberg u. a. Bd. 4, S. 273, 1927. 30) **Haenisch**: Beiträge zur Röntgendiagnostik des uropetischen Systems. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 14, S. 7, 1909-1910. 31) **Hermann**: Ueber die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nierensteine. W. med. W. N. 8, S. 190, 1899. 32) **Hirschler**: Vortäuschung eines Nierensteins durch Nierentuberculose. Berl. kl. W. N. 6, S. 140, 1920. 33) **Hohlweg**: Zur Diagnose d. Nierensteine und Nierenbeckenerkrankungen speciell mit Hilfe d. Pyelographie. Kl. w. Jg. 2, N. 3, S. 1447, 1923. 34) **Israel**: Moderne Diagnose und Differentialdiagnose der Nieren- und Harnleitersteine. Ergebn. d. Chirg. und Orthop. Bd. 15, S. 569, 1922. 35) **Joseph**: Pseudokonkrement am Ureter. Berl. kl. W. N. 11, S. 261, 1921. 36) **Joseph**: Diagnose kleiner Nierensteine. Berl. kl. W. N. 28, 1910. 37) **Joseph**: Die Verbesserung der röntgenologischen Nierensteindiagnose. Med. Kl. N. 43, 1919. 38) **Joseph**: Neuere zur Röntgendiagnose der Nierensteine. Berl. kl. W. Nr. 15, 1919. 39) **Kairis u. Zeiss**: Beiträge zur modernen Diagnostik und Therapie der Nephrolithiasis. Z. f. ur. Ch. Bd. 16, S. 237, 1924. 41) **Kielleuthner**: Steine des pelvinea Ureteranteiles und ihre Differentialdiagnose. M. med. W. Jg. 68, N. 23, S. 691, 1921. 42) **Kienböck**: Radiogramme von Nierenbeckenkonkrementen. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 6, S. 104, 1902. 43) **Kienböck**: Zur radiographischen Diagnose des Nierensteins. W. kl. W. S. 1324, 1902. 44) **Kretschmer**: A new procedure for the localization of ureteral stone. Surg. Gyn. and Obst. Vol. 27, S. 772, 1918. 45) **Kretschmer**: The diagnosis and treatment of stone in the ureter. J. of Am. med. Ass. Vol. 80, N. 20, p. 1425, 1923. 46) **Kümmel**: Experimenteller Beitrag zur Radiographie von Nierenstein mittels der Imprägnation-smethode. Z. f. ur. Ch. Bd. 10, S. 92, 1922. 47) **Lehmann**: Zur Frage der Irrtümer in der Nierensteindiagnostik. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 28, H. 5, 1921-1922. 48) **Leonard**: The diagnosis of calculous disease of the kidneys, ureters and bladder by the roentgen-method. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 4, S. 196, 1900. 49) **Lewis**: A new sign in the diagnosis of ureteral stones. J. of Ur. Vol. 7, N. 6, p. 487, 1922. 50) **Majanz**: Zur Diagnostik und Therapie der Harnleitersteine. Z. f. ur. Ch. Bd. 22, S. 293, 1927. 51) **Mező**: Verfeinerung d. Nieren- u. Uretersteindiagnose. D. m. W. Jg. 47, N. 45, S. 1359, 1921. 52) **Reichmann**: Ueber Schatten in Röntgennegativen, die Uretersteine vortäuschen können. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 9, S. 254, 1905. 53) **Ringel**: Zur Diagnose der Nephrolithiasis durch Röntgenbilder. Arch. f. kl. Chir. Bd. 59, S. 166, 1899. 54) **Roth**: Irrtümer der Röntgendiagnostik bei Konkrementen der Harnwege. Med. Kl. 1910. 55) **Rumpel**: Die Diagnose des Nierensteins mit Hilfe der neuen Untersuchungsmethoden. F. a. d. G. d. Röntstr. Ergänzungsband. 1903. 56) **Schlecht**: Röntgendiagnostik d. uropetischen Systems.

Lehrb. d. Röntgendiagnostik. Schittenhelm 1924. 57) Sgalitzer: Seitliche Rumpfaufnahme für Nierenkonkrementdiagnostik. W. kl. W. Nr. 52, S. 1381, 1918. 58) Sgalitzer: Zur Röntgendiagnostik d. Nierenkonkremente. Arch. f. kl. Ch. Bd. 116, H. 2, 1921. 59) Sgalitzer: Röntgenographische Nierenkonkrementdiagnostik. W. kl. W. Nr. 52, 1918. 60) Voelcker: Ein Beitrag zu den Fehlquellen in der Radiographie d. Harnleitersteine. F. a. d. G. d. Röntstr. Bd. 13, S. 394, 1908. 61) Voelcker: Die Steinerkrankungen der Harnwege. Z. f. Ur. Bd. 17, Beiheft S. 57, 1923. 62) Wesson u. Fulmer: Influence of ureteral stones on intravenous Pyelography. Am. J. of Roentgenology. Vol. 28, N. 1, S. 27, 1932. 63) Zondek: Zur Diagnostik und Behandlung tiefsitzender Uretersteine. Med. Kl. Jg. 18, N. 52, S. 1652, 1922. 64) Zondek: Zur topischen Diagnose der Nierensteine. Z. f. Ur. Bd. 24, S. 321, 1930. 65) Zondek: Zur Diagnostik der Nieren und Uretersteine. D. med. W. N. 37, 1919. 66) Zuckerkandl: Ueber Uretersteine. Arch. f. kl. Chir. Bd. 87, 1908. 67) 伊藤武雄: X放射線ニヨル腎結石ノ診斷. 中央醫會誌, 125號, S. 58, 大正5. 68) 北川正淳: 腎臟結石ノ1例. 附其「レントゲン」診斷. 皮尿誌, 16卷, 1號, S. 61, 大正5. 69) 皆見省吾: 腎臟結石ノ「レントゲン」診斷. 實驗醫報, 16年, 184號, 昭和5. 70) 村島耕造: 「レントゲン」的ニ興味アル腎臟結石殊ニ腎盂結石ニ就テ. 十全會誌, 28卷, 11號, S. 12, 大正12. 71) 佐谷有吉, 三宅眞, 松本操: 「ビエログラフイー」ニテ證明シ輸尿管截開術ニ依リテ摘出セル輸尿管結石ノ1例. 皮尿誌, 22卷, 5號, S. 431, (41) 大正11. 72) 杉村七太郎: 腎臟結石症ノX線検査. 實驗醫報, 2卷, 24號, S. 1037, 大正5. 73) 高橋明: 輸尿管結石症. 臨牀講座, 7號, 昭和5. 74) 浦野多門治: 腎臟結石ノ「レントゲン」診斷ニ就テ. 「テラビー」, 4年, 1號, S. 14, 昭和2.

附 圖 說 明

第Ⅰ圖, A. 腎臟表面ヨリ約1.0cmノ距離ニアル, 3個ノ結石ノ腹背方向單純撮影像

第Ⅰ圖, B. 同上結石ノ側方撮影圖

第Ⅱ圖, A. 腎臟表面上ニ直接シタ3個ノ結石ノ腹背方向單純撮影像

第Ⅱ圖, B. 同上結石ノ側方撮影圖

第Ⅲ圖, A. 腎臟表面上ニ直接シテ1個ハ腎盂直上ニ(a), 他ハ實質上ニ(b)結石ヲ裝置シテ腹背方向ニ行ヒタル單純撮影(腎盂内ニ少量ノ空氣ヲ送入シテ標示ス)

第Ⅲ圖, B. 同上側方撮影圖

第Ⅳ圖, A. 腎臟ヲ切開シ, 腎盂及皮實質内ニ結石ヲ裝填シ, 輸尿管「カテーテル」ヲ腎盂内ニ挿入シ置キテ, 腹脊方向ニ撮影シタル圖

第Ⅳ圖, B. 同上標本ノ側方撮影圖

第Ⅴ圖, A. 腎盂内ニ臭素「ナトリウム」液(30%)ヲ送入シ, 腎臟表面ヨリ約1.0cmノ距離ニ結石2個ヲ裝置シテ腹脊方向ニ撮影シタル影像

第Ⅴ圖, B. 同上標本ノ側方撮影圖

第Ⅵ圖, A. 前同様ノ標本ニ尙少量ノ臭素「ナトリウム」液ヲ送入シ, 結石ヲ腎表面ニ直接ニ裝置シテ腹脊方向ニ撮影シタル影像

第Ⅵ圖, B. 同上標本ノ側方撮影圖

第Ⅶ圖, A. 輸尿管内ニ造影輸尿管「カテーテル」ヲ挿入シ, 輸尿管壁ヨリ約1.0cmノ距離ニ結石ヲ裝置シ, 而モ「レ」線投射方向ト一致スルヤウニ結石ヲ裝置シ, 「レ」線管焦點ハⅢ腰椎體上6.0cm(○印)ニ置キテ腹脊方向ニ撮影シタル圖

第Ⅶ圖, B. 同上標本ニテ「レ」線管球焦點ヲⅢ, V腰椎横突起尖端間(○印)ニ移動シテ撮影シタ影像

第Ⅶ圖, C. 同上標本ニテ, 前述ノ2ツノ焦點ヨリ2回ニ重複撮影(Kretschmer)ヲ行ツタ影像

第Ⅷ圖, A. B. C. 前同様ノ標本ニテ, 結石ヲ前同様ノ位置ニテ輸尿管壁ニ直接ニ裝置シタルモノニ就テ, 前同様ノ3種ノ撮影ヲ行ツタ影像

第Ⅷ圖, A. 第Ⅷ圖Aト同様ニ輸尿管壁ヨリ約1.0cmノ距離デ而モ「レ」線投射方向ニ一致スルヤウニ(管球焦點ハ輸尿管直上 6.0cm ○印)結石ヲ裝置シテ腹脊方向ニ撮影シタモノ

第Ⅷ圖, B. 同上標本ニテ焦點ヲ外側方ニ移動シテ撮影シタモノ

第Ⅷ圖, C. 同上標本ニ Kretschmer 氏重複撮影ヲ行ツタモノ

第Ⅸ圖, A. B. C. 前同様ニテ, 結石ヲ輸尿管壁ニ直接サシタ標本ニ就イテ, 前記ノ3種ノ撮影法ヲ行ツタモノ。

志賀, 稻本, 廣瀨論文附圖

第 I 圖 A

第 I 圖 B

第 II 圖 A

第 II 圖 B

第 III 圖 A

第 III 圖 B

志賀, 稻本, 廣瀨論文附圖

第 III 圖 A

第 III 圖 B

第 V 圖 A

第 V 圖 B

第 VI 圖 A

第 VI 圖 B

志賀, 稻本, 廣瀨論文附圖

第 VII 圖 A

第 VII 圖 B

第 VII 圖 C

第 VIII 圖 A

第 VIII 圖 B

第 VIII 圖 C

志賀, 稻本, 廣瀨論文附圖

第 IX 圖 A

第 IX 圖 B

第 IX 圖 C

第 X 圖 A

第 X 圖 B

第 X 圖 C

Abstracts of Original Articles

(Aus d. dermato-urologischen Klinik d. Universität
zu Hokkaido, Vorstand, Prof. Ak. Shiga.)

Ueber experimentelle röntgenologische Untersuchungen der verschiedenen Röntgendiagnostik beim Nieren- und Ureterstein.

von

Prof. Dr. Ak. Shiga. und Assistant Dr. S. Inamoto, Dr. N. Hirose.

Von allen Seiten ist schon erkannt, dass die röntgenologische Untersuchung die sicherste diagnostische Methode des Nieren- und Uretersteinleidens ist. Aber nicht selten trifft man einige Fehldiagnosen, teils wegen sog. röntgen-negativen Konkrementen welche röntgenologisch keine Schatten darstellen, teils wegen sog. irrümlichen Steinschatten, die extraurogen liegend und von den Harnwegekonkrementen streng differenziert werden muss.

Beim Nierenstein ist die Lagebestimmung des Steins, ob es im Nierenparenchym oder im Nierenbecken liegt, von diagnostisch- und therapeutischem Gesichtspunkte aus unbedingt notwendig. Als differential diagnostische Hilfsmethode wurde klinisch verschiedene Aufnahmetechnik und sonstige urologischen Methoden, z. b. wiederholte Aufnahme von anderer Richtung, Sgalitzersche frontale (seitliche) Aufnahme, Kontrast-ureterkatheter-Aufnahme, Pyelographie und Pneumopyelographie, ausgeführt.

Der Verfasser wollte die Zuverlässigkeit der obenausgeführten verschiedenen diagnostischen Methoden durch experimentelle Modellversuche beurteilen.

Als Menschenmodell benutzte er eine menschliche Leiche. Er exstirpierte aus der mit Formalin fixierten Leiche ganze Bauchorgane, abgesehen von Niere, Ureter und sonstigen Harnorganen, und stellte verschieden-grosse Modellsteine (Gipsstein) an beliebigen Stellen unter verschiedenen Beziehungen mit den Ha-

rnorganen, bald innerhalb, bald ausserhalb derselben, an. Nach Einstellung des Steins führte er diverse diagnostische Röntgenaufnahmen aus, um damit festzustellen, wie weit solche X-Diagnose für die Lagebestimmung der Konkreme-
mente und für die Differentialdiagnose zwischen urogenen und extraurogenen Konkreme-
menten zuverlässig sind; und erzielte er folgende Ergebnisse:-

I. Einfache Aufnahme.

1) Bei der ventro-dorsalen Aufnahme muss die Projektionsrichtung der Hauptröntgenstrahlen genau senkrecht der Steinlage gerichtet werden, bei schiefer Aufnahme erscheinen sonst die Steinschatten mehr oder weniger dislociert im Gegensatz zur natürlichen anatomischen Lage.

2) Bázy sieht bei ventro-dorsaler Aufnahme alle Steinschatten, deren Mediankontur bis 5,5 cm von der Mittellinie der Wirbelsäule entfernt liegt, als Nierenbeckensteinschatten an, und hebt Bazy-Moyrand ein Viereck hervor;- 2 Horizontale durch die Mitte des I u. II Lendenwirbels, 2 Vertikale durch die Mitte der Wirbelsäule und 5 cm davon entfernt und meint jeder Steinschatten, der in diesem Viereck erscheint, soll im Nierenbecken liegen.

Der Meinung des Verfassers nach, ist solch Schema als klinisches Merkmal der Lagebestimmung des Nierenbeckensteins zu eng begrenzt und unzutreffend. Nach seiner genauen Messung von mehreren gesunden Pyelogrammen nahm der Verfasser an, dass alle Nierenbeckensteine in folgendem Viereck erscheinen sollen;- das Viereck besteht aus 2 Horizontale durch den obersten Rand des I. und den untersten Rand des II. Lendenwirbelkörpers, und 2 Vertikale, eins davon von der Mittellinie der Wirbelsäule 4.0 cm (bei Männern) bis 3.5 cm (bei Frauen), anders davon 9.0 cm (bei Männern) bis 8.0 cm (bei Frauen) entfernt. (Bei der Lagenanomalie der Niere und Erweiterung des Nierenbeckens hat das Schema keine Geltung)

3) Man kann nicht alle Steinschatten, welche bei ventro-dorsaler Aufnahme in den Nierenschatten erscheinen, als Nierensteinschatten betrachten. Extrarenale schattengebende Herde oder Steine, welche in der gleichen Projektionsrichtung der Hauptröntgenstrahlen sich befinden, stellen ihre Schatten in den Nierenschatten (Nephrogramm) dar und werden nicht immer mit den Nierensteinschatten verwechselt.

4) Bei letztem Fall kann man durch zweite Aufnahme von anderen Rich-

tung oder durch Sgalitzersche frontale Aufnahme der intrarenalen Steine leicht unterscheiden. Bei der ersteren verschieben sich die Schatten im Nephrogramm oder treten ausserhalb der Nierenschatten auf, und bei der letzteren erscheinen sie weit ventralwärts von dem Wirbelkörper.

5) Trotz dieser Methode sind die der Nierenoberfläche dicht anliegenden extrarenalen Steine von den intrarenalen kaum zu differenzieren, da sie nicht nur bei der zweiten Aufnahme anderer Richtung keine Lageverschiebung zeigen, sondern ihre Schatten bei der frontalen Aufnahme mit dem Wirbelkörper sich zusammen decken.

6) Einige extrarenale Steine, besonders solche, die der Nierenoberfläche dicht anliegen, lassen ihre Schatten, bei der frontalen Aufnahme, in den Wirbelkörperschatten erscheinen, und zeigen dabei ganz gleiche Verhältnisse wie renale Steine.

II. Kontrastpyelographie.

Der Verfasser untersuchte, nach Einspritzung ca 5—7 c.c von 30% Bromnatriumlösung im Nierenbecken des Leichenmaterials, die diagnostische Verwertbarkeit von Pyelographie für die differential Diagnose und Lagebestimmung von extra- und intrarenalen Steinen zu beurteilen.

1) Pyelographie ist die beste differentialdiagnostische Methode um die Pelvische und parenchymatöse Lage der renalen Steine festzustellen. Nierenbeckenstein zeigt sein Aussparungsbild sein Schatten verschwindet im Pyelogramm, und der Parenchymstein lässt seine Schatten ausserhalb des Pyelogramms erscheinen.

2) Extrarenale Steine, welche sich in derselben Röntgen-Projektionsrichtung mit d. Pyelogramm befinden, zeigen ganz ähnliches Bild wie Nierenbeckenstein. Aber dabei kann man durch Sgalitzersche seitliche Aufnahme der renalen Steine unterscheiden.

3) Aber einige extrarenale Steine, welche dicht an der Nierenoberfläche liegen, sind trotz frontaler Aufnahme von renalen Steinen nicht zu differenzieren.

III. Kontrastureterkatheter.

1) Um Uretersteine von anderen extraureteral-gelegenen irrthümlichen Steinschatten zu differenzieren ist ventro-dorsale Aufnahme mit Kontrastureterkatheter unbedingt notwendig.

2) Der Schatten des Uretersteins deckt sich dabei mit dem Katheterschatten zusammen oder liegt dicht neben dem Katheterschatten oder an der Spitze desselben,

3) Falls extraureteraler Stein in der Projektionsrichtung von Hauptröntgenstrahlen mit dem Ureter liegt, zeigt sein Schatten ein dem Ureterstein ganz ähnliches Bild,

4) Solche obengenannten Steine sind durch zweite Aufnahme von anderer Projectionrichtung sowie durch Kretschmersche Doppelaufnahme von Uretersteinschatten leicht, mit mehr oder weniger Entfernung von Katheterschatten, zu unterscheiden.

5) Extraureterale Steine, welche dicht an der Ureterwand liegen, können durch zweite Aufnahme von ureteralen Steinen kaum unterschieden werden, da ihre Schatten bei beiden Aufnahmen immer noch dicht an dem Katheterschatten liegen.

Aus der dermato-urologischen Klinik (Vorstand: Prof. Dr. K. Kitagawa)
und dem pathologischen Institut (Vorstand: Prof. Dr. M. Fukushi)
der Nippon medizinischen Fakultät zu Tokyo.

Ueber die spezifischen Veränderungen der kleinen Arterien des Hodens.

von

Dr. Miki Saito.

Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich viele Autoren mit der Forschung der physiologisch-pathologischen Veränderungen der Arterien des Hodens und haben meistens darin übereingestimmt, dass sich in der Wand der kleinen und kleinsten Arterien des Hodens öfters scheinbar homogene Substanz befindet, welche aber als hyaline Degeneration, hyaline Verdickung oder Ablagerung der Hyalinsubstanz aufgefasst wurde. Der Verfasser hat bei den Untersuchungen über