日本泌尿器科學會雜誌

第 33 卷 第 5 號

昭和 17 年(1942) 11 月

原 著

膀 胱 腫 瘍 ノ 研 究

其ノ三 膀胱腫瘍ノ實驗的研究

S. Sakai: Über Blasengeschwülste.

III Teil: Experimentelle Erzeugung von Blasengeschwülsten.

慶應義塾大學醫學部皮膚科泌尿器科教室 (主任 北川正惇教授)

醫學士 酒 井 俊 司

(本論文ノ要旨ハ第26回日本泌尿器科學會總會ニ於テ述ベタ)

I 緒 言

余ハ前二編ニ於テ膀胱腫瘍ノ臨牀的觀察竝ニ治療成績ニ關スル報告ヲ行ツタ。本編ニ於テハ家兔、海狸及ビ白鼠ニAnilin或ハ其誘導體ヲ以テ行ツタ膀胱腫瘍惹起實驗ノ結果ヲ報告スル。

膀胱腫瘍ノ發生原因ハ、其ノ大多數ニ於テ不明デアルカ或ハ不確實デアル。然シ其ノ一小群ハ所謂 Anilin 膀胱腫瘍デアツテ、芳香族 Nitro 化合物ノ永續スル作用ニヨツテ發生スル。又他ノ一小群ハ Schistosomum haematobium Bilharzi ノ寄生ニヨル膀胱ノ慢性炎症ガ原因トナツテ發生スル。其ノ他ニ、組織ノ畸形乃至ハ迷芽ガ豫定條件ト見做サレル場合、Leukoplakie 或ハ慢性膀胱炎ガ腫瘍發生ニ先行スル場合ガアリ、時ニハ膀胱結石並ニ膀胱憩室ガ腫瘍發生ノ原因ト目サレル場合ガアル(第一編參照)。

上記ノ中、吾人ノ最モ關心ヲ有スルモノハ所謂 Anilin 膀胱腫瘍デアル。

1895年 Rehn ガ初メテ Anilin 色素工場ノ職工ニ膀胱腫瘍ヲ認メ、Anilin 色素ト膀胱腫瘍トノ關係ニ就テ注意ヲ喚起シテカラハ、泰西ニ於テハ之レニ該當スル多數ノ臨牀報告ガ Leichtenstern, Wendel, Nassauer, Oppenheimer, Schwerin, Curschmann, Posner 其ノ他ノ諸氏ニヨリ行ハレタ。

又、斯ル事實ヲ實驗的ニ證明セントスル試ミノ多クハ、多クノ學者ニヨツテ各種ノ方法ヲ以

テ行ハレ其ノ多クハ失敗ニ終ツテ居タガ、1930年 Schär ガ Naphthylamin ヲ用ヒテ家兎膀胱ニ乳嘴腫及ビ癌腫形成ニ成功シテカラハ、屢々陽性報告ニ接シテ居リ、Anilin 膀胱腫瘍ノ原因ニ關スル臨牀的觀察ノ正當ナコトガ證明サレツアルガ、細部ニ就テハ尙不明ノ點ガ尠クナイ爲、今尙諸學者ニヨツテ實驗的研究が行ハレテ居ル。又、Anilin 及ビ其ノ誘導體ノ體內侵入ハ呼吸器、消化器及ビ皮膚ノ三者ヲ通ジテ行ハレル事ガ考ヘラレテ居ルガ、實際ニ之等ノ侵入路ヲ確認スベキ適確ナル臨牀的事實ハ擧ゲラレテ居ナイ。從ツテ何レノ侵入路ニ據ル時ニ膀胱腫瘍ガ惹起セラレルカ、乃至ハ惹起率が高イカヲ究メル事モ必要デアル。更ニ又、其等化學藥品ノ體內侵入後ノ運命ニ關シテモ、或ハ又膀胱腫瘍ヲ惹起スル作用ガ尿中ニ排泄サレタ物質ニヨルカ、或ハ血中ノ物質ニヨルカニ就テモ諸學者ノ說ニ一致ヲ見テ居ナイ。

余モ Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol ヲ經口の或ハ經皮的ニ投與シテ膀胱腫瘍形成ノ實驗ヲ行ツタ旁ラ、Anilinヲ直接膀胱粘膜ニ作用セシメテ膀胱腫瘍ヲ發生セシムル實驗ヲ行ヒ、共ニ見ル可キ結果ヲ收メ得タノデ茲ニ報告スル次第デアル。

II 文 獻 概 略

1895年 Rehn ハ Fuchsin 工場ニ於テ45名ノ職工ノ中2名ニ膀胱乳嘴腫、1名ニ膀胱肉腫ヲ發見シ、其レ等膀胱腫瘍ノ發生原因ガ化學藥品ニ因ル化學的刺戟ニ在ルト發表シテ學會ノ注目ヲ引イタ。爾後多クノ學者ニ依ツテ多數ノ臨牀報告が行ハレタ。即チ1898年 Leichtenstern, 1900年 Wendel, 1904年 Posner, 1904年 Rehn ノ報告ニ引續キ Fr. Strautz, Bardenheuer, Rehn, Schedler, Seyberth 等ノ觀察ガ報告サレタ。1906年 Rehn ガ同症例ノ文獻ヲ蒐集シタ結果ニ據ルト、15年間ニ18工場ノ中7工場ニ於テ33例ノ惡性膀胱腫瘍ヲ見テ居リ、且之等症例ハ總テ長年月ニ亘ツテ Anilin ヲ取り扱ツテ居タ職工デアツタ。Leuenberger ノ統計的觀察ニヨルト、1901—1910年間ニ Anilin 色素工業ニ携ハツタ職工ノ膀胱腫瘍ニ因ル死亡率ハ、他ノ者ニ比シテ33倍デアリ、又 Basel ノ外科 Klinik デ50年間ニ觀察サレタ同症例ノ半数以上ガ Anilin 色素ヲ取り扱ツタ者デアツタ。

而シテ如何ナル化學藥品ニ斯ル作用ガ存スルカニ就テハ、Nassauer ハ Anilin, Benzidin ノミガ腫瘍惹起能ヲ有スルトシ、Leuenberger ハ Anilin, Toluidin 及ビ β -Naphthylamin ニ斯ル作用ガ存スルトシテ居ルガ、多クノ學者ハ Anilin, Benzidin, Naphthylamin 及ビ其等ノ誘導體ニ腫瘍惹起能ヲ認メテ居ル。今日文獻上該膀胱腫瘍患者ガ長期ニ亘ツテ接觸シタ化學藥品トシテ擧ゲラ

レルモノハ Anilin, Benzidin, Naphthylamin, Toluidin, Xylidin, Cumidin, Diamisidin, Dihydroxylicidin, Fuchsin, Benzopurpurin, Kongoret, Safranin, Anilinblau, Anilingelb 等デアル。

是等化學藥品ノ中何レガ膀胱腫瘍惹起能ガ強烈デアルカニ就テハ、Schwerin 及ビ Curschmann ハ所謂 Anilin 膀胱腫瘍ノ發生頻度ハ Naphthylamin 工場ガ最高デアルトシ、Oppenheimer ハ Anilin 工場ガ最高デ Benzidin 及ビ Fuchsin 工場ハ之レニ次グトシテ居ル。

是等化學藥品ノ體內侵入機轉ニ關シテハ、先ヅ其等ノ蒸氣ガ呼吸道ヨリ吸引サレ、吸收サレルモノト解サレテ居リ (Büttner, Simon 其ノ他)、更ニ皮膚ヲ通シテ、或ハ經口のニ體內ニ侵入スルトモ考ヘラレテ居ル (Perlmann 及ビ Staehler)。1925年獨乙國政府ハ染料工場ノ衛生狀態改善ニ關スル法律ヲ制定シタ。之レニ依ツテ工場内ノ充分ナ換氣及ビ清潔ガ要求サレ、各職工ハ完全ニ被蔽サレタ仕事着ヲ着用シ、仕事ガ終了シタ直後ニハ必ズ入浴スル様ニナツテカラハ所謂 Anilin 膀胱腫瘍ノ發生ハ著シク減少シタ。

上述ノ化學藥品ガ體內ニ侵入シテカラ後ノ運命ニ關シテハ、Leuenberger ハ是等ノ物質ハ規則正シク體內デ Hydroxylierung ノ形式デ分解スルモノト考ヘ、Schmiedeberg ニヨレバ Anilin ノ解毒ハ para 位置ノ變化ニヨツテ生ジ、Kuchenbecker,

Kreffting, Schuchardt, Sonnenkalb 等ハ體內ニ侵入シタ Anilin 及ビ其ノ誘導體ハ膀胱ニ到達スルニ先立チ、硫酸トノ結合ニヨツテ全ク無毒ニサレルトシタ。Fr. Müller, Engelhardt, Frank 及ビ Berger ニ據レバ Anilin ノ排泄ハ Fuchsin 及ビ Sudan ト同様ニ尿路ヲ通ジテ起リ、之レニ反シテ Benzidin 及ビ Naphthylamin ハ para ノ位置ガ飽和狀態ナル爲化學結合ヲ起サズ、從ツテ一部ハ尿中ニ排泄サレルガ大部分ハ生體中デ尿酸基屬ノ導入ニヨリ Diamino-oxylphenol ニ變化スルト。EngelハNaphthylaminハ體內デ1價及ビ2價ノ Amidonaphthol ニ誘導サレ、尿中ニハ硫酸及ビ Glukuron 酸トシテ排泄サレルトシタ。Mayer ハ芳香族 Amino-oxyl 化合物ガ更ニ酸化サレテ生ズル chinoide Umwandlungsprodukte ハ急性全身性中毒乃至ハ膀胱癌腫ノ發生ヲ招來スル事ハ不可能ナ事デハナイトシテ居ル。Hückel ニヨレバ多クノ學者ハ Anilin, β -Naphthylamin, Benzidin 其ノ他ノ化學藥品ガ身體内ニ入り、水酸化性 Amido-化合物トシテ尿中ニ排泄サレ、其ノ物質ノ刺激ニヨツテ膀胱ニ腫瘍ガ惹起セラレルモノト考ヘテ居ル。又佐々木氏門下ノ研究ニ據レバ o-Amidoazotoluol ハ家兎體內ニ於テハ azo 位置ニ於テ還元分解セラレ p-Toluylendiamin 及ビ其ノ Acetyl 化シタ p-Diacetyltoluylendiamin トナリ尿中ニ排泄セラレ、其等ノ物質ガ膀胱粘膜ノ増殖惹起能ヲ有スルトシタ。

是等ニ反シテ Grandhomme ハ Anilin 中毒ノ急性中毒ニ注意シ、血尿ノ無イ「ヘモグロビン尿」ヲ認メタガ、尿中ニ Anilin ニ關係ノアル毒物ヲ見極メルコトガ出來ナカツタ。Adler ニ據ルト Benzidin ハ動物體ニ作用シテ、其ノ血液ノ Hb チ Met-Hb ニスルコトヲ證明シタガ、Benzidin カラ誘導サレタ物質ノ中、何等毒性ノアルモノハ發見出來ナカツタ。Schär, Perlmann 等モ尿中ニ發癌性ノアルト思ハレル物質ヲ發見出來ナカツタ。斯ノ如ク染色工ノ尿中ニ發癌性物質ヲ探究スルコトガ不成功ニ終ツタノデ、一部ノ學者ニヨツテ、染色工ノ血液ノ變化ガ注目サレル様ニナリ、Cook 及ビ Kennaway ノ最近ノ觀察デハ、尿中ノ物質ガ直接膀胱粘膜ニ作用シテ癌ヲ誘發スルノデハナク、發癌物質ガ血流中ヲ廻リ、膀胱ノ終末毛細管

ニ作用シテ癌ヲ誘發スルノデアラウト云フ事デアル。Ferguson 及ビ他ノ學者ニ據ルト、發癌作用ハ尿中ノ物質ニ因ルモノデハ無ク、血流ニヨリ膀胱粘膜ノ毛細血管ニ作用スルト云フ。尙彼ハ Anilin 膀胱腫瘍ガ膀胱三角部及ビ輸尿管口附近ニ多イノハ、此ノ部ニ血流が多ク、從ツテ血中ノ發癌物質ノ作用ガ大キイ爲デアルト説明シ得ルトシタ。

次ニ膀胱ニ現ハレル變化ニ就テハ、Washburn ハ Anilin 膀胱癌ノ場合ニハ、癌ガ發生スル前ニ膀胱上皮ノ表層ノ下ニ毛細血管ノ増殖ガ現ハレルトシ、Gay ニ據ルト、早期ニ現レル變化ハ粘膜基底層ノ毛細血管ノ増殖デアツテ、粘膜ヲ通ジテ増殖ヲ來スニ至ルノハ其ノ後ノ事ノ様デアル。

扱、次ニ膀胱腫瘍ノ實驗的研究ニ關スル現在迄ノ文獻ヲ涉獵スルニ、1895年 Rehn ノ報告以來、種々ノ芳香族 Amin チ以テ長期間實驗動物ヲ處理シ、以テ膀胱腫瘍ヲ人工的ニ形成セントスル試ミハ多數ノ學者ニヨツテ爲サレタガ、多クハ不成功ニ終ツテ居ル。即チ、Curschmann, Grandhomme ハ化學藥品ヲ經口ニ投與シ、Posner, Haldschiner, Jaffé, Kern ハ Anilin, Toluidin, Benzidin チ吸飲セシメ、Askazy, Oppenheimer, Fischer ハ Benzidin, Toluidin チ皮下ニ注射シタガ、總テ膀胱腫瘍形成ヲ見ルニ至ラナカツタ。

1930年ニ至ツテ初メテ、Schär ハ Naphthylamin 蒸氣ヲ家兎ニ長期間吸飲セシメ、膀胱腫瘍形成ニ成功シタ。即チ、實驗家兎 16 例ヲ四分シ、其ノ各々ニ毎日 100mg 宛チ吸飲セシメタ。斯クシテ 1 ケ年實驗サレタ家兎デハ、膀胱ニ上皮ノ増殖、結締織及ビ間質ノ肥厚、圓形細胞ノ浸潤ガ認メラレタ。其ノ中ノ最も長期間實驗サレタ 2 例ニハ膀胱腫瘍ガ形成サレタ。其ノ 1 例ハ α -Naphthylamin チ 20 ヶ月吸飲セシメラレタ家兎デアツテ、扁豆大ノ膀胱乳嘴腫ヲ形成シ、他ノ 1 例ハ β -Naphthylamin チ 2 ケ年吸飲シテ居リ、多發性膀胱乳嘴腫ヲ發生シ、其ノ一部ニハ惡性所見ガ認メラレタ。即チ上皮ノ細胞ハ大キク、其ノ配列ハ不規則デアリ、空胞化シタ核ヲ有シ、諸所ニ異型の核分裂ガ認メラレ、又多數ノ細胞集ガ存シ、個々ノ上皮突起ハ深部組織ニ侵入増殖ヲ起セル像ヲ呈シタ。

1932年ニハ Perlmann 及ビ Staehler ハ Anilin

及ビ β -Naphthylamin ナ家兎ノ皮下ニ毎日注射シ、70例中7例ニ膀胱乳嘴腫ヲ形成シタ。彼等ハ70例ノ家兎ヲ4群ニ區分シテ、第1群ニハ毎週6 mgノ β -Naphthylamin、第2群ニハ毎週6 mgノ Anilin、第3群ニハ毎週60 mgノ Anilin、第4群ニハ毎週 Anilin 及ビ β -Naphthylamin ノ各3 mg宛ヲ皮下ニ注射シタ。多クノ家兎ハ實驗開始後間モナク死亡シ、種々ノ臓器、殊ニ肺ニ之等ノ藥品ニヨル中毒ト思ハレル所見ガ認めラレタ。斯クシテ第1群31例中6例(實驗期間6—34週間)、第2群10例中1例(實驗期間4週間)ニ膀胱乳嘴腫ノ形成ヲ見タ。第3及ビ第4群デハ膀胱ニ斯ル變化ハ認めラレナカツタ。

Hueper, Willey 及ビ Wolf 等ハ牡犬ニ β -Naphthylamin ナ毎日皮下注射及ビ經口的投與シテ、12—32ヶ月間ノ實驗ニ於テ12例ノ膀胱ニ乳嘴腫及ビ癌腫ヲ形成シ、其等ノ病變ハ Anilin 職工ニ見ラレル病變ト全ク一致シテ居タト報告シテ居ル。

又 Hueper, Berenblum 及ビ Posner 等ハ Anilin 膀胱腫瘍患者ノ尿及ビ β -Naphthylamin デ處置シタ犬ノ尿ノ「エーテル抽出物」ヲ9ヶ月間白鼠ノ皮膚ニ塗布シタガ、皮膚腫瘍ヲ發生セシメル事ハ出來ナカツタ。尿中ノ發癌物質ガ微量ナ爲カ、之レヲ濃縮シタモノニ就テモ發癌作用ヲ確メル事ガ出來ナカツタ。

繙ツテ本邦ニ於ケル膀胱腫瘍ノ實驗的研究ヲ顧ルニ、近年佐々木氏及ビ其ノ門下生ハ α -Amidoazotoluol 加食餌ニヨリ白鼠ヲ飼養シテ Hepatom 形成ニ成功シタ。其ノ際100日以上實驗ヲ續ケタ163例中66例ニ膀胱乳嘴腫ヲ發生セシメ、368日間實驗シタ1例ニハ眞性癌性化シタ乳嘴腫ヲ發生セシメタ。又、大塚・長尾兩氏ハ α -m-Dimethylazobenzol ナ以テ同様ノ實驗ヲ行ヒ、122日以上實驗シタ13例ニ例外ナク膀胱乳嘴腫ヲ發生セシメタ。更ニ長尾氏ハ 4-oxy-2-3-Dimethylazobenzol ニヨツテモ亦膀胱乳嘴腫ヲ形成シ得、又、丸谷氏ハ α -Amidoazotoluol ニヨリ、原田氏ハ α -Amidoazotoluol ノ diacetyl 化シタモノニヨリ、夫々膀胱ニ乳嘴腫ヲ形成シ得タ。1937年山崎・佐藤兩氏ハ Anilin 及ビ α -Amidoazotoluol ナ家兎ノ皮下ニ注射シタ結果、Anilin ニヨツテハ、12例ノ實驗家兎ニ最長216日間ノ實驗ニ於テ、膀胱粘膜ノ増殖ヲ

惹起シ得ズ、 α -Amidoazotoluol ニヨツテハ、14例中3例ニ乳嘴様増殖ヲ惹起シタ。1940年西村氏ハ發癌性 azo 化合物ノ殆ンド全部ニ共通のニ存在シテ居ル α -Toluidin ナ用ヒテ膀胱腫瘍形成ニ成功シタ。即チ家兎ノ皮下ニ長期間注射シタ實驗デハ5例中4例ニ陽性成績ヲ舉ゲ、前處置トシテ人工的膀胱側室内ニ α -Toluidin ナ挿入シタ後長期間ニ亘リ同劑ヲ皮下注射シタ家兎ノ1例ニモ腫瘍形成ヲ認めタ。又海狸ニ同劑ヲ皮下注射シタ實驗デハ8例ニ乳嘴腫様變化ヲ惹起セシメ得タ。尙白鼠ニ於テハ、皮下注射ニヨツテハ陽性成績ヲ舉ゲ得ナカツタガ、塗布試驗デハ2例ニ陽性成績ヲ認めテ居ル。1941年石川氏ハ β -Naphthylamin ノ皮下注射ニヨリ、實驗家兎36例中18例、實驗海狸63例中14例ニ膀胱乳嘴腫ヲ形成セシメ得タ。又家兎ノ膀胱頂部ニ人工的側室ヲ作リ、其ノ中ニ β -Naphthylamin 及ビ 3,4-Benzpyrene ナ挿入シタ後、更ニ β -Naphthylamin ナ長期間皮下注射シタ實驗デハ、 β -Naphthylamin 挿入ヲ行ツタ10例中9例ニ、3,4-Benzpyrene 挿入ヲ行ツタ8例中6例ニ、夫々膀胱ノ乳嘴狀變化ヲ認めタ。西村氏及ビ石川氏ハ各藥物ヲ家兎ノ皮下ニ注射シタ實驗例ニ、所謂發芽現象(Sprossung)ガ間質表層、結締織及ビ血管ヨリ起リ、之レガ上皮層ニ侵入セルモノト認ム可キ像ヲ見、化學藥品ノ發癌作用ハ其レガ尿中ニ排泄サレテ膀胱粘膜ニ作用スルモノデハナク、血行ニヨツテ膀胱結締織層ニ運バレ、此處ノ結締織殊ニ血管ヲ刺戟シテ先ヅ其ノ増殖ヲ促シ、爲ニ該部ガ乳嘴狀ニ突起スルモノト推斷スルト妥當トスルトシテ居ル。

種々ノ機械的及ビ化學的刺戟ヲ直接膀胱ニ作用サセテ腫瘍ヲ形成セント試ミタ實驗モ甚ダ多イ。1920年 Lipschitz ハ Hydroxylamin ナ膀胱内ニ注入シテ上皮ノ増殖ヲ惹起サセ、1926年 Th. Bauer ハ家兎ノ膀胱ノ一部ヲ腹壁ニ固定シ、開放セル粘膜部ニ1ヶ月間 Teer, Anilin、漆及ビ Paraffin 油等ノ混合物ヲ塗布スルコトニヨリ、鈍絨毛狀乳嘴腫ヲ形成サセ、Latteri モ Teer 及ビ「セメント」ノ混合固形物ヲ腎盂内ニ挿入シテ、上皮ノ異形の増殖ヲ惹起サセ、1924年 Maisin 及ビ Picard ハ白鼠ノ膀胱内ニ Paraffin, Teer, Scharlachrot ノ混合物ノ小量及ビ Teer ノミヲ挿入シテ、其ノ1

例ニ實驗開始後5ヶ月ヲ經テ膀胱癌腫ノ形成ヲ見、1927年更ニ氏等ハ同様ノ混合物ノ小塊ヲ白鼠膀胱内ニ手術的ニ挿入シテ、膀胱粘膜ノ單純性増殖及ビ異型の増殖ヲ惹起セシメタ。是等ハ轉移ヲ缺キ、移植試験ハ陰性ニ終ツタガ、組織學的ニハ確カニ基底細胞癌デアツタトシ、又同年 Picard ハ上記物質ノ等分混合物ヲ白鼠膀胱内ニ挿入シ、1例ニ於テハ既ニ7日後ニ膀胱粘膜ノ増殖ヲ證明シ、1ヶ月以上生存シタ14例中13例ニ腫瘍ヲ認メ、其ノ中9例ニハ組織學的ニ惡性上皮腫ヲ形成シ、2ヶ月以上生存シタ6例中5例ニ癌腫、1例ニ乳嘴腫ヲ惹起サセ、4ヶ月以上生存シタ3例ニハ凡テ癌腫ノ形成ヲ見タ。1931年 Puccinelli ハ Maisin 及ビ Picard ノ研究ヲ追試シタ結果、數例ニハ Leukoplakie、乳嘴腫及ビ上皮ノ深部増殖ヲ認メタガ、眞ノ惡性腫瘍ヲ惹起セシメ得ナカツタトシテ居ル。1932年 Roffo ハ白鼠ノ膀胱ニ「煙草エキス」ヲ充分ニ含マセタ樹脂ノ小球ヲ挿入シ、對照動物ニハ Teer, Tricresol 及ビ Anilin ノ混合小球ヲ膀胱ニ挿入シ、又腹膜、皮下組織及ビ胃等ニモ挿入シタ結果、全例ニ有莖乃至無莖ノ乳嘴腫ヲ形成シタ。其ノ中ニハ癌性浸潤ヲ來シタモノモ認メタ。最も顯著ナ病變ハ「煙草エキス」ニヨル實驗デ、著明ニ深部組織ヘ侵入増殖スル傾向ヲ示シ、殊ニ潰瘍化ノ傾向ガアツテ組織學的ニハ癌腫ト見做シ得ベキモノデアツタ。猶轉移形成ハ缺ケテ居ルガ、人間ノ膀胱癌モ容易ニ轉移ヲ形成シナイコト、相似ノ意味アルモノト解シタ。

本邦ニ於テハ、1920年池松氏ハ約大豆大ノ天然石ヲ絹絲ヲ以テ緊縛シ、家兔膀胱内ニ懸垂セシメタ結果、1例ニ164日目ニ肉眼的ニ顯著ナ絨毛狀乳嘴腫ヲ形成シ、組織學的ニ多少惡性ノ傾向アルヲ認メタ。1922年風間氏ハ家兔、海猿、犬ヲ用ヒ、膀胱壁ヲ腹壁筋層線ニ縫合シ、Pityrol ヲ注射針ヲ以テ腹壁皮膚ヲ通シテ直接膀胱内ニ送入シ、家兔ニ於テハ16例中12例、海猿ニ於テハ7例中1例ニ乳嘴腫乃至ハ異型の増殖ヲ惹起セシメタガ、犬デハ4例共結果陰性ニ終ツテ居ル。1929年中本氏ハ海猿膀胱ノ一部ヲ結紮シ、其ノ中ニ溶解セシメタ Paraffin ヲ注入充填シテ凝固セシメ、術後5—64日ノ實驗期間ニ於ケル18例ノ膀胱ヲ検査シ容易ニ上皮ノ異型の増殖ヲ惹起セシメタコトヲ報告シ

タ。1934年渡邊氏ハ家兔膀胱ニ「石炭タール」揮發性中性成分ト「含水ラノリン」等分混合液ノ2ccヲ Nelaton 氏「カテーテル」ヲ以テ週2回宛注入シ、6例中3例ニ膀胱粘膜ノ輕度ノ乳嘴腫様増殖ヲ來シ、1例ニハ2錢銅貨大ノ乳嘴腫ヲ生ジタノミナラズ粘膜上皮ノ異所ノ異型の増殖ヲ認メタ。其ノ後同氏ハ白鼠膀胱ニ化學的、機械的のハ兩者併用ノ諸種刺激ヲ加ヘ、又、Teer, Scharlachrot 及ビ Paraffin ノ等分混合固形物、Scharlachrot 及ビ Paraffin ノ等分混合固形物、Teer 揮發性中性成分及ビ「含水ラノリン」ノ等分混合液、Paraffin 球、「セメント人造結石」等ノ挿入ニヨル膀胱腫瘍形成ノ實驗ヲ試ミ、最長507日ノ實驗期間ニ於テ興味アル成績ヲ擧ゲ、良性腫瘍ノ外惡性腫瘍ヲモ形成シ、特ニ Teer ナ含ム固形物ヲ以テスル實驗ニ於テ腫瘍惹起能最も強キヲ認メタ。1937年山崎・佐藤兩氏ハ Anilin 及ビ o-Amidoazotoluol ナ家兔膀胱内ニ注入シテ乳嘴腫及ビ乳嘴腫様増殖ヲ惹起セシメタ。即チ、1% Anilin 水ヲ以テ實驗家兔30例中12例、1% o-Amidoazotoluol「オリブ油」ヲ以テハ9例中2例(中1例ハ惡性乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ)、又 o-Amidoazotoluol 加熱水溶液ヲ以テシテハ6例中3例ニ夫々乳嘴腫ヲ惹起セシメタ。1940年西村氏ノ實驗ハ前ニ述ベタ如クデアル。1941年石川氏ハ前述ノ外ニ、手術的ニ作ツタ家兔膀胱側室内ニ β -Naphthylamin 或ハ 3,4-Benzpyrene ナ燈心ニ浸シテ挿入シタ結果、乳嘴狀増殖ヲ認メ、3,4-Benzpyrene ニヨル變化ガ β -Naphthylamin ニヨル變化ヨリモ稍々著明デアルトシテ居ル。又、1927年藤卷・木村・和田・島田ノ諸氏ハ Vitamin A 缺乏食ヲ以テ二十日鼠ヲ飼養シ、扁平上皮系統ニ種々ノ程度ノ角化充進、異型ノ上皮増殖狀態ヲ認メ、膀胱ニ於テモ乳嘴狀乃至汎發顆粒狀灰白肥厚ノ狀ヲ認メ、組織學的ニモ角化充進、上皮ノ異型の増殖ガ認メラレタガ、深部組織内ニ侵入増殖スル像ハ顯著デナカツタト述ベテ居ル。

以上述ベ來ツタ多數ノ膀胱腫瘍ノ實驗的研究業績ヲ通覽スルニ、膀胱ニ加ヘラレタ刺激ガ機械的タルト化學的タルトヲ問ハズ長期間ノレチ直接膀胱粘膜ニ作用セシメルト、程度ノ差コソ在レ、早晚該粘膜ノ増殖ガ惹起セラレルコトガ首肯サレ

ル。然シ膀胱腫瘍ノ臨牀的原因の見地ヨリ吾人ノ興味ヲ覺ヘルノハ Schär, Perlmann 及ビ Staehler, 佐々木氏門下, 山崎・佐藤兩氏, 西村氏, 石川氏等ニヨツテ行ハレタ Anilin 及ビ其ノ誘導體ノ遠隔作用ニヨル業績デアル。

茲ニ注目ス可キハ上記諸氏ノ使用シタ Anilin, Naphthylamin, o-Amidoazotoluol, o-Toluidin ノ中, Naphthylamin 以下ヲ用ヒタ實驗デハ夫々相當ナ陽性成績ガ示サレタノニ反シテ Anilin ヲ用ヒタ實驗デハ Perlmann 及ビ Staehler ノ1例ニ

余ハ是等ノ點ニ興味ヲ感ジタノデ Anilin, β -Naphthylamin 及ビ o-Amidoazotoluol ヲ白鼠ニ飼與シ, Anilin 及ビ β -Naphthylamin ヲ海鯊ニ皮下注射シ, 更ニ又 Anilin ヲ家兎膀胱ニ直接作用セシメテ實驗的研究ヲ行ヒ, 上記不明ノ點ヲ, 幾分デモ解決スルコトヲ目的トシタ次第デアル。

III Anilin 水ノ膀胱内注入ニヨル實驗

實驗方法

本實驗ニハ, 偶發腫瘍ノ惧ガ無イトサレテ居ル家兎ヲ使用シ, 榮養可良ナ, 體重 2 kg 内外ノ白毛ノモノヲ選ンダ。

實驗化學藥品ニハ Anilin ヲ 1% ノ Anilin 水トシテ使用シタ。

膀胱内ヘノ注入ハ, 雄家兎ニハ Nelaton 氏「カテーテル」ヲ, 雌家兎ニハ女子用「カテーテル」類似ノ硝子「カテーテル」ヲ使用シ, 毎週 6 回, 上記 Anilin 水 10 cc 宛行ツタ。

對照ニハ同様ノ方法及ビ間隔デ滅菌水ヲ使用

シタ。

實驗家兎ノ斃死或ハ撲殺後ハ, 直チニ之レヲ剖檢シ, 膀胱ニハ 10% 「ホルマリン水」ヲ注入シ一程度ノ緊張ヲ保タシメタ儘ニ之ヲ固定シ, 1—2 日後膀胱前壁ノ中央ニ於テ矢狀經切割ヲ加ヘ, 内景ヲ肉眼ニ觀察シ, 病變顯著ナ部位ハ之レヲ Paraffin 包埋トシ, 必要ニ應ジテ連續切片ヲ製作シ, Haematoxylin-Eosin 染色, van Gieson 氏染色, Weigert 氏染色其ノ他ヲ施シテ組織學的研索ヲ行ツタ。

實驗成績

實驗ニ供シタ家兎ハ 30 例デアル。其ノ中數例ハ實驗開始後 1 週間未滿デ死亡シタ。實驗開始後ノ生存日數 11—278 日ノ實驗家兎 19 例ニ就テ實驗ノ結果ヲ檢索スルニ, 膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ヲ認メタ例ハ 9 例デアル。對照家兎ニハ斯ル變化ハ認メラレナカッタ。實驗家兎ノ尿ハ清澄ノ事及ビ鹽類ニ因ル濁濁尿ナルコトガ多く, 時ニ白血球ヲ認メタ事ハアルガ細菌ヲ認メタ事ハ稀デアツタ。從ツテ細菌性慢性膀胱炎ガ本實驗ニ參與シタカニ就テノ考慮ノ必要ハ無イト信ズル。實驗成績ノ概要ハ第 1 表ノ通りデアル。

次ニ陽性症例ノ中, 變化ノ程度ノ異ツタ數例ニ就キ詳細ヲ述ベル。

第 7 例 生存日數, 25 日。

肉眼の所見：膀胱頂部及ビ三角部ニ輕度ノ肥厚ガアリ稍々硬イ。同所ノ粘膜面ハ腦迴轉狀ノ皺襞

ヲ成シテ居ル。其ノ範圍ハ直經大約 2 cm ノ不整圓形デ境界ハ不明瞭デアル。潰瘍形成ハ認メラレナイ (第 1 圖)。

第 1 表 1% Anilin 水ヲ家兎膀胱ニ注入セル實驗成績

家兎番號	性別	生存日數	死因	實驗終末時體重(kg)	Anilin 注入量(g)	膀胱粘膜増殖ノ部位及ビ形狀
1	♂	11	斃死	1.950	0.9	
2	♂	12	〃	1.250	1.0	
3	♀	15	〃	2.000	1.3	
4	♂	16	〃	1.850	1.4	膀胱三角部「ポリーブ狀」
5	♂	17	〃	1.950	1.5	
6	♂	24	〃	2.000	2.0	
7	♂	25	〃	2.150	2.1	膀胱頂部及三角部「ポリーブ狀」
8	♀	28	〃	2.100	2.4	
9	♀	32	〃	2.050	2.7	
10	♀	32	〃	1.950	2.7	膀胱頂部「ポリーブ狀」
11	♀	38	〃	1.880	3.2	
12	♂	104	撲殺	1.900	8.7	膀胱頂部及三角部「ポリーブ狀」
13	♀	137	〃	1.800	11.6	
14	♀	158	斃死	1.750	13.6	膀胱頂部絨毛狀
15	♂	163	〃	1.920	14.0	同上「ポリーブ狀」
16	♀	172	〃	2.050	14.8	同上樹枝狀
17	♀	184	〃	2.250	15.8	同上樹枝狀
18	♀	249	〃	2.100	21.3	膀胱頂部及三角部樹枝狀
19	♂	278	撲殺	2.200	23.8	
對照 1	♀	50	斃死	2.200		
同 2	♂	78	〃	1.850		
同 3	♀	360	撲殺	1.500		

組織學的所見：輕度ノ「ポリーブ狀」ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。即チ頂部ニ於テハ膀胱内腔ニ向ツテ稍々小ナル「ポリーブ狀」ノ乳嘴性突起ガ數個認めラレル。該突起ヲ覆ヘル上皮ハ3—7層ノ上皮細胞カラ成ツテ居ル。結締織性間質ノ分枝ハ著明デナイ。上皮下組織ニ輕度ノ「プラズマ細胞」ノ浸潤ト充血シタ血管ヲ認メル。漿膜下組織ニハ「エオジン嗜好細胞」及ビ「プラズマ細胞」等ノ浸潤ヲ認メル(第2圖)。

膀胱三角部ノ組織學的所見モ之レニ類似シテ居ル。

上皮下組織並ニ筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

第12例 生存日數, 104日。

肉眼の所見：膀胱ノ頂部及ビ三角部ニ輕度ノ肥厚ガアリ稍々硬イ。粘膜面ハ一般ニ粗糙デアツテ、頂部及ビ三角部ノ肥厚シタ部分ハ腦迴轉狀ノ皺襞ヲ形成シテ居ル。其ノ範圍ハ、頂部ノモノハ直徑約2cmノ不整形形デ、境界ハ不明瞭デアリ、三角部ノモノハ之レヨリモ稍々小デアル。

組織學的所見：膀胱頂部ニ於テハ、廣イ基底ヲ有スル「ポリーブ狀」ノ乳嘴性突起ガ膀胱内腔ニ向ツテ數個突出シテ居ル。其ノ上皮細胞ハ4—7層ヨリ成ツテ居リ、上皮組織中ニハ原形質ノ透明ナ

細胞ヨリ成ル部分及ビ原形質ガEosinニ好染セル細胞ヨリ成ル部分ヲ認メル。前者ニ於テモ、其ノ表面ニ於テハ原形質ガEosinニ好染シタ細胞ノ2—3層デ覆ハレタモノガ多イ。斯ル部デハ特ニ「ポリーブ狀」ニ膨隆シタ上皮下結締織ト、原形質ノEosinニ好染セル該細胞トガ密接ヲ關係ヲ有スルモノハ様デアル。上皮下結締織ハ浮腫狀ヲ呈シ、「プラズマ細胞」ノ浸潤ヲ認メル。血管ハ輕度ニ増殖擴張シ、筋層ニハ著變ガ認めラレナイ。

膀胱三角部ニ於テハ上皮ガ「ポリーブ狀」ニ突出シテ居ル部モアルガ、多クハ三角狀ニ突出シテ居ル。斯ル部ニ於テハ上皮下結締織ハ三角狀ニ膨隆シ、之レヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ4—5層ヲ成シ、正常ノ部分ノ上皮細胞ト比較シ著シイ差異ヲ認メナイ。斯ル所見ハ第5例其ノ他ニモ認めラレテ居リ、斯ク上皮ノ變化ガ少ク、結締織ガ増殖突出シテ居ルコトハ、乳嘴腫形成ニ際シテ結締織ガ先ヅ増殖シタ後ニ上皮ガ之レニ隨伴スル事ヲ示シテ居ルモノト解釋サレル。又、三角狀ニ膨隆シタ上皮下結締織中ノ上皮層ニ近接シタ部ニ島嶼狀ノ上皮細胞群ヲ認メル(第3圖)。

斯ル所見ガ標本製作中ノ所産デ無イコトハ連續切片ヲ精査シテ確認サレタ。上皮下組織ハ浮腫性

デ圓形細胞ノ浸潤ガ認メラレシ。

第14例 生存日数、158日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ肥厚シテ居リ、頂部ニ於テハ殊ニ著明デ硬イ。粘膜面モ一般ニ粗糙デ、頂部ニハ腦廻轉狀ノ皺襞ヲ認メル。其ノ範圍ハ直徑約1cmノ不整形形デ境界ハ不明瞭デアル。潰瘍形成ヲ認メナイ。

組織學の所見：輕度ノ絨毛狀乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。即チ、膀胱粘膜面ハ不平デ、中軸ニ相當量ノ結締織性間質ヲ伴ヘル絨毛狀ノ上皮増殖ヲ認メル。該上皮細胞ハ基底部ニ於テハ骰子狀或ハ圓柱形デ、中等度ノ核質ヲ有シ、核ハ圓形デ、原形質ハ明ルイ。該上皮細胞ノ表面ニ近イモノハ、原形質ガEosinニ好染シテ居ルモノガ多イ。絨毛狀上皮増殖ノ中軸ヲナス結締織性間質ノ膀胱壁ノ上皮下組織ニ接スル部ニ少數ノ圓形細胞浸潤ヲ認メル。上皮下組織ニ於テモ輕度ノ「プラスマ細胞」ノ浸潤及ビ結締織ノ膨化ヲ認メル。間質結締織及ビ上皮下組織ノ血管ハ増殖擴張シテ居ル。筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

絨毛狀上皮増殖ヲ認メナイ部分デハ、上皮細胞ハ6—7層ヨリ成リ、空胞狀又ハ水泡性ノ細胞ヲ認メル。同所ノ上皮下組織ニモ「プラスマ細胞」浸潤ヲ認メル。

第16例 生存日数、172日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ稍々肥厚シテ居リ、頂部ニ於テハ其レガ著明デ硬イ。膀胱粘膜ハ一般ニ粗糙デ、頂部ノ肥厚シタ部分ニハ著明ナ腦廻轉狀ノ皺襞ヲ認メル。其ノ範圍ハ直徑約1.5cmノ不整形形デ境界ハ不明瞭デアル。潰瘍形式ヲ認メナイ。

組織學の所見：膀胱頂部ノ病變部ハ著明ナ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ膀胱壁ヨリ絨毛狀、一部ハ輕度ノ樹枝狀ヲ呈スル突起ガ膀胱腔内ニ増殖突出シテ居ルヲ認メル。該突起ハ中軸ニ結締織性ノ間質ヲ伴ツテ居ル。之ヲ覆ツテ居ル粘膜ハ十數層ノ稍々圓形乃至紡錘形ノ上皮細胞ヨリ成ツテ居ル。其等ニ核分割像ハ殆ンド認メラレナイ。結締織性間質中ニ小圓形細胞ノ集簇ヲ認メル。上皮下組織ノ浮腫ハ著明デナイ。血管ハ輕度ニ増殖擴張シテ居リ、筋層ニハ著變ガ無イ。上皮ノ略々正常ノ部位ノ粘膜下ニ於テモ著明ナ小圓形細胞ノ集簇ヲ認メ

ル所ガアル。

第18例 生存日数、249日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ肥厚シテ居リ、頂部及ビ三角部ハ殊ニ肥厚ガ著明デ硬イ。膀胱粘膜ハ一般ニ粗糙デアリ、頂部及ビ三角部ノ硬ク肥厚シタ部分ニハ著明ナ腦廻轉狀皺襞ヲ認メル。頂部ノ皺襞ノ範圍ハ直徑約2.0cmノ不整形形デアリ、境界ハ不鮮明デ周圍ノ粘膜面ニ移行シテ居ル。割面ニ於テモ該肥厚ノ表面ガ乳嘴狀ヲ呈シテ居ル事ヲ明カニ認メ得ル。三角部ノ皺襞頂部ノモノニ比較シテ變化ノ度ガ遙カニ低弱デアル。潰瘍形成ハコレヲ認メナイ。

組織學の所見：膀胱頂部ノ病變部ハ樹枝狀ニ分枝増殖シタ著明ナ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱壁ヨリ輕度ノ樹枝狀乃至乳嘴狀ヲ成シテ膀胱腔内ニ向ツテ増殖突出シテ居ル突起ヲ認メル。其ノ中軸ヲ走ル結締織性間質モ輕度ノ樹枝狀ニ分枝シ或ハ乳嘴狀ヲ呈シテ居リ、此ノ部ニ小圓形細胞ノ浸潤ヲ認メル。該間質ヲ覆ヘル上皮組織ハ4—5層乃至ハ十數層ヨリ成ツテ居リ、上皮細胞ノ基底部ノモノハ、原形質ハ明ルク、核質ニ乏シイ圓形ノ核ヲ有シ、類圓柱狀デアリ、最外層ノ上皮細胞ノ原形質ハEosinニ稍々好染シテ居ル。中間層ノ上皮細胞ハ核ヲ認メヌモノ、或ハ著明ナ退行性變化ヲ營ムモノガ多イ。興味アル事ニハ、往々乳嘴狀突起ノ頂點ニ近ク、結締織性間質ト上皮トノ接合部ニ於テ間質ヨリ上皮細胞間ヲ貫イテ結締織ノ細小ナル突起ガ網狀乃至噴水狀ニ突出シテ居リ、中ニハ之レニ毛細血管ヲモ混ジテ居ルモノヲ認メル。核分割像ハ一般ニ著明デナイ(第4圖)。

膀胱三角部ハ壁ハ一般ニ平滑デ、上皮細胞ハ3—4層ヨリ成リ、上皮下ニ「プラスマ細胞」ノ浸潤ヲ認メル。一部ニハ結締織性間質ヲ伴ツタ細小ナル上皮細胞ノ突起ガアル。興味アル事ニハ、該小突起ノ中軸ヲ成ス結締織性間質ノ尖端ガ細イ結締織性細胞ニ分レテ上皮層中ニ突出シテ居ルノガ認メラレ、往々之レガ毛細血管ヲ保有シテ居ル事デアル。又、上皮組織ノ最表面部ニ於テ中等度ノ核質ヲ有シ、且原形質ノ稍々鹽基性ニ着染セル1—2層ノ細胞ヲ認メル所アルモ、該細胞ハ結締織性間質ヨリ増殖セル結締織細胞ト密接ナル關接ヲ有シ、各細胞ノ原形質ハ相互ニ移行シテ居ルガ如キ

所見ヲ認メル(第5—6圖)。

度ニ増殖擴張シ、筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

膀胱頂部及ヒ三角部共ニ上皮下組織ノ血管ハ輕

小 括 及 ビ 考 按

本實驗デハ體重約2kgノ家兎ノ膀胱ニ1%ノ Anilin 水ヲ10cc宛、毎週6回注入スルコトニ依テ膀胱粘膜ヲ直接刺戟シ、生存期間11—278日ノ實驗家兎19例ニ就テノ觀察ヲ行ツタ。

實驗家兎19例ノ中9例ニ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ヲ認メタ。即チ、Anilin 水ニヨル直接刺戟ニ因ツテモ膀胱粘膜ノ該増殖ヲ惹起シ得ル事ヲ確メ得タ。

又、該増殖ノ惹起率ヲ雌雄別ニ觀ルト、雄家兎9例中4例、雌家兎10例中5例ニ該増殖ヲ惹起シ得テ居リ、雌雄ニヨツテ惹起率ニ大差ハ認メラレナイ。

實驗期間ノ長短ト乳嘴腫性増殖發生トノ關係ヲ觀ルニ、生存日數40日未滿ノ例デハ11例中3例ガ陽性デアツタニ反シテ、生存日數40日以上ノ例デハ8例中6例ガ陽性ノ結果ヲ示シ、實驗期間ノ長イ方ニ陽性率ノ高イコトヲ認メル。然シ、生存日數僅カ16日デ陽性ノ結果ヲ示シタ例モアリ、278日生存シテ猶乳嘴腫性増殖ヲ認メ得ナイ例モアツタ。斯ル事實ハ與ヘラレタ刺戟ノ強サト、實驗動物ノ個體素因トニヨツテ生ズルモノト解サレル。

乳嘴腫性増殖ノ部位ハ、膀胱頂部ノミノ例ガ5例、頂部及ヒ三角部ノ例ガ3例、三角部ノミノ例ガ1例デアツテ、膀胱頂部ニ該増殖ヲ發生スルコトガ最モ多イ。余ハ膀胱注入ニ「カテーテル」ヲ使用シタノデアツテ、膀胱頂部ニ乳嘴腫性増殖ノ頻發ヲ見タ事ハ、「カテーテル」ノ先端ガ該部ニ與ヘタ刺戟ニ就テモ考慮ヲ要スル事デアルガ、同様ノ操作ヲ施シタ對照動物ニハ斯ル變化ヲ見ナイ事及ビ予ノ次ノ實驗即チ、化學藥品ノ經皮的及ビ經口の投與ニヨル實驗ニ於テモ膀胱頂部ニ病變ヲ頻發シテ居ル事ニヨリ、膀胱頂部ニ乳嘴腫性増殖ヲ頻發スル事ガ「カテーテル」ニ因ルモノデハナク、注入セラレタ Anilin ニ因ルモノト解釋シ得ル。

肉眼的ニハ、乳嘴腫性増殖形成ヲ見タ例デハ、膀胱ハ全般ニ輕度ニ肥厚シテ居リ、頂部或ハ三角部或ハ其ノ兩部ニ著明ナ肥厚ヲ認メタ例ト、之ヨリ變化ガ弱ク局所的ニ輕度ノ肥厚ヲ認メタニ過ギヌ例トガアル。前者ノ膀胱粘膜面ハ一般ニ粗糙デアツテ、其ノ著明ニ肥厚シタ部ノ粘膜面ハ腦迴轉狀皺襞ヲ形成シテ居リ、其ノ範圍ハ直徑約1.5—2.0cmノ不整圓形デ、境界ハ多クハ不明瞭デアリ、諸所ニ皺襞ガ車軸狀ニ周圍粘膜ニ突出シテ居ル。後者ノ膀胱粘膜面ハ一般的ニハ著變ガ無ク、輕度ニ肥厚シタ部ノ粘膜面ノ腦迴轉狀皺襞モ輕度デ範圍モ小サイ。粘膜面ニ潰瘍等ハ認メラレナカツタ。

組織學的ニハ多クノ例ハ纖維上皮腫ノ定型像ヲ示シテ居タ。上皮細胞ハ正常ノ上皮細胞ト殆ンド變リナク、2—3層デ、排列モ整然タルモノ乃至ハ上皮細胞ノ増殖著シク十數層ニ至リ、原形質ノ Eosin ニ好染シタ細胞、或ハ其ノ透明化シタ細胞、空洞狀又ハ水泡性ノ細胞、核ノ消失シタ細胞或ハ著シク退行シタ細胞等ヨリ成ツテ居ル。上皮細胞ニ著シイ異所ノ乃至異型的増殖ハ認メラレズ、又核分割像モ殆ンド認メラレナカツタ。間質結締組織ハ細長ク樹枝狀ニ分枝

スルモノ、「ポリープ状」、鈍絨毛状乃至ハ隆起状ヲ呈スルモノガアリ、其ノ間ニ赤血球ヲ以テ充滿サレ、新生擴張シタ小血管及ビ毛細血管ガ認メラレル。又、往々此ノ部ニ、又或ル例デハ乳嘴状突起ノ基根部ニ小圓形細胞浸潤ガ認メラレタ。上皮下結締織ハ少數例デハ膨化シ、浮腫状ヲ呈シ、又屢々「プラズマ細胞」ノ浸潤ガ認メラレタ。此ノ部ノ血管ノ擴張ハ著明デアツタ。以上ノ外ニ次ノ如キ興味アル所見ヲ認メタ。其ノ第一ハ、乳嘴腫性増殖ノ輕度ノ例ニ認メラレタ所見デアリ、「ポリープ状」乃至ハ三角状ノ乳嘴腫性突起ヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ正常ノ上皮細胞ト著シイ差異ガ認メラレナイニモ拘ラズ、結締織ガ増殖突出シテ居ルコトデアル。斯ノ如ク上皮細胞ニ變化ガ少ク、結締織ニノミ増殖ガ認メラレル事ハ、膀胱粘膜ヲ直接刺戟シタ場合ニモ、乳嘴腫性増殖ヲ形成スルニ際シテハ、結締織ガ先ヅ増殖突出シ、然ル後ニ上皮ノ増殖ガ之レニ隨伴スルコトヲ示シテ居ルモノト解サレル。其ノ第二ハ、乳嘴腫性突起ノ結締織性間質ト上皮組織トノ接著部ニ於テ、間質ヨリ結締織細胞ガ網状乃至噴水状ニ上皮細胞間ヲ縫ツテ突出シ、上皮層ノ中央デ消失シテ居ルモノ、上皮層ノ表層近ク迄到達シテ居ルモノ、或ハ又之ニ毛細血管ヲ伴ツテ居ルモノガ認メラレタ。即チ、間質表層ノ結締織性細胞及ビ血管ガ著シク新生増殖シテ上皮層ニ侵入シ、上皮細胞間ヲ貫イテ走行スル、即チ間質表層ノ結締織及ビ血管カラノ發芽現象(Sprossung)ト認ム可キ事デアル。其ノ第三ハ、三角状ニ膨隆シタ乳嘴腫性突起ノ上皮下組織中ノ上皮層ニ近接シタ部ニ島嶼状ノ上皮細胞群ヲ認メタ事デアル。斯ル所見ハ、上皮細胞ガ深部ニ向ツテ侵入増殖スル一過程ヲ示シテ居ルモノト解サレル。即チ、上記事實ニヨツテ、膀胱粘膜ハ之レニ直接刺戟ガ加ヘラレテモ、乳嘴腫性増殖ヲ形成スルニ當リ、先ヅ上皮下結締織ノ増殖ガ起リ、而シテ結締織細胞及ビ毛細管ガ上皮層内ニ侵入シ、或ハ島嶼状ノ上皮細胞群ガ上皮下組織内ニ侵入スルモノト考ヘラレル。筋層ニハ著變ガ認メラレナイ。

要スルニ、本實驗ニ於テハ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ハ之レヲ惹起シ得タガ、該乳嘴腫性増殖ノ惡性腫瘍化ハ認メ得ナカツタ。

IV Anilin 或ハ β -Naphthylamin ノ皮下注射ニヨル實驗

實驗方法

本實驗ニハ體重300—500 gノ榮養可良ナ海猴ヲ使用シタ。

實驗化學藥品ハ Anilin 或ハ β -Naphthylaminヲ使用シ、其等ノ0.2%「オリープ油」溶液ヲ0.1cc宛、毎週三回海猴ノ腹部皮下ニ注射シタ。斯ル方法デ連續シテ注射ヲ行ツタモノモアルガ、斯ル注射ニ堪ヘ得タ實驗海猴ニ對シテ注射藥液ヲ増量スル方法ヲ採ツタ症例ガ多イ。即チ、前記注射方法ニヨツテ2週間ヲ經過シタ後、第3週ニハ各回ニ0.15cc、第4週以後ニハ0.2cc宛注射シタ。斯ル注射スル事ニ依ツテ毎週0.6—1.2mgノ化學藥品

ヲ實驗海猴ニ與ヘタ。對照海猴ニハ「オリープ油」ヲ注射シタ。實驗海猴ノ斃死或ハ撲殺後ノ檢索ハ家兎ノ場合ト同様ニ行ツタ。

從來腫瘍ノ實驗的研究ニ當リ、海猴ヲ使用シタ實驗ハ甚ダ少ク、海猴ハ斯ル實驗動物トシテハ不適當ノ様ニ思ハレテ居タ。此ノ海猴ニ實驗的ニ腫瘍形式ヲ試ミル事ニモ興味ヲ感ジタノデ、本實驗ニハ特ニ海猴ヲ選ンダ。茲ニ注意ヲ要スルコトハ、海猴ニハ自然狀態ニ於テ稀デハアルガ、膀胱乳嘴腫竝ニ膀胱結石ガ發見セラレル事デアル。

實 驗 成 績

A. Anilin ノ皮下注射ニ依ル實驗成績 實驗ニ供シタ海猿ノ半數近クハ實驗開始後10日以内ニ斃死シタ。其等ノ膀胱ニハ乳嘴腫増殖ヲ認メナカツタ。茲ニ報告シヨウトスルノハ實驗開始後ノ生存日數ガ12—300日ノ實驗海猿15例デアツテ、其ノ中乳嘴腫性増殖ヲ示シタ例ガ11例デアル。對照海猿ニハ斯ル變化ハ認メラレナカツタ。又本實驗中膀胱結石ヲ認メタ例ハ1例モ無カツタ。

實驗成績ノ概要ハ第2表ノ一部(A 1—A 15)ニ示シタガ、陽性症例ノ中變化ノ程度ノ異ツタ數例ニ就テ次ニ述ベル。

第2表 Anilin-或ハ β -Naphthylamin-Olivenöl ナ海猿ノ皮下ニ注射セル實驗成績

海猿番號	性別	生存日數	死因	實驗終末時體重(g)	注射セル藥量(mg)	膀胱粘膜増殖ノ部位及ビ形狀
A 1	♂	12	斃死	300	1.0	膀胱頂部絨毛狀
A 2	♀	14	〃	290	1.2	
A 3	♂	14	〃	350	1.2	膀胱三角部「ポリープ狀」一部ハ樹枝狀
A 4	♂	17	〃	320	1.6	
A 5	♂	22	〃	310	2.0	膀胱頂部絨毛狀
A 6	♀	47	撲殺	400	5.6	膀胱頂部「ポリープ狀」一部ハ樹枝狀
A 7	♀	100	〃	510	8.4	膀胱全般的ナルモ頂部ハ殊ニ著明 乳嘴狀
A 8	♂	100	〃	500	15.3	膀胱頂部樹枝狀
A 9	♂	100	〃	550	15.3	膀胱頂部「ポリープ狀」
A 10	♀	100	〃	500	15.3	膀胱全般的ナルモ頂部及頂部ハ殊ニ著明 樹枝狀
A 11	♂	100	〃	550	15.3	
A 12	♂	100	〃	450	15.3	膀胱全般的ナルモ頂部ハ殊ニ著明 樹枝狀
A 13	♂	100	〃	450	15.3	
A 14	♀	188	〃	620	30.9	膀胱頂部樹枝狀
A 15	♀	300	〃	700	50.1	膀胱全般的ナルモ頂部ハ殊ニ著明 樹枝狀
B 1	♂	13	斃死	290	1.2	
B 2	♀	13	〃	300	1.2	
B 3	♂	17	〃	320	1.6	
B 4	♂	17	〃	280	1.6	
B 5	♀	47	撲殺	400	5.6	膀胱頸部樹枝狀
B 6	♂	100	〃	520	15.3	膀胱前壁樹枝狀
B 7	♀	100	〃	460	15.3	膀胱頂部小「ポリープ狀」
B 8	♀	100	〃	520	15.3	膀胱頸部小「ポリープ狀」
B 9	♂	100	〃	450	15.3	膀胱頂部樹枝狀
B 10	♂	100	〃	430	15.3	膀胱頸部絨毛狀
B 11	♀	100	〃	520	15.3	膀胱全般的樹枝狀
B 12	♂	100	〃	600	15.3	膀胱頂部「ポリープ狀」
B 13	♂	100	〃	570	15.3	膀胱頂部樹枝狀
B 14	♂	188	〃	730	30.9	膀胱頂部「ポリープ狀」
B 15	♂	190	〃	550	31.3	膀胱三角部「ポリープ狀」
B 16	♂	300	〃	650	50.1	膀胱頂部「ポリープ狀」
對照 1	♀	107	斃死	320		
同 2	♀	300	撲殺	560		

備考：海猿番號ノ項ノ A. ハ Anilin-, B. ハ β -Naphthylamin- Olivenöl ナ皮下注射シタ海猿デアル。

第1例 生存日數, 12日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ輕度ニ肥厚シテ居リ、膀胱頂部ニ於テハ其レガ稍々著明デアリ、他ノ

部ニ比ベテ幾分硬イ。粘膜面ハ他ノ部位デハ著變ガ認メラレナイガ頂部ノ肥厚ニ一致シタ部ハ屈曲シタ細イ索狀物ヨリ成ル腸迴轉狀皺襞ナ形形成シテ

居ル。其ノ範圍ハ直徑約0.8cmノ不整形形デ、境界ハ明瞭デナク、索狀物ガ周圍ニ向ツテ車軸狀ニ突出シテ居ル。潰瘍ノ形成ヲ認メナイ。

組織學の所見：上記病變部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。即チ、膀胱內腔ニ向ツテ絨毛狀ノ結締織性ノ突起ガアリ、之レヲ覆ヘル上皮細胞ハ2—3層ヨリ成リ、其ノ下層ノモノハ紡錘形ヲ成シ上層ノモノハ稍々扁平ニシテ空胞狀ヲ呈シ、變性シテ居ルノヲ認メル。絨毛狀突起ノ中軸ニハ結締織性間質ヲ認メ、同所ノ小血管ハ著明ニ増殖充血シテ居ル。上皮組織ニハ著變ナク、筋層ニモ空胞ヲ認メル他著變ヲ認メナイ。

第3例 生存日數、14日。

肉眼の所見：膀胱三角部ニ極ク輕度ノ肥厚ガ認メラレ、其ノ部ノ粘膜面ハ腦迴轉狀皺襞ヲ形成シテ居ル。其ノ性狀ハ上記第1例ニ類似ノモノデアル。

組織學の所見：該肥厚部位ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、間質結締織ノ割合ニ太イ、小「ボリープ狀」ノ突起ガ絨毛狀ニ密生シテ居リ、中ニハ間質結締織ガ樹枝狀ニ分枝シテ居ルモノモ認メラレ。上皮細胞ハ正常ノ上皮細胞ト差異ヲ認メ得ナイ。其ノ他ノ所見ハ上記第1例ト大差ガ無い。

第5例 生存日數、22日。

肉眼の所見並ニ組織學の所見ハ上記第1例ト同様デ、絨毛狀乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ(第7圖)。

第6例 生存日數、47日。

肉眼の所見：膀胱頂部ニ著明ナ腫瘤狀肥厚ガ認メラレ、硬ク觸知サレル。膀胱粘膜面ハ一般ニハ粗糙デアリ、該腫瘤狀肥厚ハ膀胱內腔ニ向ツテ著明ニ突出シテ居リ、其ノ表面ハ乳嘴狀ヲ呈シテ居ル。該腫瘤狀肥厚ノ大キサハ直徑約0.6cmノ不整形形デ、厚サハ約0.4cm、境界ハ明瞭デアル。剖面ニ於テモ其ノ表面ガ著明ニ乳嘴狀ヲ呈シテ居ルノヲ認メル。潰瘍ノ形成ハ認メラレナイ(第8圖)。

組織學の所見：定型的乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ小「ボリープ狀」ノ突起ガ膀胱內腔ニ向ツテ絨毛狀ニ密生シ、或ルモノハ樹枝狀ニ分枝シテ居ル。其ノ上皮ハ2—3層ノ上皮細胞カラ成リ、該上皮細胞ニ著變ヲ認メ得ナイ。突起ノ中軸ヲ成ス結締織性間質ハ割合ニ太イモノガ多ク、二三ノモノハ細長ク樹枝狀ニ分枝シテ居ル。此ノ部ノ小血管ハ

増殖擴張シテ居ル。上皮下組織及ビ筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

第7例 生存日數、100日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ肥厚シテ居リ、頂部ニ於テハ其レガ顯著デ、硬ク觸知サレル。膀胱粘膜面ハ一般ニハ粗糙デアツテ、頂部ノ肥厚シタ部ハ腦迴轉狀皺襞ヲ形成シテ居ル。該皺襞ノ範圍ハ直徑約1.0cmノ不整形形デ、境界ハ稍々不明瞭デアリ、索狀ノ肥厚ガ周圍粘膜面ニ車軸狀ニ突出シテ居ル。

組織學の所見：膀胱頂部ノ肥厚ノ部ハ定型的乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、乳嘴狀ノ突起ガ膀胱內腔ニ向ツテ突出シテ居ル。其ノ中軸ヲ成ス間質結締織ハ多クハ乳嘴狀ヲ成シ、之レヲ覆フ上皮細胞ニ増殖性ノ部分ガアルガ、惡性化ノ所見ハ認メラレナイ。結締織性間質内ノ小血管ノ内被細胞ノ増殖ハ他ノ例ニ比シテ稍々著明デアル。又、上皮下組織ニ於テ、上皮層ニ近接シタ部ニ嶋嶼狀ノ上皮細胞群ヲ認メル部分ガアル。其ノ他ニハ上皮下組織及ビ筋層ニハ著變ヲ認メナイ(第9圖)。

第9例 生存日數、100日。

肉眼の所見：膀胱頂部ニ著明ナ肥厚ガアリ、其ノ粘膜面ハ病變部ノ中央部ニ於テハ乳嘴狀乃至顆粒狀ヲ呈シ、周邊部ニ於テハ腦迴轉狀皺襞ヲ形成シテ居ル。其ノ大キサハ直徑約0.8cmノ不整形形、境界ハ稍々明瞭デアルガ皺襞ガ索狀トナツテ周圍ニ向ツテ車軸狀ニ數條突出シテ居ル。

組織學の所見：該肥厚部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱內腔ニ向ツテ小「ボリープ狀」ノ突起ガ認メラレ。其ノ中軸ニハ結締織性間質ガアリ、之ヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ2—3層ヨリ成ツテ居ル。該上皮細胞ニハ著變ハ認メラレナイ。上皮層ニ近接シタ上皮下組織中上皮細胞ノ嶋嶼狀集簇ヲ數箇認メル。上皮下組織ノ或ル部ハ強度ニ膨化シ、血管内被細胞ノ増殖ガ認メラレ、又同所ニ酸嗜好性白血球ヲ認メル。筋層ハ萎縮狀ヲ呈スル所ヲ認メル。

第10例 生存日數、100日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ著明ニ肥厚増殖シ、硬ク、殊ニ膀胱頸部ト頂部ニ肥厚ガ著明デアル。膀胱粘膜面ハ一般ニハ顆粒狀ヲ呈シテ居ルガ頸部及ビ頂部デハ乳嘴狀ヲ呈シテ居ル。此ノ肥厚

第 1 圖

Anilin 注入實驗第 7 例

第 2 圖

第 1 圖 組織像

第 4 圖

第 3 圖

Anilin 注入實驗第 12 例

Anilin 注入實驗第 18 例 (膀胱頂部)

第 6 圖

第 5 圖

Anilin 實驗第 18 例 (膀胱三角部)

第 5 圖 強 擴 大

第 7 圖

Anilin 注射實驗第5例

第 9 圖

Anilin 注射實驗第7例

第 11 圖

Anilin 注射實驗第10例(頂部弱擴大)

第 8 圖

Anilin 注射實驗第6例

第 10 圖

Anilin 注射實驗第10例(頸部 強擴大)

第 12 圖

Anilin 注射實驗第14例

第 13 圖

β -Naphthylamin 注射實驗第 5 例

第 15 圖

β -Naphthylamin 注射實驗第 11 例

第 17 圖

Anilin 加玄米飼養實驗第 4 例

第 14 圖

第 13 圖 組織像

第 16 圖

第 15 圖 強 擴 大

第 18 圖

Anilin 加玄米飼養實驗第 16 例

第 19 圖

β-Naphthylamin 加玄米飼養實驗第12例

第 20 圖

β-Naphthylamin 加玄米飼養實驗第14例

第 21 圖

第20圖ト同例

第 23 圖

第22圖 強 擴 大

第 22 圖

o-Amidoazotoluol 加玄米飼養實驗第1例

ノ爲ニ膀胱壁ハ伸展性ヲ減ジ、膀胱腔ハ稍々狹小ニナツテ居ル。潰瘍形成ハ認メラレナイ。

組織學的所見：膀胱頸部ハ高度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱内腔ニ向ツテ樹枝狀ニ著明ニ分枝増殖シタ突起ヲ認メル。其ノ中軸ニハ少數ノ血管ヲ伴ツタ結締織性間質ガアリ、之レヲ覆ヘル上皮細胞ハ多クハ骰子狀テ1—2層ヨリ成ツテ居ル。此ノ上皮細胞ノ原形質ハ稍々膨化シテ核周圍暈(perinuclearer Hof)ヲ有スルモノガ多イ。一般ニ上皮下組織ニハ著變ハ認メラレナイガ、其ノ一部ハ浮腫狀ニ膨化シテ居ル。然シ、之レハ上記樹枝狀突起トハ一定ノ關係ヲ示シテ居ナイ(第10圖)。

膀胱頂部ニ於テモ著明ナ樹枝狀突起ヲ認メル。

其ノ變化ノ程度ハ前記頸部ノモノヨリ稍々弱イ(第11圖)。

第 14 例 生存日數, 188 日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ頂部ノ前壁寄リニ於テ著明ニ肥厚シテ居リ, 硬ク觸知サレル。其ノ部ノ粘膜面ハ乳嘴狀ヲ呈シテ居リ, 其ノ範圍ハ直徑約 0.8 cm ノ不整圓形, 境界ハ不鮮明デアル。

B. β -Naphthylamin ノ皮下注射ニヨル實驗成績 本實驗ニ於テモ前記 Anilin ノ皮下注射ニヨル實驗ト同様實驗初期(多クハ10日以内)ニ約半数ニ近イ實驗海狸ガ斃死シタ。茲ニ報告スルノハ實驗開始後ノ生存日數ガ13—300日ノ實驗海狸16例デアツテ, 其ノ中膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ示シタ例ハ生存日數47日以上ノ12例デアル。對照海狸ニハハスル變化ハ認メラレナカツタ。又, 本實驗ニ於テモ膀胱結石ノ偶發ハ認メラレナカツタ。

實驗成績ノ概要ハ第2表ノ一部(B1—B16)ニ示シタガ, 陽性症例ノ中病變程度ノ異ツタ數例ニ就テ次ニ述ベル。

第 5 例 生存日數, 47 日。

肉眼の所見：膀胱頸部ニ著明ナ腫瘍狀肥厚ガ存シテ, 稍々硬ク觸知サレル。該部ノ粘膜面ハ乳嘴狀ヲ呈シテ居リ, 其ノ境界ハ鮮明デアル。潰瘍ノ形成ハ認メラレナイ(第13圖)。

組織學の所見：該病變部ハ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ(第14圖)。

第 7 例 生存日數, 100 日。

肉眼の所見：膀胱頂部ニ肥厚ガ認メラレ, 稍々硬イ。其ノ部ノ粘膜面ハ顆粒狀乃至腦迴轉狀皺襞ヲ形成シテ居リ, 其ノ境界ハ不明瞭デアツテ索狀ノ皺襞ガ車軸狀ニ周圍粘膜面ニ突出シテ居ル。

組織學の所見：該病變部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ, 小「ボリープ狀」乃至ハ三角狀ノ突起ガ膀胱内腔ニ向ツテ多數ニ突出シ, 其ノ突起ヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ1—2層ヨリ成ツテ居リ, 其レ等ハ概シテ骰子狀デアルガ, 所ニヨツテハ表層ニ扁平化シタ細胞ヲ認メル。結締織性間質, 上皮組織及ヒ筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

第 9 例 生存日數, 100 日。

肉眼の所見：膀胱頂部ノ前壁ニ近イ部ニ肥厚ガ認メラレ, 其ノ部ノ粘膜面ハ顆粒狀ヲ成シテ居ル。其ノ範圍ハ直徑約 0.5 cm ノ不整圓形デ, 境界ハ稍々明瞭デアル。

組織學の所見：該病變部ハ輕度ノ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。樹枝狀ニ分枝シタ突起

組織學の所見：該肥厚部ハ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ, 膀胱内腔ニ向ツテ樹枝狀乃至梁狀ニ増殖シタ突起ヲ多數認メル。其ノ中軸ニアル結締織性間質ノ細胞ハ幼若性デ, 同所ノ小血管ハ著明ニ増殖擴張シテ居ル。之レヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ1—2層カラ成ツテ居ル。上皮組織並ニ筋層ニハ著變ヲ認メナイ(第12圖)。

ヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ1—2層ヨリ成リ, 其レ等ニ著變ハ認メラレナイ。突起ノ中軸ヲ成ス結締織性間質ノ諸所ニ小血管ノ増殖擴張シテ居ル像ヲ認メル。

第 11 例 生存日數, 100 日。

肉眼の所見：膀胱ヲ摘出シ, 固定ノ爲「フォルマリン水」注入チ行ツタ際既ニ膀胱ハ全般的ニ著明ニ肥厚シ, 爲ニ其ノ内腔ガ著シク狹小ニナリ, 膀胱粘膜面ハ乳嘴狀乃至顆粒狀ヲ呈シ, 剖面ニ於テ膀胱壁ハ全般ニ亘ツテ約 0.2 cm ノ厚サニ肥厚シ, 部位ニヨリ其ノ肥厚ニ優劣ヲ認メ難イ。

組織學の所見：膀胱壁ハ到ル所高度ノ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈ス。即チ, 膀胱壁ヨリ膀胱内腔ニ向ツテ樹枝狀ニ分枝シタ突起ガ多數突出ツテ居リ, 膀胱内腔ノ殆ンド外側中部ヲ充タシテ居ル。該突起ノ中軸ニハ細イ結締織性間質ガ少數ノ小血管ヲ伴ツテ存シ, 之レヲ覆フ上皮細胞ハ1—2層ヨリ成リ, 多ク骰子狀デアル。上皮細胞ハ原形質ガ稍々膨化シテ核周圍暈ヲ有スルモノガ多イ。諸所ニ, 上記上皮細胞ノ表層ニ, 紡錘形ノ核質ニ富メル核ヲ有シ, 原形質ノ稍々鹽基性ニ着染セル上皮細胞ガアル。上皮組織ニハ, 血管ノ内被細胞ガ輕度ノ増殖ヲ營メル外著變ナク, 筋層ニモ著變ヲ認メナイ(第15, 16圖)。

第 14 例 生存日數, 188 日。

肉眼の所見：膀胱頂部ニ輕度ノ肥厚ガ認メラ

レ、之レヲ觸知スルニ稍々硬イ。此ノ部ノ粘膜面ハ顆粒狀ヲ呈シテ居リ、其ノ範圍ハ直經約0.6cmノ不整圓形デ、境界ハ不鮮明デアル。

組織學の所見：該部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱壁ヨリ内腔ニ向ツテ數箇ノ小「ボリープ狀」ノ突起ヲ認メル。其レヲ覆ツテ居ル上皮ハ1—3層ノ上皮細胞ヨリ成リ、之レ等ニハ著變ヲ認メナイ。突起ノ中軸ヲ成ス結締織性間質ニハ小血管ノ増殖充血ヲ認メル。上皮下組織及ビ筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

！第15例 生存日數、190日。

肉眼の所見：膀胱三角部附近ノ膀胱壁ハ輕度ニ

肥厚シ、其ノ部ノ粘膜面ハ乳嘴狀乃至顆粒狀ヲ呈シテ居ル。其ノ範圍ハ直經約0.4cmノ不整圓形デ、境界ハ不鮮明デアル。

組織學の所見：該部ハ中等度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。上記第14例ノモノヨリ稍々著明ナ數箇ノ小「ボリープ狀」ノ突起ヲ認メル。之レヲ覆ツテ居ル上皮ハ2—4層ノ上皮細胞ヨリ成リ、多クハ骰子狀デ、其ノ原形質ガ膨化シテ核周圍暈ヲ有スルモノガ多イ。結締織性間質ニハ小數ノ血管ヲ認メル。上皮下組織ノ表層ニ近ク、上皮細胞ノ嶋嶼狀集簇ヲ認メル。其他ニ上皮下組織及ビ筋層ニ著變ヲ認メナイ。

小 括 及 ビ 考 按

本實驗デハ體重約300—350gノ實驗海猿ノ腹部皮下ニ0.2%ノAnilin-或ハβ-Naphthylamin-「オリブ油」ヲ0.1—0.2cc宛、毎週3回注射シ、Anilinヲ用ヒタ實驗(以下「A」注射實驗ト略稱スル)デハ生存日數12—300日ノ15例、β-Naphthylaminヲ用ヒタ實驗(以下「β」注射實驗ト略稱スル)デハ生存日數13—300日ノ16例ニ就テ觀察ヲ行ツタ。

兩實驗ニ供シタ實驗海猿ノ約半數ハ實驗初期(多クハ實驗開始後10日以内)ニ死亡シタ。是等ニハ其ノ膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ認メナカツタ。

茲ニ注目ス可キハ海猿ニハ稀デハアルガ自然狀態ニ於テ膀胱乳嘴腫及ビ膀胱結石ヲ認メル事デアルガ、余ノ實驗ニ供シタ海猿ニハ膀胱結石ヲ認メタ例ハ無カツタ。

「A」注射實驗デハ實驗海猿15例中生存日數12日以上ノ11例ニ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ヲ認メ、「β」注射實驗デハ實驗海猿16例中生存日數47日以上ノ12例ニ該變化ヲ認メタ。對照海猿ニハ勿論該變化ヲ證明シ得ナカツタ。而シテ斯ノ如ク高率ニ該變化ガ惹起セラレタ本實驗ノ結果ニ對シテハ、自然狀態ニ於テ稀ニ發生スル海猿ノ膀胱乳嘴腫ニ就テ考慮ノ要ナキモノト信ズル。從ツテAnilin或ハβ-Naphthylaminハ之レヲ經皮的ニ投與シテモ膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ惹起スルモノト考ヘラレル。

過去ニ於テPerlmann及ビStaehlerガAnilin及ビβ-Naphthylaminノ皮下注射ニヨル膀胱腫瘍ノ實驗の形成ニ成功シテカラハ、Anilin及ビ其ノ誘導體ノ皮下注射ニヨル膀胱腫瘍ノ實驗の形成ガ諸氏ニヨツテ試ミラレテ居リ、β-Naphthylaminヲ用ヒタ場合デハPerlmann及ビStaehler, Hueper, Willey及ビWolf, 石川ノ諸氏が可ナリノ率ニ陽性成績ヲ擧ゲテ居ル。然シ、Anilinヲ用ヒタ實驗デハPerlmann及ビStaehlerハ20例ノ實驗家兎ノ中僅カ1例ニ陽性成績ヲ收メ得タニ止マリ、山崎・佐藤兩氏ハ實驗日數20—216日ノ實驗家兎12例中1例ニモ膀胱粘膜ノ増殖ヲ惹起シ得ナカツタ。

余ハ本實驗ニヨツテβ-Naphthylaminノ皮下注射ニ依ツテハ勿論、Anilinノ皮下注射ニ依

ツテモ可ナリノ高率ニ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ヲ惹起シ得ルコトヲ確メタ。而シテ本實驗ノ示シタ結果ニヨレバ兩者ノ該變化惹起能ハ著差ガ認メラレナイ。又、從來ハ斯ル實驗ニ海狸ハ餘リ用ヒラレテ居ナイガ、斯ル實驗的研究ノ實驗動物トシテ海狸ハ必ズシモ不適當デナイコトモ確メラレタ。

雌雄別ニ該變化ノ發生率ヲ觀察スルト、「A」注射實驗デハ雄海狸 9 例中 6 例、雌海狸 6 例中 5 例ニ、「B」注射實驗デハ雄海狸 11 例中 8 例、雌海狸 5 例中 4 例ニ該變化ガ發生シタ。「B」注射實驗デハ、又 47 日以上生存シタ實驗海狸ノ總テニ該變化ノ發生ヲ見テ居ル。即チ雌雄ノ別ニヨツテ該變化ノ發生率ニ著差ヲ認メナイ。

實驗期間ノ長短ト乳嘴腫性増殖發生トノ關係ヲ觀ルニ、「A」注射實驗デハ生存日數 40 日未滿ノ 5 例中 3 例ニ、生存日數 40 日以上ノ 10 例中 8 例ニ夫々該變化ヲ認メ、「B」注射實驗デハ生存日數 40 日未滿ノ 4 例ニハ該變化ガ認メラレズ、生存日數 40 日以上ノ 12 例ハ總テ該變化ガ認メラレタ。即チ實驗期間ノ長イ方ニ陽性率が高イ。然シ短期間ノ實驗(12 日間及ビ 14 日間)デモ陽性ノ結果ヲ示シテ居ル例モアリ、又長期間ノ實驗(100 日間)ニヨツテモ陰性ノ結果ヲ示シタ例モアリ、更ニ實驗期間ノ長短ハ必ズシモ乳嘴腫性増殖ノ強弱ニ一致シテ居ナイノデアツテ、是等ノ事實ハ實驗動物ニ與ヘラレタ刺戟ノ強弱ト實驗動物ノ個體素因トニヨツテ發生スルモノト解サレル。

「A」並ニ「B」注射實驗例ニ就テ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ノ發生シタ部位ヲ觀察スルニ、膀胱頂部ノミニ變化ガ認メラレタカ或ハ其ノ部ニ變化ガ著明デアツタ例ガ 16 例、膀胱頸部或ハ三角部ノミニ變化ガ認メラレタカ或ハ著明デアツタ例ガ 6 例、膀胱全般的ニ變化ガ認メラレタ例ガ 1 例デアル。即チ、化學藥品ノ皮下注射ニヨル遠隔作用ニヨツテモ該變化ハ膀胱頂部ニ頻發シテ居ル。斯ル事實ハ人間ノ所謂 Anilin 膀胱腫瘍ガ膀胱三角部附近ニ好發スル事實ト比較シテ興味ノアルコトデアル。

肉眼的ニハ、乳嘴腫増殖ヲ來シタ例デハ、總テノ例ニ膀胱壁ノ肥厚ヲ認メタ。其ノ高度ノ例デハ膀胱壁ガ全般的ニ著明ニ肥厚シ、爲ニ膀胱内腔ハ縮小ヲ來シテ居リ、其ヨリ變化ノ弱イ例デハ程度ノ強弱、範圍ノ大小ハアルガ過半數ニ於テ膀胱頂部及ビ其ノ附近ニ局限性ノ腫脹ヲ認メタ。該變化ノ弱イ例デハ肉眼的ニ極輕度ノ肥厚ガ認メラレルニ過ギズ、其ノ範圍モ狹小デアアル。膀胱ノ粘膜面ハ多クハ腦迴轉狀皺襞ヲ形成シ、數例ニ於テハ乳嘴狀乃至腫瘤狀ノ顯著ナ像ヲ呈シタガ、少數例デハ輕度ノ顆粒狀ヲ呈シタニ過ギナカッタ。粘膜面ニ潰瘍ヲ認メタ例ハ無イ。剖面ニ於テ肥厚表面ガ明カニ乳嘴狀ヲ呈シタ例モアツタ。

組織學的ニハ多クノ例ハ定型ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。膀胱内腔ニ突出シテ居ル突起ニハ樹枝狀ニ分枝シテ居ルモノ、更ニ其ガ吻合錯綜シテ居ルモノ、或ハ乳嘴狀ヲ呈スルモノ、小「ボリープ狀」ノモノガ絨毛狀ニ密生シテ居ルモノ、「ボリープ狀」、隆起狀乃至三角狀ヲ呈スルモノ等ヲ認メル。斯ル突起ヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ顯著ナ例デハ 5—6 層乃至 10 層以上ニ増殖肥厚

シテ居ルガ、多クノ例デハ2—3層ヨリ成リ、其ノ下層ノモノハ紡錘形ヲナスモノモアルガ、多クハ骰子狀デアリ、上層ノモノハ多クハ扁平化シテ居ル。上皮細胞ニハ原形質が稍ニ膨化シテ核周圍暈ヲ有スルモノ、空胞狀ヲ成スモノ、又上層ノ上皮細胞ニハ、紡錘形ノ核質ニ富ンダ核ヲ有シ、原形質が稍ニ鹽基性ニ着染シタモノモ認メタガ、其等上皮細胞ニ惡性所見ハ認メラレナカツタ。該増殖ノ顯著デナイ例ノ多クノモノニハ上皮細胞ニ著變ヲ認メナカツタ。膀胱腔内ニ突出シテ居ル突起ノ中軸ヲナス結締織性間質ハ突起ノ形狀ト同様ニ樹枝狀ニ分枝、吻合、錯綜シテ居ルモノ、乳嘴狀、「ボリーブ狀」、隆起狀、三角狀ヲ呈スルモノヲ認メタ。該間質中ニハ小血管ガ増殖擴張シ、其ノ中ニ赤血球ヲ充滿スル像ヲ屢々認メタ。又同所ニ細胞浸潤ヲ示シタ例モアル。上皮組織ニハ酸嗜好性白血球ノ浸潤並ニ血管内被細胞ノ増殖ヲ屢々認メタ。又諸所ニ同組織ノ膨化セル像ヲ認メタ。

以上ノ外ニ次ノ如キ興味アル所見ヲ認メタ。即チ、乳嘴腫性増殖ノ輕度ナ例デハ結締織ノ増殖、血管ノ増殖擴張ガ認メラレルニモ拘ラズ、上皮細胞ニハ著變ガ認メラレナイ事ガ屢々アツタ。斯ノ如ク上皮細胞ニ變化ガ少ク結締織ニノミ増殖ガ認メラレル事ハ、膀胱ノ乳嘴腫性増殖形成ニ際シテハ、結締織ガ先ヅ増殖突出シ、然ル後ニ上皮ノ變化ガ之レニ隨伴スルコトヲ示シテ居ルモノト考ヘラレル。又、數例ニ於テハ三角狀乃至ハ膨隆狀ニ突出シタ上皮組織ノ上皮層ニ接スル部ニ島嶼狀ノ上皮細胞群ヲ認メタ。斯ル所見ハ上皮細胞ガ深部ニ向ツテ侵入増殖スル一過程デアルト解サレル。

筋層ニハ稀ニ空胞或ハ萎縮狀ヲ呈スル部ヲ認メタ以外ニハ著變ヲ認メナイ。

即チ、本實驗ニ於テモ可ナリ高度ノ乳嘴腫性増殖ヲ惹起シ得タガ、惡性化ノ所見ハ認メ得ナカツタ。

V Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗

實驗方法

Anilin 或ハ β -Naphthylamin 加玄米飼養ニヨル實驗ニハ體重100 g 内外、o-Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗ニハ體重150 g 内外ノ榮良可良ナ白鼠ヲ使用シタ。

實驗化學藥品ハ Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol ナ用ヒ、各々其ノ5%「オリーブ油」溶液ヲ、成ル可ク殻皮ヲ附着セシメタ儘細カク粉粹シタ玄米ニ2%ノ割ニ混合シ、之レヲ白鼠ノ飼糧トシタ。即チ、該飼糧100 g 中ニ化學藥品0.1 g ナ含有セシメタ。之レヲ白鼠ノ食スルガ儘ニ、其ノ都度新製シテ充分ニ投與シタ。對照白鼠ニハ粉粹シタ玄米ニ「オリーブ油」ヲ2%ノ割ニ混合シタモノヲ飼糧トシタ。

實驗白鼠ノ斃死或ハ撲殺後ノ檢索ハ家兎乃至ハ

海獺ノ場合ト同様ニ行ツタ。

茲ニ注意スベキコトハ、白鼠ニハ自然狀態ニ於テ往々膀胱結石ヲ見ルコト及ビ *Trichosomoides crassicauda* (Bellingham) ノ膀胱寄生ヲ見ルコトデアアル。Wolff 及ビ Wherry ハ膀胱乳嘴性腫瘤ト膀胱結石トガ併發シタ成熟鼠ノ例ヲ報告シテ居リ、Löwenstein ハ *Trichosomoides crassicauda* ト鼠膀胱乳嘴腫トガ因果關係ヲ有スルコトヲ強調シタ。渡邊氏ハ神戸及ビ其ノ近郊ヨリ捕ツタ2種ノ野鼠ニ就キ調査シ、「エジプト鼠」(*Rattus alexandrius* Geoffroy) 134 例ニハ本蟲ノ膀胱寄生ヲ認メズ、「ドブ鼠」(*Rattus norvegicus* Erxleben) 365 例中ニハ本蟲ノ膀胱寄生ヲ認メタ例ガ142 例デ、其ノ中ノ40例ニハ單ナル粘膜炎ノ増生乃至稍：高

度ノ乳嘴腫ヲ認メテ居ル。又同氏ノ白鼠ヲ用ヒタ膀胱腫瘍ノ實驗的研究中ニモ本蟲ノ膀胱寄生ヲ少數例ニ認メル。即チ、白鼠ヲ用フル膀胱腫瘍ノ實

驗的研究ニハ、實驗條件以外ニ膀胱結石及ビ *Trichosomoides crassicauda* (Bellingham) ノ膀胱寄生ノ偶發ヲ豫期シナケレバナラナイ。

實驗成績

A. Anilin 加玄米飼養ニヨル實驗成績 茲ニ報告スルノハ實驗開始後ノ生存日數ガ65—240日ノ實驗白鼠19例ニ就テデアル。其ノ中膀胱粘膜ニ乳嘴腫性増殖ヲ示シタ例ハ5例デアル。實驗成績ノ概略ハ第3表ノ1部(A1—A19)ニ示シタガ、陽性症例ノ中ノ數例ニ就テ次ニ述ベル。

第4例 生存日數, 120日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ頂部ニ於テ輕度ニ肥厚シテ居リ、其ノ部ノ粘膜面ハ粗糙デアル。

組織學の所見：該部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。即チ、膀胱壁カラ腔内ニ向ツテ三角狀乃至「ボリープ狀」ノ突起ガ突出シテ居ル。該突起ノ中軸ハ結締織性間質ヨリ成リ、之レチ3—5層ノ上皮細胞ガ覆ツテ居ル。上皮細胞ニハ核質ノ稍々貧ナル圓形ノ核ヲ有シ、原形質ノ透明ナ細胞及ビ原形質ノ稍々鹽基性ニ着染シテ居ル細胞ヲ認メル。又上皮細胞中ニ少數ノ核分割像ヲ認メル。間質ニ於ケル小血管ハ増殖擴張シ、特ニ乳嘴狀ニ突出シテ居ル部ノ結締織性間質ト上皮トノ接着部ニ毛細血管ハ著明ニ充血スル。結締織性間質ハ稍々浮腫狀ヲ呈シテ居ルガ、同部ニハ細胞浸潤ハ少イ。筋層ニ於テハ筋細胞ガ空胞狀ヲ呈スルノヲ認メル(第17圖)。

第5例 生存日數, 124日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ一般ニ稍々肥厚シテ居リ頂部ニ於テハ其レガ稍々著明デアル。粘膜面ハ一般ニ粗糙デアリ、頂部ノ肥厚ノ部ニ一致シタ部デハ乳嘴狀乃至顆粒狀ヲ呈シテ居ル。剖面ニ於テハ該部ガ明カニ乳嘴狀ヲ呈スルノガ認メラレル。

組織學の所見：該肥厚部ハ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱腔内ニ向ツテ樹枝狀ニ分枝シタ突起ガ突出シ、其ノ中軸ハ結締織性

間質ヨリ成リ、之レチ被覆スル上皮ハ10層内外ノ上皮細胞カラ成ツテ居ル。該上皮細胞ノ最表層ノモノハ膨化シテ居リ核ヲ認メナイ。其ノ他ノ上皮細胞ノ核ハ核質ニ乏シク、其レニ1個ノ核小體ヲ認メ、其ノ原形質ハ概ネ透明乃至ハ顆粒狀デアル。核分割像ハ著明デナイ。該上皮層中ニ間質結締織ヨリ延長シタ結締織性細胞ガ索狀乃至噴水狀ニ侵入シテ居ルノヲ認メル。上皮下組織ニハ著明ナ小圓形細胞浸潤ガアリ、酸嗜好性白血球ヲ散在性ニ認メル。此ノ部ノ血管ハ中等度ニ擴張充血シテ居リ、一部ニ Russel 氏小體ヲ認メル。

第16例 生存日數, 240日。

肉眼の所見：膀胱頂部ヲ中心ニ大約膀胱上部ニ亘ル著明ナ肥厚ガアリ、觸知スルニ稍々硬イ。其ノ粘膜面ハ顆粒狀乃至鱗迴轉狀ヲ呈シ、周圍ノ粘膜面トノ境界ハ稍々明瞭デアル。

組織學の所見：該肥厚部ハ乳嘴狀乃至輕度ノ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱腔内ニ乳嘴狀乃至輕度ノ樹枝狀ニ分枝シタ突起ヲ多數認メル。其ノ中軸ハ結締織性間質ヨリ成リ、其ヲ覆ツテ居ル上皮ハ4—5層ノ上皮細胞ヨリ成ツテ居ル。該上皮細胞ニハ原形質ノ透明ナ細胞及ビ核質並ニ原形質ノ中等度ニ存スル細胞ヲ認メル。結締織性間質ニハ著變ヲ認メナイ。上皮下組織内ノ上皮層ニ近イ部ニ嶋嶼狀ノ上皮細胞群ヲ認メル(第18圖)。

B. β -Naphthylamin 加玄米飼養ニヨル實驗成績 茲ニ報告スルノハ實驗開始後ノ生存日數ガ42—290日ノ實驗白鼠14例ニ就テデアル。其ノ中膀胱粘膜ニ乳嘴性増殖ヲ示シタ例ガ6例デアル。實驗成績ハ第3表ノ1部(B1—B14)ニ示シタガ、陽性例ノ中ノ數例ニ就テ次ニ述ベル。

第3表 Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol 加玄米ヲ以テ

白鼠ヲ飼養セル實驗成績

白鼠番號	性別	生存日數	死因	實驗終末時體重(g)	使用藥物量(g)	偶發症 結石 寄生虫		膀胱粘膜増殖ノ 部位及ビ形狀
A 1	♂	65	撲殺	87	0.650		+	
A 2	♀	65	〃	108	0.650		+	
A 3	♂	120	〃	138	1.110			
A 4	♂	120	〃	92	1.095			膀胱頂部「ポリープ狀」
A 5	♂	124	斃死	75	0.960		+	膀胱頂部 樹枝狀
A 6	♀	126	撲殺	100	1.340			膀胱頂部「ポリープ狀」
A 7	♀	150	〃	91	1.390	+	+	
A 8	♀	152	斃死	90	1.45	+	+	
A 9	♀	158	〃	76	1.725			
A 10	♂	171	〃	74	1.890			
A 11	♀	177	撲殺	112	1.720	+	+	膀胱頂部「ポリープ狀」
A 12	♀	186	斃死	92	2.070			
A 13	♂	232	〃	73	2.600			
A 14	♂	240	撲殺	87	2.245			
A 15	♂	240	〃	107	2.235	+		
A 16	♂	240	〃	133	2.175	+		膀胱頂部 樹枝狀
A 17	♂	240	〃	109	2.205	+	+	
A 18	♂	240	〃	92	1.985			
A 19	♀	240	〃	93	2.215			
B 1	♀	42	斃死	61	0.400			
B 2	♂	48	〃	58	0.558			膀胱頂部 絨毛狀
B 3	♂	48	〃	65	0.562			膀胱三角部「ポリープ狀」
B 4	♂	66	〃	42	0.485		+	
B 5	♂	98	〃	38	0.780			
B 6	♂	124	撲殺	135	1.150			膀胱頂部 絨毛狀
B 7	♂	124	〃	125	1.115			
B 8	♀	150	〃	99	1.390			
B 9	♂	152	斃死	82	1.500			
B 10	♀	170	〃	70	2.090			膀胱頂部「ポリープ狀」
B 11	♂	170	〃	72	1.580			
B 12	♀	188	〃	75	1.740			膀胱頂部 樹枝狀
B 13	♀	212	〃	70	2.005			
B 14	♂	290	撲殺	96	2.350			膀胱頂部及ビ頸部樹枝狀
C 1		119	撲殺	128	1.333			膀胱頸部 乳嘴狀
C 2		119	〃	149	1.159			「ポリープ狀」
C 3		119	〃	157	1.228	+		「ポリープ狀」
C 4		119	〃	111	1.487			「ポリープ狀」
C 5		119	〃	133	1.390			乳嘴狀
對照 1	♀	115	斃死	69				
同 2	♂	160	〃	63				
同 3	♂	249	〃	60				
同 4	♀	290	撲殺	112				

備考：白鼠番號ノ項ノ A. ハ Anilin, B. ハ β -Naphthylamin, C. ハ o-Amidoazotoluol

加玄米ヲ以テ飼養シタ白鼠デアル。

第3例 生存日數, 48日。

肉眼的所見：膀胱壁ハ三角部ニ於テ稍々肥厚シ、其ノ部ノ粘膜面ハ粗糙顆粒狀ヲ呈シテ居リ、周圍粘膜トノ境界ハ不鮮明デアル。

組織學的所見：該部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈

スル。即チ、三角狀乃至「ポリープ狀」ノ突起ガ膀胱壁ヨリ内腔ニ向ツテ突出シテ居ル。其ノ中軸ハ結締織性間質ヨリ成リ、之レヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ、基底部ニ於テハ扁平乃至ハ骰子狀ヲ呈シテ居ルモノ多ク、最外層ニ於テハ膨化シテ居ルモノ

ヲ認メル。又上皮細胞ノ中原形質ノ透明ナ細胞ハ少イ。上皮下組織ハ稍々浮腫狀ヲ呈スル外ニ著變ヲ認メズ、此ノ部ノ血管擴張モ著明デナイ。筋層ニハ輕度ノ退行性變化ヲ認メル。

第10例 生存日数、170日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ頂部ヲ中心トシ直經約0.5cmノ不整圓形ノ範圍ニ輕度ニ肥厚シテ居ル。其ノ部ノ粘膜面ハ粗糙顆粒狀ヲ呈シ、其ノ周圍粘膜面トノ境界ハ不明瞭デアル。

組織學の所見：前記第3例ト類似ノ所見デ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈シタ。然シ本例デハ上皮細胞ハ原形質ノ透明ナルモノガ多い。

第12例 生存日数、188日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ膀胱頂部ノ稍々前壁寄リニ直經約0.7cmノ境界不鮮明ナル不整圓形ノ範圍ニ於テ肥厚シテ居ル。其ノ部ノ粘膜面ハ顆粒狀乃至乳嘴狀ヲ呈シテ居ル。

組織學の所見：輕度ノ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ膀胱壁ヨリ膀胱腔ニ向ツテ乳嘴狀乃至輕度ノ樹枝狀ニ分枝シタ突起ガ突出シテ居ル。其ノ中軸ハ細イ結締織性間質ヨリ成リ、之レヲ覆ツテ居ル上皮ハ3—4層ノ上皮細胞ヨリ成ツテ居ル。其ノ他ハ前記第3例ト類似ノ所見ヲ呈シテ居ル(第19圖)。

C. o. Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗成績 茲ニ報告スルノハ實驗開始以後ノ生存日数が119日ノ實驗白鼠5例ニ就テデアル。其ノ中ノ2例ハ膀胱粘膜ニ強度及ビ中等度ノ乳嘴腫性増殖ヲ、他ノ3例ハ輕度ノ乳嘴腫性増殖ヲ呈スル。本實驗デ遺憾ナ事ハ實驗白鼠ノ雌雄ヲ記錄シナカッタ爲、其レニ就テハ不明デアル事ト、又、固定方法ガ拙劣デアツタ爲病變部位ヲ確認シ得タ例ガ少イ事トデアル。

實驗成績ハ第3表ノ1部(C1—C5)ニ示シタガ、其ノ中ノ變化ノ強度ノ例ト輕度ノ例ニ就テ次ニ述ベル。

第1例 生存日数、119日。

肉眼の所見：膀胱頸部ニ半米粒大ノ著明ナ隆起ヲ認メタ。其ノ表面ハ乳嘴狀ヲ呈シテ居リ、周圍トハ境界ハ明確デアル。

組織學の所見：該隆起部ハ著明ナ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ、膀胱壁ヨリ膀胱腔ニ向ツテ乳嘴狀ノ突起ガ突出シテ居リ、其ノ中軸ハ索狀ノ結締織性間質ヨリ成リ、之レヲ覆ツテ居ル上皮ハ5—8層ノ上皮細胞ヨリ成ツテ居ル。上皮細胞ノ基底部

第14例 生存日数、290日。

肉眼の所見：膀胱壁ハ頂部ト頸部トニ於テ輕度ニ肥厚シテ居ル。其ノ部ノ粘膜面ハ顆粒狀乃至乳嘴狀ヲ呈シテ居ル。頂部ノモノハ直經約0.5cmノ不整圓形、頸部ノモノハ膀胱ノ下方約 $\frac{1}{4}$ ヲ占メ漏斗狀デアリ、夫々周圍粘膜面トノ境界ハ不鮮明デアル。

組織學の所見：頂部及ビ頸部ハ共ニ強度ノ樹枝狀ニ分枝シタ乳嘴腫ノ像ヲ呈スル。即チ弱擴大ニ於テハ膀胱壁ヨリ膀胱腔ニ堤防狀ニ隆起シタ腫瘤ヲ認メル。該腫瘤ハ上皮細胞ヨリ成ツテ居リ、其ノ間ニ細イ樹枝狀ニ分枝シタ結締織性間質ガ縱横ニ走り吻合錯綜シテ居ル。從ツテ結締織性間質ニヨリ圍マレタ上皮細胞群ヲ多數認メル。強擴大ニ於テハ、上皮細胞ハ橢圓形デ核質ハ貧、1—3箇ノ核小體ヲ有シテ居ル。結締織性間質中ノ毛細血管ニ著明ナ充血ヲ認メル。同所ノ細胞浸潤ハ著明デナイ。興味アル所見トシテ、結締織性間質ト上皮トノ接觸部ニ於テ間質ヨリ上皮細胞間隙ヲ縫ツテ結締織細胞及ビ毛細血管ガ上皮層ニ侵入増殖シテ居ル像ヲ認メル。上皮下組織ノ浮腫ハ一般ニ著明デナク、同所ノ血管ニハ輕度ノ充血ヲ認メル。筋層ニハ著變ヲ認メナイ(第20、21圖)。

ノモノハ圓柱狀乃至紡錘形デアリ、表層ノモノハ骰子狀乃至稍々扁平デアル。上皮細胞ハ一般ニ原形質ハ稍々鹽基性ニEosinニ着染シテ居ルガ、少數ノモノハ原形質ガ透明ニナツテ居ル。諸所ニ於テ、間質結締織カラ毛細血管ガ上皮層中ニ上皮細胞間隙ヲ縫ツテ表層ニ向ツテ走行シテ居ル像ヲ認メル。該毛細血管ノ二三ニハ其ノ中ニ赤血球ガ一列ニ配列シテ居ルノガ認メラレル。又、其ノ他ノ部ニ於テ上皮細胞間ニ紡錘形ノ稍々核質ニ富ミ原

形質ノ細長イ結締織細胞ヲ認メルガ、斯ル部ニ於テハ未ダ毛細血管ノ形成ヲ見ナイ。結締織性間質ハ輕度ニ浮腫狀デ、酸嗜好性白血球ノ浸潤ヲ認メル。結締織性間質ノ尖端部ニ近イ所ニ於テ間質内ニ嶋嶼狀ノ上皮細胞ノ一群ヲ認メル。同細胞群中ニ原形質突起ニヨリ連結サレタ結締織性細胞ガ存シ、其レガ數箇ノ上皮細胞ヲ取り圍ムガ如キ像ヲ呈シテ居ル。特ニ該結締織性細胞ハ上記ノ嶋嶼狀上皮細胞群ノ周圍ノ結締織性間質ノ近クニ著明ニ存スル。上皮下組織ハ血管ニ充血ヲ見、血管ノ一部ノモノニ内被細胞ノ輕度ノ増殖ヲ認メル外ニ著變ナク、深層ニモ特記事項ヲ認メナイ(第22, 23圖)。

第4例 生存日數, 119日。

D. 對照實驗 生存日數 115—290日ノ對照實驗白鼠4例ニハ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ヲ示シタモノハ1例モ無イ。膀胱結石或ハ *Trichosomoides crassicauda* ノ寄生ヲ認メタ例モ無イ。

小 括 及 ビ 考 按

本實驗デハ Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol ヲ 0.1%ノ割合ニ混ジタ玄米ヲ以テ白鼠ヲ長期間飼養シタ結果ヲ觀察シタ。實驗白鼠ハ前二實驗ニハ體重 100g 内外ノモノ、後者ニハ 150g 内外ノモノヲ使用シタ。

Anilin 加玄米飼養ニヨル實驗(以下「A」飼養實驗ト略稱スル)デハ 19例ノ中生存日數 120—240日ノ5例ニ膀胱ノ乳嘴性増殖ヲ認メ、 β -Naphthylamin 加玄米飼養ニヨル實驗(以下「 β 」飼養實驗ト略稱スル)デハ 14例ノ中生存日數 48—290日ノ6例ニ、又、o-Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗(以下「o」飼養實驗ト略稱スル)デハ生存日數 119日ノ5例ノ總テニ、該變化ヲ認メタ。

茲ニ注意ス可キ事ハ、膀胱腫瘍ノ實驗的研究ニ際シテ白鼠ヲ使用スル場合ニハ實驗條件以外ニ腫瘍惹起誘因トシテ膀胱結石及ビ *Trichosomoides crassicauda* (Bellingham) ノ膀胱寄生ノ偶發ヲ考慮ニ入レナケレバナラナイ事デアル。「A」飼養實驗デハ是等ノ偶發ヲ認メタ9例中3例、此等ノ偶發ヲ認メ得ナカッタ10例中2例ニ膀胱乳嘴腫性増殖ヲ認メテ居ル。即チ、前者ニ多少乍ラ頻發シテ居ルガ後者ニモ發生シテ居ル所カラ、Anilin 加玄米飼養ニ依ツテモ該變化ガ惹起セラレルモノト解サレル。「 β 」及ビ「o」飼養實驗ノ中、膀胱乳嘴性増殖ヲ證明シタ例ニハ上記ノ偶發症ヲ認メ得ナカッタ。即チ、該變化ハ β -Naphthylamin 及ビ o-Amidoazotoluol ノ飼養ニヨツテ惹起セラレタモノト考ヘ得ラレル。對照實驗デハ勿論變化ハ證明シ得ナカッタ。從ツテ、Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol ハ之レヲ經口的ニ投與シテモ、膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ惹起スルモノト解サレル。

過去ニ於テ Anilin 其ノ他ノ化學藥品ノ飼與ニ依ツテ實驗的膀胱腫瘍ヲ惹起シ得タノハ佐々

肉眼の所見：膀胱壁ニ帽針頭大ノ境界明確ナ肥厚ヲ認メル。其ノ部ノ粘膜面ハ顆粒狀ヲ呈シテ居ル。

組織學的所見：該部ハ輕度ノ乳嘴腫ノ像ヲ呈シテ居ル。即チ、膀胱壁カラ膀胱内腔ニ向ツテ「ボリープ狀」乃至絨毛狀ノ突起ガ突出シテ居リ、其ノ中軸ハ結締織性間質デ、之レヲ覆ツテ居ル上皮ハ4—6層ノ上皮細胞カラ成ツテ居ル。結締織性間質ハ輕度ニ浮腫狀ヲ呈シ、上皮細胞ニハ諸所ニ退行性變性ヲ行ツテ居ルモノヲ認メル。上皮下組織モ輕度ニ浮腫狀ヲ呈シ、其ノ部ノ血管ハ充血シテ居ルガ筋層ニハ著變ヲ認メナイ。

木氏及ビ其ノ門下生ノ o-Amidoazotoluol 及ビ其ノ他ヲ用ヒタ白鼠ノ飼養實驗及ビ Hueper, Willey 及ビ Wolf 等ノ β -Naphthylamin = ヨル牡犬ノ飼養實驗ノミデアツテ, Curschmann 及ビ Grandhomme ハ數種ノ藥品ヲ用ヒテ飼養實驗ヲ行ツタガ陽性成績ヲ舉ゲ得ナカツタ。予ハ本實驗ニ於テ o-Amidoazotoluol 及ビ β -Naphthylamin ノ外ニ Anilin ノ經口的投與ニ依ツテモ膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ惹起シ得ル事ヲ確メタ。而シテ、其レ等化學藥品ノ該増殖惹起能ハ、予ノ實驗成績ノ示ス所ニヨレバ、o-Amidoazotoluol 最モ強く、 β -Naphthylamin 之レニ次ギ、Anilin ハ最モ弱イ。

雌雄別ニヨル該變化ノ發生率ニ就テ觀ルニ、「A」飼養實驗デハ雄白鼠 11 例中 3 例、雌白鼠 8 例中 2 例ニ陽性成績ガ示サレテ居リ、「 β 」飼養實驗デハ雄白鼠 9 例中 4 例、雌白鼠 5 例中 2 例ニ陽性成績ガ示サレテ居ツテ、雌雄別ニヨツテ該變化ノ發生率ニ著差ハ認めラレナイ。

實驗期間ノ長短ト該乳嘴腫性増殖發生トノ關係ヲ觀ルニ、該變化發生迄ノ最短期間ハ「A」飼養實驗デハ 120 日、「 β 」飼養實驗デハ 48 日デアリ、又、該變化ノ發生率ハ實驗期間ノ長イ程大アルトハ認めラレナイ。即チ比較的短期間ノ實驗ニ依ツテモ陽性ノ結果ヲ示シタ例ガアリ、又コレヨリ長期間ノ實驗ニヨツテモ陰性ノ結果ヲ示シタ例モアリ、更ニ又、實驗期間ノ長短ハ必ズシモ該變化ノ強弱ニ一致シテ居ナイ事ヲ認メル。是等ノ事實ハ實驗動物ニ與ヘラレタ刺激ノ強弱ト實驗白鼠ノ個體素因トニ因ツテ招來セラレタモノト解サレル。

「A」、「 β 」並ニ「o」飼養實驗例ニ就テ該變化ノ發生シタ部位ニ就テ觀察スルニ、膀胱頂部ノ例ガ 9 例、膀胱三角部ノ例ガ 1 例、膀胱頸部ノ例ガ 1 例、膀胱ノ頂部及ビ頸部ノ例ガ 1 例デアツテ、化學藥品ノ經口的投與ニヨル遠隔作用ニヨツテモ該變化ハ膀胱頂部ニ頻發シテ居ル。斯ル事實ハ人間ノ Anilin 膀胱腫瘍ガ膀胱三角部附近ニ好發スル事實ト比較シテ興味ノアル事デアル。

肉眼的ニハ、乳嘴腫性増殖ヲ發生シタ多クノ例デハ、膀胱壁ノ局限性肥厚ガ認めラレタ。其ノ高度ノ例デハ肥厚ガ可ナリ著明デ、範圍モ廣ク、⁵稍々硬ク觸知サレルガ、輕度ノ例デハ肥厚ガ微弱デ、範圍モ狹小デアツタ。其ノ粘膜面ハ腦迴轉狀皺襞ヲ形成シテ居ル例モアルガ、多クハ乳嘴狀乃至顆粒狀デアリ、變化ノ輕度ナ少數例デハ粘膜面ガ粗糙デアルニ過ギナカツタ。其ノ境界ハ多クハ不明瞭デアツタガ、變化強度ノ例デハ明瞭デアツタ。少數例デハ剖面ニ於テ該肥厚ノ粘膜面ガ著明ニ乳嘴狀ヲ呈シタ。粘膜面ニ明カニ潰瘍ヲ認メタ例ハナイ。

組織學的ニハ、多クノ例ハ定型の乳嘴腫ノ像ヲ呈シテ居タ。即チ、膀胱壁ヨリ膀胱腔内ニ向ツテ突出シテ居ル突起ハ、2—3ノ例デハ樹枝狀ニ分枝シテ居リ、他ノ多クノ例デハ乳嘴狀、「ポリープ狀」、三角狀乃至ハ隆起狀ヲ呈シ、或ハ小「ポリープ狀」ノ突起ガ密生シテ絨毛狀ヲ呈シタ。斯ル突起ヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ多クノ例デハ 3—5 層ヲ成シテ居ルガ、10 層内外ニ増殖シテ居ル例モ認めラレタ。上皮細胞ハ基底部ノモノハ圓柱狀、紡錘形、骰子狀乃至ハ稍々扁平狀ヲ呈シテ居リ、表層ノモノハ一般ニ之ヨリ稍々扁平化シテ居ル。少數例ニ於テハ、最表層ノ

上皮細胞ノ原形質が膨化シテ居ルノミナラス、之ニ核ヲ認メ得ナイモノガアル。二、三ノ例デハ上皮細胞ノ中ニ原形質ノ透明ノモノ及ビ顆粒狀ノモノ或ハ原形質が鹽基性ニ着染シテ居ルモノヲ認メル。核分割ノ像ハ、1例ニ少數之レヲ認メタ外、大多數例デハ著明デナイ。上記ノ膀胱腔内ニ突出シテ居ル突起ノ中軸ニハ結締織性間質ガアリ、突起ノ形狀ト同様ニ樹枝狀ニ分枝シ、或ハ乳嘴狀、「ボリーブ狀」、三角狀乃至隆起狀ヲ呈シテ居ル。1例ニ於テハ結締織性間質ノ樹枝狀ノ分枝ガ著明デ、細イ結締織性間質ガ上皮細胞ノ厚イ層ノ中デ分枝、吻合シテ居リ、結締織性間質ニ圍マレタ上皮細胞群ガ排列スルカノ如キ像ヲ呈シタ。結締織性間質ニ於ケル細胞浸潤ハ多クノ例デハ著明デナイガ、少數例デハ酸嗜好性白血球ノ浸潤ヲ認メタ。又、少數例ニ於テ結締織性間質ガ輕度ノ浮腫狀ヲ呈スルヲ認メタ。結締織性間質及ビ上皮下組織ニ於ケル血管ハ屢々増殖、擴張、充血ノ像ヲ呈シタ。上皮下組織ハ少數例ニ於テ、輕度ノ浮腫狀ヲ呈シ、小圓形細胞及ビ酸嗜好性白血球ノ浸潤ヲ認メル。興味ノアル所見トシテ、二、三ノ例ニ、上皮層ト結締織性間質トノ接合部ニ於テ、該間質ヨリ上皮細胞間隙ヲ縫ツテ毛細血管ガ派生シ、上皮層中ヲ表層ニ向ツテ走行シテ居ル像ヲ認メタ。該毛細血管ノ或ルモノニハ、其ノ中ニ赤血球ガ一列ニ配列シテ居ルノガ明カニ認メラレル。又、其ノ附近ニハ上皮細胞間ニ、紡錘狀ノ稍々核質ニ富ミ原形質ノ細長イ結締織性細胞ヲ認メルガ、斯ル所デハ未ダ毛細血管ノ形成ヲ見ナイ。又、少數例ニ於テ、上皮下組織ニ近接スル部ニ嶋嶼狀ノ上皮細胞群ヲ認メタ。即チ、上皮細胞ガ深部ニ向ツテ増殖シテ居ルト解スベキ所見ヲ認メタ。

筋層ニハ、少數例ニ於テハ、其ノ空胞狀ヲ呈スルモノ、或ハ又、退行性變化ヲ營ムモノヲ見タガ、多數例ニ於テハ著變ガ認メラレナカツタ。

要スルニ、本實驗ニ於テモ可ナリ強度ノ乳嘴腫性増殖ヲ惹起シ得タガ、惡性腫瘍様ノ變化ハ認メラレナカツタ。

Ⅶ 總括及ビ考按

予ハ Anilin 膀胱腫瘍ノ實驗的研究トシテ次ノ諸實驗ヲ行ツタ。

I. Anilin 水ヲ家兎膀胱内ニ注入セル實驗

(以下「A」注入實驗ト略稱スル)

II. 藥物ヲ海猿ノ皮下ニ注射セル實驗

A. Anilin 「オリーブ油」溶液ノ皮下注射ニヨル實驗(以下「A」注射實驗ト略稱スル)

B. β -Naphthylamin 「オリーブ油」溶液ノ皮下注射ニヨル實驗(以下「 β 」注射實驗ト略稱スル)

III. 藥物加玄米ヲ以テ白鼠ヲ飼養セル實驗

A. Anilin 加玄米飼養ニヨル實驗

(以下「A」飼養實驗ト略稱スル)

B. β -Naphthylamin 加玄米飼養ニヨル實驗

(以下「 β 」飼養實驗ト略稱スル)

C. o-Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗

(以下「o」飼養實驗ト略稱スル)

以上ノ諸實驗ノ結果ニ就テ總括並ニ考按ヲ試ミルト次ノ通りデアル。

膀胱乳嘴腫性増殖ノ惹起率 上記諸實驗ソノ各々ニ發生率ニ差ハアルガ、何レニ於テモ膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖形成ガ認メラレタ。即チ、「A」注入實驗デハ生存日數13—300日ノ實驗家兎19例中9例ニ、「A」注射實驗デハ生存日數12—300日ノ實驗海猿15例中11例ニ、「 β 」注射實驗デ

ハ生存日數13—300日ノ實驗海獺16例中12例ニ,「A」飼養實驗デハ生存日數65—240日ノ實驗白鼠19例中5例ニ,「β」飼養實驗デハ生存日數42—290日ノ實驗白鼠14例中6例ニ,「o」飼養實驗デハ生存日數119日ノ實驗白鼠5例ノ總テニ,夫々該變化ガ認メラレタ。他方各實驗ノ對照實驗動物ニハ該變化ハ認メラレナカツタ。

實驗條件以外ノ膀胱粘膜増殖ヲ招來シ得ル因子トシテ,「A」注入實驗デハ機械的刺戟及ビ膀胱炎,「A」及ビ「β」注射實驗デハ實驗動物トシテ使用シタ海獺ニハ稀デハアルガ膀胱乳嘴腫ノ自然發生及ビ膀胱結石ノ偶發アルコト,「A」,「β」及ビ「o」飼養實驗デハ實驗動物トシテ使用シタ白鼠ニハ膀胱結石及ビ膀胱寄生蟲ノ偶發ノアルコト等ニ注意スルト共ニ,全實驗ヲ通ジテハ Vitamin 缺乏症ヲ起サヌ様考慮ヲ拂ツタ。是等ニ就テハ各實驗ノ小括ノ項述ベタ通りデアツテ,以上ノ因子ニ原因スルヲ思料セシモノハ無ク,各實驗總テニ於テ,膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ハ何レモ予ノ企圖シタ實驗條件ニヨツテ惹起セラレタモノト考ヘラレル。其ノ中デ最モ考慮ヲ要スルノハ白鼠ヲ使用シタ「A」飼養實驗デアツテ,膀胱結石及ビ膀胱寄生蟲ノ偶發ガ實驗白鼠ノ約半數例ニ認メラレ,陽性例5例中3例ニハ是等ノ偶發ガ認メラレタガ,陽性例中ノ他ノ2例ニハ其等ノ偶發ガ認メラレナカツタ。從ツテ本實驗例ノ陽性率ハ其レ等偶發因子ニヨツテ高メラレタデアラウ事ハ認メナケレバナラナイガ,又,予ノ企圖シタ實驗條件ニヨツテ該變化ガ惹起セラレタ事ハ否定シ得ナイト考ヘラレル。

要スルニ, Anilin ヲ以テ膀胱粘膜ヲ直接刺戟シテモ,或ハ又, Anilin 或ハ β -Naphthylamin ヲ經皮的ニ投與シテモ,更ニ又, Anilin, β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol ヲ經口的ニ與ヘテモ,膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ガ惹起セラレルコトハ首肯シ得ベキコトデアル。而シテ Anilin 及ビ其ノ誘導體ノ經皮的或ハ經口的投與ニヨツテ該變化ガ惹起シ得タ事實ハ,所謂 Anilin 膀胱腫瘍ノ場合ニ於テ Anilin 及ビ其ノ誘導體ガ職工ノ皮膚ヲ通シテ或ハ經口的ニ體內ニ輸入セラレタ結果,膀胱腫瘍ヲ形成スルニ至ル事ノアルヲ教フルモノト云ヘル。從ツテ是等化學藥品ヲ取扱フ者ハ,之レニ直接接觸スルコトヲ避け,且之レヲ經口的ニ体内ニ輸入セシメナイ様ニ注意スル事が必要デアル。

以前カラ Anilin ヲ用ヒテ,所謂 Anilin 膀胱腫瘍ノ發生原因ヲ實驗的ニ證明セントノ試ミハ諸氏ニヨリ各種ノ方法ニヨツテ行ハレタガ,多クハコレニ失敗シテ居リ, Perlmann 及ビ Staehler ガ Anilin ヲ皮下注射スル事ニヨツテ實驗家兎30例中僅カニ1例ニ陽性成績ヲ得タニ止マツテ居ル。余ハ本實驗中ノ「A」注射實驗ニ於テハ海獺ニ可ナリノ高率ニ陽性成績ヲ收メ得,「A」飼養實驗ニ於テハ白鼠ニ陽性成績ヲ擧ゲ得タ。

更ニ又,從來ハ斯ル實驗の研究ノ實驗動物トシテ海獺ハ余リ用ヒラレテ居ナイガ,余ノ海獺ヲ使用シタ「A」及ビ「β」注射實驗ノ結果ヨリ觀レバ,斯ル實驗的研究ノ實驗動物トシテ海獺ハ必ズシモ不適當デナイコトガ確メラレタ。

予ノ使用シタ化學藥品ニ就テ,其ノ膀胱粘膜ニ對スル乳嘴腫性増殖惹起能ヲ比較スルニ,

「A」及ビ「B」注射實驗デハ、觀察例ニ對スル陽性例ノ率ハ兩者ノ間ニ著差ヲ認メナイ。從ツテ Anilin ト β -Naphthylamin トノ該變化惹起能ニハ大差ヲ認メ得ナイ。然シ「A」、「B」及ビ「O」飼養實驗デハ、觀察例ニ對スル陽性率ハ「O」飼養實驗ニ於テ最も高く、「B」飼養實驗ニ於テハ之ニ次ギ、「A」飼養實驗ニ於テ最も低イ。即チ、乳嘴腫性増殖惹起能ハ o-Amidoazotoluol が最も強く、 β -Naphthylamin 之ニ次ギ、Anilin が最も弱イ結果ヲ示シテキル。

雌雄ノ別ト該増殖惹起率 余ノ行ツタ各種實驗ノ結果ヨリ、雌雄ノ別ト膀胱乳嘴腫性増殖ノ發生トノ關係ヲ觀ルニ、各實驗共該増殖ノ發生率ハ雌雄ノ別ニヨツテハ著差ガ示サレナカツタ。

實驗期間ト該増殖惹起率 實驗期間ノ長短ト膀胱乳嘴腫性増殖惹起トノ關係ヲ觀ルニ、「A」注入實驗、「A」及ビ「B」注射實驗ノ示シタ成績デハ、實驗期間ノ長イ方ニ該變化ガ頻發シテ居ルガ、「A」及ビ「B」飼養實驗ノ示シタ成績デハ、實驗期間ノ長イ方ニ該變化ガ頻發スルトハ言ヒ難イ。又、各實驗ニ於テ惹起セラレタ乳嘴腫性増殖ノ強弱ハ、必ズシモ實驗期間ノ長短ト一致シテ居ナイ。斯ル事實ハ各實驗ニヨツテ實驗動物ニ與ヘラレタ刺激ガ該變化惹起ニ對シテ適度ヲ異ニシタ爲及ビ實驗動物ニヨツテ該變化發生ノ素因ヲ異ニシ、尙又、同種動物ト雖モ該變化發生ノ個體素因ヲ異ニスル爲ニ招來セラレタモノト考ヘラレル。

該増殖發生ノ部位 余ノ行ツタ各種實驗ノ結果ヨリ、乳嘴腫性増殖ノ發生スル膀胱ノ部位ニ就テ觀察スルニ、「A」注入實驗デハ頂部ノ例ガ5例、頂部及ビ三角部ノ例ガ3例、三角部ノ例ガ1例デアリ、「A」及ビ「B」注射實驗デハ頂部ニ該増殖ヲ認メタカ或ハ其レガ著明デアツタ例ガ16例、頸部或ハ三角部ニ該増殖ヲ認メタカ或ハ其レガ著明デアツタ例ガ6例、膀胱全般的ニ該増殖ヲ認メタ例ガ1例デアリ、「A」、「B」並ニ「O」飼養實驗デハ、頂部ノ例ガ9例、三角部ノ例ガ1例、頸部ノ例ガ1例、頂部及ビ頸部ノ例ガ1例デアル。

即チ Anilin 水ヲ以テ家兔膀胱ヲ直接刺戟シテモ、或ハ又 Anilin 及ビ其ノ誘導體ヲ經皮的乃至經口的ニ投與シテモ、膀胱ニ惹起サレル乳嘴腫性増殖ハ膀胱頂部ニ頻發シテ居ル。

翻ツテ人間ノ所謂 Anilin 膀胱腫瘍ハ輸尿管口附近乃至ハ膀胱三角部ニ頻發スル事ガ一般ニ認メラレ、或ハ此ノ部位ガ發癌物質ヲ含ム尿ニ多ク接觸スル爲ト説明サレ、或ハ又此ノ部位ガ血管ニ富ミ從ツテ血流中ノ發癌物質ガ其處ニ最も多ク作用スル爲ト考ヘラレテ居ル。

而シテ後ノ説明ハ、予ノ實驗ニ於テ乳嘴腫性増殖ガ血管ノ粗ナル膀胱頂部ニ頻發シテ居ル事實ト一致シテ居ナイシ、又予ノ實驗ニ於テ化學藥品ノ遠隔作用ニヨル場合ニ於テモ Anilin 水注入ヲ以テスル直接刺戟ニヨル場合ト類似ノ部位ニ該増殖ヲ招來スル事實ハ寧ロ前ノ説明ヲ支持スル一事實ト考ヘラレル。而シテ人間ノ所謂 Anilin 膀胱腫瘍ト實驗動物ノ該増殖トヲ比ベテ、ソノ發生部位ニ斯ク相異ヲ來スコトハ、兩者ノ體位ノ異ナル事が、ソノ原因ノ一デアルコトモ亦想像ニ難クナイ。

乳嘴腫性増殖ノ肉眼の所見 該増殖ヲ證明シ得タ例ノ中最も多クノ例デハ膀胱壁ニ肥厚ガ認メラレ、其ノ部ハ伸展性ヲ缺キ、稍々硬ク觸知サレタ。斯カル肥厚ハ多クハ膀胱頂部及ビ其ノ

附近ニ存シタガ、少數例デハ膀胱三角部或ハ頸部ニモ認メラレタ。該變化ノ強度ナ例デハ膀胱壁ハ全般的ニ著明ニ肥厚シ、爲ニ内腔ガ狭小トナツテ居ル例ヲ認メタガ、他方該肥厚ガ微弱デ肉眼的ニハ辛ウジテ之レヲ認メ得ルニ過ギヌ例モアツタ。

該肥厚部ノ膀胱粘膜面ハ多クハ腦廻轉狀皺襞ヲ形成シテ居ルカ或ハ乳嘴狀乃至顆粒狀ヲ呈シテ居ル。其ノ境界ハ變化強度ノ例デハ明瞭デアアルガ、他ノ多クノ例デハ不鮮明デアリ、腦廻轉狀皺襞ハ車軸狀ニ周圍粘膜面ニ突出シテ居リ、形狀ハ多ク不整圓形デアアル。粘膜面ニ潰瘍乃至糜爛ヲ明カニ認メタ例ハ無イ。

膀胱乳嘴腫性増殖ノ組織學的所見 乳嘴腫性増殖ヲ發生シタ例ノ中、多クノ例ハ定型的乳嘴腫ノ像ヲ呈シテ居リ、膀胱内腔ニ向ツテ突出シテ居ル突起ハ變化強度ノ例デハ樹枝狀乃至ハ乳嘴狀ヲ呈シ、之レヨリ變化ノ弱イ例デハ「ボリーブ狀」乃至ハ隆起狀ヲ呈シ、又小「ボリーブ狀」ノ突起ガ密生シテ絨毛狀ヲ呈シテ居ル例モ認メラレタ。

斯ル突起ヲ覆ツテ居ル上皮層ハ常態ト大差ナク、2—3層ノ上皮細胞乃至ハ10層以上ニ増殖シタ上皮細胞カラ成ツテ居ル。上皮細胞ノ下層ノモノハ多ク圓柱狀、類圓形、骰子狀ヲ呈シ、上層ノモノハ概シテ之ヨリ扁平化シテ居ル。上皮細胞ノ中ニハ Eosin ニ好染シタ細胞、原形質ガ稍ニ膨化シテ周圍暈ヲ有スル細胞、空洞狀又ハ水泡性ノ細胞、核ノ消失シタ細胞或ハ著シク退化シタ細胞ヲ認メタ。稀ニハ其ノ諸所ニ核分割像ヲ認メタ例ガアツタガ上皮細胞ノ異所的乃至ハ異型的増殖ノ顯著ナ例ハ認メラレナカツタ。

該突起ノ中軸ヲ成ス結締織性間質ハ、變化ノ強度ノ例デハ細長ク樹枝狀ニ分枝シ、更ニ吻合錯綜シテ居ルカ、或ハ稍ニ太ク乳嘴狀ヲ呈シテ居ルガ、之レヨリ變化ノ弱イ例デハ「ボリーブ狀」乃至ハ隆起狀ヲ呈シテ居ル。多クノ例デハ結締織間質中ノ小血管及ビ毛細血管ガ増殖擴張シ、中ニ赤血球ヲ充滿シテ居ル像ガ認メラレタ。又少數例デハ間質結締織ハ輕度ノ浮腫狀ヲ呈シ、又往々其ノ部或ハ該突起ノ基底部ニ小圓形細胞ノ浸潤ガ認メラレタ。

上皮下結締織ハ少數例ハ膨化シテ浮腫狀ヲ呈シ、酸嗜好性細胞或ハ「プラズマ細胞」ノ浸潤ガ認メラレタ。此ノ部ニ血管ガ著明ニ増殖擴張シタ例ガ屢々認メラレ、又二、三ノ例ニハ血管内被細胞ノ増殖ヲ認メタ。

筋層ニハ少數例ニ空胞或ハ退行性變性乃至ハ其ノ萎縮ヲ認メタガ、多數例ニハ著變ヲ認メ得ナカツタ。

即チ定型的乳嘴腫ノ像ハ各實驗ニ於テ認メラレタガ、惡性腫瘍ノ像ハ1例ニモ認メ得ナカツタ。

以上ノ外ニ次ノ如キ興味アル所見ヲ認メタ。其ノ第一ハ、「A」注入實驗並ニ「A」及ビ「B」注射實驗ニ於テ屢々認メラレタ所見デアツテ、乳嘴腫性突起ノ上皮下結締織ガ増殖突出シ、又血管ノ新生擴張ヲ認メタニモ拘ラズ、之レヲ覆ツテ居ル上皮細胞ハ正常ノ其レト比ベテ著シイ差異ヲ示サナカツタ事デアアル。斯ル所見ハ乳嘴腫性増殖形成ガ先ヅ上皮下結締織ノ増殖ニ始マリ、

後ニ上皮ノ増殖ガ之レニ隨伴スル事ヲ示シテ居ルモノト解サレル。其ノ第二ハ、「A」注入實驗並ニ「A」,「B」及ビ「C」飼養實驗デ屢々明カニ認メラレタ所見デアアルガ、乳嘴腫性突起ノ結締織性間質ト上皮組織トノ接着部ニ於テ、間質カラ該結締織性ノ細小ナル突起ガ網狀乃至噴水狀ニ上皮層内ニ上皮細胞間ヲ縫ツテ突出シテ居リ、之レガ上皮層ノ中央デ消失シテ居ルモノ、上皮層ノ表層ニ迄延長侵入シテ居ルモノ、又、之レガ毛細血管ヲ伴ツテ居ルモノヲ認メタ事デアアル。斯ル所見ハ間質表層ノ結締織細胞及ビ毛細血管ガ著シク新生増殖シテ上皮層ニ侵入シ上皮細胞間ヲ貫イテ走行シタ事ヲ示シ、間質表層ノ結締織及ビ毛細血管カラ發芽現象(Sprossung)ヲ起シタモノト認ム可キデアアル。而シテ斯ル所見ガ、膀胱粘膜ヲ直接刺戟シタ「A」注入實驗ニ於テモ、又遠隔作用ニソノ發生ヲ俟ツ飼養實驗ニ於テモ認メラレタ事ハ注目ス可キ事實デアアル。其ノ第三ハ、各實驗ニ於テ屢々認メラレタ所見デアツテ、乳嘴腫性突起ノ上皮下組織中ノ上皮層ニ近接シタ部ニ嶋嶼狀ニ存在スル上皮細胞群ヲ認メタ事デアアル。斯ル所見ハ乳嘴腫性増殖ノ過程ニ於テ、上皮層カラ新生上皮芽ガ上皮下組織内ニ侵入シ、其ガ増殖シタ事ヲ示ス像デアルト考ヘラレル。

文献概略ノ項デ述ベタ如ク、Washburn ハ Anilin 膀胱癌ノ場合ニハ、癌ガ發生スル前ニ膀胱上皮ノ表層ノ下ニ毛細血管ノ増殖ガ現レルトシ、Gay ニ據レバ早期ニ現レル變化ハ粘膜基底層ノ毛細血管ノ増殖デアツテ、粘膜ヲ通シテ増殖ヲ來スニ到ルノハ其ノ後ノ事ノ様デアアル。西村氏及ビ石川氏ハ各々所謂發芽現象ガ間質表層ノ結締織及ビ毛細血管ヨリ起リ、之レガ上皮層ニ侵入スルモノト爲ス可キ像ヲ認メ、刺戟物質ノ作用ハ、其ガ尿中ニ排泄サレテ膀胱粘膜ニ働クモノデハ無ク、血行ニヨツテ其ガ膀胱結締織層ニ運バレ、其處ノ結締織殊ニ毛細血管ヲ刺戟シ、先ヅ其ノ増殖ヲ促シ、以テ該部ガ乳嘴狀ニ突起スルモノト推斷スルヲ妥當トスルトシタ。

予ノ實驗ノ示シタ上記所見カラ觀テモ、膀胱粘膜ノ乳嘴腫性増殖ハ、其レヲ惹起セシメタ刺戟ガ、Anilin 水注入ニヨル直接作用ニヨルモ、或ハ又、Anilin 及ビ其ノ誘導體ノ經皮乃至經口ノ投與ニヨル遠隔作用ニヨルモ、先ヅ上皮下結締織ノ増殖ニ始マリ、其ノ部ノ血管ノ新生擴張ヲ來シ、後ニ上皮ノ増殖ガ之レニ隨伴スルモノト考ヘラレル。

其ノ際ニ結締織性ノ細小ナ突起ガ間質カラ上皮層内ニ侵入スル像及ビ嶋嶼狀ノ上皮細胞群ガ上皮下結締織内ニ侵入スル像ヲ屢々認メタガ、是等ハ上皮下結締織ノ増殖ニ次デ起ル變化デアルト解サレル。而シテ結締織性ノ細小ナ突起ガ間質カラ上皮層内ニ侵入シテ居ル像ハ、膀胱粘膜ヲ直接刺戟シタ場合ニ於テモコレガ明カニ認メラレテ居ル故、斯ル所見ヲ以テ刺戟物質ノ作用ガ血行ニヨツテ結締織竝ニ血管ニ働き、先ヅ其ノ増殖ヲ促シ、爲ニ該部ガ乳嘴性ニ突起スルモノトノミハ必ズシモ推斷ヲ許サレナイ。

要スルニ予ノ行ツタ實驗例ノ組織學的觀察ニ據レバ、乳嘴腫性増殖惹起ノ刺戟ガ血行ヲ介シテ膀胱ニ到達シテ起ルト考フルヨリハ、同様ノ所見ガ直接作用ニヨツテ起ルコトヨリ推シテ、經皮乃至經口ノ體內ニ侵入シタ藥品ハ腫瘍惹起能ヲ有スル物質トシテ尿中ニ排泄セラレ、

然ル後膀胱粘膜ニ直接作用スルト考フルヲ寧ロ妥當トスル。

Ⅶ 結 論

1. 予ハ Anilin 膀胱腫瘍ノ實驗的研究トシテ次ノ諸實驗ヲ行ヒ、各實驗ニ於テ膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ惹起セシメ得タ。

〔Ⅰ〕 Anilin 水ヲ家兎膀胱内ニ注入セル實驗

〔Ⅱ〕 藥物ヲ海獺ノ皮下ニ注射セル實驗

〔A〕 Anilin 「オリーブ油」溶液ノ皮下注射ニヨル實驗

〔B〕 β -Naphthylamin 「オリーブ油」溶液ノ皮下注射ニヨル實驗

〔Ⅲ〕 藥物加玄米ヲ以テ白鼠ヲ飼養セル實驗

〔A〕 Anilin 加玄米飼養ニヨル實驗

〔B〕 β -Naphthylamin 加玄米飼養ニヨル實驗

〔C〕 o-Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗

2. 膀胱乳嘴腫性増殖ノ惹起ハ次ノ通りデアツタ。

〔Ⅰ〕 Anilin 水ヲ家兎膀胱内ニ注入セル實驗デハ生存日數11—278日ノ實驗家兎19例中9例ニ該増殖ノ惹起ヲ認メタ。

〔Ⅱ〕〔A〕 Anilin 「オリーブ油」溶液ノ皮下注射ニヨル實驗デハ生存日數12—300日ノ實驗海獺15例中11例ニ該増殖ノ惹起ヲ認メタ。

〔Ⅱ〕〔B〕 β -Naphthylamin 「オリーブ油」溶液ノ皮下注射ニヨル實驗デハ生存日數13—300日ノ實驗海獺16例中12例ニ該増殖ノ惹起ヲ認メタ。

〔Ⅲ〕〔A〕 Anilin 加玄米飼養ニヨル實驗デハ生存日數65—240日ノ實驗白鼠19例中5例ニ該増殖ノ惹起ヲ認メタ。

〔Ⅲ〕〔B〕 β -Naphthylamin 加玄米飼養ニヨル實驗デハ生存日數42—290日ノ實驗白鼠14例中6例ニ該増殖ノ惹起ヲ認メタ。

〔Ⅲ〕〔C〕 o-Amidoazotoluol 加玄米飼養ニヨル實驗デハ生存日數119日ノ實驗白鼠5例ノ總テニ該増殖ノ惹起ヲ認メタ。

各實驗ノ對照動物ニハ斯ル増殖ハ認メラレナカツタ。

實驗條件以外ノ膀胱粘膜ノ増殖ヲ招來シ得ル因子ニ就テハ Anilin 加玄米飼養ニヨル實驗ニ於テノミコレニヨツテ幾分ノ陽性率ハ高メラレテ居ルデアラウ事ヲ否定出來ナイガ、他ノ各實驗デハコレニ就テノ考慮ヲ要シナイ。從ツテ膀胱ノ乳嘴腫増殖ハ、予ノ企圖シタ實驗條件ニヨツテ惹起セラレタモノト信ジラレル。

即チ、Anilin ヲ以テ家兎ノ膀胱粘膜ニ直接刺戟ヲ與ヘタ場合ニモ、Anilin 或ハ β -Naphthylamin ヲ海獺ニ經皮的ニ與ヘタ場合ニモ又 Anilin、 β -Naphthylamin 或ハ o-Amidoazotoluol ヲ白鼠ニ經口的ニ與ヘタ場合ニモ、膀胱ニ乳嘴腫性増殖ヲ惹起シ得ルコトハ事實デアル。

該増殖惹起能ハ α -Amidoazotoluol が最も強く、 β -Naphthylamin 之ニ次ぎ、Anilin が最も弱カツタ。

3. 實驗動物ノ雌雄ニヨツテ乳嘴腫性増殖ノ發生ニ著差ハ認めラレナイ。

4. 乳嘴腫性増殖ノ惹起率及ビ該増殖ノ強弱ハ實驗期間ノ長短ト必ズシモ並行スルモノトハ認め難イ。而シテ斯ル惹起率及ビ強弱ニ差アル事ハ、各實驗ニヨリ與ヘラレタ刺激ノ程度ガ異ツタ爲及ビ實驗動物ニヨツテ該増殖發生ノ素因ヲ異ニスル爲、又同種動物ト雖モ該増殖發生ノ個體素因ヲ異ニスル爲ト考ヘラレル。

5. 膀胱乳嘴腫性増殖ノ好發部位ハ、Anilin 水ヲ以テ家兎ノ膀胱ヲ直接刺激シタ場合ニ於テモ、又 Anilin 或ハ其ノ誘導體ヲ海狸ニハ經皮的ニ、白鼠ニハ經口的ニ與ヘタ場合ニ於テモ等シク膀胱頂部デアル事ガ示サレタ。

6. 膀胱乳嘴腫性増殖ハ、其レヲ惹起スル刺激ガ化學藥品ノ直接作用ニヨルモ、或ハ又、化學藥品ノ經皮的乃至經口的投與ニヨル遠隔作用ニヨルモ、先ヅ上皮下結締組織ノ増殖ニ始マリ、其ノ部ノ血管ハ新生擴張ノ像ヲ呈シ、後ニ上皮ノ増殖ガ之レニ隨伴スルモノト考ヘラレル。又屢々結締組織ノ細小ナ突起ガ間質カラ上皮層内ニ侵入セル像及ビ嶋嶼狀ノ上皮細胞群ガ上皮下結締組織内ニ侵入セル像ヲ認メタガ、是等ハ上皮下結締組織ノ増殖ニ次デ起ル變化デアルト解サレル。

7. 乳嘴腫性増殖發生ノ部位及ビ其ノ組織學的所見ハ、體內ニ侵入シタル化學藥品ガ發癌物質トシテ尿中ニ排泄セラレ膀胱粘膜ヲ直接刺激シ膀胱腫瘍ヲ招來スルトノ說ヲ支持スル事實ヲ示シテ居ルモノト考ヘラレル。

欄筆スルニ臨ミ御懇篤ナル御指導御校閲ヲ賜ツタ恩師北川正惇教授、川村麟也教授及ビ金子助教ニ謹謝シ、終始御鞭撻御教示下サツタ岡田博士、小田學士其ノ他教室員各位ニ感謝ノ意ヲ表ス。

主 要 文 献

- 1) Askanazy: Dtsch. med. Wschr., 19, 1904. 2) Bardenheuer: Verh. dtsch. ges. Chir., 1904. 3) Beer, E.: Tumor of the urinary bladder, 1935. 4) Curschmann: Zbl. Gewerbehyg., 8, 1920. 5) Hückel: Hb. d. pathol. Anat. von Henke-Lubarsch, 6/2. 6) 藤卷, 木村, 和田, 島田: 癌, 23年, 昭4. 7) 橋本: 癌, 29年, 昭10. 8) 池松: 京都醫學誌, 17, 1920. 9) 石川: 日泌誌, 30, 1940. 10) Jaffé: Zbl. Pathol., 31, 3, 1920-1921. 11) Joseph, E.: Hb. Urol. von Lichtenberg-Völker-Wildbolz, 5. 12) Ferguson, R. S.: J. Urol., 31, 1934. 13) 風間: 癌, 16年, 大11; 17年, 大12. 14) Kuchenbecker: Zbl. Gewerbehyg., 8, 1920. 15) Leuenberger, S. G.: Bruns Beitr. kl. Chir., 69, H. 2, 1910; 80, H. 2, 1912. 16) Löwenstein: Bruns Beitr. kl. Chir. 69, 533, 1910. 17) Maisin u. Picard: Cpt. rend. soc. de biol., 96, 13, 1058, 1927; Ref: Zbl. H. u. G., 25, 624, 1928. 18) Müller, A.: Münch. med. Wschr., 77, 1387, 1933. 19) 西村: 日泌誌, 29, 1939. 20) 森, 鈴江: 實驗腫瘍學. 21) 中本: 癌, 23年, 昭4. 22) 緒方: 癌, 30年, 昭11. 23) 大塚, 長尾: 癌, 30年, 昭11. 24) Oppenheimer: Zschr. urol. Chir., 21, 336, 1933. 25) Perlmann u. Staehler: Kl. Wschr., 47, 1953, 1932. 26) Picard: Zbl. H. u. G., 28, 772, 1928. 27) Posner: Zschr. Urol., 18, H. 8, 1913. 28) Rehn: Verh. dtsch. ges. Chir., 1895; 1904; 1905; 1906. 29) Roffo: Zbl. H. u. G., 42, 185, 1932. 30) Schür: Dtsch. Zschr. Chir., 226, 1930. 31) Schmiedeberg: Arch. exp. Path. u. Pharm., 8, 10. 32) 渡邊: 皮膚科紀要, 23, 1934; 24, 1934; 25, 1935. 33) 山崎, 佐藤(正): 皮尿誌, 42, 1937. 34) 吉田: 癌, 29年, 1935.

(昭和17年9月22日受付)