日本泌尿器科學會雜誌

第 34 卷 第 2 號

昭和 18 年 (1943) 2 月

原 著

諸種「ホルモン」劑ノ雄性海狸生殖器ノ 發育ニ及ボス實驗的研究

T. Asahara: Experimentelle Studien über die Einflüsse der
endokrinen Organextrakte auf das Wachstum der männlichen
Geschlechtsorgane des Meerschweinchens.

九州帝國大學醫學部病理學教室 (指導 大野教授)

九州帝國大學醫學部皮膚科學教室 (指導 皆見教授)

專攻生 朝 原 達 雄

第 1 章 緒 論

由來生體ガ正常ナル發育ヲ爲サンガタメニハ、諸種「ホルモン」劑ノ緊密ナル相互作用ヲ必要トスルモノニシテ、既ニ古クヨリ發育ニ重大ナル關係ヲ有スル内分泌腺トシテ腦下垂體、副腎、甲狀腺、胸腺等ガ注目セラレタリ。而シテ之等ノ内分泌腺ハ各獨自ノ作用ヲ發揮スルト共ニ緊密ナル相互作用ヲモ有シ、或ハ促進的ニ、或ハ抑制的ニ作用シ、常ニ一定ノ平衡狀態ヲ保持セルモノナリト言フ。而モ該「ホルモン」ハ生殖器系統ニ對シテハ生殖腺及ビ其ノ附屬器ノ發育、分化並ニ機能ニ影響ヲ及ボシ、生殖機能ノ遂行ニ重要ナル役割ヲ演ズルモノトセラル。

輓近内分泌學ノ著シキ進歩ニ伴ヒ、諸種内分泌腺ノ相互關係ハ大ニ研究論議セラルルニ至リ、夫等「ホルモン」ノ生殖器系統ニ及ボス影響ニ就テモ亦幾多先人ノ業績有リテ微ニ入り細ヲ穿チテ説明セラレタルモ未ダ全ク闡明ノ域ニ達セザルガ如シ。就中之等諸種「ホルモン」ガ雄性生殖器ノ發育ニ及ボス影響ニ就テハ、最近漸ク其ノ報告ヲ重ヌルニ至リタリト雖モ尙實ニ寥々タル觀有リ、而モ學者ニ依リテ各所說ヲ異ニシ、或ハ促進スト言ヒ、或ハ抑制スト説キ、未ダ其ノ一致ヲ見ザルノミナラズ、促進作用有リト主張スルモノモ、其ノ詳細ナル事項ニ關シテハ未ダ満足ナル解決ヲ與ヘタルモノナシ。尙諸家ノ使用シタル「ホルモン」ヲ見ルニ、主トシテ市販ノ製劑又ハ動物ヨリ得タル材料ニシテ、人體材料ヲ以ツテ實驗シタルモノハ極メテ稀ナリ。從ツテ人體材料ヲ用ヒテ實驗スルハ、夫等ノ作用ヲ吟味スルニ意義有ルモノト言フベシ。

而シテ「ホルモン」ハ其ノ作用ヲ發揮スルニ當リテハ、種々ノ要約ニ支配セラル、モノニシテ、個體ニ依リテ各感受性ノ等シカラザルハ勿論、動物ノ種族、年齡、性別、「ホルモン」ノ種類、又其ノ投與ノ量竝ニ方法等ニ依リテ異ルモノナリ。加之「ホルモン」ノ投與ハ各内分泌腺相互關係ニモ影響ヲ及ボスモノナルヲ以ツテ、吾人が「ホルモン」ノ作用ヲ檢索スルニ際シテハ、頗ル慎重ニ之ヲ取扱フ要有ルハ多言ヲ俟タズ。就中發育、分化ノ過程ヲ嚴密ニ且系統的ニ探究セント欲セバ、實驗動物ノ可及的幼若未熟ニシテ、未ダ自體ノ内分泌機能ノ發現セザルカ或ハ極メテ其ノ微弱ナル時期ニ於テ之ヲ行フヲ至當ト信ズ。サレバ新産仔ハ以上ノ目的ニ最モ適合シタルモノト云フベシ。

余ハ凡ソ雄性生殖器ノ發育ニ關係ヲ有スベキ諸種「ホルモン」ノ作用ヲ知ラント欲シ、特ニ人體材料ヨリ所定ノ方法ニ依リテ得タル腦下垂體前葉竝ニ後葉、甲状腺、副腎皮質及ビ卵巢濾胞等ノ諸種臟器「エキス」ヲ海猴新産仔ニ注射シ、之等ガ其ノ睾丸竝ニ攝護腺ノ發育ニ及ボス影響ヲ組織學的ニ檢索シ、併セテ正常發育例ト比較シ、夫等臟器「エキス」ニ依ル發育促進ノ程度ヲ闡明セント企圖セルモノナリ。

第2章 實驗方法

第1節 實驗材料

本實驗ニ使用セシ注射材料ハ當病理學教室ニテ剖檢ニ附セラレタル新鮮ナル人屍體中主トシテ機能旺盛ナル青壯年期ノ男女ヨリ得タル腦下垂體前葉、後葉、副腎皮質、甲状腺及ビ卵巢濾胞ニ就キ其ノ「エキス」ヲ作レルモノニシテ、夫等ノ處置法ハ大約次ノ如シ。

第2節 「エキス」ノ製法

第1項 腦下垂體前葉及ビ後葉「エキス」 新鮮ニシテ且著變ナキ腦下垂體ヲ先ヅ前葉ト後葉トニ可及的嚴密ニ分離シ、別個ニ之ヲ純「アセトン」中ニ入レ、3—5日間放置シ、之イデ之ヲ濾紙上ニ擴ゲ一程度乾燥セシメタル後更ニ細片トナシ、數日間室温ニ放置シ、充分乾燥スルヲ待チテ乳鉢ニ入レ入念ニ磨碎ス。該粉末ハ引濕セザル様保存セリ。

使用ニ際シテハ該粉末ヲ滅菌生理的食鹽水ヲ以ツテ1%溶液トシ、之ニ「クロロフォルム」ノ適量ヲ加ヘテ腐敗ヲ防ギ、1晝夜氷室ニ保存シ、有效成分ノ充分浸出スルヲ待チテ遠心器ニカケ、其ノ上澄ヲ採リテ注射ニ供セリ。

第2項 副腎皮質「エキス」 副腎ハ之ヲ可及的嚴密ニ皮質ト髓質トニ分離シタル後皮質ノミヲ採リテ前記同様ニ處置シタリ。

第3項 甲状腺「エキス」 甲状腺ハ周圍組織ヲ充分ニ除去シタル後之ヲ細片トナシ前記同様ニ處置ヲトレリ。

第4項 卵巢濾胞「エキス」 黃體ヲ出來得ル限リ除去シ濾胞ノミヲ採リ、前記同様ニ處置ヲ施シ、前4者ト同一條件ノ下ニ「エキス」ヲ作製セリ。

第3節 實驗動物

實驗動物トシテハ專ラ雄性海猴ヲ使用シ、新産仔ヨリ生後60日迄ノモノナリ一定期間數群ニ分チテ對照群トシタル以外ハ新産仔ハ、之ヲ生後5日目迄、就中生後2—3日目ノモノヲ使用セリ。

第4節 注射方法及ビ注射量

注射ハ專ラ皮下注射トシ、注射ノ形式ハ前記諸種「エキス」ノ0.3cc及ビ0.6ccヲ原則トシテ1—2週間毎日注射シ、注射終了後翌日屠殺セリ。其ノ他最終注射ノ效力ヲ充分發揮セシメンガため注射終了後7日目ニ屠殺セシモノアリ。此等2群ニ分チ實驗セル注射總量ハ表中ニ之ヲ記載セリ。

第5節 測定方法

體重及ビ各臟器ノ重量ハgヲ單位トシテ之ヲ測定シタリ。但シ各臟器ノ重量ハ凡テ10%「フォルマリン」液ヲ以ツテ固定シタル後ニ之ヲ測定シタルモノナリ。

第6節 標本作製

鏡檢標本ハ專ラ10%「フォルマリン」液ニテ固定シ、「ツエロイザン」切片シタル後「ヘマトキシ

リン、エオジン」重複染色ヲ施シタリ。尙睾丸ノ標本ハ凡テ右側ノモノニ就キ之ヲ作製セリ。

第3章 實驗成績

第1節 記載方法ニ就テ

余ハ諸種臓器「エキス」ヲ海猿新産仔ニ注射シテ其ノ雄性生殖器ノ發育ニ及ボス影響ヲ實驗的ニ研究シタルモノナルガ、主トシテ睾丸及ビ攝護腺ニ就テ述ベン。尙生殖腺以外ノ内分泌腺ニ就テハ剖檢時肥大或ハ充血等多少見ル可キ所見ヲ得タルモ其ノ詳細ナル發表ハ他ノ機會ニ譲ル事トセリ。

第1項 體重 體重ハ注射前毎日空腹時ニ之ヲ測定シタルモ、表中ニハ注射開始前及ビ屠殺時ニ測定セルモノノミヲ掲ゲ、更ニ比較ニ便ナラシメシガタメ體重増加率ヲ求メ之ヲ併記セリ。

第2節 腦下垂體前葉「エキス」ノ雄性海猿新産仔生殖器ノ發育ニ及ボス影響

第1項 文獻ノ概要 腦下垂體ト生殖腺トノ關係ハ既ニ古クヨリ注目セラレシ所ナルモ、1912年 Aschner, Ascoli u. Legnani 等ノ剔出試驗ヲ經テ始メテ兩者ノ關係ニ確定の根據ヲ得タルモノト云フベシ。

Evans & Simpson(1926)ハ幼若「ラッテ」ニ牛腦下垂體前葉「エキス」ヲ毎日腹腔内ニ注射セシニ、身體發育ハ著明ナラズシテ、睾丸ノ重量ハ減ジ、精細管ハ狭小トナリ、更ニ胚種部ニモ一定ノ退行性病變ヲ見タリト云フ。Biedl(1927)ハ「ラッテ」及ビ「マウス」ニ腦下垂體前葉ヲ移植及ビ其ノ「エキス」ヲ注射シタルニ、雌性ニテハ卵巢ノ發育促進セラレ、雄性ニハ睾丸及ビ精囊ノ發育抑制セラレタルヲ確メタルヲ以ツテ、腦下垂體前葉ハ睾丸ニ對シテハ抑制的ニ作用シ、卵巢ニハ促進的ニ作用スルモノナラント結論セリ。之ニ反シテ Smith & Engle(1927)ハ腦下垂體剔出後ニ睾丸ノ變性現象ヲ見タルモ、腦下垂體ヲ移植ニ依リテ之ガ回復シ、更ニ之ニ依リテ精子發生ヲ惹起セシメ得タリト云ヒ、Voss & Loewe(1928)ハ羊ノ前葉ヲ「マウス」ニ移植シ、12日後ニ睾丸ハ肥大シ、内腔ノ擴

第2項 睾丸 睾丸ノ檢索ニ當リテハ先ヅ左右兩側ノ睾丸ヲ各秤量シ、其ノ平均重量ヲ求メ、之ヲ對照群ノ夫レト比較シ重量増加率ヲ算出セリ。組織學的ニハ之ヲ精細管ト間質トニ分チテ檢索セリ。其ノ詳細ハ妊娠尿「ホルモン」ヲ以ツテセル實驗報告ニ悉セルヲ以ツテ之ヲ省略ス。

第3項 攝護腺 攝護腺ノ重量測定竝ニ組織學的所見ニ就テハ妊娠尿「ホルモン」ヲ以ツテセル實驗報告ノ際詳述シタルヲ以ツテ之ヲ省略シ、總テ之ニ準據セルモノナル事ヲ附記スルニ止メントス

張ト精細胞ノ増加トヲ認メ、尙少數例ニ精子發生セルヲ見、前葉ヲ移植ニ依リ雄性動物ニモ眞ノ早期成熟ヲ惹起スルモノナラント言ヘリ。Belawenetz(1930)ハ Pituitrin A.ヲ幼若「ラッテ」ニ注射シ、少量ニテハ性成熟ヲ促進セシメ、早期精子發生ヲ惹起セシメ得タルモ、大量ヲ用フル時ハ却ツテ其ノ抑制セララルヲ見タリ。

Steinach u. Kun(1928)ハ牛ノ前葉「エキス」ヲ幼若「ラッテ」ニ注射シ、睾丸ノ肥大ト同時ニ副生殖腺ノ著明ナル肥大ヲ惹起セシメ、更ニ間細胞ノ著明ナル増殖ヲ見、國重(1931)モ亦「マウス」ニ牛腦下垂體前葉ヲ0.2g以上移植スルカ又ハ10倍牛腦下垂體前葉乳劑ヲ少量宛頻回注射スル時ハ、輕度乃至中等度ノ間細胞増殖ト精囊ノ著明ナル肥大トヲ惹起スルモノナリト記載セリ。櫻根(1934)ハ牛腦下垂體前葉ノ5%水溶「エキス」ヲ未熟家兔ニ注射シ、睾丸ハ輕度ニ重量増加シ、精細管ノ外徑モ輕度ニ増加シ、造精機轉モ亦之等ニ平行シテ一定度ニ促進セラレ、間質部ノ極メテ輕度ノ肥大ト性附屬器ノ多少ノ肥大傾向トヲ認メ得タルニ過ギズト言ヘリ。

第2項 實驗成績

本實驗ニ使用セン新産仔ハ總數42頭ニシテ、其ノ内實驗中途ニシテ斃死センモノ17頭アリタ

ルモ、之等ニモ大體ニ於テ其所見ヲ窺知シ得タルヲ以ツテ敢テ之ヲモ表示シ參考ニ供シタリ。

第1表 對 照 群

動物番號			6	7	8	17	18	平均	1	2	3	4	平均
生後日數			2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
體 重 (g)			72	70	75	68	66	70	74	76	80	85	79
重量(g)	辜 丸	左 側	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06		0.05	0.06	0.07	0.06	
		右 側	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06		0.07	0.06	0.07	0.06	
		平 均	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
	攝 護 腺		0.11	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11
組織學的所見	辜 丸	間 質 結 締 組織	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)		(H)	(H)	(H)	(H)	
		精 巢 最大外徑 (μ)	51	50	50	53	51	51	52	50	53	51	52
		精 巢 腔	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 祖 細胞	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)	
		精 母 細胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 娘 細胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 子	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 巢 最大外徑 (μ)	143	143	169	143	104	140	169	156	156	143	156
	攝護腺小葉	充實性ノモノ	(H)	(H)	(H)	(H)	(+)		(H)	(H)	(H)	(H)	
		管腔形成初期ノモノ	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)		(H)	(H)	(H)	(H)	
		管腔尙狹キモノ	(H)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(H)	(+)	
		中等大ノモノ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	
攝護腺小葉	廣 小葉	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		
	分泌物ヲ容ルモノ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		
攝護腺小葉	分岐著シキモノ	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		

動物番號		10	23	24	25	平均	14	15	20	21	30	平均		
生後日數		10	10	10	10	10	17	17	17	17	17	17		
體 重 (g)		105	110	108	102	106	120	115	120	120	126	120		
重量(g)	辜 丸	左 側	0.10	0.09	0.07	0.08		0.11	0.11	0.11	0.12	0.10		
		右 側	0.09	0.09	0.09	0.08		0.11	0.10	0.11	0.12	0.11		
		平 均	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11		
	攝 護 腺		0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	
組織學的所見	辜 丸	間 質	結 締 組織	(H)	(H)	(H)	(H)		(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	
		精 巢	最大外徑 (μ)	58	59	59	59	59	65	64	62	63	68	64
		精 巢	腔	(小)	(小)	(小)	(小)		(小)	(小)	(小)	(小)	(小)	
		精 巢	祖 細胞	(+)	(+)	(+)	(+)		(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	
		精 巢	母 細胞	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(土)	
		精 巢	娘 細胞	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 巢	子	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 巢	最大外徑 (μ)	156	169	195	169	172	208	169	260	208	195	208
	攝護腺	小 葉	充 實 性	ノ モ ノ	(+)	(H)	(H)	(H)		(+)	(H)	(+)	(+)	(H)
			管腔形成初期	ノ モ ノ	(H)	(H)	(H)	(H)		(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
			管腔尙狹キ	モ ノ	(H)	(H)	(H)	(H)		(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
中等大			ノ モ ノ	(+)	(+)	(土)	(-)		(H)	(土)	(+)	(H)	(+)	
攝護腺	小 葉	廣 大	キ モ ノ	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(土)	(+)	(-)	
		分泌物ヲ容ル	モ ノ	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(土)	(-)	(-)	(-)	
攝護腺	小 葉	分岐著シキ	モ ノ	(-)	(-)	(-)	(-)		(土)	(-)	(-)	(+)	(土)	

動物番號	13	19	23	27	平均	60	61	62	63	平均	44	46	47	平均			
生後日數	23	23	23	23	23	27	27	27	27	27	30	30	30	30			
體重(g)	165	160	150	165	160	185	185	188	173	183	205	190	200	198			
重量(g)	辜丸	左側	0.13	0.13	0.11	0.12		0.15	0.18	0.22	0.19		0.27	0.23	0.25		
		右側	0.12	0.13	0.10	0.13		0.15	0.18	0.23	0.18		0.27	0.22	0.27		
		平均	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.15	0.18	0.23	0.19	0.19	0.27	0.23	0.25	0.25	
	攝護腺	0.20	0.19	0.17	0.19	0.19	0.22	0.19	0.24	0.20	0.21	0.39	0.25	0.37	0.34		
組織學的所見	辜丸	間質	結締組織	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)			
		精細管	最大外徑(μ)	67	64	65	69	65	77	83	87	84	83	91	88	89	89
		精細管	精母細胞	(小)	(小)	(小)	(小)		(中)	(中)	(中)	(中)		(大)	(中)	(中)	
		精細管	精母細胞	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	
		精細管	精母細胞	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		(+)	(+)	(+)	
		精細管	精子	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	
		攝護腺	最大外徑(μ)	299	221	260	221	250	230	260	312	247	270	364	240	351	325
	腺葉	充實性	ノモノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	
		管腔形成初期	ノモノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	
		管腔尙狹	キモノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	
中等大		ノモノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)		
廣		キモノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)		
腺葉	分泌液ヲ容ル	モノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)		
	分岐著シ	キモノ	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)		

動物體	番號	生後日數	50	51	52	平均	35	36	39	平均	40	41	42	平均	
			40	40	40	40	50	50	50	50	60	60	60	60	
體重			重 (g)	260	250	235	265	280	290	243	288	330	340	325	332
重量 (g)	辜丸	左側	0.45	0.37	0.33		0.43	0.45	0.45		0.77	0.67	0.69		
		右側	0.45	0.36	0.32		0.42	0.45	0.45		0.77	0.70	0.79		
		平均	0.45	0.37	0.33	0.38	0.43	0.45	0.45	0.44	0.77	0.69	0.72	0.73	
攝護腺	攝護腺		0.43	0.37	0.42	0.41	0.66	0.72	0.59	0.66	1.12	0.98	1.09	1.06	
	間質	結締組織	(±)	(+)	(+)		(±)	(±)	(±)		(±)	(±)	(±)		
	精細管	最大外徑 (μ)	121	103	101	108	123	125	137	128	177	168	171	172	
組織學的所見	辜丸	精細管	精母細胞	(大)	(大)	(大)		(大)	(大)	(大)		(大)	(大)	(大)	
		精細管	精母細胞	(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)	
		精細管	精母細胞	(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)	
攝護腺	精細管	精母細胞	(++)	(++)	(+)		(+)	(+)	(+)		(++)	(++)	(++)		
	精細管	精子	(+)	(±)	(-)		(±)	(+)	(+)		(++)	(++)	(++)		
	精細管	最大外徑 (μ)	390	338	390	373	468	624	494	529	832	546	481	620	
腺葉	精細管	充實性ノモノ	(+)	(±)	(+)		(±)	(+)	(±)		(±)	(±)	(±)		
	精細管	管腔形成初期ノモノ	(+)	(++)	(++)		(++)	(+)	(+)		(±)	(±)	(+)		
	精細管	管腔尙狹キモノ	(+)	(++)	(+)		(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(±)		
	精細管	中等大ノモノ	(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		(+)	(+)	(+)		
	精細管	廣キモノ	(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		
	精細管	分泌物ヲ容ルルモノ	(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		
腺葉	精細管	分岐著シキモノ	(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		(++)	(++)	(++)		

第2表 腦下垂體前葉「エキス」ヲ注射セシ例

實驗群			I				II		III		IV				
實驗動物番號			47	48	172	173	60	168	169	46	170	171	157	158	159
生後日數			2	4	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3
體注射量(g(cc))	注射前		67	95	69	72	64	86	91	60	84	85	65	70	80
	屠殺時		85	118	80	92	91	163	165	75	93	110	123	130	154
	增加率		1.25	1.24	1.16	1.28	1.42	1.92	1.81	1.25	1.11	1.29	1.89	1.86	1.93
	1回量		0.3				0.3			0.6			0.6		
	回数		7				14			7			14		
總量		2.1				4.2			4.2			8.4			
注射終了後屠殺迄ノ日數			翌				翌			翌			翌		
重量	辜丸	左側	0.16	0.26	0.15	0.17	0.20	0.34	0.35	0.17	0.13	0.21	0.29	0.30	0.40
		右側	0.16	0.25	0.15	0.17	0.20	0.32	0.36	0.17	0.12	0.20	0.29	0.29	0.39
		平均	0.16	0.26	0.15	0.17	0.20	0.33	0.36	0.17	0.13	0.21	0.29	0.30	0.40
		增加率	1.78	2.89	1.67	1.89	1.82	3.00	3.27	1.89	1.44	2.33	2.64	2.73	3.64
	攝護腺		0.29	0.34	0.23	0.23	0.30	0.47	0.42	0.28	0.20	0.28	0.44	0.41	0.64
增加率			2.07	2.43	1.64	1.64	1.76	2.76	2.47	2.06	1.43	2.00	2.56	2.41	3.76
組織學	辜丸	間質細胞	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		精細管	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		最大外徑(μ)	94	96	92	96	85	115	118	74	114	117	103	107	112
		增加率	1.60	1.63	1.56	1.63	1.33	1.80	1.84	1.25	1.93	1.98	1.61	1.67	1.75
		精細管	(大)	(大)	(大)	(大)	(中)	(大)	(大)	(中)	(大)	(大)	(大)	(大)	(大)
	精細管	精母細胞	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)
		精母細胞	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(H)	(H)	(+)	(H)	(H)	(+)	(+)	(H)
		精母細胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(土)	(土)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
		精母細胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		精母細胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
的所見	攝護腺	最大外徑(μ)	260	299	286	234	338	481	494	286	221	286	455	403	494
		增加率	1.51	1.74	1.66	1.36	1.63	2.31	2.38	1.66	1.28	1.66	2.19	1.94	2.38
		充實性ノモノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(土)	(土)	(+)	(+)	(土)	(土)	(土)	(土)
		管腔形成初期ノモノ	(+)	(H)	(H)	(H)	(土)	(H)	(H)	(H)	(H)	(+)	(H)	(H)	(H)
		管腔尚狹キモノ	(+)	(H)	(H)	(H)	(H)	(+)	(+)	(H)	(H)	(+)	(+)	(+)	(土)
		中等大ノモノ	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(+)	(H)	(H)	(+)	(H)	(H)	(H)	(H)
		廣キモノ	(+)	(+)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(土)	(土)	(H)	(H)	(H)	(H)
		分泌物ヲ容ルモノ	(+)	(+)	(H)	(+)	(H)	(H)	(H)	(土)	(土)	(H)	(H)	(H)	(H)
分岐著シキモノ	(-)	(H)	(+)	(+)	(H)	(H)	(+)	(H)	(土)	(H)	(H)	(H)	(H)		

實驗群			V		VI				VII		VIII			
實驗動物番號			139	140	141	103	104	112	113	131	132	133	135	136
生後日數			3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2
體注射量(g(cc))	注射前		75	85	83	85	80	75	65	78	75	90	75	65
	屠殺時		133	152	142	115	105	118	116	146	145	126	188	182
	增加率		1.77	1.79	1.71	1.35	1.31	1.57	1.78	1.87	1.93	1.40	2.51	2.80
	1回量		0.3			0.3				0.6			0.6	
	回数		7			14				7			14	
總量		2.1			4.2				4.2			8.4		
注射終了後屠殺迄ノ日數			7			7			7			7		
重量	辜丸	左側	0.22	0.24	0.19	0.23	0.25	0.20	0.19	0.20	0.17	0.14	0.42	0.36
		右側	0.21	0.24	0.20	0.24	0.25	0.20	0.19	0.21	0.22	0.14	0.43	0.35
		平均	0.22	0.24	0.20	0.24	0.25	0.20	0.19	0.21	0.20	0.14	0.43	0.36
		增加率	2.00	2.18	1.82	2.00	2.08	1.67	1.58	1.91	1.82	1.27	3.50	3.00
	攝護腺		0.26	0.36	0.25	0.35	0.37	0.38	0.39	0.29	0.35	0.28	0.71	0.65
增加率			1.53	2.12	1.47	1.84	1.95	2.00	2.05	1.75	2.06	1.65	3.74	3.42

組 織 學 的 攝 所 護 見	率	結 締 大	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
		間 肥 大	(+)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
		質 細 增 殖	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		精 管	最 大 外 徑 (μ)	90	92	79	111	114	98	97	92	89	82	128	125				
			增 加 率	1.41	1.44	1.23	1.68	1.73	1.48	1.47	1.44	1.39	1.28	1.94	1.89				
	丸	內 腔	(大)	(大)	(中)	(大)	(大)	(大)	(大)	(大)	(中)	(中)	(大)	(大)					
		精 祖 細 胞	(中)	(中)	(+)	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(+)	(中)	(中)					
		精 母 細 胞	(+)	(+)	(+)	(+)	(中)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
		精 娘 細 胞	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(土)	(土)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
		精 子	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
腺 小 腺 葉	最 大 外 徑 (μ)	364	325	221	416	429	351	429	260	299	286	520	494						
	增 加 率	1.75	1.56	1.06	1.66	1.72	1.40	1.72	1.25	1.44	1.38	2.08	1.98						
	充 實 性 ノ モ ノ	(+)	(+)	(土)	(+)	(+)	(土)	(土)	(土)	(+)	(+)	(+)	(土)	(土)					
	管 腔 形 成 初 期 ノ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(土)	(+)	(+)	(中)	(中)	(+)	(土)	(土)	(土)					
	管 腔 尙 狭 キ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)	(+)	(+)	(中)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)					
	中 等 大 ノ モ ノ	(+)	(+)	(中)	(+)	(中)	(+)	(+)	(中)	(中)	(中)	(+)	(+)	(+)					
	廣 キ モ ノ	(+)	(+)	(土)	(中)	(中)	(+)	(中)	(土)	(中)	(+)	(中)	(中)	(中)					
	分 泌 物 ナ シ ル モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)	(中)	(中)	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)					
	分 岐 著 シ キ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)	(+)	(中)	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)					
重 量	率	左 側	0.14	0.15	0.17	0.16	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15	0.12	0.17	0.18	0.15	0.20	0.29	0.24	0.37
		右 側	0.14	0.15	0.16	0.15	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15	0.11	0.17	0.19	0.16	0.21	0.27	0.24	0.37
		平 均	0.14	0.15	0.17	0.16	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15	0.12	0.17	0.19	0.16	0.21	0.28	0.24	0.37
		增 加 率	1.56			1.78	1.44	1.89	1.33	1.33	1.67	1.33						2.18	3.36
		攝 護 腺	0.32	0.25	0.24	0.25	0.29	0.27	0.23	0.20	0.18	0.17	0.27	0.26	0.25	0.37	0.45	0.40	0.66
	腺 小 腺 葉	增 加 率	2.29			1.79	2.07	1.93	1.64	1.43	1.29	1.21						2.10	3.47
		結 締 大	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		間 肥 大	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		質 細 增 殖	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		精 管	最 大 外 徑 (μ)	73	75	76	82	78	71	70	83	84	64	84	89	88	87	92	84
腺 小 腺 葉	精 管	增 加 率	1.24			1.39	1.32	1.20	1.19	1.14	1.42	1.08					1.31	1.75	
	內 腔	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(中)	(小)	(中)	(中)	(中)	(中)	(大)	(中)	(大)	
	精 祖 細 胞	(中)	(+)	(中)	(中)	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)	(中)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
	精 母 細 胞	(+)	(+)	(+)	(+)	(土)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(土)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
	精 娘 細 胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(土)	
	精 子	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	最 大 外 徑 (μ)	273	234	286	247	195	195	377	260	234	247	143	273	273	299	409	429	442	
	增 加 率	1.59			1.44	1.13	1.13	1.90	1.51	1.86	1.44						2.06	2.13	
	充 實 性 ノ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(土)	(+)	(+)	(+)	(+)	(土)	(+)	(土)	(+)	(+)	(+)	(土)	(土)	(+)	
腺 小 腺 葉	管 腔 形 成 初 期 ノ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(中)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(中)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
	管 腔 尙 狭 キ モ ノ	(+)	(中)	(+)	(中)	(+)	(+)	(中)	(+)	(中)	(+)	(中)	(中)	(中)	(+)	(+)	(+)	(中)	
	中 等 大 ノ モ ノ	(中)	(+)	(中)	(中)	(+)	(+)	(+)	(中)	(+)	(+)	(+)	(中)	(中)	(中)	(中)	(+)	(+)	
	廣 キ モ ノ	(+)	(+)	(中)	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
	分 泌 物 ナ シ ル モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
	分 岐 著 シ キ モ ノ	(+)	(土)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(土)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(土)	(土)	

第 2 表ニ示スガ如ク、先ヅ所定注射終了後翌日屠殺セシモノヲ見ルニ、1 回量 0.3cc ヲ 1 週間注射セシ第 I 群ニテモ既ニ辜丸竝ニ攝護腺ノ發育ハ可成リ促進セラレ、同量ヲ 2 週間持續セシ第 II 群ニハ更ニ著明トナレリ。次ニ 1 回量ヲ 0.6cc 宛注射シ 1 週間反復セシ第 III 群ニテハ 1 回量 0.3cc ヲ 1 週間注射セシ第 I 群ニ比シ更ニ著明ナルモ、1 回量 0.3cc ヲ 2 週間持續セシ第 II 群ニ比スレバ、注射總量ハ何レモ 4.2cc ニシテ同量ナルモ、稍々之ニ劣レルガ如シ。而シテ 1 回量 0.6cc ヲ 2 週間持續セシ第 IV 群ニテハ最モ著明ナリ。

以上ハ注射終了後翌日屠殺セシモノニシテ、此ノ場合最終注射ノ效力ハ未ダ充分ニ發揮セラレザルモノト思惟セラレタルヲ以ツテ、所定注射量ノ效力ヲ出來得ル限り充分ニ發揮セシメンガタメ、以上ノ各群ニ於ケルト同様ニ實驗シ、唯注射終了後 7 日目は屠殺セル第 V—VIII 群ニアリテハ、何レモ其ノ成績前 4 群ニ比シ一層著明ナルヲ確メ得タリ。

第 3 項 本節ノ概括及ビ考察

以上ノ實驗成績ニ據リ余ハ腦下垂體前葉「エキス」ハ海猿新産仔ノ辜丸及ビ攝護腺ノ發育ヲ著明ニ促進スルモノナルヲ推知シ得タリ。

更ニ以上ノ成績ニ基キ余ハ上述ノ 1% 人腦下垂體前葉「エキス」ニ對スル辜丸竝ニ攝護腺ノ反應ヲ檢查シ、先人ノ成績ト比較考察セリ。

先ヅ辜丸ニ就テ見ルニ重量増加率ハ一般ニ著シク大ニシテ其ノ最大ナルモノハ 3.64 ニ達ス。即チ對照辜丸ノ重量ノ 3 倍半ニシテ Evans & Simpson ノ牛腦下垂體前葉「エキス」ノ注射例ニ見ラレタルガ如キ重量ノ減少セシモノヲ見ズ。精細管ノ擴張モ亦著明ニシテ最大外徑増加率ノ最大ナルモノハ 1.98 ニ達シ對照例ノ略々 2 倍ヲ示セリ。而シテ造精機轉ノ進展ヲ見ルニ、反應ノ程度ニ從ヒ各時期ノ精細胞ノ出現ヲ見ルモノナレドモ、最モ著明ナルモノニ於テスラ Voss u. Loewe, Belawenetz 等ノ言ヘルガ如キ定型的ナル精子ノ發生ヲ見ルニ至ラザリキ。唯明カニ其ノ移行型ヲ見出シ得タルニ過ギザルモ、造精機轉ノ進展ハ極メテ顯著ナリト言フベシ。間質ニテハ間細胞ノ肥大ハ大多數ニ見ラレタルモ、國重, Steinach u. Kun 等ノ如キ其ノ増殖セル例ヲ見ル事ナカリキ。其ノ他 Evans & Simpson, Biedl 等ノ如ク却ツテ其ノ發育ガ抑制セラレタル例ヲ見タル事ナシ。

次ニ攝護腺ニ就テ見ルニ重量増加率ハ著明ナル増加ヲ示シ、其ノ最大ナルモノハ 3.76 ニシテ對照例ノ約 3 倍半トナレリ。腺小葉最大外徑増加率ハ一般ニ著シク大トナリ、其ノ最大ナルモノハ 2.38 ニ達シ對照例ノ約 2 倍半トナレリ。

以上ノ如ク余ノ 1% 人腦下垂體前葉「エキス」ニ對スル海猿新産仔ノ辜丸及ビ攝護腺ノ反應ハ極メテ著明ニシテ、其ノ最大ナルモノヲ正常發育例ト比較スルニ、實驗例各臟器ノ組織學的所見ハ何レモ大約生後 40 日ノ例ニ見ラル、ガ如キ所見ヲ呈セリ。

之ヲ要スルニ人腦下垂體前葉「エキス」ノ注射ニ依リ、海猿新産仔ノ辜丸竝ニ攝護腺ハ程度ノ差ハアレドモ、兩者共ニ夫等ノ發育ハ著シク促進セラレ、其ノ著明ナルモノハ大約生後 40 日

ノ例ニ相當シ、生長日數ヨリ之ヲ見ル時ハ約17日ダケノ促進ヲ示スモノト言フベシ。

因ミニ該「エキス」ノ作用ヲ注射量ト注射期間トノ關係ヨリ示セバ次ノ如シ。

1. 1回量 0.3cc ヲ1週間注射セル例ニモ可成リ著明ニ該組織ノ發育促進認メラル。
2. 1回量ヲ 0.6cc ニ増加シテ注射スル時ハ更ニ其ノ發育著明ナリ。
3. 注射期間ヲ2週間ニ延長スル時ハ1回量 0.3ccヲ用フルモ著明ニ其ノ發育促進セラレ、該量ヲ 0.6ccニ増加スル時ハ其ノ結果更ニ著明ナリ。
4. 注射總量相等シキ時ハ 0.6ccヲ1週間注射スルヨリモ 0.3ccヲ2週間注射セル例ノ方ガ其ノ作用顯著ナリ。

第3節 腦下垂體後葉「エキス」ノ雄性海獺新産仔生殖器ノ發育ニ及ボス影響

第1項 文献ノ概要 腦下垂體ガ生體ノ發育ニ重大ナル關係ヲ有スルモノナルハ、既ニ幾多ノ臨牀的竝ニ實驗的研究ニ依リ周知ノ事實ナルモ、近時内分泌學ノ著シキ進歩ニ伴ヒ腦下垂體前葉ト生體發育トノ關係明カトナリタルモ、腦下垂體後葉ト發育成長トノ關係ニ就テハ、其ノ報告甚ダ渺ク Romeis(1913), Krizenecky(1924) 等ハ何レモ後葉ヲ以ツテ蛙蝌蚪ニ就キ其ノ發育ヲ著明ニ促進セシメ得タルモ、Smith(1923) ハ「ラッテ」ニ同様ノ

實驗ヲ試ミ何等ノ影響ヲモ確メ得ズト言ヒ其ノ主張互ニ相反スルモノノ如シ。

一般ニ後葉ト生殖腺トノ關係ニ就テノ報告ハ誠ニ寥寥タルモノニシテ、就中後葉ト雄性生殖器トノ關係ヲ論述セシモノハ僅ニ Behrenroth(1914) 及ビ大西(1931)ノ報告アルニ過ギズ、此等ハ共ニ Pituitrin ノ注射ニ依リテ睾丸ノ發育旺盛トナレルヲ見タリト言フ。

第2項 實驗成績

本實驗ニ於テハ時局柄動物ヲ充分使用シ得ザリシヲ以ツテ、僅ニ14頭ノ新産仔ニ所定注射ヲ施シ其ノ終了後7日日ニ屠殺鏡檢セリ。

今其ノ成績ヲ見ルニ、第3表ニ示スガ如ク 1回量 0.3ccヲ1週間注射セン第Ⅰ群ニ於テモ睾丸竝ニ攝護腺ノ組織學的所見ハ輕度ニ變化ヲ示シ、該量ヲ2週間持續セン第Ⅱ群ニテハ更ニ之ハ著明トナリ可成リ發育ハ促進セラル。

1回量ヲ 0.6ccニ増加シ之ヲ1週間反復セン第Ⅲ群ニ於テハ其ノ結果第Ⅰ群ヨリ著明ナルモ第Ⅱ群ニ及バズ、而モ該量ヲ2週間持續セン第Ⅳ群ニテハ甚ダ著明ニシテ第Ⅱ群ヨリモ更ニ顯著トナレリ。

第3項 本節ノ概括及ビ考察

以上ノ如ク腦下垂體後葉「エキス」モ亦前葉「エキス」ノ場合ニ見ラル、ガ如ク、新産仔ノ生殖器發育ヲ促進セシムルモノナリ。

睾丸ニテハ重量增加率ハ本群ニテモ亦著シク大トナリ、其ノ最大ナルモノハ 1.83ヲ示シ對照例ノ略ニ2倍ニ近クナレリ。精細管最大外徑增加率ハ最大ナルモノハ 1.42ニシテ對照例ノ約1倍半ナリ。而シテ精細胞出現ノ狀態ヲ見ルニ主トシテ精祖細胞、精母細胞ノ増加ヲ見ル外、著明ナルモノニハ稀ナルモ精娘細胞ノ出現ヲ確認セリ。之ニ依リテ見レバ造精機轉ノ進展ハ可成リ

ノ如シ。

1. 1 回量 0.3ccヲ 1 週間注射スルモ生殖腺ノ發育促進セラル。
2. 1 回量ヲ 0.6ccニ増加スル時ハ其ノ所見更ニ著明ナリ。
3. 注射期間ヲ 2 週間ニ延長スル時ハ 1 回量 0.3ccヲ用フルモ之ハ著明ニ促進セラレ、該量ヲ 0.6ccニ増加スル時ハ更ニ著明トナレリ。
4. 注射總量相等シキ時ハ 0.6ccヲ 1 週間注射スルヨリモ 0.3ccヲ 2 週間持續スル方が其ノ效果顯著ナリ。

第 4 節 甲状腺「エキス」ノ雄性海獺新産仔生殖器官ノ發育ニ及ボス影響

第 1 項 文献ノ概要 甲状腺ト睾丸トノ間ニ密接ナル相互關係存スル事ハ幾多先人ノ研究ニ依リ明カナリ。然レドモ詳細ナル事項ニ至リテハ或ハ一致シ、或ハ然ラズシテ必ズシモ未ダ一定セズ、蓋シ兩者ノ關係極メテ複雑ナルヲ思ハシムル所以ナリ。

先づ臨床的ニ該腺疾患タル Basedow 氏病ニ於ケル睾丸ノ變化ニ就テ見ルニ Chrustalew (1913), Kraus (1924) 等ハ變化ナシト述べ、加藤 (1920) ハ初期萎縮ヲ見タリト言フ。其ノ他粘液性腫、Kretin 病或ハ甲状腺腫等ニ於テモ亦夫々變化ガ見ラルモノノ如ク、Marchand (1906), Sternberg (1920) 等ハ粘液性腫ニ明カニ睾丸ノ萎縮及ビ變性ヲ見、Diamontopolus (1921) ハ Bernノ兒童ニ就テ調査シテ其ノ $\frac{2}{3}$ ニ於テ睾丸ノ發育不全有ルヲ認メ、之ヲ同地方ニ類發スル甲状腺腫ト關係有ルモノノ如ク主張セリ。Schinz u. Slotopolsky (1924) ハ甲状腺發育不全ト鼠蹊睾丸トヲ有スル 18 歳ノ男子ノ例ヲ舉ゲ、睾丸ノ發育不全ハ全身發育不全ニ起因スルモノナラント説ケリ。

次ニ實驗的研究ノ主ナルモノヲ見ルニ、Eiselsberg (1901), Lanz (1904), Hofmeister (1921) 等ハ甲状腺剔出ニ依ル生殖腺萎縮ヲ記載シタルモ、Evans & Long (1921) ハ甲状腺剔出後發情期ノ出現ニ何等ノ影響ヲ及ボス事ナク、又甲状腺劑ヲ以ツテ之ヲ飼養スルモ發情期ニ障礙ヲ見ルニ至ラザリシ事ヲ言ヘリ。Remotti (1926) ハ甲状腺劑飼養ニ依リテ精子發生ノ正常ニ完遂セラルルヲ見、Pi-

ghini (1926) モ同様ノ實驗ニ依リ其ノ少量ヲ用フル時ハ性成熟ヲ惹起スルモ大量使用例ニハ睾丸ニ變性ヲ招來スト言ヘリ。其ノ他 Saller (1926), Mislowsky (1927) 等ハ寧ロ其ノ發育ヲ抑制セラルト主張セリ。

Belawenetz (1928) ハ Thyreokrin ナリツテ「ラツテ」ヲ飼養シタルニ、最初ノ 1 週間ニハ睾丸ノ大サ、重量ハ勿論其ノ組織像等ニ何等ノ變化ナモ見ザリシニ、次ノ 2 週間ニテハ睾丸ノ變性ヲ見、其ノ程度ハ動物ガ幼若ナル程強カリシト言フ。宮村 (1928) ハ甲状腺「ホルモン」ハ生殖腺「ホルモン」ヲ相援ケテ其ノ作用ヲ著明ニ發揮セシムルモノナリト言ヒ、迂ハ副腎皮質ト生殖腺及ビ甲状腺トノ關係ニ就テ、生殖腺機能旺盛ナル時ニハ副腎皮質ノ分泌ヲ要求スルモノニシテ、副腎皮質機能之ニ及バザル時ハ甲状腺ハ代償的ニ其ノ機能ヲ充進セシムルモノナリト説明セリ。Döderlein (1930) ハ海獺ニ甲状腺末ヲ内服セシメ其ノ生殖能力ヲ檢セシニ睾丸ニテハ精粗細胞、精母細胞ノ分裂旺盛ニシテ形態學的ニハ充分ニ機能ハ保持セラレタルモ、雌性動物ヲシテ受胎セシメ得ザリシヲ以ツテ、生物學的ニハ必ズシモ健全ナラズトシ、甲状腺ノ機能充進ニ依ル生殖腺ノ機能低下ノ原因ハ、甲状腺ノ生殖腺ニ對スル直接ノ拮抗作用ニ依ルモノニ非ズシテ寧ロ可溶性脂肪物質ヲ含有セル血液ノ過剰竝ニ副腎皮質ノ類脂肪體沈澱ノ結果ニ基クモノナラント言ヘリ。

第 2 項 實 驗 成 績

本實驗ニ使用セン新産仔ハ總數 23 頭ニシテ其ノ内 2 頭ハ所定注射終了後斃死セリ。

第 4 表ニ示スガ如ク、先ヅ所定注射終了後翌日屠殺セルニ、1 回量 0.3ccヲ 1 週間(第 I 群)及ビ 2 週間(第 II 群)注射シタルモノニハ、辜丸竝ニ攝護腺ノ重量ハ何レモ對照例ニ及バザレドモ、組織學的ニハ明カニ變化ヲ示シ兩群共ニ輕微乍ラ發育ハ促進セラレタリ。1 回量 0.6ccヲ 1 週間注射セシ第 III 群ニテハ重量ハ何レモ對照例ト大差ナク組織學的變化モ稍ミ著明トナレリ。而シテ該量ヲ 2 週間持續セシ第 IV 群ニテハ重量ハ輕度ニ増加シ、組織學的ニハ變化更ニ著明トナリ夫等ノ發育ハ可成リ促進セラレタリ。

次ニ所定注射終了後 7 日目ニ屠殺セル例ニテハ其ノ所見何レモ前 4 群ニ比シ著明ニシテ、1 回量 0.3ccヲ 1 週間注射セシ第 V 群ニテハ辜丸竝ニ攝護腺ノ重量ハ對照例ト大差ナク、組織學的變化ハ第 I 群ト大差ナキモ、該量ヲ 2 週間持續セシ第 VI 群ニテハ其ノ變化前群ニ比シ著明ニシテ且第 II 群ヨリモ顯著ナリ。而シテ之ハ 1 回量 0.6ccヲ 1 週間注射セシ第 VII 群ニモ更ニ著明トナレルモ第 VI 群ニ及バズ。但シ之ハ該量ヲ 2 週間反復セシ第 VIII 群ニハ最も著明ナリ。

第 3 項 本節ノ概括及ビ考察

以上ノ實驗成績ニ依リ明カナルガ如ク、甲狀腺「エキス」モ亦雄性海猿新産仔生殖器ノ發育ヲ促進セシムルモノト解シ敢テ妨ゲ無キモノナルベシ。

試ミニ 1% 人甲狀腺「エキス」ニ對スル反應ヲ辜丸竝ニ攝護腺ノ各部ニ就キ夫々精査シ、諸家ノ成績ト比較考察スルニ、先ヅ辜丸ニテハ重量増加率ハ前記 2「エキス」例ヨリハ遙ニ小ナルモ一般ニ著明ニ増加シ其ノ最大ナルモノハ 1.67 即チ對照例ノ約 1 倍半ニ達セリ。而シテ所定注射終了後 7 日目ニ屠殺セシモノニハ重量増加率ハ一般ニ著明ニ増加セルモ、注射ノ翌日屠殺セシモノニハ却ツテ其ノ減少セルモノヲ見タルハ、屠殺時期ノ尙早ナリシタメ所定注射量ノ效力ガ未ダ充分ニ發揮セラレザリシニ因ルモノナルベシ。精細管最大外徑増加率ハ最大ナルモノ 1.38 ニシテ對照例ノ約 1 倍半ニ達セントス。サレド辜丸重量ノ對照例ニ及バザルモノニテモ既ニ多少ノ擴張ヲ示セルハ注目ニ値ス。造精機轉モ之ト略ミ並行シテ進展セルモノノ如ク、一般ニ精母細胞期ニ達セルモノ多ク、最も著明ナル進展ヲ示シタルモノニハ稀ニ精娘細胞ヘノ移行型ヲ見タルモノ有リテ其ノ進展ハ可成リ著明ナリト言フベシ。

然レドモ余ノ例ニハ Remotti ノ言ヘルガ如キ精子ノ發生ヲ見ル事ナク、可成リ大量ヲ用ヒタルモ Pighini ノ見タルガ如キ變性ヲ惹起セシモノナシ。更ニ Saller, Mislavsky ノ言ヘルガ如キ抑制セラレタルモノヲ見ル能ハザリキ。

尙 Belawenetz ハ最初ノ 1 週ニハ辜丸ノ大サ、重量ハ勿論組織學的ニモ何等變化ヲ認メザリシト言ヘルモ、余ガ 0.3ccヲ 1 週間注射セシモノニハ、重量ハ對照例ニ及バザレドモ組織學的ニハ明カニ變化ヲ示シ輕微乍ラ分化ノ促進セラルハヲ窺知シ得タリ。

間質ニテハ明カニ間細胞ノ肥大セルモノヲ見タルモ、之ハ極メテ稀ニシテ僅ニ精細管ノ變化ガ著明ナリシモノニ於テノミ見ラレタリ。然レドモ其ノ増殖ヲ見タル事ナシ。

次ニ攝護腺ニテハ重量増加率ハ其ノ増加辜丸ニ比スレバ一般ニ輕微ニシテ其ノ最大ナルモノ

モ1.17ヲ示セルニ過ギズ、然レドモ腺小葉最大外徑増加率ハ一般ニ大ニシテ其ノ最大ナルモノハ1.56ヲ示シ對照例ノ約1倍半トナレリ。

以上ノ如ク余ノ1%人甲狀腺「エキス」ヲ以ツテセル海猿新産仔ノ睪丸竝ニ攝護腺ノ反應ハ可成リ著明ニシテ、其ノ著シキモノヲ正常發育例ト比較セシニ何レモ大體ニ於テ生後30日ノモノニ相當シ、生後27日ノモノニ比スレバ稍々之ヲ凌駕セリ。

該「エキス」ノ作用ヲ注射量ト注射期間トノ關係ヨリ見ルニ次ノ如シ。

1. 1回量0.3ccヲ1週間注射スルモ睪丸及ビ攝護腺ノ發育ヲ促進セシメ得。
2. 該量ヲ2週間持續スル時ハ之ハ可成リ著明トナル。
3. 1回量ヲ0.6ccニ増加スル時ハ1週間注射スルモ可成リ著シクシテ更ニ之ヲ2週間持續スル時ハ一層著シ。
4. 注射總量相等シキ時ハ0.6ccヲ1週間注射スルヨリモ0.3ccヲ2週間持續スル方が其ノ作用著明ナリ。

第5節 副腎皮質「エキス」ノ雄性海猿新産仔生殖器ノ發育ニ及ボス影響

第1項 文献ノ概要 副腎ト生殖腺トノ間ニモ亦緊密ナル内分泌の關係存スルハ多數學者ノ信ズル所ニシテ、Tandler(1910)、Bittorf(1919)等ハAddison氏病ノ場合ニ睪丸ハ萎縮シ精子缺乏症ヲ來スヲ見、Goldzieher(1912)ハ小兒症(Infantilismus)ヲ副腎ノ發育不全ニ起因スルモノト看做セリ。Schneider(1913)、Mattias(1922)、Schmidt(1924)、Dietrich u. Siegmund(1927)等ハ副腎ノ肥大又ハ腫瘍等ニ依リ性徴ノ變化、早期發情ヲ來スト言ヘリ。

Jaffé u. Tannenberg(1927)ニ據レバ假性半陰陽ハ副腎皮質増殖ノ結果ニ非ズシテ副腎皮質ト生殖腺トノ同時の畸形ニ過ギズト解セリ。

實驗的研究ニ就テ見ルニLeupold(1920)ハ副腎皮質「コレステリン」ノ減少ハ精上皮細胞ノ變性ヲ惹起スル事ヨリ副腎ト睪丸トノ間ニハ一定ノ關係存スルモノト解シ、Watson(1923)モ亦略々同様ナル見解ヲ有シタリ。

之ニ反シJaffé及ビ其ノ門下ハLeupoldノ說ヲ認容セズシテ兩者間ニハ一定ノ關係ナキモノト主張セリ。西村(1928)ハ副腎ト生殖腺トノ關係ニ就テハ明言シ得ズト述べ、衣笠(1930)ハ副腎剔出ハ幼若動物生殖器ノ分化、發育ヲ阻害スル事ナク、副腎皮質ノ移植又ハ其ノ「エキス」ヲ注射スルモ亦該動物生殖器ノ分化、發育ヲ促進セシメズト言ヘリ。

Hewer(1922)ハ「ラッタ」ニ副腎皮質末Cortexノ投與又ハ「ヨボイド」ノ注射ヲ行ヒシニ、初メハ睪丸發育ハ促進セラルレドモ、長期間之ヲ持續スル時ハ終ニ其ノ變性ヲ招來スルニ至ルト言フ。Amson(1913)ハCortisuprenノ注射ニ依リ雄性生殖器ノ發育抑制セラレタルヲ見、Conner(1930)ハ成熟鶏ニ副腎皮質「インゲル」氏液乳劑ヲ注射セシニ睪丸ハ萎縮シ且精子消失スルヲ認メタリ。之ニ反シテNovak(1913)、井倉(1927)等ハ副腎剔出ニ依リテ生殖器ノ發育不全ヲ惹起セシメ、Riddle(1923)ハ雄性鳩ニ副腎移植ヲ繰返ス事ニ依リテ性早期成熟ト生殖器ノ肥大トヲ惹起セシメタリ。McKinley u. Fisher(1926)ハ新鮮ナル副腎ヲ以ツテ「ラッタ」ヲ飼養シ睪丸重量21.5%ダケ増加セルヲ見、Müller(1931)及ビKlein(1931)モ「ラッタ」ニ副腎皮質ノ食鹽水「エキス」ヲ注射シ雄性生殖器ノ發育促進ヲ見タリ。Kaplan(1933)ハ副腎皮質ノ浸出液ヲ分チテ副腎皮質總物質ノ含有浸出液、類脂肪體ノ浸出液、類脂肪體非含有浸出液及ビMüller氏法ニ依ル浸出液ノ4種トシ、以上各種浸出液ヲ夫々「ラッタ」ニ注射シタル結果、内眼的ニハ雌雄兩性共ニ其ノ生殖器發育ニ一定ノ關係ヲ見出ス能ハザリシモ、顯微鏡的ニハMüller氏法ニ依ル浸出液注射例ニノミ兩性共ニ發育遲延セルヲ見、類脂肪體含有浸出液ノ注射例ニハ雄性生殖器ニノミ

其ノ發育促進セラルルヲ確メタリト言フ。

第2項 實 驗 成 績

本實驗ニ於テモ動物ノ入手困難ナリシタメ所定注射終了後7日目は屠殺セシモノノミニシテ其ノ新産仔總數僅カニ11頭ナリ。

第5表 副腎皮質「エキス」ヲ注射セシ例

實 驗 群			I		II		III		IV				
實 驗 動 物 番 號			105	116	117	110	216	217	202	203	204	205	206
生 後 日 數			3	3	2	3	3	3	2	2	3	5	5
體 重 (g)	注 射 前		76	75	70	90	85	85	65	73	80	115	114
	屠 殺 時		100	116	100	125	160	155	102	115	126	174	180
注 射 量 (cc)	増 加 率		1.32	1.55	1.43	1.39	1.88	1.82	1.57	1.58	1.58	1.51	1.58
	1 回 量		0.3			0.3			0.6			0.6	
注 射 量 (cc)	回 數		7			14			7			14	
	總 量		2.1			4.2			4.2			8.4	
注射終了後屠殺迄ノ日數			7			7			7			7	
重 量 (g)	辜 丸	左 側	0.10	0.10	0.08	0.09	0.13	0.16	0.09	0.12	0.12	0.16	0.18
		右 側	0.10	0.10	0.07	0.10	0.13	0.16	0.08	0.12	0.13	0.16	0.19
		平 均	0.10	0.10	0.08	0.10	0.13	0.16	0.09	0.12	0.13	0.16	0.19
		増 加 率	0.91	0.91	0.73	0.83	1.08	1.33	0.82	1.09	1.18	1.33	1.58
攝 護 腺	攝 護 腺	0.17	0.15	0.14	0.19	0.18	0.19	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	
	増 加 率	1.00	0.88	0.82	1.00	0.95	1.00	0.88	1.06	1.06	1.16	1.26	
組 織 學 的 所 見	辜 丸	間 質	結 締 織	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(+)	(+)
		間 質	肥 大	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
		細 胞	増 殖	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		最 大 外 徑 (μ)	64	72	63	71	66	79	69	70	75	85	89
		増 加 率	1.00	1.13	0.98	1.08	1.00	1.20	1.08	1.09	1.17	1.29	1.35
	精 管	內 腔	(小)	(中)	(中)	(中)	(中)	(小)	(中)	(小)	(中)	(小)	(中)
		精 祖 細 胞	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)
		精 母 細 胞	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)
		精 娘 細 胞	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)
		精 子	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
攝 護 腺	最 大 外 徑 (μ)	286	195	195	247	312	260	260	221	208	377	390	
	増 加 率	1.38	0.94	0.94	0.99	1.25	1.04	1.25	1.06	1.00	1.51	1.66	
	充 實 性 ノ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
	管 腔 成 形 初 期 ノ モ ノ	(++)	(++)	(+)	(+)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(+)	
	管 腔 尚 狹 小 ノ モ ノ	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	
	中 等 大 ノ モ ノ	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(++)	(+)	(+)	(++)	(++)	
	廣 大 ノ モ ノ	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)	(++)	(++)	
	分 泌 物 ヲ 容 ル モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	
分 岐 著 シ キ モ ノ	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(++)	(++)	
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(++)	(++)	

第5表ニ示スガ如ク、1回量0.3ccヲ1週間注射セシ第I群ニ於テハ辜丸竝ニ攝護腺ノ重量ハ僅カニ對照例ニ劣レルモ組織學的ニハ明カニ變化ヲ示シ、該量ヲ2週間持續セシ第II群ニハ更ニ著明トナレリ。次ニ1回量0.6ccヲ1週間注射セシ第III群ニハ其ノ所見第I群ヨリモ著明ナルモ第II群ノ如ク著シカラズ。而シテ該量ヲ2週間持續セシ第IV群ニテハ更ニ著明トナリ可成リ發育ハ促進セラレタリ。

第3項 本節ノ概括及ビ考察

彼上ノ實驗成績ノ示スガ如ク、海猿新産仔ノ辜丸竝ニ攝護腺ノ發育ハ、副腎皮質「エキス」ニ依リテモ亦可成リ著明ニ促進セラル、モノニシテ、辜丸ニアリテハ重量増加率ハ其ノ増加前述

ノ腦下垂體前葉竝ニ後葉「エキス」例ニハ遙カニ及バザルモ、甲状腺「エキス」例ト略々匹敵シ、其ノ最大ナルモノハ1.58ヲ示セリ。精細管最大外徑増加率ハ其ノ最大ナルモノ1.35ナリ。即チ甲状腺「エキス」例ト相伯仲シ、是レ亦對照例ノ1倍半ニ達セントス。而シテ造精機轉ニ就テ見ルニ、精祖細胞及ビ精母細胞ハ増加シ、著明ナルモノニハ稀ニ精娘細胞ヘノ移行型ヲ示シ、造精機轉ハ可成リ著明ニ促進セラル。尙間細胞ノ肥大ヲ認メタルモ、精細管變化ノ輕微ナルモノニハ之ヲ見ル事ナク且其ノ増殖モ見ラレタル事ナシ。

次ニ攝護腺ニテハ重量増加率ハ最大ナルモノ1.26ナリ。而モ腺小葉最大外徑増加率ハ本實驗例ニ於テモ其ノ増加著明ニシテ、其ノ最大ナルモノ1.56ヲ示シ甲状腺「エキス」例ト同様トナレリ。而シテ最モ著明ナル反應ヲ示シタルモノヲ以ツテ正常發育ノ夫レト比較スルニ、睪丸竝ニ攝護腺ハ何レモ大體ニ於テ生後30日ノモノニ相當セルガ如ク、生後27日ノモノニ比スレバ明カニ之ヨリ優レルガ如シ。

以上余ガ1%人副腎皮質「エキス」ヲ以ツテ得タル成績ヲ先人ノ夫レト比較考察スルニ、睪丸重量ノ増加ニ就テハ Mc Kinley u. Fisherハ「ラツテ」ヲ副腎ニテ飼育シ睪丸重量21.5%ダケ増加セルヲ見タルモ、余ノ例ニテハ最大ナルモノハ58%ノ増加ヲ示シ遙々顯著ナル成績ヲ得タリ。而シテ Amson ハ Cortisupren ノ注射ニ依リ之ガ抑制ヲ見、Conner ハ「リンゲル氏液乳劑」注射ニ依リ萎縮ヲ見、Hewer ハ Cortex 又ハ「リボイド」ノ注射ニ依リテ變性ヲ見タルモ、余ノ例ニ於テハ全然斯カル所見ナカリキ。即チ余ノ成績ハ大體ニ於テ Riddle, Müller, Klein, Kaplan 等ノ所見ト一致シ、副腎皮質ハ雄性生殖器ノ發育ヲ促進セシメ、造精機轉ヲ促スモノト認容シ得ベシ。

之ヲ要スルニ1%人副腎皮質「エキス」ハ海猿新産仔ノ睪丸及ビ攝護腺ノ發育ヲ促進セシメ、其ノ程度ハ其ノ注射量ト注射期間トニ關係スルモノノ如シ。今其ノ關係ヲ示セバ次ノ如シ。

1. 1回量0.3ccヲ1週間注射スルモ明カニ生殖腺發育促進セラル。
2. 該量ヲ2週間持續スル時ハ之ハ可成リ著明トナル。
3. 1回量ヲ0.6ccニ増加スル時ハ其ノ成績1週間注射例ニモ可成リ著明ニシテ、更ニ2週間持續スル時ハ一層顯著ナリ。
4. 注射總量相等シキ時ハ0.6ccヲ1週間注射スルヨリモ0.3ccヲ2週間持續スル方ガ其ノ結果ハ著明ナリ。

第6節 卵巢濾胞「エキス」ノ雄性海猿新産仔生殖器ノ發育ニ及ボス影響

第1項 文献ノ概要 女性「ホルモン」ハ生理的ニハ雄性生殖器ノ發育ニ必要ナルモノニ非ザレドモ、之ガ雄性生殖腺乃至ハ其ノ性徴ニ及ボス影響ニ就テハ幾多ノ報告アリ。

1903年 Halban ハ女性「ホルモン」ノ生殖器非特異性ヲ主張シタルモ、1912年 Steinach ガ Feminie-

rung, Maskulierung ノ實驗ニ依リ其ノ特異性有ナル實證シテ以來之ヲ追試スル者簇出シ、Laqueur, Jough u. Hart (1926) ハ女性「ホルモン」ハ雄性生殖器ノ發育ニ著シキ抑制作用ヲ及ボス事ヲ證明セリ。

Beuthner u. Fels (1928) ハ Menformon ヲ注射

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

第 4 圖

第 5 圖

第 6 圖

第 7 圖

第 8 圖

第 9 圖

第 10 圖

第 11 圖

第 12 圖

第 13 圖

第 14 圖

シタルニ、幼若動物ニアリテハ肉眼的ニモ顯微鏡的ニモ睾丸ニ著明ナル退行性病變ヲ認メタルモ、成熟動物ニハ多量ヲ用フルモ著變ナク、更ニ生物學的ニ生殖機能ヲ檢シタルモ交尾能力ハ正常ナリシヲ以ツテ、女性「ホルモン」ハ幼若動物ニハ明カニ拮抗の影響ヲ及ボスモ、成熟動物ノ生殖器ニ對シテハ何等影響ヲ及ボス事ナシト言ヘリ。Moore & Price(1932)ハ Oestrin ニ依リ「ラッテ」睾丸ノ著シキ縮小及ビ精細管ノ著明ナル萎縮ヲ見タリ。Spencer, Amour & Gustavson(1932)モ Oestrin ノ抑制作用ヲ見、Schoeller u. Gehre(1933), Pepe(1933), Halpern & Amour(1934), Kun(1933) Bail(1941), 國重(1931), 福島(1933), 櫻根(1934) 内野(1936)等ハ依レモ「濾胞ホルモン」ニ依リ之ガ抑制セラルルヲ見タリ。

一方 Gardner(1937), Lacassagne(1934)等ハ諸種ノ女性「ホルモン」ヲ以ツテ實驗シタルニ其ノ結果ハ不遑ナリキ。Bugbee & Simmond(1926)ハ濾胞「ホルモン」ハ雌雄兩性ニ同様ニ作用スルモノナリト言ヒ、Juhn, Amour & Womack(1930)ハ雌雄兩性「ホルモン」ヲ適宜混合セシモノヲ動物ニ投與シタルニ、各其ノ作用ヲ現ハシ且兩性「ホルモン」ノ混在ニ依リ相互ニ其ノ作用ノ強力トナルガ如キ事實ハナカリシモ、兩者間ニ拮抗作用存在セザル事ヲ證明セリ。

Neumann(1931)ハ Follikulin ナ幼若「マウス」

ニ注射シタルニ、其ノ形大ニシテ且成熟セル精祖細胞現ハレ、更ニ少數ノ精母細胞出現セルヲ見タリ。而シテ成熟セルモノハ13日間注射シタルモ精細管ニ何等ノ變化ヲ見ザリキ。松山(1916)ハ雌雄單純「バラビオーゼ」ノ例ニ睾丸ハ後ニ實質ノ變性ヲ惹起スルニ至レルモ、初メハ却ツテ正常ヨリ高度ニ發育セリト言ヒ、Wade & Doisy(1935)ハ生後21—25日ノ「ラッテ」ニ113—242日間ニ亘リ Theelin 及ビ Theelol ナ注射シタルモ、其ノ全例ニ於テ尚精祖細胞存在セルヲ見タリ。

Laqueur(1932), Freud, Joug u. Laqueur(1933) Sassolini(1934)等ハ濾胞「ホルモン」ノ注射ニ依リ去勢動物ノ精囊發育促進セラルルヲ見タルモ、Champy u. Conjard(1937)ハ Follikulin ノ注射ニ依リ非去勢動物ニ於テノミ攝護腺ノ腺腫様増殖ヲ惹起セシメ得タリト言フ。

Pighini, Giacomo, Delini(1932)等ハ牛馬ノ卵巢濾胞水ヲ幼若動物ニ注射シタルニ、大量ニテハ却ツテ睾丸變性ヲ認メタルモ、少量ニテハ造精機轉ヲ促進セシムルモノナリト言ヒ、Geréb(1931)ハ女性「ホルモン」ニ依リテモ亦幼若「マウス」睾丸ノ造精機轉ヲ促進セシメ得ルモ、其ノ作用ハ常ニ腦下垂體前葉「ホルモン」ノ作用ニ劣リ、初期ニハ之ヲ促進セシメ、長期投與例ニハ却ツテ其ノ抑制ヲ來スト言ヘリ。

第2項 實 驗 成 績

本實驗ニ使用セシ新産仔ハ總數19頭ニシテ、第6表ニ示スガ如ク所定注射終了後翌日屠殺セシ場合ニハ、1回量 0.3ccヲ1週間注射スルモ(第Ⅰ群)辜丸竝ニ攝護腺ノ發育ハ明カニ促進セラレ、之ヲ2週間反復セシ例(第Ⅱ群)ニハ其ノ所見更ニ著明トナレリ。而シテ1回量ヲ0.6ccニ増加セシ例(第Ⅲ群)ニハ1週間ニテモ之ハ可成リ著明ニ促進セラレ、該量ヲ2週間持續シタル3例(第Ⅳ群)中2例ニハ之ガ著明ニ促進セラレ、他ノ1例ニハ逆ニ明カニ抑制セラルハヲ確メタリ。

次ニ所定注射終了後7日目ニ屠殺セシ場合ニハ、前群ニ比シ一般ニ其ノ作用著明ニシテ、1回量 0.3ccヲ用ヒタル例(第Ⅴ群)ニテモ稍々著明ニ促進シ、之ヲ2週間持續セシ場合(第Ⅵ群)ニハ更ニ著明ナリキ。又1回量 0.6cc宛使用セシ例(第Ⅶ群)ニハ第Ⅴ群ヨリモ其ノ所見著明ナリシモ第Ⅵ群ニ及バズ。而シテ之ヲ2週間持續シタル例(第Ⅷ群)ニテハ何レモ著明ニ抑制セラレタリ。

第3項 本節ノ概括及ビ考察

以上ノ如ク卵巢濾胞「エキス」モ亦海猿新産仔ノ雄性生殖器ノ發育ニ影響ヲ及ボスハ明カニシテ、其ノ影響ハ該「エキス」ノ注射量ト注射期間トノ如何ニ依リテ異ルモノノ如シ。

而シテ本實驗例ノ辜丸竝ニ攝護腺ノ各部ニ就テ之ヲ見ルニ、辜丸ニテハ重量増加率ハ著明ニ増加シ、其ノ最大ナルモノハ2.83ヲ示シ對照例ノ略々3倍ニ達セントス。然ルニ抑制セラレタルモノハ最小0.58ニシテ對照例ノ約半分ニ減ゼリ。精細管最大外徑増加率ハ其ノ最大ナルモノ1.67ニシテ對照例ノ約1倍半トナレルモ、抑制セラレタルモノハ0.83トナレリ。造精機轉ニ就テ見ルニ著明ナルモノハ精娘細胞期ニ達シ著シク促進セラル。然レドモ Geréb, ノ言ヘルガ如ク腦下垂體前葉「エキス」ノ作用ニ及バズ。間質ニテハ精細管ノ發育ガ著明ニ促進セラレタルモノノミ間細胞ノ肥大ヲ認メタルモ其ノ増殖ヲ見タル事ナシ。

攝護腺ニテハ重量増加率ノ最大ナルモノ3.37ニシテ、抑制セラレタルモノハ最小0.72ナリ。而シテ腺小葉最大外徑増加率ハ最大ナルモノ1.88ナルモ、抑制セラレタルモノハ0.73ナリ。

以上ノ如ク余ノ1%人卵巢濾胞「エキス」ニ對スル海猿新産仔辜丸竝ニ攝護腺ノ所見ニハ著シキ差異有リ、少量ヲ用フルカ又ハ大量ニテモ之ヲ短期間注射シタル場合ニハ明カニ促進ヲ示シ Neumann, Pighini 等ノ實驗例ノ如ク辜丸造精機轉ノ促進ヲ見ルモ、大量ヲ長期間注射セシ例ニハ却ツテ其ノ抑制セラルハ事實有レバ、卵巢濾胞「エキス」ハ促進作用ト抑制作用トノ正反對ノ2作用ヲ有スルモノノ如ク、其ノ要約ハ該「エキス」ノ注射量ト注射期間トノ如何ニ依リテ左右セラルハモノト言フベシ。從ツテ Laqueur 等大多數ノ學者ハ雄性生殖器ノ發育ハ濾胞「ホルモン」ニ依リテ抑制セラルト言ヒ、Geréb ハ長期ニ亘リテ女性「ホルモン」ヲ投與スル時ハ却ツテ其ノ抑制ヲ來スト主張スレドモ、余ノ成績ヨリ見ル時ハ大量ヲ比較的長期間注射スル事ニ依リテ始メテ諸家ノ例ニ見ルガ如ク其ノ抑制セラルハヲ認メ得ルモノニシテ、卵巢濾胞「ホ

ルモン」ノ作用ハ極メテ複雑微妙ナリト言フベシ。

茲ニ於テ該「エキス」ニ對シ最モ著明ニ反應ヲ示シタルモノヲ以ツテ正常發育ノ夫レト比較スルニ、辜丸竝ニ攝護腺ハ何レモ大體ニ於テ生後30日ノモノニ相當セリ。尙該「エキス」ノ作用ヲ注射量ト注射期間トノ關係ヨリ示セバ次ノ如シ。

1. 1回量 0.3ccヲ1週間注射スルモ生殖腺ノ發育ハ可成リ著明ニ促進セラレ、其ノ2週間持續例ニハ一層著明ナリ。
2. 1回量 0.6cc宛ヲ注射スル時ハ1週間反復スルモ可成リ著明ニ之ガ促進セラル。
3. 1回量 0.6ccヲ2週間持續スル時ハ却ツテ之ハ抑制セラル。
4. 注射總量相等シキ時ハ1回量 0.6ccヲ1週間注射スルヨリモ1回量 0.3ccヲ2週間持續スル方ガ其ノ作用顯著ナリ。

第4章 考 按

余ハ第3章ニ於テ正常時ニ於ケル海猿ノ辜丸及ビ攝護腺ノ發育狀態ヲ組織學的ニ系統的ニ觀察スルト共ニ、凡ソ生殖腺ノ發育ニ關係ヲ有スベキ諸種「ホルモン」劑ヲ使用シ、之等ガ海猿新産仔ノ辜丸竝ニ攝護腺ノ發育ニ及ボス影響ヲ逐次檢索セシヲ以ツテ、本章ニ於テハ以上ノ全實驗成績ヲ通覽シ綜合的觀察ヲ試ミントス。

這般ノ實驗成績ヲ要約スルニ腦下垂體前葉及ビ後葉、甲狀腺、副腎皮質、卵巢濾胞等ノ諸種抽出劑ハ、程度ノ差コソアレ、何レモ海猿新産仔ノ辜丸及ビ攝護腺ノ發育ヲ促進セシムルモノニシテ、發育促進ノ程度ハ夫等ノ注射量竝ニ注射期間ニ關係セルモノノ如ク、一般ニ注射期間相等シキ時ハ少量ヲ用フルヨリモ大量ヲ用ヒタル例ニ效果ハ著明ニシテ、注射總量相等シキ時ハ大量ヲ短期間用フルヨリモ少量ヲ比較的長期間用ヒタル例ニ之ガ顯著ナリ。而シテ最モ著明ニ促進セラレタルハ何レノ「エキス」劑ヲ用フルモ大量ヲ長期間注射セル例ニ見ラレ、唯卵巢濾胞「エキス」ノミハ之ト趣ヲ異ニシ少量ヲ長期間用フル時ガ最モ著明ニシテ、大量短期間使用例ニハ可成リ促進セラレ、大量長期間使用例ニハ却ツテ抑制ヲ見タルハ注目スベキ所ナリ。

試ミニ以上諸種「エキス」劑ノ作用ヲ所定注射量竝ニ注射期間ノ範圍内ニ於ケル各部ノ増加率ノ最大値ヲ以ツテ比較スルニ次ノ如シ。

體重増加率ハ最大ナルモノ卵巢濾胞「エキス」注射例ノ2.81、次イデ腦下垂體前葉「エキス」例ノ2.80、以下腦下垂體後葉「エキス」例ノ2.10、甲狀腺「エキス」例ノ2.05、副腎皮質「エキス」例ノ1.88ノ順トナレリ。

辜丸ニ就テ見ルニ重量増加率ハ最大ナルモノ前葉「エキス」注射例ノ3.64、次イデ卵巢濾胞「エキス」例ノ2.83、後葉「エキス」例ノ1.83、甲狀腺「エキス」例ノ1.67、副腎皮質「エキス」例ノ1.58ノ順ナリ。精細管最大外徑増加率ハ是レ亦最大ナルハ前葉「エキス」例ノ1.98、次イデ卵巢濾胞「エキス」例ノ1.67ニシテ、以下後葉「エキス」例ハ1.42、甲狀腺「エキス」例ハ1.38、副腎皮質「エキス」例ハ1.35トナレリ。造精機轉ニ就テ見ルニ最モ著明ナルハ前葉「エキス」例ニシテ、余ノ

例ニテハ定型的ナル精子ノ發生ヲ見ル事ナカリシモ、明カニ其ノ移行型ヲ見タルヲ以ツテ造精機轉ノ進展ハ顯著ナリト推定シ得ベシ。卵巢濾胞「エキス」モ亦著明ニ之ヲ促進セシメ精娘細胞ヲ出現セシムルモ前葉「エキス」例ニ及バズ、更ニ後葉「エキス」例、甲狀腺「エキス」例、副腎皮質「エキス」例ニアリテモ稀ニ精娘細胞又ハ其ノ移行型ノ出現ヲ見ルモノニシテ可成リ夫レハ著明ナリト雖モ、夫等ノ優劣ハ此ノ場合明確ニハ決定シ難シ。間質ノ變化ニ就テ之ヲ見ルニ間細胞ハ前葉「エキス」及ビ後葉「エキス」ニ依リテハ實驗例ノ大多數ニ其ノ肥大ヲ示シタルモ、其ノ他ノ「エキス」注射例ニアリテハ一般ニ不規則ニシテ、大體ニ於テ精細管ニ促進著シキモノニ於テノミ肥大スルヲ見タリ。余ノ例ニ於テハ何レノ實驗例ニモ其ノ増殖ヲ見タルモノナカリキ。

以上睾丸ノ所見ヲ見ルニ、之等ノ諸種「エキス」劑ハ主トシテ胚種部ニ作用ヲ及ボシ造精機轉ヲ促スモノナルモ、他方間質ニ對シテモ亦多少ノ影響ヲ與ヘ不規則ニラ間細胞ノ肥大ヲ招來スルヲ見レバ、該「エキス」劑ハ何レモ胚種部ト間細胞トニ作用スル各2種ノ因子ヲ含有スルモノノ如シ。而モ上述ノ如ク間細胞ノ變化ガ不規則ナリシハ後者ニ及ボス因子ノ含有セラル、事虧キカ或ハ其ノ作用ノ弱キカ何レニカ因ルモノナランモ、更ニ動物ノ幼若ニシテ該組織ノ未熟ナルタメ反應弱キ事モ亦其ノ一因ナルベシ。

次ニ攝護腺ニ就テ見ルニ重量増加率ノ最大ナルハ前葉「エキス」例ノ3.76、次イデ卵巢濾胞「エキス」例ノ3.37ニシテ以下後葉「エキス」例ノ1.47、副腎皮質「エキス」例ノ1.26、甲狀腺「エキス」例ノ1.17ノ順ナリ。腺小葉最大外徑増加率ハ其ノ最大ナルモノ亦前葉「エキス」例ニシテ2.38ヲ示シ、次イデ卵巢濾胞「エキス」例ノ1.88、後葉「エキス」例ノ1.66ノ順トナリ、甲狀腺「エキス」例及ビ副腎皮質「エキス」例ハ共ニ1.56トナレリ。而シテ腺小葉分化ノ程度ニ就テ見ルニ、之ニ於テハ睾丸ノ造精機轉ニ見ラル、ガ如キ劃然タル區別ヲ見出ス事能ハザリシモ、余ガ腺小葉ヲ其ノ組織學的造構ニ基キテ分類セン7型ヲ基礎トシテ考察スル時ハ必ズシモ困難ナルモノニ非ズ。即チ分泌物ヲ容ル、モノ及ビ分歧著シキモノハ、管腔廣キモノト共ニ發育モ分化モ促進セラレ且機能モ亦充進セラル、ヲ推知シ得ルモノナリ。畢竟腺小葉ニシテ充實性ノモノ、管腔形成初期ノモノ及ビ管腔狹キモノ等ノ如キハ未ダ分化セザルカ或ハ其ノ低級ナルモノト解シ妨ゲナカルベシ。而シテ以上ノ「エキス」劑ニ依リテ惹起セラレタル發育、分化ノ狀態ヲ見ルニ、之ヲ睾丸精細管ノ變化ニ見ルモ、將又攝護腺小葉ノ所見ニ徴スルモ其ノ程度ニ著シキ差異有リテ全ク反應ヲ受ケザリシ觀有ルモノト著明ニ變化ヲ示シタルモノトガ混合セリ。斯カル事實ハ就中大量ノ「エキス」ヲ比較的短期間注射セシモノニ著明ナリキ。之ハ正常發育ノ尖レガ比較的均等ナルヲ思フ時大ニ注目スベキ所ニシテ、「エキス」劑ハ其ノ作用ヲ發揮スルニ當リテハ、必ズシモ常ニ一律ニ影響ヲ與フルモノニ非ザルヲ了解シ得ルモノナルベシ。

以上ノ如ク攝護腺モ亦之等諸種「エキス」劑ノ作用ニ依リ其ノ發育ハ促進セラレ、而モ睾丸ノ夫レト略々並行スル所見アルハ、既ニ諸家ノ實證セシガ如ク睾丸ト攝護腺トノ間ニ緊密ナル内分泌關係ガ存在シ、攝護腺ノ變化ハ睾丸ノ機能充進ニ基ク二次的作用ニ因ルモノト解スル時容

易ニ首肯シ得ルガ如シ。

茲ニ於テ辜丸ノ内分泌機能ハ果シテ其ノ何レノ部位ニ存スルモノナルカノ疑義生ズルハ當然ナルベシ。抑モ男性「ホルモン」ノ產生部位ニ關シテハ今尙甲論乙駁ノ域ヲ脫セザルノ現状ニシテ、就中間細胞ハ最モ論争ノ中心トナリ、古來幾多ノ學者ニ依リ種々研究セラレ、Steinachノ如キハ所謂若返リ法ニ理論的根據ヲ推定スルニ至リタルモ、其ノ後之ガ誤解ヲ指摘セル有力ナル追試出ヅルニ及ビ、間細胞ノミヲ以ツテ男性「ホルモン」ノ產生部位ナリト信ズル者ハ漸ク其ノ數ヲ減ズルニ至レリ。余ノ實驗ニ依リテ得タル成績ノミヲ以ツテハ、直チニ之ニ對スル明確ナル解答ヲ與ヘ得ベキモノニハ非ザレドモ、余ノ例ニ於テ辜丸造精機轉ノ進展ト攝護腺小葉ノ分化トハ相並行シ。加之攝護腺ノ發育ハ比較的顯著ナリシニ拘ラズ此ノ場合間細胞ニ著變無カリシ事實ヨリ見ル時ハ、寧ロ胚種部ニ其ノ機能存スルモノト解スルノ妥當ナルヲ思フ。

之ヲ要スルニ人腦下垂體前葉竝ニ後葉、甲狀腺、副腎皮質及ビ卵巢濾胞等ノ諸種「エキス」ハ程度ノ差コソアレ、何レモ海猿新産仔雄性生殖器ノ發育ヲ促進セシムルモノニシテ、其ノ作用ノ最モ著明ナルハ腦下垂體前葉「エキス」ニシテ、卵巢濾胞「エキス」、腦下垂體後葉「エキス」等之ニ次ギ甲狀腺「エキス」及ビ副腎皮質「エキス」ハ比較的輕度ニ作用スルモノト看做スベキモノナラン。

第5章 總括竝ニ結論

本研究ニ於テ得タル成績ノ概要ヲ述ブレバ次ノ如シ。

1. 人腦下垂體前葉竝ニ後葉、甲狀腺、副腎皮質及ビ卵巢濾胞ノ各1%「エキス」ハ其ノ一定量ヲ與フル時何レモ海猿新産仔辜丸及ビ攝護腺ノ發育ヲ促進セシム。
2. 發育促進ノ程度ハ何レモ夫等「エキス」ノ注射量竝ニ注射期間ニ關係シ、注射期間相等シキ時ハ少量使用例ヨリモ大量使用例ニ著明ニシテ、注射總量相等シキ時ハ大量短期間使用例ヨリモ少量長期間使用例ニ顯著ナリ。但シ卵巢濾胞「エキス」例ノミハ他ノモノト趣ヲ異ニシ、少量ヲ長期間用フルカ又ハ大量ニテモ之ヲ比較的短期間使用スレバ著明ニ促進スルモ、大量長期間使用例ニハ却ツテ抑制セラルハヲ見ル。
3. 以上ノ「エキス」ニ依リテ最モ著明ニ促進セラレタルモノヲ正常發育ノ夫レト比較スルニ、最モ著明ナルハ腦下垂體前葉「エキス」ニ依ルモノニシテ、大約生後40日ノモノニ相當シ、卵巢濾胞「エキス」例亦著明ニシテ生後約30日ノモノニ匹敵セリ。而シテ腦下垂體後葉「エキス」例ハ大約生後30日ノモノニ相當シ、甲狀腺及ビ副腎皮質「エキス」例ハ何レモ稍々之ニ劣レルガ如シ。
4. 以上ノ「エキス」注射實驗ニ於テハ、其ノ種類ニ依リ、更ニ其ノ投與ノ方法ニ依リテ結果ニ差異アレドモ、辜丸ニ對シテハ主トシテ胚種部ニ作用シ造精機轉ヲ促スモノナリ。而モ何レノ「エキス」劑ヲ用フルモ上述ノ實驗例ニ於テハ眞ノ性早期成熟ヲ惹起セルモノナシ。其ノ他間細胞ノ肥大ヲ惹起スル事ハ不定ニシテ、特ニ其ノ増殖ヲ確認セル事ナシ。
5. 攝護腺ニ對シテハ主トシテ腺小葉ニ作用シ、腺小葉ハ増大シ圓形トナリ又ハ分岐ス。而シ

テ管腔ハ擴張シ更ニ内ニ分泌物ヲ含有スルニ至ル。

6. 辜丸竝ニ攝護腺ノ發育ハ殆ンド常ニ相並行シテ促進セラル、モノノ如シ。

以上ノ成績ニ基ツキ次ノ如ク結論セント欲ス。

人腦下垂體前葉、後葉、甲狀腺、副腎皮質「エキス」ハ程度ノ差コソアレ何レモ雄性海狸生殖器ノ發育ヲ促進セシム。而シテ卵巢濾胞「エキス」ハ其ノ注射量竝ニ注射期間ノ如何ニ依リテ或ハ著シク之ヲ促進セシメ或ハ逆ニ之ヲ抑制ス。

摘筆ニ臨ミ終始御懇篤ナル御指導竝ニ御校閲ノ勞ヲ賜ハリシ恩師大野教授竝ニ皆見教授ニ深甚ノ謝意ヲ表ス。

主 要 文 献

- 1) **Amson**: Endokrinol. Bd. 9, S. 241, 1931. 2) **Aschner**: Hirsch's Handb. d. inner. Sekr. Bd. 2, S. 277, Leipzig, Kabitzsch, 1927. 3) **Aschner**: Arch. Gynäk. Bd. 97, S. 200, 1912.
- 4) **Ascoli u. Legnani**: Münch. med. Wsch. Nr. 10, S. 518, 1912. 5) **Bail**: Frankf. Z. Path. Bd. 55, S. 14, 1941. 6) **Behrenroth**: Dtsch. Arch. klin. Med. Bd. 113, S. 393, 1914. 7) **Belawenetz**: Virchows Arch. Bd. 274, S. 585, 1930. 8) **Belawenetz**: Anat. Anz. Bd. 65, S. 144, 1928. 9) **Beuthner u. Fels**: Endokrinol. Bd. 2, S. 406, 1928. 10) **Biedl**: Arch. Gynäk. Bd. 132, S. 167, 1927. 11) **Bittorf**: Berl. klin. Wsch. Nr. 33, S. 776, 1919. 12) **Bugbee a. Simmond**: 内野ニ據ル. 13) **Champy u. Coujard**: Zit. n. Rössle u. Zahler. 14) **Chrastalew**: Münch. med. Wsch. Nr. 29, S. 1621, 1913. 15) **Collip, Helye u. Thomson**: Virchows Arch. Bd. 290, S. 34, 1933. 16) **Conner**: Zit. n. Kaplan. 17) **Diamontopolus**: Zit. n. Jaffé u. Berberich. 18) **Dietrich u. Siegmund**: Henke-Lubarsch's Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd. 8, S. 951, Berlin, Springer, 1926. 19) **Döderlein**: Beitr. path. Anat. Bd. 83, S. 92, 1930. 20) **Eiselsberg**: Zit. n. Asher. Hirsch's Handb. d. inner. Sekr. Bd. 2, S. 168, Leipzig, Kabitzsch, 1927. 21) **Evans a. Long**: Anat. Rec. Vol. 21, P. 61, 1921. 22) **Evans a. Simpson**: Anat. Rec. Vol. 32, P. 206, 1926. 23) **Freud, Jong u. Laqueur**: Ref. in Berichte u. d. g. Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 73, S. 163, 1933. 24) 福島: 臨床産科, 第 8 卷, 764 頁, 1933. 25) 藤田: 日本病理學會々誌, 第 14 卷, 130 頁, 1924. 26) **Gardner**: Anat. Rec. Vol. 68, P. 339, 1937. 27) **Geréb**: Endokrinol. Bd. 9, S. 119, 1931. 28) **Goldzieher**: Zit. n. Wegelin. 29) **Halban**: Arch. Gynäk. Bd. 70, S. 205, 1903. 30) **Halpern a. Amour**: Ref. in Berichte u. d. g. Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 85, S. 153, 1935. 31) 秦: 東京醫學會雜誌, 第 29 卷, 647 頁, 1915. 32) 遠水: 日本病理學會々誌, 第 9 卷, 96 頁, 1919. 33) **Hewer**: Brit. med. Journ. Vol. 1, P. 138, 1922. 34) **Hofmeister**: Zit. n. Asher. 35) **Hohlweg u. Junkmann**: Klin. Wsch. Nr. 8, S. 321, 1932. 36) 井倉: 日本內分泌學會雜誌, 第 3 卷, 610 頁, 1927. 37) 石橋: 日本病理學會々誌, 第 3 卷, 181 頁, 1914. 38) **Jaffé a. Marine**: J. of exper. Med. Vol. 38, P. 107, 1923. 39) **Jaffé u. Tannenber**: Hirsch's Handb. d. inner. Sekr. Bd. 1, S. 473, Leipzig, Kabitzsch, 1927. 40) **Juhn, Amour a. Womack**: Amer. J. Physiol. Vol. 95, P. 641, 1930. 41) **Kaplan**: Frankf. Z. Path. Bd. 44, S. 302, 1933. 42) 加藤: 日本病理學會々誌, 第 10 卷, 26 頁, 1920. 43) **Klein**: Endokrinol. Bd. 9, S. 401, 1931. 44) **Koch**: Münch. med. Wsch. Nr. 36, S. 1501, 1936. 45) **Krezeneky**: Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.-mechan. Bd. 101, S. 621, 1924. 46) **Kraus**: Henke-Lubarsch's Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd. 8, S. 810, Berlin, Springer, 1926. 47) **Kraus u. Holzer**: Virchows Arch. Bd. 251, S. 253, 1927. 48) 工藤: 日新醫學, 第 11 卷, 1213 頁及 1367 頁, 1921-22. 49) 衣笠: 朝鮮醫學會雜誌, 第 20 卷, 116 頁, 1930. 50) **Kun**: Endokrinol. Bd. 13, S. 311, 1933. 51) 國重: 岡山醫學會雜誌, 第 43 卷, 1150 頁, 1931. 52) **Laccassagne**: Zit. n. Bail. 53) **Lanz**: Zit. n. Jaffé u. Tannenber. 54) **Laqueur**: Ref. in Berichte u. d. g. Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 72, S. 154, 1933. 55) **Laqueur, Hart u. Jough**: Dtsch. med. Wsch. Nr. 30, S. 1247, 1926. 56) **Leupold**: Beitr.

- path. Anat. Bd. 69, S. 305, 1921. 57) **Leupold**: Ref. in Zbl. Path. Bd. 31, S. 390, 1920-1921. 58) **Leupold**: Ref. in Zbl. Path. Bd. 31, S. 571, 1920-1921. 59) **Leupold**: Veröffentlich. a. d. Kriegs-u. Konstitutionspathol. Jena, Fischer. H. 4, 1920. 60) **Marchand**: Münch. med. Wschr. Nr. 29, S. 1440, 1906. 61) **Mattias**: Virchows Arch. Bd. 236, S. 446, 1922. 62) **松山**: 日新醫學, 第8卷, 1765頁, 1916. 63) **McKinley u. Fisher**: Zit. n. Bayer. 64) **Mislawsky**: Zit. n. Belawenetz. 65) **宮村**: 日本內分泌學會雜誌, 第4卷, 2012頁, 1928. 66) **Moore a. Price**: Amer. J. Anat. Vol. 50, P. 13, 1932. 67) **Müller**: Endokrinol. Bd. 8, S. 5, 1931. 68) **Neumann**: Ref. in Zbl. Gynäk. Bd. 20, S. 1639, 1931. 69) **西村**: 日本內分泌學會雜誌, 第4卷, 1942頁, 1928. 70) **Novak**: Arch. Gynäk. Bd. 101, S. 36, 1913. 71) **大西**: 日本內分泌學會雜誌, 第7卷, 857頁, 1931. 72) **Pepe**: Ref. in Berichte u. d. g. Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 79, S. 417, 1934. 73) **Pighini**: Zit. n. Belawenetz. 74) **Pighini, Giacomo, Delfini**: 内野ニ據ル. 75) **Rauther**: Oppel's Lehrb. d. vergl. mikrosk. Anat. d. Wirbelt. Bd. 4, S. 239, Jena, Fischer, 1904. 76) **Remotti**: Zit. n. Belawenetz. 77) **Riddle**: Zit. n. Kaplan. 78) **Romeis**: Arch. Entw.-mechan. Bd. 37, S. 183, 1913. 79) **Rösle u. Zahler**: Virchows Arch. Bd. 302, S. 251, 1938. 80) **櫻根**: 大阪醫學會雜誌, 第33卷, 4111頁, 4135頁及4149頁, 1934. 81) **Saller**: Z. Anat. u. Entw.-mechan. Bd. 80, S. 579, 1926. 82) **Sassolini**: Ref. in Berichte u. d. g. Physiol. u. exper. Pharmacol. Bd. 84, S. 644, 1935. 83) **Schmidt**: Virchows Arch. Bd. 251, S. 8, 1924. 84) **Schinz u. Slotopolsky**: Virchows Arch. Bd. 248, S. 285, 1924. 85) **Schneider**: Verh. dtsh. Path. Ges. 1923. 86) **Schoeller u. Gehre**: Biochem. Z. Bd. 264, S. 352, 1933. 87) **Smith**: Amer. J. Physiol. Vol. 65, P. 277, 1923. 88) **Smith**: Amer. J. Anat. Vol. 40, P. 159, 1927. 89) **Smith**: J. amer. med. Assoc. Vol. 88, P. 158, 1927. 90) **Spencer, Amour a. Gustavson**: Amer. J. Anat. Vol. 50, P. 129, 1932. 91) **Steinach**: Pflügers Arch. Bd. 144, S. 71, 1912. 92) **Steinach u. Kun**: Med. Klin. Nr. 14, S. 524, 1928. 93) **Steinach u. Kun**: Dtsch. med. Wschr. Nr. 26, S. 1107, 1927. 94) **Sternberg**: Beitr. path. Anat. Bd. 67, S. 275, 1920. 95) **Stieve**: Möllendorff's Handb. d. mikrosk. Anat. d. Menschen. Bd. 7/2, Berlin, Springer, 1930. 96) **Tandler**: Wien. klin. Wschr. Nr. 13, S. 459, 1910. 97) **Trendelenburg**: Die Hormone, ihre Physiol. u. Pharmak. Bd. 1, Berlin, Springer, 1929. 98) **角田**: 日本病理學會々誌, 第12卷, 359頁, 1922. 99) **辻**: 井倉ニ據ル. 100) **内野**: 日本內分泌學會雜誌, 第12卷, 45頁, 1936. 101) **Voss u. Loewe**: Pflügers Arch. Bd. 218, S. 604, 1928. 102) **Wade a. Doisy**: Endocrinology Vol. 17, P. 128, 1936. 103) **Watson**: J. of Physiol. Vol. 58, P. 240, 1923-24. 104) **Zondek u. Aschheim**: Arch. Gynäk. Bd. 130, S. 1, 1927. 105) **Zondek u. Aschheim**: Klin. Wschr. Nr. 8, S. 1322, 1927. 106) **Zondek u. Aschheim**: Klin. Wschr. Nr. 1, S. 8, 1928. 107) **Zondek**: Klin. Wschr. Nr. 6, S. 245, 1930. 108) **Zondek**: Klin. Wschr. Nr. 9, S. 393, 1930.

附 圖 說 明

辜丸組織ハ總テ擴大80倍, 攝護腺ノ夫レハ50倍
ニテ鏡檢セリ。

- 第1圖 正常海猿ノ辜丸組織像(第27號)
第2圖 同攝護腺組織像(何レモ生後23日目)
第3圖 腦下垂體前葉「エキス」大量2週間注射例
(7日目ニ屠殺)海猿辜丸組織像(第135號)
第4圖 同攝護腺組織像
第5圖 卵巢濾胞「エキス」少量2週間注射例 (7
日目屠殺)海猿辜丸組織像(第143號)
第6圖 同攝護腺組織像
第7圖 卵巢濾胞「エキス」大量2週間注射例 (7

- 日目ニ屠殺)海猿辜丸組織像(第101號)
第8圖 同攝護腺組織像
第9圖 腦下垂體後葉「エキス」大量2週間注射例
(7日目ニ屠殺)海猿辜丸組織像(第191號)
第10圖 同攝護腺組織像
第11圖 甲狀腺「エキス」大量2週間注射例 (7日
目ニ屠殺)海猿辜丸組織像(第149號)
第12圖 同攝護腺組織像
第13圖 副腎皮質「エキス」大量2週間注射例 (7
日目ニ屠殺)海猿辜丸組織像(第206號)
第14圖 同攝護腺組織像

(特掲 昭和18年1月20日受付)