膀胱腫瘍ノ Radon 療法ニ關スル實驗的研究

第 1 篇 家兎膀胱竝ニ筋組織ノ Radon 金管射入 ニヨル組織學的變化

K. Komatsu: Experimentelle Studien über

die Radiumemanationsbehandlung der Blasen Tumoren.

I. Mitteilung: Histologische Veränderungen der mit Radongoldkapillaren
eingespickten Blasenwand und Muskeln des Kaninchens.

東京帝國大學醫學部皮膚科泌尿器科教室 (泌尿器科主任 高橋明教授)

副 手 醫 學 士 小 松 勁 一

(本論文ノ要旨ハ昭和18年10月20日第109回日本泌尿器科學會東京地方會ニ於テ報告シタ。)

緒 言

Radium が發見セラレテカラ數年, Blauel⁽³⁾ 及ビ Abbe ニヨリ始メテ行ハレタ組織内照射ハ Radium ノ有スル特性ヲ活用シタ幾多ノ利點ヲ有スル照射法デアリ, Radium ト殆ド時ヲ同ジクシテ發見セラレタ Röntgen 線ノ近付キ難キ一特色ト謂フコトガ出來ル。此組織内照射ハ次デ Duane ニヨリ Radon 毛細管ガ考案セラレ, Joly⁽¹⁹⁾ 及ビ Stevenson⁽⁴⁶⁾ ニヨツテ始メテ治療ニ應用セラレ, 次デ舌, 口腔, 咽喉, 胸部及ビ膀胱等ノ惡性腫瘍ノ治療ニ用ヒラレテ其特性ヲ遺憾ナク發揮シタ。

Radium ノ組織ニ與フル變化ニ關シテハ Schaudinn (1899)⁽⁴⁾ ニ始マリ, 以後既ニ多數ノ諸家ニヨリ研索セラレ, Radon 毛細管ニ就テモ此種報告ヲ見ル。併シ Failla (1925)⁽¹⁰⁾ ニヨリ案出セラレタ Radon 毛細金管ハソノ發スル放射線ノ差異カラ組織ニ與フル變化ハ Radon 毛細硝子管ノソレトノ間ニハ懸隔ガアラウト想像セラルハニ拘ラズ斯ル報告ハ甚ダ尠イ。殊ニ正常膀胱壁ニ與フル Radon 毛細管ノ組織變化ニ就テハ殆ド報告ヲ見ナイ様デアル。抑ニ Radium 放射線ノ正常膀胱ニ與フル影響ニ關シテハ, 偶ニ婦人性器癌ニ對スル Radium 療法ノ際認メラルハ爲之ガ記載ヲ見ルノミデ, 之等ノモノハ單ニ Radium 療法ノ副作用トシテ簡潔ニ之ニ觸ルハニ止リ纔カニ Ottow⁽³³⁾, Schroeder⁽⁴¹⁾, Viethen⁽⁴⁹⁾, McNally⁽²⁶⁾ 等數氏ニヨリ稍ニ詳細ニ記述セラレテキルガ系統的記載ニ至ツテハ全ク之ヲ見ナイ。余ハ此問題ヲ闡明セント試ミテ實驗ヲ開始シタノデアルガ, 同時ニ Radon 毛細金管ノ作用ヲ可及的均質性ニ富ム正常組織ニ於テ比較觀察スル爲膀胱ト共ニ筋組織ヲ撰ビ竝行シテ實驗ヲ進メタ。

文 獻 の 考 察

Radium 放射線ノ正常組織ニ與フル變化ニ關シテハツルノ發見當時已ニ Mm. Curie, Becquerel ニヨリ認メラレタモノデ、Heinecke⁽¹⁶⁾, Thies⁽⁴⁸⁾, Dominici, Wickham 等多數諸家ニヨリ詳細ニ檢索セラレタ。Blauel 及ビ Abbe ニヨリ Radium ノ組織内照射ガ創始セラル、ニ及ビ放射源ノ容積ヲ可及的縮小セシムル必要カラ組織内照射法ハ2方向ニ別レテ進ンダ。即チ一ハ放射性物質鹽類ヲ直接組織内ニ注入シテコレノ發スル α , β 及ビ γ 線ノ悉クナ利用シテ組織ニ變化ヲ與ヘントスルモノデアリ、他ハ Radon ノ組織内導入デアル。前者ニ關シテハ已ニ Caspari u. Blumenthal(1903)⁽²²⁾ ハ放射性物質溶液ヲ腫瘍内ニ注射シ、Bouchard, Curie et Barthazard (1904) 及ビ Gies u. Mayer (1905) ガ不溶性 Radium 鹽ヲ、次デ Bickel (1911) ガ Aktinium, Prado Tangle (1912) ハ Radium 及ビ Mesothorium, Lazarus u. Werner⁽¹⁴⁾ ハ Radium 鹽溶液、Lacassagne (1925) ハ Polonium 鹽ヲ動物體內ニ注入シテ實驗ヲ試ミタト云フ⁽³²⁾。Ostrčil u. Novák (1931)⁽³²⁾ ハ Thoriumsaliicylat ヲ家兎耳ニ、Eichbaum (1937)⁽⁸⁾ ハ Radiumchlorid 溶液ヲ家兎眼内ニ注入シテ變化ヲ組織學的ニ檢索シタ。又 Loeb u. Wreschner (1928)⁽²⁵⁾ 及ビ Halberstaedter (1927)⁽¹⁴⁾ ノ如ク β 線ノミチ發スル Uran X_1 ナ應用セントシタモノモアル。

他方 Duane ハ使用 Radium ノ容積ヲ縮小シ組織内挿入ニ便ナラシムル爲 Radon 毛細管ヲ案出シタノデアルガ、Joly and Stevenson (1914)⁽¹⁹⁾ ニヨリ創メテ作製セラレタ Radon 毛細管ガ述べラレ、Stevenson (1914) ニヨツテ始メテ臨牀的ニ應用セラレタ。Janeway (1920)⁽¹⁸⁾ ハ Radon 毛細管ヲ多數ノ惡性腫瘍ノ治療ニ使用シ著效ヲ收メタガ挿入毛細管ノ周圍ニ發生スル比較的廣汎ナ壊死ハ避け得ラレズ、コレガ結締組織ニヨツテ置換セラレ治癒ニ至ル迄ニハ長時日ヲ要シタ。コノ毛細管周圍ニ生ズル壊死ハ Radon ヨリ發スル柔軟ナ一次 β 線ニヨルコトガ Regaud (1921)⁽³⁷⁾ ニヨリ確カメラレ Radon 毛細管ノ進路ハ此一次 β 線除去ニ向ケラレタ。Heublein u. Quick (1925)⁽¹⁷⁾ ハ毛細管ノ代リニ後ニ至ツテ溶解吸收セラル、濾過物

質ヲ用ヒントシ次炭酸蒼鉛 Vaseline ヲ使用シ、Failla (1925) ハ鉛硝子ヲ應用シタガ満足スベキ結果ニ到達シナカツタ。他方 Radium β 線ヲ濾過除去シテ深達性アル γ 線ノミチ得ントスル試ミハ Abbe (1914)⁽¹⁾ ヨリ Failla, Quimby and Dean (1922)⁽⁹⁾ 等ノ研究ニヨリ金屬ニ指向セラレ、Quimby (1925)⁽³⁶⁾ ハ白金、金及ビ Iridium 等ノ重金屬ガ此目的ノタメ適スルコトヲ證シタ。而シテ Failla (1925) ハ遂ニ最モ廉價ニシテ此目ニ充分ナル金ヲ撰ビ今日吾人ノ使用スル Radon 毛細管ニ到達シタノデアル。現在主ニ使用サレテキル Radon 毛細管ハ壁厚 0.3mm デ之ニヨリ柔軟ナ一次 β 線ハ大部分除去セラレ γ 線及ビ僅カニ 8.8 % ノ硬 β 線ガ周圍組織ニ作用ヲ及ボスモノデアル⁽¹¹⁾。

Radon 毛細管ノ動物正常組織ニ與フル變化ニ對スル檢索ハ Bagg, Lacassagne, Cutler, Adair, 大塚等ニヨリ行ハレテキル。先ヅ Bagg (1920)⁽²⁾ ハ鼠ノ皮膚、筋、腦、睾丸等ニ 5.5—0.1 mc ノ Radon 硝子管ヲ射入シテ 13 乃至 60 日ノ期間ニ於ケル變化ヲ追求シ Radon 量ニハ殆ド無關係ニ徑 5 mm ノ壊死ガ起リ此周圍 2—3 mm ノ間ニ浮腫、核濃縮及ビ斷裂、充血並ニ淋巴球浸潤等ノ變化ヲ觀察シタ。Lacassagne (1921)⁽²⁸⁾ ハ硝子管及ビ種々ノ壁厚ヲ有スル白金管ヲ家兎筋肉内ニ射入シ、中心部組織ハ硬ク灰白色均質性トナリ外側ハ充血層ヲ壞セラレ、顯微鏡的ニハ中心部ハ壊死ニ陥リ外側ノ健常組織トノ境界ハ明瞭デ其間ニ移行ヲ認メズ、且變化ハ射入後 12 日ニ於テ最高トナリ漸次縮小シ瘢痕組織デ圍繞セラレル。種々實驗ノ結果壊死ノ大サハ初強度ニ比例スルガ硝子管ヲ除イテ白金管ハ最大徑 7 mm ナ越エナカツタ。Levin (1925)⁽²⁴⁾ モ植物及ビ動物組織ニ Radon 硝子管ヲ作用セシメ、内側ノ完全壊死及ビ外側ノ退行變性層ノ生ズルヲ認メ β 及ビ γ 線ノ生物學的性質ハ同ジモノデアルトシタ。Cutler (1926)⁽⁶⁾ ハ Radon 金管ヲ家兎筋肉内ニ射入シ肉眼的ニ乳白色中心部ト外側充血部トヲ區別シ得、組織學的ニハ最内完全壊死層、中間部不完全凝固層、最外充血層ニ分カレ、後 2 者ノ境界ハ明瞭デアリ、且硝子管ト金管トナ

比較スルニ前者デハ完全壞死層廣ク後者デハ凝固層ガ廣ク壁厚 0.3mm ニ達スレバ完全壞死層ハ消失シ壁厚ノ増加ト共ニ凝固層ハ狭クナル。而シテ壞死層ノ廣サハ初強度ニ關係スルコトヲ認メタ。Petrov u. Kusmina (1926)⁽³⁵⁾モ Radon 硝子管ヲ天竺鼠及ビ家兎筋肉内ニ射入シテ其變化ヲ時間的ニ觀察シ管周圍ニ生ジタ組織ノ均質化ハ 8—12 日デ最高ニ達シ纖維芽細胞ニテ圍繞セラレタ壞死組織ノ衰化ヲ認メ、放射線ノ作用ガ單ナル腐蝕ニ非ザルコトヲ述ベタ。更ニ Kusmina (1927)⁽²¹⁾ハ家兎耳翼、肝ニ於テモ實驗ヲ試ミタ。Adair (1927)⁽³²⁾ハ家兎腰筋ヲ使用シテ生ズル壞死ノ大サヲ測定シ、コレハ射入後 3—4 日デ最高ニ達シ以後殆ト増大セズ。從ツテ總放射量ヨリ寧ロ初強度ニ大イニ關係スルコトヲ確認シ、壞死ノ大サト皮膚紅斑量トノ關係ヲ見出しテ之ヲ治療ニ應用セント試ミタ。又 Sittenfield (1927)⁽⁴⁴⁾ハ孵化スル鶏心及ビ脾ノ組織培養ニ於テ Radon 毛細管ガコレノ發育ヲ抑制スルヲ認メタ。

Halberstaedter (1927) ハ Thorium-X 小桿ヲ用ヒテ皮膚、睾丸、腦ニ於ケル變化ヲ調べ、壞死、充血、圓形細胞浸潤、細胞分裂障礙ヲ認メ壞死ノ大サハ放射量、放射線ノ性質及ビ放射時間ニ關係スルガ特ニ或ル程度ヲ越エテ放射量ガ大キクナルト線ノ種類ニヨラズ壞死ヲ生ズルヲ見テ組織内照射ニハ此適當ナ量ヲ撰ブトガ重要ナルコトヲ述ベタ。又 Takeda (1927)⁽⁴⁷⁾ハ同様 Thorium-X 小桿ヲ鼠睾丸内ニ射入シ時間的ニ其變化ヲ追及シ、Simons (1928)⁽⁴⁸⁾ハ裸小桿及ビ金桿ヲ鶏冠内ニ刺入シ生ズル變化ヲ比較シタ。Cairns and Fulton (1930)⁽⁵⁾ハ種々ノ強度ノ Radon 毛細管ヲ犬及ビ猿ノ脊髓硬膜外ニ射入シ其影響ヲ檢シタ。大塚 (昭13)⁽³⁴⁾ハ家兎ノ胃、食道壁、肝、舌、筋、肺、脾、腎及ビ睾丸内ニ Radon 金管ヲ射入シ其組織學的變化並ニ金管ノ運命ヲ詳細ニ互リ檢索シタ。同氏ニヨレバ筋ニ於テハ内側ニ核破壊物質及ビ白血球浸潤ノ存スル壞死層、之ヲ圍ミテ筋纖維ノ腫脹、蠟燭並ニ空胞變性及ビ最外層タル萎縮並ニ血管周圍細胞浸潤層ヲ區別シ後 2 者間ノ境界ハ不明瞭デアリ、且壞死層ハ 8 日目ヨリ次第ニ狭小トナリ、變性部ハ經過ト共ニ變化強度トナリ 30 日頃ニハ新生結締織デ置換サレル。又同氏ハ壞死層ヲ價

重ニ測定シ最大 0.3mm トシ且本層ハ管壁ヨリ放射サレタ二次電子ニヨツテ生ズルモノナルヲ明カニシタ。

Radium 放射線ニヨル人體膀胱ヘノ影響ニ關スル報告ハ比較的少ク、主トシテ子宮頸管癌ニ對スル Radium 療法ノ際ニ Radium 放射線ガ癌組織ノミナラズ周圍臟器タル膀胱、直腸等ニモ及ビ變化ヲ與フル事カラ婦人科の方面ヨリ若干ノ觀察ガナサレテキルニ止マル。

膀胱ノ Radium 放射線感受性ニ關シテ Laborde, Cheval 等ハ扁平上皮ニ蔽レタ部位ヨリ感受性ニ乏シイト云フガ之ニ反對スル人モアリ未ダ一定シナイ様デアル (山川)。Neff (1932)⁽²⁹⁾ハ皮膚ヨリ耐忍量ガ稍々高イノミデアルトシタ。Kulle (1929)⁽³⁸⁾ハ 7200mg 時ノ Thorium-X 及ビ 1200mg 時ノ Radium 照射後膀胱瘻ヲ形成セル 1 例ヲ述べ、Mikuricz-Radecki (1933)⁽²⁷⁾ハ 8016mg 時 (Röntgen 強照射併用) 及ビ 4100mg 時放射後血管擴張ヲ認メ、Neff u. Hoff (1939)⁽³⁰⁾ハ Röntgen-Radium 照射ニヨリ膀胱底ガ 6800—8000mg 時ノ照射ヲ受ケタ時ノ所見トシテ上皮剝脱、痔實狀隆起、毛細管擴張及ビ膀胱陰瘻ヲ認メタ。

Radium 放射線ニヨル膀胱ノ變化ニ關シテ Dean (1929)⁽⁷⁾ハ照射後 24 時間前後ニ生ズル膀胱粘膜ノ一次性紅斑、照射後 21—28 日ニ發生スル二次性反應及ビ遲發性障礙タル三次性反應ヲ區別シ、Radium ニヨル膀胱障礙ノ組織學的ニ閉塞性動脈炎デアリ、障礙防止ニハ頸管放射量 8500mg 時ヲ安全上國トシタ。Schmitz (1930)⁽⁴⁰⁾ハ Dean ノ分類セル 3 反應ノ膀胱鏡所見ヲ述べ、二次性反應ハ潰瘍及ビ其周圍ノ粘膜發赤ガアリ、三次性反應ハ徐々ニ起リ粘膜ハ光澤ヲ失ヒ血管網ノ減少、毛細管擴張等ノ所見ヲ舉ゲタ。Mikulicz-Radecki (1935) ハ Radium 放射線ニヨル變化ハ皮膚ノ場合ト同様デ變化ハ先ヅ血管ニ生ジ血管運動性ガ失ハレ次デ局所性感染ニヨリ潰瘍ヲ形成スルトシタ。Rychlowski (1930)⁽³⁹⁾ハ遲發性膀胱變化ハ放射線ノ蓄積ニ因ルトシタ。最近 McNally (1938) ハ放射線性膀胱炎ノ組織ニ就テ述べ、急性ノ場合ハ筋層ヨリ上皮細胞迄白血球浸潤ガアリ膀胱壁ハ概シテ纖維ニ乏シク壞死性トナリ結締織ト小圓形細胞及ビ Plasma 細胞ガ所々ニ見ラレル。遲發性ノ場合ハ

閉塞性動脈炎ニヨル遲發性血管障礙ノタメノ組織變化ヲ呈シ、上皮ハ剝脫シ組織ノ浮腫及ビ充血ヲ見、膀胱鏡的ニ定型的ナルモノハ中心ガ血管消失シ其周圍ニ擴張セル血管ヲ見ルトシタ。此他 Radium 放射線ニヨル膀胱變化ノ臨牀症狀ニ就テハ Schugt (1923)⁽⁴²⁾ ハ Radium 及ビ X 線照射後膀胱出血ヲ見膀胱鏡的ニ擴張血管ノ集合セルヲ認め、Heidler (1928)⁽⁴⁵⁾ ハ膀胱粘膜ノ廣泛ト壊死脱落ニヨル Cystitis dissecans gangraenescens ノ 1 例ヲ報告シ、Schroeder (1932) ハ膀胱鏡所見ヲ記述シタ。コノ他 Gouverneur et Fabre (1924)⁽⁴³⁾, Zeiss

(1927)⁽⁵¹⁾, Stacy (1928)⁽⁴⁵⁾, Ottow (1930)⁽⁵⁰⁾, Wille (1930)⁽⁵⁰⁾, Newell and Crossen (1935)⁽³¹⁾ 等ノ簡單ナ記載ガアル。

泌尿器系統ニ對スル Radium 放射線ノ與フル變化ニ對スル實驗的研究ハ甚ダ少イ。Mühsam (1932)⁽²⁵⁾ ハ犬ノ腎及ビ輸尿管ニ 0.5mc/cm ノ Thorium-X 針ヲ刺入シ12日乃至8週間ニ亙リ變化ヲ追求シタ。大塚 (昭13) ハ腎臓ニ Radon 金管ヲ射入シテ實驗ヲ行ツテキル。膀胱ニ對シテハ川村 (昭12)⁽²⁰⁾ ガ犬ノ膀胱壁ニ Radon 金管ヲ射入シテ其組織學的變化ヲ檢シタ業績ガアルノミデアル。

實 驗

動物 1.8—2.0kg ノ雄性家兎ヲ使用シ其膀胱壁及ビ背筋内ニ Radon 金管ヲ射入シテ實驗ヲ行ツタ。

射入方法 膀胱ニ Radon 金管ヲ射入スルニハ先ヅ型ノ如ク下腹部ノ毛ヲ出來ル丈ク短刈シ Jod 丁幾ヲ以テ皮膚ヲ消毒後開腹術ヲ行ヒ膀胱ニ到達シ、射入器ヲ用ヒテ腹腔側ヨリ膀胱壁内ニ Radon 金管ヲ射入シタ。此際金管ガ膀胱壁ヲ穿孔シテ膀胱腔内ニ脱落セザル様注意シテ粘膜面ニ平行スル如ク膀胱筋層内ニ射入スル。射入部位ハ左右ニ存スル血管ヲ避ケテ膀胱前後壁略々中央ノ血管ニ乏シキ部位ニ各1本宛トシタ。筋肉内射入ハ同一家兎ノ背筋ヲ使用シタ。即チ背部ニ於テ最下位肋骨附着部附近ノ毛ヲ短刈シ皮膚消毒ノ後皮膚ニ小切開ヲ加ヘ、コレヨリ射入器ヲ皮下ニ挿入シ筋膜ヲ通シテ針メニ筋肉内ニ刺入シタ後射入器ノ方向ヲ筋纖維ト平行ニ約1cm刺入シテ筋組織内ニ Radon 金管ヲ射入シタ。

實 驗

方 法

放射期間 射入セル Radon 金管ハ1.0—1.3m^c ナ含ムモノデアル。而シテ Radon 金管射入後1日(24時間), 4日(3.8日, 半減期), 8日(7.7日, 1/4 減期), 12日(11.6日, 1/8減期), 21日, 35日(放射能消失期)及ビ60日ヲ經タル後靜脈内空氣栓塞ニヨリ動物ヲ死ニ到ラシメ直チニ解剖シ Radon 金管ノ射入位置ヲ確メ完全收縮狀態ニ於テ肉眼的所見ヲ記載シタ。動物ハ大體各期3頭ヲ以テシタ。

標本製作法 金管ヲ含ム組織ヲ肉眼的觀察後10% Formalin 水デ48—72時間固定シタ後金管ヲ拔去シ型ノ如ク Paraffin 包埋ニヨリ組織切片ヲ作製シタ。尙切片ハ金管軸ノ垂直平面ニ一致セシメル様ニ作製シタ。

染色方法 ハ Hämatoxylin-Eosin 染色, van Gieson 染色, Mallory 染色, Weigert 彈力纖維染色, Gram-Weigert, Fibrin 染色ヲ行ヒ組織ノ變化ヲ觀察シタ。

成 績

第1節 Radon 金管ニヨル筋組織ノ變化

1. 對照 家兎 Nr.31 空ノ金管射入後4日。金管周圍ニハ肉眼的ニ全ク變化ヲ認めナイ。

組織學的所見：金管孔ヲ繞リ極ク輕度ノ圓形細胞浸潤ヲ見ルノミデ筋組織ノ變性竝ニ滲出ハ認めナイ。

家兎 Nr.32 空金管射入後12日。金管ノ周圍ニハ肉眼的ニ變化ヲ認めナイ。

組織學的所見：金管孔緣ノ細胞浸潤ハ前者ヨリ

更ニ少ク、金管ハ輕度ニ結締織性ニ包裹サレテキル。

2) 射入後1日 家兎 Nr. 24 (Radon量1.2mc) 金管ノ周圍ニ直徑4mmノ充血部アリ、周圍ノ健常組織ト明確ニ境セラル。壊死部ハ肉眼的ニハ認めラレナイ。

組織學的所見：金管ハ筋纖維走向ニ直角ニ筋肉内ニ射入サレテアリ金管孔ハ正圓ニ現レテキル。

金管ニ接觸シター部ニハ極メテ薄イ壞死層ガアリ
之ヲ繞ツテ筋纖維ノ退行變性ニ陥ツタ薄イ層ガア
リ此層内ニ多核白血球ノ浸潤ガ高度ニ認メラレ、
コレヨリ外側ニハ變性及ビ萎縮ニ陥ツタ數層ガア
リ白血球浸潤ガ輕度ニ存スル。金管ニ近キ部分デ
ハ筋横紋消失シ無構造トナツテキル。浮腫及ビ充
血ハ筋纖維ノ走向ニ一致シテかなり高度デア
ルガ走行ト直角ノ方向ニハ變化ノ及ンダ範圍ハ極メテ
短距離デア
ル。血管周圍ニハ白血球ノ浸潤ト共ニ
Fibrin ノ滲出ガ高度デア
ル。

家兎 Nr. 27 (Radon量 1.2 mc) 肉眼の所見ハ
Nr. 24 ト全く同ジデア
ル。

組織學の所見：Nr. 24 ト略々同様デア
ルガ退行
性變化ハ稍々強度デア
ル。外側ニハ筋組織ノ萎縮、
核ノ變形又ハ濃縮ガ認メラレ
ル。此層内ニ存スル
血管ノ周圍ニハ多核白血球及ビ Fibrin ノ滲出ガ
高度デア
ル。萎縮ノ見ラレ
ル部位ハ未ダ比較
的狭
ク徑約 0.2mm デア
ル。

3) 射入後 4 日 (半減期) (第 1 圖) 家兎 Nr. 22
(Radon 量 1.2mc) 肉眼のニハ金管ニ接シテ灰白
色變性層ガアリ之ヲ繞ツテ充血ガ約 1.5mm ノ半
徑デ存スル。

組織學の所見：金管ハ纖維方向ニ直角ニ射入サ
レテキル。金管孔ニ臨ム壞死層ハ 1 日ノ場合ヨリ
増強シ周圍ノ白血球浸潤モ擴大シテキル。Fibrin
ノ滲出ガ高度デ金管ニ近キ筋組織ハ蠟樣變性ニ陥
ツテキル。退行變性ヲ認メ
ル範圍ハ 1 日ノ場合ヨ
リ擴大シ約 0.4mm デア
ル。

家兎 Nr. 23 (Radon量 1.2mc) 肉眼のニハNr. 22
ヨリ充血層ハ稍々狭ク約 1.2mm デア
ル。金管ヲ
包ミ薄イ變性層ニ存スルコトハ同様デア
ル。

組織學の所見：金管ハ筋纖維走行ニ一致シテ射
入サレテキル。金管孔ニ臨ム壞死層ノ幅ハ未ダ甚
ダ狭イ。外側ノ退行變性層ハ 0.2—0.8mm ノ幅ヲ
有スル橢圓形ヲ呈シ健常組織ニ移行スル。間質ノ
増殖ハ未ダ認メラレナイ (第 1 圖)。

家兎 Nr. 25 及ビ Nr. 26 (Radon 量 1.2mc) 變
化ハ Nr. 22 及ビ Nr. 23 ト略々同様デア
ル。

4) 射入後 8 日 (1/4 減期) (第 2 圖) 家兎 Nr. 18
(Radon 量 1.2mc) 金管ヲ圍ム充血層ハ稍々狭ク
徑 2—3 mm トナツテキルガ、金管ニ直接スル灰
白色變性層ハ殆ド認メラレナイ。

組織學の所見：金管孔ヲ圍ム壞死層ハ 4 日ノ場
合ヨリ更ニ擴大シ附近ニハ充血、白血球浸潤及ビ
Fibrin ノ滲出ガ存在スル。コレヲ圍ム外側ノ筋組
織ニハ蜂窩狀變性並ニ萎縮ガ見ラレ
ル。變化ハ二
方向ニハ 0.3mm、他ノ二方向ニハ 0.6mm ノ橢圓
形ヲ呈スル。

家兎 Nr. 21 (Radon 量 1.2mc) 肉眼のニハ金管
ヲ中心トシテ徑 3 mm ノ充血部ガ認メラレ
ル。

組織學の所見ハ同様デア
ルヲ認メラレ
ルノハ筋
纖維ト直角ノ方向デハ 0.25mm、平行方向デハ 0.3
mm デア
ル (第 2 圖)。

家兎 Nr. 28 (Radon 量 1.0mc) 組織學の所見：
前 2 者ト殆ド同ジ所見デア
ル。

5) 射入後 12 日 (1/3 減期) 家兎 Nr. 19 (Radon 量
1.2mc) 金管ヲ中心ニ直徑 4 mm ノ充血層ガアリ、
金管ニ接シテ約 1.5—2 mm ノ灰白色變性層ヲ透
見スル。

組織學の所見：金管ノ存在シテキタ孔ハ圓形ニ
殘リ此孔緣ニ 2—3 束ノ筋束ガ壞死ニ陥ツテキ
タ 8 日ノ場合ヨリ更ニ變化ハ厚クナツテキル。此附
近ニハ Fibrin ガ強度ニ滲出シ輕度ノ白血球浸潤
ガアル。金管孔ヲ繞ル筋組織ハ萎縮シ金管ヲ遠ザ
カルニ隨ヒ正常組織ニ移行スル。此範圍ハ金管孔
ト略々同心圓ナシ半徑約 0.3mm デア
ル。

家兎 Nr. 20 (Radon 量 1.2mc) 肉眼のニハ徑 3
mm ノ境界明確ナ充血部ガアリ金管ヲ取巻キ 2mm
徑ノ灰白色變性層ガ見ラレ
ル。組織ニ變化ノ認メ
ラレ
ル範圍ハ 0.5mm デア
ル。

家兎 Nr. 29 (Radon 量 1.0mc) 組織學の所見：
變化ハ略々同様デア
ルガ Nr. 19 及ビ 20 ト比較シ
テ稍々輕度デア
ル。

6) 射入後 21 日 (第 3 圖) 家兎 Nr. 15 (Radon 量
1.1 mc) 金管ニ密接シテ灰白色變性層ガアリ其周
圍ニ 3 mm 徑ノ充血層ガアル。

組織學の所見：金管ヲ取巻キ筋組織ノ退行性強
ク、金管孔緣ニハ壞死ニ陥リ Hämatoxylin ニ可
染性ノ無構造組織ガアリ、極ク少數ノ圓形細胞、
白血球ノ浸潤ヲ認メ、Fibrin モ少許滲出シテキ
ル。間質ハ餘リ増加シテキナイ。其周圍ノ筋組織
ハ萎縮ニ陥リ白血球及ビ圓形細胞ノ浸潤ガ強ク漸
次正常組織ニ移行スル。變化ノ認メラレ
ル範圍ハ
徑約 0.8mm デ 12 日ノ場合ヨリ擴大シテキル (第 3

圖)。

家兎 Nr.16 (Radon量 1.1mc) 肉眼的の所見ハ Nr.15 ト略々同様デアル。

組織學的ニハ壊死層ハ Nr.15 ニ比シ稍々厚ク周圍ノ細胞浸潤ハ遙カニ輕度デアル。

7) 射入後35日(放射能消失期) 第4圖) 家兎 Nr.8 (Radon量 1.2mc) 金管ノ周圍ニ存スル變性層ハ稍々厚ク洞濁シ周圍ノ充血層ハ徑約 3mm デ殆ド變化ハナイ。

組織學的の所見：金管ハ筋纖維ノ方向ニ對シテ直角ニ射入サレテキル。金管ノ周圍ニハ筋纖維ノ壊死、退行變性及ビ少シ離レテ萎縮ガ輪狀ニ金管ヲ取巻キ、退行變性部ニハ白血球浸潤ガ可成リ強度デ萎縮部ニ於テハ間質ノ増加ガ見ラレル。van Gieson 染色デハ間質ノ増殖ハ輕度デアルガ變性部ノ變化ハ肉芽組織デナク Fibrose ト云フ可キ所見デアル。即チ筋組織ハ瘢痕ヲ形成セズシテ筋組織ノ硬化ト云フ狀態ニナツテキルノガ認メラレル。變化ヲ認メル範圍ハ 0.8—1.3mm ノ筋纖維方向ニ細長キ橢圓形ヲ呈スル(第4圖)。

家兎 Nr.10 (Radon量 1.2mc) 金管周圍ニ存スル充血層ハ Nr.8 ヨリ稍々狭ク變性層ハ略々同様デアル。

組織學的の所見：變化ハ Nr.8 ト略々同ジデアル。壊死層ハ未ダ少シク殘存スル。間質ノ増加ハ中等度ニ認メラレル。孔緣ヨリ正常組織迄ノ距離ハ約 0.5mm ナルモ筋纖維ノ走ル一方方向ノミハ組織ノ變化ハ深ク進ミ 1.9mm デアル。

第2節 Radon 金管ニヨル膀胱壁ノ變化

1) 對照 家兎 Nr.31 空金管射入後4日、肉眼的ニ金管射入部位ハ全ク變化ガナイ。

組織學的の所見：金管ハ漿膜近クノ筋層内ニ射入サレテキル。射入部位ハ Radon 金管ノ場合ト異リ境界明瞭ナ圓形ノ斷面孔ヲ示サズシテ少シク不規則ナ緣ヲ有スル組織間隙デアル。孔緣ヲ繞リ少數ノ赤血球及ビ白血球遊出ガアルノミデ組織ノ壊死乃至ハ變性ハ全ク認メラレナイ。上皮細胞ニモ異狀ハ見ラレナイ。

家兎 Nr.32 空金管射入後12日、射入部位ハ粘膜面ヨリ膀胱壁内ニ存在スル金管ガ透視シ得ラレ金管ノ周圍ハ肉眼的ニ全ク異狀ガナイ。

家兎 Nr.17 (Radon量 1.1mc) 肉眼的の所見ハ Nr.10 ニ同ジデアル。

組織學的の所見：變化ハ前者ト同様デアル。萎縮部ノ間質増加ハ著明デアル。變化ヲ來セル組織ノ幅ハ比較的狭ク管孔緣ヨリ 0.3mm ヲ示シ金管ヲ中心トシテ圓形ヲナス。

8) 射入後60日(第5圖) 家兎 Nr.3 (Radon量 1.2mc) 金管ノ周圍ニハ金管ヲ含ミ直徑約 2mm ノ灰白色變性層ガアリ組織ハ洞濁不透明化シ、此外側ニハ肉眼的ニ正常ヲ組織ガアリ其境界ハ比較的明瞭デアル。變性層外側ノ充血ハ見ラレナイ。

組織學的の所見：金管ハ筋纖維ト直角ノ方向ニ射入サレテキル。金管ニ直接接觸シタ部位ニハ壊死ニ陷ツタ筋組織ガ薄層ヲナシテ存シ同時ニ多少ノ石灰沈著ト共ニ Fibrin、白血球浸潤ガ可成リ存在スルガ、壊死層ノ幅ハ35日ノ場合ニ比スルト一層狭小トナツテキル。其外側ニハ退行萎縮セル筋組織ガアリ處ニヨツテ結締組織ニ硬化シテキル處モアル。間質ハ可成リ増加シテキル。作用ノ及ンダ範圍ハ稍々偏心性デ金管孔ヲ中心トセズ 0.6—0.9mm、筋纖維ノ方向ニ細長キ橢圓形ヲナス(第5圖)。

家兎 Nr.5 (Radon量 1.3mc) 肉眼的及ビ組織學的の所見ハ Nr.3 ト同ジデ、作用範圍ハ金管壁ヨリ 0.65mm デ金管ヲ中心トスル同心圓ヲナス。

家兎 Nr.6 (Radon量 1.3mc) 所見ハ Nr.3 ト同様デ變化ヲ來セル大サハ金管壁ヨリ 0.5mm デアル。

組織學的の所見：金管ハ筋層中央ニ射入サレテキル。金管孔緣ハ4日ノ場合ト比較スルト境界明瞭トナリ孔緣ニハ薄キ白血球浸潤層ガアリ、此外側ニハ増殖セル結締組織ノ薄層ガアツテ金管ヲ包裹セントシテキル。金管周圍ノ組織ニ壊死又ハ變性ハ全ク認メラレナイ。

2) 射入後1日(第6圖) 家兎 Nr.24 (Radon量 1.2mc) 金管ヲ中心ニシテ金管ヲ長徑トセル橢圓形ノ充血ヲ認メル。充血層ノ幅ハ金管ノ方向ニハ稍々狭ク金管ト直角方向ニハ廣イガ其差ハ僅少デアル。金管ト直角方向ノ充血層ノ幅ハ徑 5mm デアル。

組織學的所見：金管ハ膀胱粘膜直下ニ射入サレテキル。從ツテ金管直上ノ上皮細胞ハ全ク脱離シテキル。粘膜下層ハ退行變性ニ陥リ其原形質ハ均質化シ核濃縮ニ陥ツテキル。金管孔ニ直接スル處ニハ薄イ壞死層ガアリ、核破壞物質、Fibrin 及ビ多核白血球デ充サレテキル。之ニ外接スル組織ハ浮腫著明デ膨大シ粗鬆トナリ高度ニ擴張セル血管ハ赤血球デ充サレ多核白血球ノ浸潤ガ中等度ニ存シ膀胱外側ノ漿膜迄及ンデキル。血管擴張ハ金管孔ヲ距ル 2mm ノ處迄ヲ認メル。彈力纖維ハ壞死層デハ破壊サレテキルガ其周圍ニ於テハ異常ヲ認メナイ。

家兎 Nr. 27 (Radon 量 1.2mc) 比較的粘膜側ニ近ク射入サレタモノハ 7mm 横徑ノ橢圓形充血部ガ粘膜面ニ認メラレル。

組織學的所見：組織ノ變化ハ Nr. 24 ト略ク同様デ白血球浸潤ハ約 0.2mm デ薄イ層ヲナス。粘膜下層ノ結締織ハ輕度ニ膨大シ其上部ニアル上皮細胞ハ蜂窩狀ニ腫脹シ或ハ壞死ニ陥ツテキル。核ノ變化ハ比較的少イガ核濃縮ガ認メラレル (第 6 圖)。

筋層ノ中央ニ射入セラレタモノハ粘膜面近クノ場合ト異リ粘膜下層ハ多少浮腫狀デ其上ノ上皮細胞モ輕度ニ腫脹セル程度デアル。金管周圍ノ變化ハ略ク同様ノ所見デアル。彈力纖維ハ組織ノ壞死ニ陥レル部分デハ消失シテキルガ其周圍ニ於テハ變化ガナイ。

家兎 Nr. 30 (Radon 量 1.0mc) 4mm ノ間隔ヲ以テ 2 本ノ金管ガ射入サレテキル。粘膜面ハ全般的ニ發赤充血シテキル。射入部位ニ充血以外ノ著明ナ肉眼的變化ハ認メラレナイ。

組織學的所見：金管ハ筋層ノ略ク中央ニ射入サレテキル。變化ハ Nr. 27 ト同様デアル。2 本ノ金管ノ中間ニ於テハ白血球浸潤、赤血球溢出、結締織ノ膨大ガ著明デ Fibrin ノ滲出モ亦高度ニ認メラレル。

3) 射入後 4 日 (半減期) (第 7, 8 圖) 家兎 Nr. 22 (Radon 量 1.2mc) 金管ノ周圍ニハ出血ガアリ此外側ニ充血ガ著明デアルガ外方ハ不明瞭デ充血層ノ範圍ハ測定困難デアル。

組織學的所見：金管ハ筋層内ニ射入サレテキル。金管ヲ圍ム壞死層ハ 1 日ノ場合ヨリ擴大シ 0.15—0.2mm トナリ、白血球浸潤モ増強シ且厚クナリ

(0.5mm)、コレニ隨ツテ組織ノ壞死モ擴大シテキル。粘膜下層ノ結締織ハ膨大シテ壞死ニ陥リ其表面ニ存スル上皮細胞ハ大部分脱落シ其變化ハ不明デアルガ一部殘存セル上皮ハ蜂窩狀トナツタリ或ハ收縮シタリシテキル。金管孔下ニ存スル筋組織ハ泡狀ニ退行變性ヲナシテキル。浸潤部位ノ彈力纖維ハ減少シテキル。即チ變化ハ粘膜方向及ビ粘膜面ニ平行方向ニ強ク進行シ約 0.6mm デアルガ筋層方向 (膀胱外ノ方向) ニハ狭ク約 0.3mm デアル。

粘膜下層ノ下ニ射入セラレタ部分ハ結締織ハ一層粗鬆トナリ退行變性ガ強ク認メラレル (第 7 圖)。

家兎 Nr. 23 (Radon 量 1.2mc) 金管ハ粘膜直下ニ存スル爲金管ヲ包ムガ如ク周圍ニ薄キ灰白色變性層アルノガ透視セラレ、此外圍ニ半徑約 6mm ノ充血層ガアル。膀胱外面ハ充血輕度デ且其境界ハ不明瞭デアル。

組織學的所見：金管ハ上皮層直下ニ射入セラレテキル。變化ハ Nr. 22 ト略ク同様デアルガ金管ガ上皮層ニ近キ爲粘膜面ニ於テハ上皮ハ既ニ全ク失ハレ潰瘍ヲ形成シ將ニ破潰シテ金管ヲ排出セントシテキル所見ガ見ラレル。金管ヲ繞ル他ノ部分ノ變化ハ比較的深部ニ進行セズ、壞死層ニ隣接スル筋組織ニ泡狀變性ガ輕度ニ認メラレル。結締織ニ退行變性ノ認メラレル範圍ハ粘膜平行方向ニ於テ約 0.6mm デアル (第 8 圖)。

家兎 Nr. 25 (Radon 量 1.2mc) 金管ヲ圍ミ直徑 9mm ノ充血部ヲ見ル。

組織學的所見：金管ハ粘膜直下ニ射入セラレタ爲上皮ハ既ニ脱落シ直下ノ組織内ニ出血ガアル。變化ハ Nr. 23 ト略ク同ジデアル。

家兎 Nr. 26 (Radon 量 1.2mc) 金管ヲ中心ニ徑 1cm ノ充血ヲ認メル。

組織學的所見：金管ハ粘膜下層ノ下方ニ存シ變化ハ Nr. 22 ト略ク同様デアル。

4) 射入後 8 日 (1/4 減期) (第 9 圖) 家兎 Nr. 18 (Radon 量 1.2mc) 膀胱粘膜ハ血管擴張ガ著明デ充血シテキル。漿膜近クニ射入サレタ金管ノ周圍ニハ灰白色ノ變化層ガ金管ヲ取卷イテキルノガ透見シ得ラレル。粘膜下ニ入りタルモノニハ變性層ハ殆ド見ラレナイ。金管周圍ノ充血ハ膀胱ノ收縮狀態ニ於テ 4—5mm デアル。

組織學の所見：金管ハ筋層内ニ射入セラレテキル。金管孔ヲ繞ル壞死層ハ更ニ擴大シテ組織ハ均質性トナリ核破壞物質ト共ニ白血球浸潤及ビ充血ガ強度ニ見ラレル。上皮細胞ハ大部分脱落シテキルガ殘存セルモノハ泡狀變性ガ認メラレル。粘膜下層ノ結締織ハ退行變性ニ陥リ白血球ノ浸潤ガ高度デ壞死ハ表面ニ向ツテ進行シツ、アル傾向ヲ示ス。金管孔附近ノ筋組織ニハ蠟燭變性ガ認メラレル。退行變性ヲ認メル範圍ハ粘膜面ト平行方向ニ0.7—0.8mm デ4日ノ場合ヨリ變化ハ更ニ擴大シテキル(第9圖)。

家兎 Nr. 21 (Radon 量 1.2 mc) 金管ハ粘膜直下ニ入レル爲粘膜面ニ幅 3 mm ノ灰白色變性部ヲ認メル。其周圍ニハ半径 3 mm ノ充血層ガ之ヲ繞ツテキル。漿膜側ニハ金管ニ相當シテ點狀出血ヲ認メル。

組織學の所見：壞死ハ表面ノ方向ニ進行シ上皮細胞ニ近イ所ハ白血球ノ浸潤ガ強く、粘膜下層ノ退行變性ガ強クナリ表面ニ壞死竈ガ破潰シ潰瘍化セントスル像ガ見ラレ、其表面ニハ壞死物質ガ附著シテキル。上皮細胞ハ既ニ脱落シテ見ラレナイ。筋層ニ近キ所ハ0.15mm ノ間ガ結締織性トナリ白血球ノ浸潤モ4日ノ場合ヨリ稍々輕度トナリ結締織ガ少シク膨大シテ Fibrin 滲出ガ輕度ニ認メラレル。彈力纖維ノ變化ハ著明デナイ。變化ノ認メラレル範圍ハ金管孔緣ヨリ 0.8mm デアル。

家兎 Nr. 28 (Radon 量 1.0 mc) 肉眼の所見ハ前2者ト大差ハナイ。

組織學の所見：金管ハ粘膜ヨリ稍々遠ク筋層内ニ射入サレテキル。變化ハ前標本ト同様デアル。粘膜下層ハ却ツテ薄クナリ核濃縮ニ陥ツテキル。上皮細胞ハ著明ニ膨大シテキル。滲出層ノ外側ニハ孔緣ヨリ 0.5mm ノ距離ニ於テ輕度ノ結締織ノ増殖ガ既ニ認メラレル。

5) 射入後12日(1/8減期) 家兎 Nr. 19 (Radon 量 1.2 mc) 粘膜ニ接近シテ射入セラレタ金管ノ周圍ニハ灰白色ノ變性層ガ僅カニ透見シ得ラレ、粘膜面ノ充血、血管擴張強ク徑約 9 mm デアル。外側ヨリ斜メニ粘膜下ニ入リタル金管デハ粘膜面ニ横徑 8mm ノ略々橢圓形ヲ呈スル充血斑ガ認メラレル。金管ノ周圍ニハ出血ヲ見ル。

組織學の所見：金管ハ粘膜下層ニ射入サレテキ

ル。金管孔ニ臨ム組織ハ壞死ニ陥リ、其周圍ニハ Fibrin 及ビ白血球ノ浸潤ガ中等度ニ存シ、浮腫及ビ充血モ可成リノ程度ニ見ラレルガ8日ノ場合ヨリ輕度デアル。此外側ニハ結締織ノ増殖ガ輕度ニ認メラレ、附近ノ筋纖維ハ萎縮ニ陥ツテキル。粘膜下層ハ肥厚シ擴張セル血管竝ニ充血ガ強度デ結締織ノ増殖ガ高度デアル。附近ノ上皮細胞ハ輕度ノ膨大ヲ示シ基底層ニ細胞ガ増加シテキル。退行變性ノ認メラレル層ノ金管壁ヨリノ距離ハ8日ノ場合ヨリ著シク狭クナリ 0.5mm デアル。

家兎 Nr. 20 (Radon 量 1.2 mc) 粘膜下ニ入リ 8.5mm ノ充血部ト金管ニ密接スル出血部ヲ見ル。

組織學の所見：金管ハ上皮直下、粘膜下層ヨリ筋層ニカケテ存スル。變化ハ Nr. 19 ト略々同様デアルガ白血球浸潤ガ稍々輕度デアル。組織ノ退行變性ノ認メラレル範圍ハ金管壁ヨリ 0.5mm デ其外側ニハ結締織ノ増殖ガ見ラレル。深部ヘノ變化ハ淺ク約 2 分ノ1 デアル。

家兎 Nr. 29 (Radon 量 1.0 mc) 粘膜ノ充血ハ 7 mm デアル。

組織學の所見：金管ハ筋層中央ニ射入サレテキル。變化ハ前2者ト同様デアル。8日ノ場合ト異ル點ハ浸潤層ニ於ケル組織ガ無構造ニ均質化シ從ツテ變性層ガ8日ノ場合ヨリ著シク明確ニナツテキルコトデアル。變化ヲ認メル範圍ハ8日ト略々等シク 0.7mm デアル。粘膜下層ハ肥厚ガ著明デ結締織ノ増殖ガ高度デアル。上皮細胞ハ寧ろ萎縮シテキル如ク見エル。

6) 射入後21日(第10圖) 家兎 Nr. 15 (Radon 量 1.1 mc) 金管周圍ニ存スル粘膜ノ充血ハ12日ノ場合ト比較スレバ狭小トナリ約 6 mm デアル。金管ニ密接スル灰白色變性層ハ著明ニ認メラレル。

組織學の所見：金管ハ漿膜ニ近キ筋層内ニ射入サレテキル。金管孔ニ臨ム部分ハ Eosin 可染性ノ薄キ壞死層ガアリ此外側ニ可成リ強度ノ Fibrin 滲出ト共ニ極ク輕度ノ充血及ビ白血球ノ浸潤ガ認メラレル。結締織ノ膠原化ガ著明デアル。此層内ニ存スル筋組織ハ退行變性ニ陥リ、コレヨリ少シク離レタ處ニハ萎縮ガアル。此外側ニハ結締織ノ増殖セル層ガ之ヲ取巻ク。金管孔緣ヨリ此増殖層迄ノ距離ハ粘膜面ニ平行方向ニ於テハ 0.5mm デアルガ、粘膜面ニ向ツテハ約 1.0mm デ結締織増殖

ニヨリ肥厚セル粘膜下層ニ移行シ、此境界部ニ白血球及ビ圓形細胞ノ浸潤ガ認めラレル。上皮細胞ハ膨大シ基底層ニ細胞ガ増加シテキル。彈力纖維ニハ餘リ變化ハ認めラレナイ。

家兎 Nr. 16 (Radon 量 1.1 mc) 組織學の所見：膀胱壁ノ略々中央ニ射入セラレタモノハ Nr. 15 ト全ク所見ハ等シイ。粘膜下層ニ射入セラレタモノデハ該部ノ浸潤ガ強く壊死竈ハ粘膜面ニ破潰セントシテ上皮細胞ハ既ニ脱落シテキル。深部方向ノ變化ハ Nr. 15 ト略々同ジク、金管孔縁ヨリ外圍スル結締組織増殖層迄ハ最短 0.4 mm デアル。要スルニ 12 日ノ場合ト比較シテ變化ハ擴大セズ、急性炎ノ像ハ輕度トナリ結締組織ノ膠原化ガ著明トナツテ來テキル (第 10 圖)。

家兎 Nr. 14 (Radon 量 1.1 mc) 組織學の所見：金管ハ漿膜近クノ筋層内ニ射入セラレテキル。變化ハ Nr. 15 ト同様デアルガ、膨大セル結締組織内ニ充血ガ未ダ著明デ、此外側ノ新生結締組織ニヨル被包ハ稍々廣ク金管孔縁ヨリ 0.5 mm ニ始マル、粘膜ハ金管周圍ノ硬化性變化ノ爲強く牽引セラレ瘢痕性ニ陥凹ヲ示シテキル。上皮細胞ニハ一部膨大ガ見ラレ、粘膜下層ニハ結締組織ノ硬化ヲ認メル。

7) 射入後 35 日 (放射能消失期) (第 11 圖) 家兎 Nr. 8 (Radon 量 1.2 mc) 金管ハ膀胱腔内ニ既ニ脱落シ粘膜面ニ小陥凹アリ、其周圍ハ噴火口縁狀ニ隆起シ之ヲ繞ル血管ノ擴張ヲ見ルガ 21 日ノ場合ヨリ更ニ狭小且其程度ハ輕減シテキル。

組織學の所見：陥凹部ハ邊緣ニ上皮細胞ヲ殘スモ大部分ハ脱落シ潰瘍面ヲ形成シ少量ノ壊死物質ヲ附著スル。潰瘍ハ輕度下縁シ潰瘍縁ニハ白血球浸潤及ビ充血ヲ中等度ニ認メル。潰瘍底及ビ其深部ハ纖維性トナリ組織ノ硬化ガ著明デ收縮ガ生ジテキル。此廣サハ徑 2.0 mm デアル。其周圍ニハ萎縮ニ陥ツタ筋纖維ヲ見ル。潰瘍底ニ於テハ彈力纖維ガ減少シテキル。筋層ノ中央部ニハ金管射入ノ際ニ生ジタト覺シキ孔ガアリ、邊緣ニハ白血球ノ浸潤ガ高度デアルガ、附近ノ組織ニハ大ナル變化ヲ認め難イ。

家兎 Nr. 10 (Radon 量 1.2 mc) 金管ハ膀胱壁ノ中央ニ位置シ金管ヲ圍ミ白色不透明ナル變性層ガ僅カニ存在シ其周圍ニハ充血ハ輕度ニ存在シ粘膜面ニハ著明ニ擴張セル血管ガ金管ヲ中心ニ放線狀

ヲナシテキル。

組織學の所見：金管ハ膀胱壁ノ略々中央ヨリ粘膜層ニ稍々近ク筋層内ニ射入サレテキル。金管孔縁ニ臨ンデ存シタ壊死組織ハ略々吸收セラレテ消失シ其痕跡ヲ殘スノミデアル。van Gieson 染色ニヨルト金管ノ周圍ニハ膠原纖維ノ増殖ガ著明デ筋組織ニハ輕度ノ萎縮ガ認めラレル。此處ニハ極ク僅カノ圓形細胞及ビ白血球ノ浸潤竝ニ輕度ノ充血ガ認めラレル。多少 Fibrin モ殘存シテキル。粘膜下層ハ纖維化ガ可成リ著明デアリ、上皮細胞ハ周圍ト比較シテ大ナル變化ハ見ラレナイガ多少萎縮性デ、粘膜下層ニハ輕度ノ圓形細胞浸潤ガアル。彈力纖維ハ差シテ増加シテキナイ。結締組織増殖層ハ粘膜ト平行方向ニ於テ金管孔縁ヨリ 0.65 mm デアル (第 11 圖)。

家兎 Nr. 17 (Radon 量 1.1 mc) 金管ハ既ニ脱落シ粘膜面ニハ點狀ノ出血點ガアリ陥凹シテキル。金管ノ脱落時期ハ不明デアル。

組織學の所見：金管ノ存在シテキタト思ハレル部位ハ粘膜面ガ陥凹シ膀胱壁ノ厚サハ從ツテ減少シ瘢痕性ニ收縮シテキル。上皮細胞ニハ殆ド變化ガナイガ、上皮直下ニ出血ヲ認メル。粘膜下層ハ著シク肥厚シ硬化シテ此處ニモ出血ガ少許認めラレ白血球モ少數遊出シテキル。コレヨリ筋層部ニカケテハ組織ノ硬化ガ見ラレ附近ノ筋組織ハ萎縮シテキル。硬化ノ強キ部位ニハ彈力纖維ハ稍々増加シテキル。

8) 射入後 60 日 (第 12 圖) 家兎 Nr. 3 (Radon 量 1.2 mc) 金管ヲ中心ニ横徑 5 mm ノ橢圓形ノ充血部アリ其境界ハ比較的明確デアル。金管ニ密接スル灰白色不透明層モ稍々狭小トナツテキル。即チ肉眼的ノ變化ハ 35 日ノ場合ヨリ一層縮小シテキルガ其境界ハ却ツテ明確トナツテキル。

組織學の所見：金管ハ粘膜下層ノ直下ニ射入サレテキル。金管ヲ圍ンデ纖維ノ膠原化ガ著明デ金管ヲ包ムガ如ク、此中ニ圓形細胞浸潤ガ中等度ニ認めラレ、其周圍組織ニハ炎症性浮腫ヲ缺キ纖維化スル傾向ガ少イ。金管ヲ圍ム瘢痕ハ組織ノ萎縮ガ未ダ多少殘ツテキル。粘膜下層ハ肥厚シ硬化及ビ圓形細胞浸潤ヲ可成リノ程度ニ認メル。上皮細胞ニハ大ナル變化ヲ認めナイ。彈力纖維ノ増加ハ殆ド見ラレナイ。組織ニ變化ヲ起シテキル範圍ハ

比較的狭ク金管孔ヨリ 0.6mm デアル (第12圖)。

家兎 Nr. 5 (Radon 量 1.2mc) 金管射入部位ハ漿膜ニ近キ筋層内デ該部ハ膀胱壁肥厚シ輕度ノ充血ヲ附近ニ認メルガ Nr. 3 ヨリ輕度デ且明確デナイ。

組織學的所見：金管孔ハ漿膜下筋層内ニアリ。金管孔ニ面シタ組織ニハ結締織ガ均等ニ硝子化シ壞死ハ認メラレズ瘢痕性ニ萎縮セル像ガ認メラレル。附近ニハ輕度ノ圓形細胞浸潤ガアリ、正常ノ筋組織ハ消失シテキル。粘膜ノ上皮細胞ハ略々正常ニ再生シテキル。粘膜下層ハ瘢痕性ニ收縮シ膀胱形成シ筋纖維ノ斷裂及ビ消失ガアル。彈力纖維ハ増加シテキナイ。

家兎 Nr. 6 (Radon 量 1.2 mc) 金管ハ既ニ脱落シ該部ハ膀胱壁肥厚シ、脱出部位ノ粘膜面ハ陷凹シテ潰瘍ヲ形成シテキル。附近ニ充血ハ最早ヤ認メラレナイ。金管脱落時期ハ不明デアル。

組織學的所見：金管ハ既ニ脱落シ該部ハ陷凹ヲ示シテ潰瘍ヲ形成シ其表面ニハ壞死ニ陷ツタ物質ヲ附著スル。潰瘍ハ少シク下縁シ潰瘍縁ニハ白血球ノ浸潤ガ中等度ニ存スル。潰瘍底ハ纖維性瘢痕トナリ收縮シ組織ノ硬化ガ著明デアル。潰瘍底ニ於テハ彈力纖維ガ殆ド消失シテキル。潰瘍底下ノ組織ニ變化ノ起レル幅ハ 2.0mm デアル。

第3節 總 括

Radon 金管ニヨル正常筋組織ノ變化 家兎背筋内ニ Radon 毛細管ヲ射入シタ場合ノ變化ハ射入後 1 日ニシテ已ニ著明ナ變化ヲ認メル。即チ肉眼的ニハ金管ヲ包ムガ如ク之ト同心圓ヲナシ且周圍健常組織トノ境界明瞭ナ充血層ヲ認メル。組織學的ニハ金管ニ接シタ組織ノ壞死ヲ既ニ認メルガ是ハ未ダ極メテ薄イ。此外側ニ於テハ組織ノ浮腫、充血、Fibrin 滲出ト共ニ高度ノ白血球浸潤ヲ認メ、筋組織ハ腫脹シ泡狀變性ヲ來ス。此退行變性層ノ直グ外側ニハ筋組織ノ萎縮ガ見ラレルガ、之等ノ變化ハ金管ヲ遠去カルニツレテ稍々急速ニ健常組織ニ移行シ此幅ハ未ダ著シク狭小デアル。金管ヲ遠ク離レタ血管周圍ニハ細胞浸潤、Fibrin 滲出等ガアリ肉眼的ニ認メラレル充血層ニ一致シタ距離ニ於テ是等ヲ觀察シ得ラレルガ、組織學的ニ之等ノ境界ヲ定メル事ハ困難デアル。射入後 4 日目 (3.85 日)ニ於テハ金管ヲ繞ル充血層ノ大サニハ餘リ變化ハナイガ、金管ニ密接シテ灰白色不透明ナ薄層ヲ生ジ金管ヲ包裡シ、金管ニ直接接觸シタ組織ニ變性ガ發生セルヲ肉眼的ニ明カニ認メルコトガ出來ル。組織學的ニハ最内側ノ壞死層ハ 1 日ノ場合ヨリ擴大シテキルガ未ダ甚ダ狭イ。之ヲ繞ツテ筋組織ノ退行變性、Fibrin 滲出、白血球浸潤等ノ變化ガ存スルコトハ 1 日ノ場合ト同様デアルガ、變化ハ擴大シテ其幅ハ平均 0.25mm トナル。8 日目 (7.7 日)ニ於テハ壞死層ハ一層擴大シテ之ニ外接スル變性モ細胞浸潤等ト共ニ進行シテ更ニ高度トナルガ、變性層ノ厚サハ平均 0.3mm デ 4 日ノ場合ヨリ稍々擴大セルノミデアル。間質ノ増殖ハ未ダ認メラレナイ。射入後 12 日 (11.6 日)、Radon ノ放射能ガ $1/3$ ニ減弱セル場合ニ於テハ肉眼的ニ觀察シ得ル金管周圍ノ充血層ノ廣サハ殆ド變化ガナイガ灰白色不透明ナ變性層ハ稍々厚クナル。組織學的ニモ最内側ノ完全壞死層ハ 8 日ノ場合ヨリ更ニ厚サヲ増シ核破壊物質ヲ混ジ Hämatoxylin ニ濃染スル。之ニ外接スル變性浸潤層ハ平均 0.4 mm デ 8 日ノ場合ヨリ更ニ擴大シテキルガ白血球浸潤ハ反對ニ著シク減弱シテキル。最外側ニハ萎縮セル筋束ガ漸次健常筋組織ニ移行シテキル。21 日ヲ經過シタルモノニ於テハ肉眼的ニ見得ル充血層及ビ變性層ノ大サハ少シモ増減シナイガ、變性層ハ一層明瞭トナル。組織學的ニハ

金管孔＝面スル壊死層ハ無構造且明確トナルガ其大サヲ増サナイ。之ヲ圍ム變性層＝於テハ炎症像ハ更ニ輕減スルガ蠟樣變性＝陷ツタ筋組織ト周圍ノ健常組織トノ境界ハ稍ミ明瞭トナリ且其大サモ擴大シテ平均 0.6mm トナル。而シテ變性層＝於ケル筋組織ノ再生ハ認メラレナイガ、間質ノ増加ヲ可成リノ強度＝證シ得ル。射入後35日ヲ經過シテ Radon 金管ノ放射能ガ全ク消滅シタ場合＝於テハ金管＝密接セル不透明層ハ多少厚ク且境界明瞭トナルガ之ヲ圍繞スル充血層ノ大サハ變化シナイ。組織學的ニハ最内層ノ壊死層ハ吸收セラレテ狹小トナリ此外側＝存スル浸潤變性層ハ組織ガ無構造化シ Fibrose ト謂フ可キ狀態トナル。組織ノ變性及ビ萎縮ハ漸次明瞭トナリ其幅ハ平均 0.6mm デアル。60日ヲ經タル場合ハ金管周圍ノ不透明層ハ擴大シ且境界明瞭トナルガ周圍ノ充血層ハ著シク減弱スル。組織學的ニハ壊死層ハ一層狹小トナリ之ヲ圍繞スル浸潤變性層＝於ケル白血球浸潤ハ更ニ輕減シ組織ノ再生ナク癆痕性＝硬化シテ恰カモ金管ヲ被包スルガ如キ狀態トナル。間質ハ35日＝於テ稍ミ増加シ來ル。射入後 198 日＝於テハ周圍ノ充血ハ全ク認メラレズ灰白色癆痕ガ金管ヲ取巻キ、組織學的ニハ壊死組織ハ全ク吸收セラレテ消失シ新生セル結締織ヲ以テ包裡セラレル。

對照トシテ空金管ヲ射入シタ場合＝於テハ射入後 4 日及ビ12日ヲ經過スルモ肉眼的ニハ金管周圍＝全ク變化ヲ認メズ、組織學的ニモ管孔周縁＝白血球遊出ヲ少許認メルノミデ上述ノ如キ變化殊ニ組織ノ變性、壊死等ハ全ク之ヲ認メ得ナイ。

Radon 金管ニヨル膀胱壁ノ變化 家兎膀胱壁＝Radon 金管ヲ射入スル時ハ筋肉＝於ケルト同様射入後 1 日ヲ經過スル＝已ニ著明ナ變化ガ惹起セラレル。即チ射入部位ノ粘膜面＝ハ横徑平均 6 mm ノ橢圓形充血斑ヲ生ジ血管擴張ガ著明デアル。組織學的ニハ金管＝接觸シタ最内側＝ハ既ニ薄イ完全壊死層ガ認メラレ、核破壊物質及ビ Fibrin ラ混ジ Hämatoxylin ニ濃染スル。此外側＝ハ組織ノ浮腫、多核白血球ノ浸潤、充血等ノ存スル浸潤變性層ガアル。金管ガ粘膜近ク射入セラレタ場合ハ粘膜下層ハ著明ナ變化ヲ被リ高度ノ浮腫＝ヨリ其結締織ハ粗鬆トナリ白血球浸潤、充血ト共ニ退行變性强ク、其上部＝存スル上皮細胞ハ膨大シ核膨化ガアリ又ハ剝離脱落スル。金管ガ粘膜面＝稍ミ遠キ場合ハ上皮及ビ粘膜下層ノ變化ハ比較的輕微デアル。完全壊死層＝於テハ彈力纖維ハ破壊消失スルガ浸潤變性層＝於テハ保タレテキル。3.85 日ヲ經過スルト金管ヲ圍ム充血層ハ稍ミ擴大シ平均 8 mm トナリ且金管＝密接シテ灰白色不透明ナ變性層ヲ透見シ得ルニ至ル。組織學的ニハ最内側ノ壊死層ハ擴大シテ厚クナリ(0.2mm)、外側ノ浸潤層モ擴大シテ 0.6mm トナリ且變化ガ高度トナル。金管＝近キ筋組織ハ膨大シ輕度ノ泡狀變性が認メラレル。金管ガ粘膜面＝近キ場合ハ粘膜下層ハ壊死＝陷リ上皮細胞ハ脱落シ粘膜面＝向ツテ破潰シ潰瘍ヲ形成セントスルノガ認メラレル。斯ル場合＝於テハ深部ヘノ變化ハ比較的輕微デアル。彈力纖維ハ壊死層ヲ除イテハ保タレテキル。射入後 8 日目＝於テハ肉眼的ニ見ラル、金管周圍ノ充血層ノ擴大ハ最早ヤ認メラレナイガ變性層ハ増大シ 3 mm トナル。組織學的ニハ壊死層ハ 4 日目ノ場合ヨリ厚ク平均 0.3mm トナリテ均一性ヲ加ヘ之ヲ圍繞スル浸潤變性

層モ更ニ周圍ニ向ツテ擴大シ 0.8mm ニ達スル。此滲出層ニ於テ金管ニ近キ筋組織ハ蠟樣變性が認めラレル。粘膜直下ニ射入セラレタモノハ4日目ニ於ケル變化ト同様ノ所見デアルガ之ニ比較シテ更ニ一層高度デアル。射入後12日ヲ經過シタモノデハ肉眼的ニ認めラレル充血層及ビ變性層ノ大サハ餘リ大ナル増加ハ認めラレナイ。組織學的ニハ最内側ノ壞死層ハ最早ヤ擴大セズ、之ヲ圍ム滲出層ニ於テモ組織ノ浮腫、白血球ノ浸潤、充血等ハ8日ノ場合ヨリ寧ロ輕減シ變性組織ノ均等性竝ニ層内ニ存スル筋組織ノ退行變性及ビ萎縮ハ漸ク明確トナリ、此外側ニハ結締織ノ新生ガ輕度ニ認めラレル。粘膜下層ニハ結締織ガ増殖シ上皮細胞ハ再生ノ像ヲ示ス。變性層ノ幅ハ平均0.6mmデアル。21日ヲ經過スルト金管ヲ圍繞スル充血層ハ稍ミ狹小トナリ不透明層ハ境界明瞭トナル。組織學的ニハ壞死層ハ吸收セラレテ狹小トナリ浸潤變性層ハ周圍ニ擴大セズ滲出機轉ハ減退消失シ組織ハ均質化シ結締織ニヨル硬化ガ著明トナル。最外層ニ於ケル結締織ノ増殖ハ一層著明トナル。射入後35日、放射能ノ全ク消失セル時期ニ於テハ金管周圍ノ充血ハ稍ミ消褪シ擴張セル血管ヲ認め、金管ノ存スル部位ハ癰痕性ニ牽引陷凹スル。組織學的ニハ壞死層ハ更ニ狹小トナリ變性層ハ硬化シテ恰モ金管ヲ包裹スルガ如ク、最外層ノ新生結締織層ハ厚クナル。粘膜下層ハ硬化シ上皮細胞ノ變化ハ金管ガ稍ミ遠イ場合ハ細胞體ノ膨大ト基底層ノ細胞増加ヲ認めルガ金管ノ近く存スル場合ハ脱落シタ上皮ハ未ダ再生サレナイ。退行變性ニ陷ツタ筋組織ノ再生ハ認めラレズ、彈力纖維ノ増加モ亦著明デナイ。金管ガ既ニ膀胱腔内ニ排泄セラレタ跡ハ潰瘍トナリ附近ニハ白血球ノ浸潤ト共ニ組織ノ硬化が見ラレル。60日ヲ經タル場合ニ於テハ肉眼的變化ハ幾分縮小スルト共ニ一層明確ニナツテ來ル。組織學的ニ認めラレル變化ハ35日ニ於ケル夫レガ更ニ強化セラレ硝子化シタ層内ニ於ケル筋組織ハ消失シ組織ノ再生ナク、從ツテ癰痕ヲ形成スルコトナクシテ Fibrose ト謂フ可キ狀態トナル。上皮細胞ニハ殆ド變化ヲ認めナイガ脱落セルモノハ未ダ再生サレナイ。最外層ナル新生結締織層迄ノ距離ハ孔緣ヨリ平均0.7mmデ Radon 金管射入ニヨリ變化ヲ生ジタ最大距離(射入後8乃至12日)ニ略ミ等シイ。

對照トシテ射入セル空金管ノ周圍ニハ射入後4及ビ12日ニ於テモ肉眼的ニ何等變化ヲ認めズ組織學的ニモ金管周圍ニ少數ノ白血球浸潤ヲ認めルノミデ組織ノ壞死又ハ變性ヲ全ク認めナイ。

結 論

家兎膀胱壁及ビ背筋内ニ 1.0—1.3mc ノ Radon 毛細金管ヲ射入シテ生ズル肉眼的竝ニ組織學的變化ヲ射入直後ヨリ 2 ヶ月ニ亘リ觀察シテ次ノ如キ所見ヲ得タ。

家兎背筋ニ射入シタ場合ハ、

1) 射入後1日ニシテ金管周圍ニ著明ナ充血層ヲ認め組織學的ニハ金管ヲ圍ミ内側ヨリ壞死層、退行變性層及ビ萎縮層ヲ認めル。壞死層ハ極メテ薄ク核破壞物質ヨリ成リ Fibrin ノ滲出ヲ認め、退行變性層ニハ組織ノ浮腫、充血、白血球浸潤ト共ニ筋組織ノ退行變性ヲ見ル。之等

小松論文附圖

第 1 圖 射入後 4 日

第 2 圖 射入後 8 日

第 3 圖 射入後 21 日

第 4 圖 射入後 35 日

第 5 圖 射入後 60 日

第 6 圖 射入後 1 日

小松論文附圖

第 7 圖 射入後 4 日

第 8 圖 射入後 4 日

第 9 圖 射入後 8 日

第 10 圖 射入後 21 日

第 11 圖 射入後 35 日

第 12 圖 射入後 60 日

ノ幅ハ極メテ薄ク殊ニ變性竝ニ萎縮層及ビ健常組織トノ境界ハ明瞭デナク急激ニ健常組織ヘ移行シ、且肉眼的ニ明確ナ充血層ノ境界ハ之ヲ組織學的ニ明示スルコトハ困難デアル。

2) 射入後4日目ニハ之等ノ變化ハ擴大シ且強度トナリ、8日目ニハ更ニ變化ハ増大シ12日目ニ最高ニ達シ、退行變性層ハ幅 0.4mm ニ達スル。

3) 21日ヲ經過スレバ之等ノ急性炎症像ハ輕減シ來リ、壞死層ハ狹小ナリ退行變性層ハ均質無構造化シ其境界ハ漸ク明瞭トナリ其幅ハ 0.6mm ニ達スル。

4) 35日及ビ60日ヲ經過スレバ變化ノ生ジタ組織ノ限界ハ益々明確トナリ Fibrose ノ狀態ヲ呈シテ癰痕性ニ金管ヲ被包スル。

家兎膀胱壁ニ射入シタ場合ニハ、

1) 射入後1日ニシテ粘膜面ニ著明ナ充血及ビ血管擴張ヲ見、組織學的ニハ金管ヲ圍ミ壞死層、退行變性細胞浸潤層ガ認メラレル。粘膜面ニ近ク射入サレタ場合ハ粘膜下層ノ變化ハ特ニ高度デ上皮細胞及ビソノ核ノ膨大又ハ脱落ヲ來ス。

2) 4日目ニハ充血層ハ稍々擴大シ金管ニ密接シテ灰白色變性層ノ發生ヲ認メ組織學的變化モ高度トナリ筋組織ニモ退行變性ガ生ズル。壞死層ニ於テハ彈力纖維ハ消失スルガ其他ノ部位ニ於テハ保タレテキル。粘膜面ニ近ク射入サレタ場合ハ粘膜ハ破潰サレ潰瘍ヲ形成スル。射入後8日目ニ至レバ變化ハ更ニ一層高度トナリ變性層ノ幅ハ 0.8mm ニ達スル。

3) 射入後12日ニハ變化ノ擴大ハ停止シ急性炎症像ハ稍々輕減シ來ル。變性組織ノ限界ハ漸ク明瞭トナリ此外側ニハ新生結締組織ノ發生ヲ認メル。

4) 21日以後ハ變化ハ最早ヤ擴大セズ日ヲ追フテ明確且無構造化シ、此處圍ニ結締組織ノ増殖ガ盛ンデアル。粘膜ニ近ク射入サレタ場合ハ上皮ニ未ダ變化ガ認メラレルガ放射線ノ作用ガ近ク強力デ上皮ノ脱落ヲ來シタ場合ハ未ダ再生サレナイ。膀胱壁ハ癰痕性ニ收縮陷凹シ變性組織ハ再生セラレズ Fibros 状態ヲ呈シテ金管ヲ被包スル。

文 獻

(既ニ本誌第34卷第2號98頁ノ論文ニ引用記載シタモノハ凡テ省略シタ。)

- 1) Abbe, R.: Strahlentherapie, 4, 27, 1914.
- 2) Bagg, H.J.: Amer. J. Roent., 7, 536, 1920.
- 3) Blauel, C.: Bruns' Beitr., 45, 141, 1905.
- 4) Burnam, C.F.: Amer. J. Roent., 36, 437, 1936.
- 5) Cairns, H. and J. F. Fulton: Lancet., II, 16, 1930.
- 6) Cutler, Max: Amer. J. Roent., 16, 535, 1926.
- 7) Dean, A.L.: J. Amer. Med. Assoc., 89, 1121, 1927.
- 8) Eichbaum, Fr.: Strahlentherapie, 59, 90, 1937.
- 9) Failla, G., E.H. Quimby and A. Dean: Amer. J. Roent. 9, 479, 1922.
- 10) Failla, G.: Brit. J. Radiol., 30, 420, 1925.
- 11) Failla, G.: Amer. J. Roent., 16, 507, 1926.
- 12) Failla, G. et al: Amer. J. Roent., 15, 1, 1926.
- 13) Gouverneur, R. and S. Fabre: Bull. Soc. d' Obst. et Gynec., 13, 782, 1924.
- 14) Halberstaedter, L.: Strahlentherapie, 24, 253, 1927.
- 15) Heidler, H.: Zschr. Geb. u. Gyn., 92, 1, 1928.
- 16) Heinecke, H.: Münch. med. Wschr., 51, 1382, 1904.
- 17) Heublein, A. C. and D. Quick: Amer. J. Roent., 14, 116, 1925.
- 18) Janeway, H. H.: Amer. J. Roent., 7, 92, 1920.
- 19) Joly, J. and W. C. Stovenson: Brit. Med. J., I, 1212, 1914; ibid. II, 42, 1914.
- 20) 川村太郎:

皮尿誌, 42, 260, 昭12. 21) **Kusmina**: Zbl. allg. Path. u. path. Anat., 40, 169, 1927. 22) **Kuznitzky, E. u. H. Jacoby**: Jadassohn's Handb. V/2, 629, 1929, Berlin. 23) **Lacassagne, A.**: ref. n. Amer. J. Roent., 9, 701, 1922. 24) **Levin, Isaac and Michael Levin**: J. Amer. Med. Assoc., 83, 1645, 1925. 25) **Loeb, L. F. u. M. Wreschner**: Strahlentherapie, 27, 487, 1928. 26) **McNally, A.**: Amer. J. Roent., 40, 895, 1938. 27) **Mikulicz-Radecki, F. v.**: Strahlentherapie, 54, 493, 1935. 28) **Mühsam, E.**: Strahlentherapie, 44, 131, 1932. 29) **Neef, Th. C.**: Strahlentherapie, 44, 257, 1932. 30) **Neef, Th. C. u. F. Hoff**: Strahlentherapie, 64, 113, 1939. 31) **Newell, Q. U. and H. S. Crossen**: Surg. etc., 60, 763, 1935. 32) **Ostrčil, A. u. F. V. Novák**: Strahlentherapie, 42, 291, 1931. 33) **Ottow, B.**: Zschr. Geb. u. Gynäk., 97, 121, 1930. 34) **大塚廣**: 日レ會誌, 16, 271, 昭13. 35) **Petrow, N. u. E. Kusmina**: Dtsch. med. Wschr., 52, 622, 1926. 36) **Quimby, E. H.**: Amer. J. Roent., 13, 330, 1925. 37) **Regaud, C.**: ref. n. Zbl. Hautktrkt., 10, 347, 1924. 38) **Rulle, P.H.**: Zbl. Gynäk., 53, 357, 1929. 39) **Rychlowski, Zbigniew**: Gynec. et Obstétr., 19, 212, 1929. 40) **Schmitz, H.**: Amer. J. Roent., 24, 47, 1930. 41) **Schroeder, C.**: Arch. f. Gynäk., 150, 147, 1932. 42) **Schugt, P.**: Zbl. Gynäk., 47, 1862, 1923. 43) **Simons, A.**: Strahlentherapie, 29, 711, 1928. 44) **Sittenfeld, M.J.**: Amer. J. Roent., 15, 155, 1926. 45) **Stacy, Leda, J.**: Amer. J. Roent., 19, 323, 1928. 46) **Stevenson, W. C.**: Brit. Med. J., II, 9, 1914. 47) **Takeda, T.**: Acta Radiol., 8, 130, 1927. 48) **Thies, A.**: Dtsch. med. Wschr., 31, 1402, 1905. 49) **Viethen, H.**: Arch. f. Gyn., 157, 536, 1934. 50) **Wille**: Zschr. Geb. u. Gynäk., 97, 125, 1930. 51) **Zeiss, L.**: Zschr. Urol., 21, 630, 1927.

欄筆スルニ當リ終始御指導ト御鞭撻ヲ賜ツタ恩師高橋教授ニ心カラノ感謝ヲ捧ゲル。尙組織所見ニ關シ多大ノ御助言ヲ賜ツタ千葉醫科大學瀧澤教授ニ感謝スル。

尙稿尾附圖ノ「アト紙」ハ著者ノ提供セルモノデアル。

附 圖 說 明

第1圖 家兎 Nr.23 筋肉内射入後4日 向ツテ左方ノ金管射入孔ニ臨ミ極メテ薄イ壞死層ガアリ其外側ニ Fibrin 及ビ白血球浸潤ヲ有スル退行變性層ガアリ次第ニ健全筋組織ニ移行スル。

第2圖 家兎 Nr.21 筋肉内射入後8日 金管孔ニ面シタ壞死層ハ厚クナリ此外側ニハ白血球浸潤及ビ Fibrin 滲出ト共ニ筋組織ノ蜂窩狀變性層竝ニ萎縮層ガアル。

第3圖 家兎 Nr.15 筋肉内射入後21日 壞死層ハ薄クナリ之ヲ繞ル筋組織ハ萎縮ガ著明デ急性炎症像ハ反ツテ減退シテキル。

第4圖 家兎 Nr.8 筋肉内射入後35日 退行變性層ハ均質化シ萎縮ハ21日ノ場合ヨリ著明且境界明確トナル。

第5圖 家兎 Nr.3 筋肉内射入後60日 變性層ニ萎縮層ノ境界ハ益々明確トナリ年輪狀ニ金管孔ヲ取り巻ク。

第6圖 家兎 Nr.27 膀胱壁射入後1日 最内側ニ薄イ壞死層ガアリ其周囲ハ浮腫及ビ白血球浸潤ニヨリ組織ハ粗鬆トナツテキル。上皮細胞ハ腫

脹シテキル。

第7圖 家兎 Nr.22 膀胱壁射入後4日 壞死層ハ厚クナリ粘膜下層ハ粗鬆トナツテキル。變化ハスベテ増強サレテキル。

第8圖 家兎 Nr.23 膀胱壁射入後4日 粘膜面ニ近ク射入サレタ爲ニ上皮ハ既ニ脱落シ將ニ粘膜面ニ向ツテ破潰セントシテキル。

第9圖 家兎 Nr.18 膀胱壁射入後8日 壞死層ハ更ニ厚クナリ浮腫、細胞浸潤等ノ變化ガ強ク又粘膜下層ノ變化モ著明デ上皮ハ脱落シテキル。

第10圖 家兎 Nr.16 膀胱壁射入後21日 最内側ノ壞死層ハ反ツテ狭小トナリ急性炎症像ハ輕減シ變性部ノ組織ノ均質化ガ起ツテキル。退行變性チナセル筋組織ガ見ラレル。

第11圖 家兎 Nr.10 膀胱壁射入後35日 金管射入部ヲ圍シテ組織ノ均質化ハ益々著明且明確トナル。粘膜面ハ瘢痕性ニ收縮陷凹シテキル。

第12圖 家兎 Nr.3 膀胱壁射入後60日 金管ヲ繞ツテ組織ノ硬化ハ更ニ顯著トナリ附近ノ筋組織ノ變性萎縮ガ見ラレル。

(昭和18年6月10日受付)