泌尿器科領域に於ける Phosphatase の組織化學的研究

横濱醫科大學皮膚科泌尿器科教室

(主任 原田 彰教授)

助教授 小 澤 靜

HISTOCHEMICAL STUDIES ON THE PHOSPHATASES OF THE UROGENITAL SYSTEM

Shizuka Ozawa

From the Department of Dermato-urology, Yokohama University,
School of Medicine. (Director: Prof. A. Harada)

(本論文の要旨は第37回, 第38回, 第39回日本泌尿器科學會總會並に第160回, 第170回東京地方會に於て報告した.)

第1篇 新法による Phosphatase の組織化學的 證明並に正常泌尿性器に於ける所見に就て

Report I. On the New Methods for Histochemical Demonstration of the Phosphatases
and their Findings in the Urogenital System.

緒 言

磷酸エステルを加水分解する一種の酵素が鈴木等(1907)により植物組織内に發見され, 次いで Mc Collum等(1908)により動物組織内にも存在することが報告され, その酵素は Phosphatase と呼ばれることになった. Phosphatase の生化學的意義が問題になつてきたのは實に Robinson (1923) による化骨現象に本酵素が關與するという説について試験管内でカルシウムと磷酸エステルの混合液に骨或は石灰化組織内に含まれる酵素を添加する事により磷酸石灰の沈澱が得られるという實驗(1930)以來である. 間もなく Robinson(1923), Kay (1931), 湊(1933), Robinson 等(1934), Eldobacher(1934), 高松(1940)等により人及び動物組織内に於ける本酵素の分布が生化學的に明かにされて來た.

この間生化學的測定法は諸家により區々の方法と單位が用いられて來たが, Kay の方法を發展せしめた Bodansky 法(1933)や King-Armstrong

法(1934)等が廣く用いられるに至りその測定値は一層正確となり, 正常並に病的狀態に於ける諸臓器, 血清内 Phosphatase の消長につき業績が發表せられ, 生體の廣汎な物質代謝に關與する生物學及び病態生理學上の意義が着々明かにされた. Phosphatase なる名稱もその分解する基質に従い種々な名稱を附せられるに至り, (Monophosphatase, Diphosphatase, Triphosphatase 等) 又その最高の分解能を示す至適酸度により通常アルカリ性 Phosphatase (以後 al-Ph と略稱) 及び酸性 Phosphatase (以後 ac-Ph と略稱) と大別されるに至つた.

かゝる業績は al-Ph について行われたものが多かつたが Kutscher 等(1935, 36)による前立腺並にその分泌液中には ac-Ph が高濃度に存在するという報告に續き Gutman, Sproul and Gutman (1936) により前立腺癌の骨轉移巢には Phosphatase 特に ac-Ph が増加し同時に血清 ac-Ph の上昇も伴うことが明かにされて以來 ac-Ph も大いに

注目されるに至つた。一方核酸化學の進歩に伴い核酸と Phosphatase との関係が Brachet and Jeener (1943), Biesel and Biesel (1944), Bradfield (1946) 等により追及せられる所となり此の方面に於ける業績も甚だ多い。

生化學的研究はこのように早くより多くの報告があるが組織化學的研究は高松(1938, 39)次いで Gomori (1939) により先ず al-Ph の組織内證明法が完成せられ生体内分布並にその消長につき更に詳細な検索を可能ならしめた。高松法の原理は Phosphatase を含む切片を至適酸度に保たれた鹽化カルシウムとグリセリン磷酸との混合液中で一定時間作用せしめると組織 Phosphatase によりグリセリン磷酸は加水分解せられカルシウムと結合し磷酸カルシウムが組織内に沈着し、之を Kossa 氏硝酸銀法により證明するのである。Gomori 法はクロールカルシウムの代りに硝酸カルシウムを用いたもので、甚だ酷似した方法が東西相次いで全く別個に發表されたのである。

ついで Gomori は ac-Ph の證明法を發表(1941)したが、その方法は至適酸度(pH 4.8前後)に保たれたグリセリン磷酸と硝酸鉛の混合液中で Phosphatase 作用により磷酸鉛を切片内に沈着せしめこれに硫化アムモニウムを作用させて硫化鉛として證明するのである。

以上の方法はいずれもグリセリン磷酸を基質として用いる所謂 Glyceromonophosphatase 法であるが、之等と全く方法を異にしたアゾ結合法(Azo dye-test)が Menten, Yung and Green (1944)により al-Ph の證明法として發表され、ついで Manheimer and Arnold(1949)により兩種 Phosphatase に用い得る變法が發表された。これ等の原理はナフトール磷酸を基質とし、これにジアゾニウム鹽を混合し切片の Phosphatase を作用せしめると磷酸基を脱したナフトール基はジアゾニウム鹽と組織内でアゾ結合を直接に行いアゾ色素を形成するというのである。

以上の原法及び各種の變法による研究は多數にのぼり重要な知見も明かにされているが、泌尿器科領域に於ては前立腺、睪丸、腎等の斷片的研究

に接するのみで系統的研究に乏しく、al-Ph 及び ac-Ph 兩者の統一ある知見に接しない。Phosphatase の如く生體の代謝に必須な酵素にならねど且つ未知の事項の多い今日、生化學的研究に加うるに精細な組織化學的研究を行う事は甚だ肝要である。このため著者は上述の諸種證明法の追試を行い更に又簡易に兩種 Phosphatase を證明する23方法を得ることができたので本篇に於ては其の方法並に正常泌尿性器の所見に就て報告する。

證明法手技及び所見

I. 證明法手技

1) アゾ結合法(高松・小澤)

Menten 等及び Manheimer 等による本證明法は試薬の入手合成等の點から本邦の現状では必ずしも容易に行い得ない憾がある。それで著者は高松博士の保存される60餘種のアミン類についてアゾ結合を試み、水に溶け難く鏡檢に際し美しく鑑別の容易な化合物を求めた結果 Benzidin (H_2N — — NH_2) 及び Cresidin (CH_3 —)を得た。

基質としては Ca- α -Naphtholphosphate を合成して用いた。

實施方法

1. 固定脱水 新鮮標本を無水アセトン中に投じ48時間内に3回アセトンを交換し固定と脱水を同時に行う。

2. パラフィン包埋, キシロールを通し透明化の後パラフィン(融點48~50°C)に包埋する。この際孵卵器は55°C以下に保つ。

3. 切片作製 厚さ5~7 μ

4. 脱パラ後アルコール、水を通し次の基質液中に投ずる。

5. 基質液

第1液 0.1% Ca- α -Naphtholphosphate 10cc.

第2液 ジアゾ化液

Benzidin 又は Cresidin	50mg
1 M. HCl	4.0cc
冷水(氷片を浮かす)	45.0cc
1 M. 亞硝酸ソーダ	2.0cc

(上記試薬を Benzidin より順次加えるのであるが、1 M. HCl を加えた時 Benzidin が完全に溶解するのを待ち次の冷水及び亜硝酸ソーダを加える。この時溶液は透明な褐色調を呈する。ジアゾ化を充分に行わせるため容器に蓋をして数分間放置する)。

第3液 緩衝液

(イ) pH 9.1 硼砂硼酸緩衝液 10.0cc

(ロ) pH 4.8 醋酸醋酸ソーダ緩衝液 10.0cc

第1液と第2液を混合、al-Ph 証明には(イ)を ac-Ph 証明には(ロ)を加える。

6. 室温に於て作用せしめる。al-Ph は2~6時間、ac-Ph は12~24時間で組織に色素の合成が認められる。

7. 水洗 20分

8. 要すればヘマトキシリンによる核染色

9. ゴムシロップ封入

結果は Benzidin では紫紅色、Cresidin では鮮紅色の色素沈着を來すのであつて鏡檢すると微細色素顆粒として認められる。腎の如く本酵素の豊富な臓器では20分前後で既に着色を認め得る。37°C 孵卵器内で作用せしめるとジアゾ化合物が組織蛋白と結合して切片を黄染するので微細な観察を困難ならしめるから避くべきである。

第1液の Ca- α -Naphtholphosphate は比較的水に難溶であるので乳鉢で碎挫し溶解するがよい。

第2液はジアゾ化過程であるので冷却下に行うのがよい。このため著者は氷片を浮かした水を用いた、亜硝酸ソーダ加注後は特に注意して-N=N-結合を充分に行わしめる必要がある。

2) Gomori 法改変第1法(高松・小澤・井崎)

本法は Gomori の ac-Ph 証明法に若干の改良を加え酸、アルカリ兩種 Phosphatase に用い得るようにしたものである。

1. 固定脱水包埋切片作製は前記アゾ結合法と同様に行い下記基質液内に於て作用せしめる。

2. 基質液

2%グリセリン磷酸ソーダ 10.0cc

1%硝酸鉛 5.0cc

緩衝液 10.0cc

水

75.0cc

緩衝液は al-Ph には pH 9.1 硼砂硼酸緩衝液を用い、ac-Ph には pH 4.8 醋酸醋酸ソーダ緩衝液を用いる。この際基質液は白濁するが反應には影響ない。要すれば濾過して用いる。本液は数回の連続使用が可能である。

3. 37°C 孵卵器内で al-Ph は6~12時間、ac-Ph は18~24時間で反應が完了する。即ち Phosphatase により遊離された磷酸は基質液内の硝酸鉛と結合し磷酸鉛を組織切片に沈着せしめる。

4. 水洗 20分

5. 0.2%硫化ソーダ液中に数秒

茲に於て切片に沈着した磷酸鉛は硫化鉛を形成し褐色乃至深褐色を呈し観察し得るようになる。本液は其の都度新鮮な溶液を用いる。

6. 水洗 10分

7. ヘマトキシリン核染色

8. 脱水、キシロールを通しバルサム封入

結果は Phosphatase 作用を有する部分は褐色がら深褐色を呈し弱い部分は黄色を呈する。硫化ソーダ液に長時間浸すと切片が剥離することがあるので豫め稀薄ツエロイジン膜を以つて覆うか、或は最短時間内に作用せしめて次の水洗に移すべきである。多くは2、3秒で褐色の硫化鉛を形成する。

(附記：本法は其後更に少しく改良し標準化して高松、井崎と共に発表した。)

3) Gomori 法改変第2法(高松・小澤)

改変第1法の硝酸鉛の代りに1%醋酸鉛を使用しただけの相違で他は全く同じ操作により同様な成績が得られる。但し醋酸鉛液は放置すると反應が不良となるので連続使用は好ましくない。又 al-Ph 反應の場合は稍々沈澱が多く組織切片に附着する場合があるので濾過使用するか或は水洗を充分に行う必要がある。

以上の3新法は從來の Phosphatase 証明法が al-Ph 及び ac-Ph に關し夫々別個の方法が採られたため實驗操作が繁雜に堪えないので改良されたものである。この三法を從來の高松(1938, 39), Gomori (1939, 42), Menten 等 (1944), Man-

heimer 等 (1949), Bern (1949) 等の成績と比較するに殆ど差異が認められないので、著者は之等の方法を用い泌尿性器の観察を行つた。3 法夫々の所見は大差がないので以下特に區別することなく記載する。

II 正常泌尿性器に於ける組織 Phosphatase の所見

實驗材料は屍體又は手術により得たものに就て観察した。

腎: al-Ph 近側曲細尿管部より移行部に至る迄上皮細胞は強陽性で特に細尿管腔に面して強く出現する。ヘンレ氏蹄係、遠側細尿管部、集合管部は陰性である。糸絨體は時に弱く反應するが多くは陰性である。腎盂粘膜上皮は中等度に反應を示す。家兎、大黒鼠では上記の外乳頭管部上皮、特に核に陽性であり糸絨體も屢々弱陽性である。

ac-Ph は曲細尿管部の上皮及び核に陽性であつて、糸絨體、ヘンレ氏蹄係に於ても弱陽性である。乳頭管部上皮の核も陽性を示す。かゝる所見は家兎、大黒鼠、二十日鼠でも同様で著しい種屬的差異は認められない。腎盂では粘膜上皮の核及び上皮下組織に陽性である。

尿管: al-Ph 上皮細胞原形質に陽性、上皮下組織、筋層には疑陽性である。毛細血管には陽性である。

ac-Ph 上皮細胞の核、上皮下組織、筋層に陽性であるが毛細血管は時に反應を示すのである。大黒鼠では毛細血管の反應は兩種 Phosphatase 共に強陽性である。

膀胱: al-Ph 上皮細胞原形質並に上皮下組織に陽性であるが、筋層は反應を示さない。

ac-Ph 上皮細胞の核に陽性であるが原形質は極めて弱く反應を示すのみである。筋層は al-Ph より著明に強い反應を示す。

前立腺: al-Ph 前立腺上皮に弱陽性である。分泌物及び類澱粉小體にも弱く反應を示し滑平筋にも反應する。種屬的差異は大きく大黒鼠及び二十日鼠では前立腺腹葉上皮は強い反應を示すが前葉及び背葉では間質に反應を認める。家兎では上皮は陰性で腺間々質に陽性である。

ac-Ph 人では腺上皮に極めて強く反應し核も亦強陽性である。上皮下、毛細血管、滑平筋も中等度に反應する。動物では大黒鼠及び二十日鼠前立腺上皮は腹葉に於て稍と反應するのみで多くは上皮下組織及び筋層が反應を示す。上皮の核は孰れも中等度陽性である。家兎にあつても同様の所見である。

精囊腺: 精囊腺上皮は弱く al-Ph に反應するのみであるが、上皮下組織、筋層ではそれよりも強く反應を示す。分泌物は中等度に陽性である。ac-Ph は上皮、筋層及び分泌物に強く反應を示す。動物では al-Ph は大黒鼠、二十日鼠は上皮に陰性で間質組織にのみ弱く反應し家兎では中等度に陽性である。ac-Ph は上皮の核には凡て陽性で上皮下組織に強く反應し間質組織には弱く反應を示す。

睪丸: al-Ph 各段階に於ける精細胞はすべて強い反應を示す。精子では主として頭部に、時に尾部に及ぶ反應が認められる。セルトリ氏細胞及び間質は弱い反應を示すのみであるが毛細血管壁は強陽性を示すことが多い。

ac-Ph 精細胞は精原細胞が最も強く反應し成熟するに従い反應が弱くなる傾向が認められる。精子は頭部に陽性である。間質細胞は核に陽性である。

動物による差異は殆ど認められない。

副睪丸: 副睪丸管上皮では al-Ph 陰性であるが、その核は ac-Ph に陽性である。間質は兩種 Phosphatase 共に反應する。

輸出管: 上皮細胞は兩種 Phosphatase 共に陰性で核で ac-Ph が中等度に反應する。上皮下組織及び筋層は中等度に反應し毛細血管では al-Ph が特に強い反應を示す。家兎では輸出管上皮に al-Ph が陽性である。

總括並に考按

高松, Gomori により Phosphatase の組織化學證明法が完成されて以來その原法又は改變法による多くの観察がなされているが、今日主として基質剤による特殊性の研究と至適酸度による研究が行われる趨勢にある。前者に関しては Glycero-phosphate, Hexosediphosphate, Pyrophospha-

te, Adenosintriphosphate, Yeast Nucleate, Phenolphthaleinphosphate, Naphthylphosphate 等甚だ多く、之等の基質劑による各種臓器の特殊性がよく研究されている。(高松, Gomori, Bamann Engelhardt 等)

後者に關しては生化學的の比較研究が主としてなされたが組織化學的には從來兩種 Phosphatase の觀察が區々に行われたに過ぎず、同一標本に就いて比較研究した論文は甚だ乏しい。從來の方法を以てすると兩種 Phosphatase を同時に證明するには甚しい操作上の不便を伴う事が大きな原因をなしていると思う。al-ph の證明法として高松法も Gomori 法も共に完成された方法と見做してよいが ac-Ph に關しては Gomori 法は成績が不定の憾がある (Bern 1949)。著者等の追試によるとその原因は切片内に形成された硝酸鉛を硫化鉛として着色せしめる最終段階にあることが判明したので、之を改善し S 含有量の不定な硫化アモニウムに代りに硫化ソーダを用いることにより反應を極めて安定なものとなし得た。又基質液内の硝酸鉛は醋酸鉛でも同様の成績が得られることが判つた。これ等の改變法は又緩衝液を替えることにより容易に兩種 Phosphatase を組織化學的に證明することが出来て操作は大いに簡便となつた。

Menten 等により考案され、Manheimer 等により改變されたアゾ結合法は直接組織切片内でアゾ結合をなし色素を形成するので從來の方法と全

く原理を異にした進歩した方法であるが、その試薬は總てを合成に俟たねばならぬし、ジアゾ化鹽の保存が困難であるため今日尙廣く行われないが著者は入手容易な試薬により本法の改變法を提唱した。即ち普遍的なアミンである Benzidin 並に Cresidin はジアゾ化されて顯色劑として働き、組織 Phosphatase により磷酸基を脱した α -Naphthol と結合して組織内に紫紅色及び鮮紅色色素を合成するのである。この反應は次の如くであると考える。

本法は緩衝液を異にするのみで al-Ph にも ac-Ph にも同様に用いられる。

Phosphatase の組織化學的證明法はその反應が確實である限り、より至便な方法が試みられるべきであるが、僅に Berger (1947) により Gomori 法に準據した貯藏液を備え用に臨み兩種 Phosphatase 反應を迅速に行うという程度の提唱があるに過ぎない。Phosphatase は比較的安定な酵素の一つであり組織内證明法も確立され、變法も多いが、要するに研究目的に應じて確實に反應を示す簡易な方法を選ぶことが必要である。

アゾ結合法は Phosphatase 存在部位に直接色素を合成しその顆粒は比較的大きいので時に細胞内の微細な病理學的所見を得るには困難なことがあり、又酵素の作用が弱い場合には鋭敏さでは第1法又は第2法に及ばない。又アゾ結合法はジアゾ化操作に稍不安定な點はあるが、石灰化組織等に於てはカルシウム、燐等と無關係に反應を行

うので磷酸化合物を切片内に証明する従來の方法に比し有利である。Yokoyama等(1951)によると Gomori 原法もアゾ結合法も共に同様に鋭敏であるが、アゾ法は基質劑の分子が大きいため反應が稍と困難で、切片の Phosphatase 量が少ない場合は反應は特に不良であり、正常に反應する場合も色素顆粒が大きすぎ、又核に變化を來すなどの缺點があり、たとへ其の反應が迅速で石灰化組織への應用に適していても細胞學的研究には不向であると言ひ、著者の見解に相通するものがある。しかしアゾ法は Naphthol 基と磷酸基とにより種々なる磷酸エステルの合成が可能であるので基質劑による各種 Phosphatase の研究には甚だ有利であり、形成する色素が組織の有する色素と全く異なる色調を呈することは最も大きい利點であると思う。

泌尿器及び性器に關する組織學的研究は al-Ph に就いては高松(1939), Gomori(1941), Kabat and Furth(1941), 武内, 馬渡(1943, 44), Montagna and Molback(1946), Zorzoli and Stowell(1947), Atkinson(1948), Souliarac and Thibault(1948), Dempsey, Greep and Dean(1949), Wislocki(1949), Stafford, Robinson and Meyer(1949)等の報告があり、ac-Phに就いてはGomori(1941), Wolf, Kobat and Newman(1943), Wislocki(1949)等の報告がある。著者の觀察はこれ等諸家の報告と大差はないが兩種 Phosphatase を同時に比較觀察したことにより更に廣く本酵素の性狀を知り得たと考える。之を總括すれば次の通りである。

1) 上皮細胞に陽性(al-Ph: 腎近側曲細尿管部 腎盂, 膀胱, 精囊腺, 前立腺等, ac-Ph: 腎曲細尿管部, 蹄係, 前立腺, 精囊腺等)

2) 或部の上皮下組織並に毛細血管に陽性(al-Ph 尿管, 膀胱, 輸出管等)

3) 或部の平滑筋層又は間質に陽性(al-Ph 及び ac-Ph: 尿管, 膀胱, 前立腺, 輸出管等)

4) 核に陽性(主として ac-Ph)

等にて特徴づけることが出来る。此の中泌尿器科領域に於て興味あるものは、腎細尿管, 前立腺,

精囊腺, 睪丸等の Phosphatase であろう。

腎細尿管の al-Ph に就いては既に高松, Gomori 以來種々な磷酸鹽の排泄調整と之に伴う體液のアルカリ平衡の維持に重要な役割を果していると言われて來たが, Bamann(1927, 28)は糖尿時の腎 Phosphatase の増量を觀察し, Danielli(1946)は近側曲細尿管部に於ける糖の再吸収の機序に細胞内及び管腔内 Phosphatase が關與するであろうと述べ, Kochakian(1948)は絲球體より細尿管腔に本酵素が濾出することを組織化學的に觀察している。腎機能との關係に就いては Wilmer(1944)により、腎障碍と尿中 Phosphatase 量に就いては Breedis等(1943)により、結石との關係については Harris(1932), Hepler 等(1945), Cordonnier(1951)により報告されているがこれ等の詳細は後章で述べる。膀胱粘膜 Phosphatase に就いては高松(1941), 久保(1951)等が膀胱は單なる尿の貯藏器管ではなく或る機能を有する事を豫想しているに過ぎない。前立腺 Phosphatase に關しては Kutscher(1935, 36)以來主として前立腺癌との關係に就き諸家の研究相次ぎ臨床並に病理學上重要な寄與がなされたことは周知の通りである。しかして本酵素の生理的意義に就いては Huggins 等(1941)はアスコルビン酸の分泌との關係を明らかにし更に Davis and Mann(1947), Mann(1948)は果糖及びクエン酸の分泌に就いて本酵素の關與を強調し特に鼠では精液の果糖は前立腺前葉, 中葉及び背葉に發するものであると述べた。Bern(1949)はこの際腺上皮に Phosphatase 反應の強い腹葉では果糖は分泌されないがクエン酸が分泌され、間質に Phosphatase 反應の強い前葉及び背葉では果糖を分泌すると述べた。精囊腺 Phosphatase, については主として生化學的研究から本酵素の作用が明かにされつゝある。Lundquist(1947)は精液内の ac-Ph は Phosphorylcholin を分解することを認め, Wilmer(1944), Sonlairac and Thibault(1948)等により精囊腺 Phosphatase は精液中の果糖の輸出に與り, Bern(1949)は之につき間質の al-Ph により果糖磷酸エステルが分解され精液中に流出するのであらうと

推論した。しかし睪丸及び副睪丸間質は al-Ph に富むが生化学的には果糖が證明し得ないので必ずしも本酵素の存在が果糖の存在を意味しないという見解もある。(Mann, 1946) この他睪丸に就いては動物により季節的變動が著明であつて、發情期前に至り始めて睪丸精細胞の Phosphatase が增強することも觀察されている。(Wislocki, 1949)

かくの如く Phosphatase の作用に就いては諸家の多くの見解があり、廣汎な磷酸エステル代謝に關與していることは明かであるが、それ等が獨立した酵素と認むべきか或はその他の形であるのか今日尙明かでない。著者の兩種 Phosphatase を同一標本に就いて觀察した所見によれば al-Ph の活性の強い組織は必ずしも ac-Ph の存在を意味しない。むしろ兩者は無關係の状態に於て作用しているように思われる。かくの見解は Engelhardt (1939), Bamann (1937), Gomori (1942) により Adenosintriphosphatase, Pyrophosphatase, Hexosediphosphatase 等について述べられている所である。

現在本酵素は基質劑による特殊性、臟器特殊性或は特殊な賦活劑及び抑制劑による變化等が廣く

行われているが更に多くの研究觀察が重ねられねばならない事を痛感する。

結 論

1. 酸性及びアルカリ性兩種 Phosphatase を組織學的に觀察するためアゾ結合法, Gomori 法改變第 1 法及び第 2 法を考案した。

2. アゾ結合法は本邦の現状でも容易に實施し得る如く改變した。Phosphatase 反應として切片内に合成される色素は美麗で且つ識別は容易である。

3. 改變第 1 法及び第 2 法は原法に比し反應がより安定となつた。

4. 之等 3 新法は緩衝液を替えるのみで兩種 Phosphatase の證明に用い得られ操作を甚だ簡易ならしめ得た。

5. 之等の方法を用い泌尿性器組織の兩種 Phosphatase の分布を觀察した。個々の臟器に就ては先人の述べた所と大差がなかつた。

6. 兩種 Phosphatase を併せ觀察することにより兩者は夫々無關係に獨自の分布と活性を有していることを知つた。

第 2 篇 泌尿器科疾患に於ける Phosphatase の組織學的消長に就て

Report 2. On the Histochemical Findings of the Phosphatases in Urogenital Diseases

緒 言

Phosphatase の病態生理學的研究は既に前篇に於て述べた如く化骨機轉に關しては佝僂病、カシン・ベック氏病、ビタミン D 缺乏症、上皮小體ホルモン等の關係に就き早くより多くの報告がなされ (Fell 1925, Kay 1929, Fabisch, 1932, 高松 1937), 次いで糖類代謝との關係に就いては糖尿、飢餓等の状態に於ける本酵素の態度が明かにされて來た (Wolberg, 1936, Barrenscheen 等, 1927,

Thanhauser 等, 1946, Marsch 1947, Canter 等 1947). かくしてその病態生理學的意義は次第に擴大され、臨床的には惡性腫瘍に就き (高松等, 1939, 41, Davis, 1934, Köhler, 1934 等), 前立腺、前立腺癌及びその轉移巢に就き (Kutscher 等, 1945, Gutman 等, 1936, Robinson 等, 1939, Herger 等, 1941, Huggins 等, 1941) 多くの重要な知見が明らかにされた。これ等の知見と關連し或は獨立して結核症、性器並に附屬器官、腎並にその

機能との関係、血球、畸形組織等に就いて生化学的或は組織化学的研究が今日盛んに行われている。

しかし泌尿器科疾患に就いては断片的報告に接するのみで統一ある所見には乏しい現状であるから本篇に於ては一般泌尿器科疾患の Phosphatase の組織所見に就き報告する。

実験材料及び実験方法

実験材料はすべて横濱醫科大學泌尿器科教室に於て手術その他によつて得た材料につき術後2時間以内にアセトン又はアセトン・アルコール固定を行い用に供した。

Phosphatase 反応は前篇に於て述べた余等のアゾ結合法、第1第2改變法により、同一標本に同一條件で兩種 Phosphatase 反応を行い觀察した。

実験成績

I. 結核性疾患

1) 腎結核

a. 乳頭部崩壊のみを認める3例では腎剖面は稍と混濁し少數の結核結節を認め腎盂粘膜には發赤及び結核結節を認めた。組織學的には崩壊部周囲より一部は皮質に及ぶ細胞浸潤及び細尿管、糸絨體の部分的變性であつた。

Phosphatase 反応：al-Ph も ac-Ph も共に正常腎に比し反應減弱を認める。變性を來した細尿管では消失し ac-Ph のみが痕跡狀に残り、細胞浸潤を認める部分でも殆ど痕跡狀に兩種 Phosphatase が反應するのみである。その他の健常な部位では ac-Ph は概ね正常であるが al-Ph は減弱している。崩壊部周囲の圓形細胞には ac-Ph が反應し、毛細血管には al-ph が中等度に反應を示す。増殖した結合織には殆ど反應を認めない。結核結節に於ても同様の所見を呈した。

b. 乾酪化巢乃至は比較的小さな空洞形成を少數認めた5例では組織學的には更に廣汎な細胞浸潤並に病變部位より皮質に及ぶ變性が強く且つ廣汎であるが健常と認められる部分も相當な範圍に及んでいる。

Phosphatase 反応：反應は更に全般に減弱し特に al-Ph は變性を認める近側曲細尿管部及び細

胞浸潤を認める部位では全く消失するか或は部分的に痕跡を認める程度である。一見正常な部位でも減弱している。ac-Ph は細尿管上皮内では同様に減弱しているが核には中等度に反應を示す、硝子樣變性の如き高度の變性を示す部位は全く反應がない。浸潤細胞では反應する。乾酪乃至空洞壁には兩種 Phosphatase 共に反應を示さないが結核結節周囲では ac-Ph が圓形細胞に反應を示す。毛細血管壁に al-Ph が反應することは既述の通りである。

C. 高度の乾酪空洞化により僅かに皮質にのみ腎實質を残存する3例では組織學的には細尿管、糸絨體の變性は高度で圓形細胞の浸潤も被膜下に及び結合織の浸潤も高度で細尿管は散在性に残存するのみである。

Phosphatase 反応：残存する小部分の近側曲細尿管に al-Ph が弱く反應と示し ac-Ph は同部位では稍と減弱した反應である。細胞浸潤を高度に認める部位や細尿管の變性が強い部位では僅に ac-Ph が核に反應を示すのみである。空洞周囲では前記所見と同様に al-Ph が毛細血管に反應し、ac-Ph は小圓形細胞核に反應するのみである。

d. 結核性膿腎症と稱すべき2例では組織學的には腎組織は全く痕跡狀に極く小部分に認められるのみで大部分は高度に結合織化している。

Phosphatase 反応：残存腎組織には全く Phosphatase は反應を示さない。膿胞壁結合織には彌蔓狀に ac-Ph の反應を認めることがあるが al-Ph は陰性である。浸潤細胞には ac-Ph は反應を示す。残存腎組織の核にも ac-Ph 陽性であるが甚だ減弱している。

2) 結核性尿管炎

a. 結核性病變が輕度で尿管は僅に肥厚している程度の3例では組織學的に粘膜上皮の浮腫及び上皮下組織に中等度の小圓形細胞の浸潤が認められた。

Phosphatase 反応：al-Ph は正常に近く粘膜上皮細胞に反應し粘膜下及び筋層に於ける毛細血管壁の反應は増強した部位と正常の部位とが認められる。増強は稍と病變が進行した像を示す部位

であつて、1例の尿管壁の肥厚が他の2例より著しい例では筋層に瀰蔓状の反応が認められた、ac-Phは上皮細胞核、粘膜下組織及び筋層に正常に反応し浸潤細胞にも反応を認める。

b. 結核性病變が中等度で尿管壁が肥厚し硬度を増している4例では組織學的には粘膜上皮は浮腫状で細胞浸潤は上皮下より筋層に及んでいる。

Phosphatase 反應：上皮細胞の al-Ph は消失するか痕跡状であるが、上皮下及び筋層の毛細血管壁には強く al-Ph の反応が認められ筋線維にも瀰蔓状に反応する。ac-Ph は上皮細胞核、浸潤細胞、筋層に反応を示すが、上皮細胞では稍々減弱している。

c. 高度に結核性病變を認める3例では上皮細胞は全く消失し潰瘍を形成し結合組織は高度に増殖し尿管壁は肥厚硬化し細胞浸潤は殆ど尿管壁全層に及んでいる。

Phosphatase 反應：al-Ph は毛細血管壁に著明に増強した反応を示し、一部圓形細胞にも陽性である。筋層にも軽度瀰蔓性に反応を示す。ac-Ph は浸潤細胞及び筋層に中等度に反応を示す。

3) 結核性膀胱炎

兩腎結核屍につき1例を得たのみである。

膀胱は硬度を増し且つ萎縮し、粘膜は發赤浮腫が強く結核性潰瘍の多くは白苔で覆われていた。組織學的には上皮組織の缺損部位でもその他の部位でも一様に筋層に及ぶ高度の細胞浸潤と結合組織化が認められた。

Phosphatase 反應：al-Ph は上皮下毛細血管壁及び筋線維に反応を示し特に毛細血管では増強を示した。ac-Ph は比較的正常に近い上皮細胞核、筋線維及び浸潤圓形細胞に陽性である。しかし細胞浸潤や結合組織化の強い部分では兩種 Phosphatase 共に減弱乃至消失し痕跡状である。結核結節周囲では瀰蔓状の al-Ph 反應を認めることがあるが特有ではない。

4) 前立腺結核

本例も前記症例に就いての觀察である。

摘出前立腺は正常大であるが著しく硬化し剖面は稍々發赤し分泌物は膿性であつた。組織學的に

は間質の著明な結合組織の増殖と、集簇した圓形細胞群が散在性に浸潤し腺腔は縮小し上皮の腺腔内脱落及び腺腔周囲の細胞浸潤等であつた。

Phosphatase 反應：al-Ph は腺上皮下の毛細血管壁に強く反応し、たとえ炎症性變化が高度であつても反応が示している。滑平筋線維にも瀰蔓性に反応する。腺上皮には多くは陰性で部分的に弱陽性である。ac-Ph は腺上皮に於ては正常に比し甚だ減弱しているが、筋線維や上皮下では中等度の反応が認められ、腺腔内分泌物にも弱反応を示す。浸潤圓形細胞にも中等度に反応する。

5) 結核性副睪丸炎

乾酪病巣を形成する2例、小膿瘍を形成する3例、單に結核結節及び結合組織の増殖を示す3例につき觀察した。

Phosphatase 反應：al-Ph は病變部及び周囲の毛細血管に著明に反応し、副睪丸管上皮下でも強く反応するが、間質結合組織では中等度に反応するのみである。ac-Ph は結核病巣周囲の浸潤細胞及び間質組織に反応を示す。輸出管筋線維にも中等度に反応を認める。

小 括

泌尿器及び性器結核の組織 Phosphatase 反應を總括すれば次の通りである。

1. 腎では結核性病變が高度であれば勿論のこと、極く初期の病變でも al-Ph は速かに影響を受け反應は減弱乃至消失に至る。かゝる反應減弱は組織學的變化に先行するが如くである。しかし ac-Ph 反應の變化はしかく敏感でなく、核及び筋線維で輕微な變化を認めるのみである。

2. 結核は病變により増強される唯一の反應は炎症による増殖性變化が盛んな場合に毛細血管壁に於て al-Ph の呈するそれである。之に伴つて ac-Ph も主として浸潤細胞及び滑平筋線維に軽度の増強を示す。かゝる所見は尿管、副睪丸、輸出管に認められる。

3. しかし前立腺に於ては結核性病變により毛細血管の al-Ph は増強するが腺上皮の ac-Ph は却て減弱を示し、筋線維のそれも減弱化する。かゝる變化は病變による細胞變性に相伴うが如くで

ある。

II. 腫瘍

1) 副腎腫

検し得た2例は肉眼的にも組織學的にも定型的な副腎腫であつた。

Phosphatase 反應：腫瘍細胞の原形質及び核は兩種 **Phosphatase** に甚だよく反應を示し、特に核では強く **ac-Ph** に反應する。間質組織も反應中等度である。又所謂血管結合組織索なる網狀支柱組織はよく **al-Ph** 反應を示しその構造が明瞭に認められる。腎實質内に浸潤する腫瘍細胞も **Phosphatase** 反應により一見して識別することが出来る。

残存腎組織は殆ど結合組織化し所々に硝子様變性を來した絲毬體と細尿管を認めるが、核に **ac-Ph** が反應するのみである。

2) 膀胱乳頭狀瘤

悪性度第2度を示す膀胱乳頭狀瘤の1例につき觀察した。

Phosphatase 反應：**al-Ph** は大部分の腫瘍細胞に陰性であるが一部では不規則に陽性反應を示す。間質は弱陽性で、之に伴う毛細血管壁には中等度陽性である。之に反し **ac-Ph** は腫瘍細胞及びその核に強陽性で、間質に於ても **al-Ph** よりは強い反應を示すが毛細血管壁には陰性である。間質内の浸潤細胞には中等度陽性である。

3) 腎線維性肉腫

腎組織を一部に残し他は大部分灰白色の腫瘍となつており組織學的には線維性肉腫であつた1例である。

Phosphatase 反應：兩種 **Phosphatase** 共に腫瘍細胞にも腎細尿管上皮にも陰性であつて、僅に腫瘍内の小部分の毛細血管に **al-Ph** が弱陽性であるのと細尿管上皮に **ac-Ph** が反應するのみである。

4) 膀胱乳頭腫

膀胱側壁に發生した乳頭腫で組織學的には規則正しく配列した境界明瞭な上皮細胞と基質より成る定型的な乳頭腫であつた。

Phosphatase 反應：**al-Ph** は腫瘍細胞には陰性で間質毛細血管に陽性に現れるのみであり、**ac-**

Ph は腫瘍細胞核に弱陽性で、間質結合組織には瀰蔓性に弱く反應する。

5) 子宮癌膀胱浸潤病巣

子宮頸部扁平上皮癌で膀胱筋層に浸潤した1例につき觀察した。組織學的には浸潤が筋層より粘膜下組織に及ぶのを認めた。

Phosphatase 反應：**al-Ph** は腫瘍細胞には陰性で毛細血管壁にのみ陽性である。膀胱平滑筋線維には正常の如く瀰蔓性に反應する。**ac-Ph** は腫瘍細胞核及び間質結合組織に弱い反應が認められるのみである。平滑筋線維も弱陽性に反應する。

6) 内尿道口軟線維腫

女子内尿道口に發生した櫻實大の軟線維腫で、組織學的にも重層扁平上皮に包まれて長紡錘狀の核を有し且つ規則正しく一定方向に配列した腫瘍細胞から成り、血管に乏しく、一部では變性に陥つてゐる。

Phosphatase 反應：**al-Ph** は上皮及び腫瘍細胞に陰性で腫瘍内毛細血管壁に中等度に反應を示すのみである。**ac-Ph** は腫瘍細胞の核にのみ弱陽性に反應する。

7) 前立腺癌

内分泌療法を行わない1例と、之を行つた2例につき檢した。内分泌療法を行わない例では腫瘍細胞は腺様構造或は充實性を呈し前立腺實質内に旺盛に浸潤しているが本療法を行つた例では腫瘍細胞は萎縮し核の濃縮、有絲分裂の消失、腫瘍細胞の腺腔内脱落化が認められ且つ實質の線維性増殖が著明である。

Phosphatase 反應：**al-Ph** は腫瘍細胞及び實質の筋線維に弱陽性であつて、健常前立腺に認められる程度の反應である。内分泌療法を行つた例では反應は不規則に腫瘍細胞に認められるのみである。**ac-Ph** は腫瘍細胞に甚だ強い反應を示し健常前立腺上皮のそれよりも強く、實質内浸潤細胞でも同様である。之に内分泌療法を施し腫瘍の縮小を認めた例では、前述の如き組織學的變性は **Phosphatase** 反應にも強く影響し、全く反應が消失した細胞と弱陽性を示す細胞、中等度陽性の細胞等が不規則に混在して腫瘍組織を成すが全體と

しては正常に比較し大いに減弱した反応を示す。實質の筋線維も弱陽性を示し減弱している。

8) 前立腺肥大症

前立腺肥大症の4例を検した。組織學的にはいづれも腺腫型で著しい腺腔の擴張と腺上皮の扁平化間質組織の萎縮等の所見を呈した。

Phosphatase 反應: al-Ph は高度に扁平萎縮した腺上皮には殆ど痕跡狀に反應するのみであるが中等度に萎縮した部位では弱陽性である。間質でも弱陽性である。ac-Ph も萎縮の高度な上皮には全く痕跡狀で核に弱陽性であるが、中等度の部位では正常に近く陽性である。間質では正常のそれより遙かに反應の減弱を認める。

9) 陰莖癌

陰莖癌は1例を検した。組織學的には定型的な扁平上皮癌であつた。

Phosphatase 反應: al-Ph は主として腫瘍組織内の毛細血管壁に強陽性で、その走行を明瞭に認め得る程であるが、腫瘍細胞には陰性である。ac-Ph も腫瘍細胞には陰性であるが間質結合組織には弱陽性である。

10) 睪丸腫瘍

精上皮腫(セミノーム)2例、同骨轉移例1例、同後腹膜腔及び頸部淋巴腺轉移例1例につき検した。組織學的には定型的な精上皮腫及びその轉移であつた。

Phosphatase 反應: 本腫瘍は al-Ph に強い反應を示す。即ち大形の核を有し原形質に富む腫瘍細胞は al-Ph に強陽性であるが、核がクロマチンに富み原形質に乏しい腫瘍細胞群を認める例では本細胞は中等度に反應を示すに過ぎない。そのため兩細胞群が混在している時は反應は判然たる斑狀を呈する。しかし腫瘍の大部分は強い反應を示す大形の腫瘍細胞である。骨轉移組織では更に強い反應を示す。ために定規の反應時間では標本は濃厚に染まり過ぎる。頸部淋巴腺に轉移を來した例では腫瘍細胞は少なく普通染色によつては判別容易ではなかつたが、Phosphatase 反應により明瞭にその存在を認め得た。此の反應は全く原発病巣と同じく al-Ph に強陽性であつた。之に反し

ac-Ph は間質結合組織に弱陽性を示し腫瘍細胞では核に陽性反應を示すのみである。

小 括

泌尿器及び性器腫瘍10種計19例に於て al-Ph 及び ac-Ph を比較觀察した結果を小括すれば次の如くである。

1. 腫瘍の悪性良性による差異

腫瘍が副腎腫、精上皮腫、乳嘴狀癌等の如く發育轉移の旺盛な悪性腫瘍では一般に腫瘍組織内毛細血管は強く al-Ph を含み腫瘍細胞の Phosphatase も酸性、アルカリ性の差はあれ強い反應を示し、核は一樣に ac-Ph が反應している。しかし良性腫瘍では Phosphatase は陰性であるか又は弱く反應し、毛細血管の反應も強くない。

2. 腫瘍原発組織との關係

腫瘍の原発組織と腫瘍細胞との Phosphatase 反應は必ずしも一致しない。前立腺癌、精上皮腫の如きはよく一致するが乳頭腫は膀胱粘膜 Phosphatase の性狀を有しない。

3. 轉移巣と原発巣との關係

轉移巣が原発腫瘍の Phosphatase の性狀を保持することは精上皮腫に於て認められた。特に骨轉移の際に極めて高度の反應増強が認められた。扁平上皮癌の如く原発巣が反應陰性の場合には轉移巣も陰性である。

4. 治療との關係

前立腺癌の内分泌療法を施した例では著しい ac-Ph 作用の低下並に不均等を認めたが反應を全く陰性化せしめるには至らなかつた。

5. 結合組織、筋線維等では特に著しい變化を認めなかつた。

III. 結石症

腎結石症の Phosphatase 所見に就ては、動物實驗成績と共に本誌第43巻2號誌上に辻知躬と共著で報告したので参照され度い。

前立腺結石症

前立腺肥大症に併發した1例で、結石は半米粒大迄數個認めた。組織學的には結石の存在した腺腔では腺上皮の消失、萎縮及び脱落が認められ上皮結合組織は増殖し小圓形細胞の浸潤は軽度であ

つた。

Phosphatase 反應: al-Ph は結石に陽性であるが腺上皮並にその周辺では全く反應は認められない。ac-Ph も上皮では痕跡狀に反應し周辺の結合織、筋線維でも弱く瀰蔓狀に反應するのみである。

IV. ショック死腎

土工作業中土砂に埋没し救助されたが20時間後死亡した1例につき腎を觀察した。尙本症例は其の間無尿で定型的なショック症狀を呈していた。組織學的には著しい腎組織の荒廢即ち絲毬體の萎縮、曲細尿管部を主とした混濁腫脹、上皮の管腔内脱落及び圓柱形成、小靜脈の鬱血等が認められた。

Phosphatase 反應: al-Ph は近側曲細尿管部では全く消失するか或は痕跡狀に認められるのみである。絲毬體は萎縮しているので瀰蔓性に反應が認められる。ac-Ph は上皮の核に弱く反應するのみである。

總括並に考按

泌尿器科領域に於ける Phosphatase の觀察を惡性腫瘍、良性腫瘍、結核症、結石症及びショック腎に就て行つた。

1. 尿路結核に就て

從來結核病巢の al-Ph の研究は多くは生化學的測定(高松, 1940)であり組織學的研究には高松、武内等(1939~44) Gomori 等の斷片的な研究があるが泌尿器系結核症に就ては Sureau(1942)の al-Ph に關する報告に接するのみで、その他は實驗的結核症(Rouse 等, 1944)に於ける觀察であつて兩種 Phosphatase の系統的觀察はないようである。

腎結核ではその病變が未だ初期で組織學的に多くの健常組織を認める場合でも既に al-Ph 反應は著明な影響を受け減弱乃至消失を示している。病變が廣汎な場合は多くは痕跡狀に残存する反應を認めるのみである。かゝる所見は腎結核症では比較的早期より腎機能の低下が認められる事實と關連して甚だ興味あることである。腎は結核症のみでなくその他の病變に對し敏感に反應することは周知の事實で、たとえ結核性病變が限局してい

も腎全體に相當の變化を來すことは當然であるがこの際 Phosphatase 反應は腎障礙の程度をよく反映し組織學的に著變はなくとも障礙の強弱が敏感に切片の Phosphatase 反應に現われるのである。しかし ac-Ph はかゝる敏感な反應を示さないで主として核及び浸潤細胞に相當長く存在することが認められた。このことは ac-Ph の作用機序が al-Ph のそれとは全く異なることを示すものである。

尿管及び膀胱結核では尿管壁及び膀胱壁の毛細血管 al-Ph に特異な増強が認められた。組織の肥厚硬化が認められる場合には全例に證明されるがこの事は又前立腺結核、副睪丸結核組織の毛細血管に就ても同様であつた。この種臓器は正常狀態でも毛細血管は al-Ph に反應するのであるが、結核性病變では特に強く之は組織の肥厚等に關連するものと思われる。Danielli (1946)は組織再生時の al-Ph を報告し、Bradfield (1946)は線維蛋白合成と本酵素との關係を強調し、Jeener(1948)も同様に線維蛋白の生成が速い場合は本酵素の作用が上昇することを認めている。かゝる見解よりすると結核症に於ける尿路組織の肥厚硬化の原因としての結合織増殖も同様に本酵素が重要な關係を有すると言つてよい。

2. 腫瘍組織に就て

腫瘍組織でも同様に毛細血管壁は al-Ph に強い反應を示した。この反應増強は副腎腫、精上皮腫、乳頭狀瘤の様な發育が速い惡性腫瘍に特有であつて、乳頭腫や線維腫の様な良性腫瘍では反應は比較的弱い。腫瘍組織内の毛細血管が al-Ph に強い反應を示すことは高松、大月等(1942)、Manheimer 等(1949)も既に認める所であるが、生體に對する異種組織と見做される腫瘍が極めて速い細胞増殖を營むことに對應する反應であると考えられる。

腫瘍細胞 Phosphatase は原發組織の性狀をよく保持するものとししないものがある。精上皮腫や前立腺等では原發組織と同じ Phosphatase 反應を示し反應は常に強いが、乳頭腫等は全く反應しない腫瘍細胞より成つてゐるに不拘、原發組織である膀胱粘膜は al-Ph 反應を示すのである。副

腎腫の原發組織に就ては今日尙定説を得ないが、副腎皮質に於ける反應よりは兩種 Phosphatase 共に強く反應を示し、腎組織よりは ac-Ph に於て強い反應を有し原發臓器の性狀を示さない。即ち原發臓器の Phosphatase は必ずしも腫瘍細胞のそれを性格づけるものではない。

精上皮腫で腫瘍の轉移巢が甚だよく、原發巢の Phosphatase 特性を保持していることは興味ある所見であるが、骨に轉移した例では轉移巢が特異的に強い al-Ph を有していることが示された。al-Ph に富む腫瘍が骨轉移を來した場合多くは骨溶解性であつて血清 al-Ph 値の上昇が認められることは既に生化學的に明かにされた所であるが (Woodard, 1947) 著者の成績は組織化學的に之を證明するものである。

前立腺癌の骨轉移に際し血清 Phosphatase 特に ac-Ph の上昇が認められ内分泌療法により急速に低下することは Gutman, Woodard Huggins 等やその他多くの研究者により確認され周知の如く重要な臨床的意義を持つものであるが、著者は充分に内分泌療法を行つた場合でも ac-Ph の活性を保持する腫瘍細胞がなお残存していることを認めた。多くの腫瘍細胞は明かに變性を來し ac-Ph 反應を示さないが、部分的には正常に近く強い反應を示す部位が認められたのである。Gilbert 等 (1943) は内分泌療法を施した前立腺癌について生化學的に腫瘍の Phosphatase 値を測定し正常前立腺に比し非常な低下 (1199 : 8) を認めた。著者は之を組織化學的に検出したのであるが、この成績によれば前立腺癌の内分泌療法は現在の一般方式では或る限界があるように思われる。即ち小部分でも Phosphatase 活性を有する腫瘍細胞が認められることは放置すれば再發の危険性があることを豫告するものとする。精上皮腫に對するナイトロジェンマスタードの効果に就ては治療後摘出した標本が既に無構造化していたので遺骸乍ら検索し得なかつたが、見るべき Phosphatase 作用の變化が生じていたことと思われる。

3. 尿路結石と Phosphatase に就ては本誌上の著者等の報文にゆする。

4. ショック死腎に就て。

高度の挫傷による死亡例 1 例に就き死後 9 時間後の腎 Phosphatase を檢した。組織學的には荒廢した所見であつたが、Phosphatase 反應は殆ど痕跡狀に現われたのみである。本例は死後長時間を経過したのと、唯 1 例のみであるから決定的な事は言えないが、少くとも本酵素は相當な影響を蒙つたようである。所謂控減症候群に於て腎實質の虚血が無尿乃至乏尿の大きな原因であることは Trueta (1947) 等が明らかにしているが、かかる虚血の状態に於ては Phosphatase も直に影響されるものと思われる。

結 論

泌尿器科に於ける結核症、結石症、腫瘍及びショック死腎に就き著者等の新證明法により酸性及びアルカリ性兩種 Phosphatase を觀察した。

1. 腎は結核性病變が輕微でもアルカリ性 Phosphatase は速かに活性低下を來し、病變が進むに従い反應は高度に減弱乃至消失し腎機能障礙の程度をよく示す。

2. 結核性病變により泌尿性器の個有の Phosphatase 反應は消失する。此の際アルカリ性 Phosphatase は酸性 Phosphatase より速かに且つ高度に反應減弱乃至消失を來す。

3. 結核性病變により臓器の肥厚硬化を來した場合 (尿管、膀胱等) 該部の毛細血管壁にはアルカリ性 Phosphatase の増強が認められる。

4. 前立腺結石症では兩種 Phosphatase 共反應が減弱し部分的には消失を認めた。

5. 腫瘍組織は必ずしも原發臓器の Phosphatase 特性を保持しない。しかし轉移巢はよく原發腫瘍の Phosphatase 特性を保持する。

6. 悪性腫瘍組織の毛細血管は極めて強いアルカリ性 Phosphatase 反應を示すが良性腫瘍ではその反應は弱いか陰性である。

7. 悪性腫瘍細胞の核は酸性 Phosphatase のみならずアルカリ性 Phosphatase も強い反應を示すが、良性腫瘍では反應は弱いか陰性である。

8. 前立腺癌細胞は内分泌療法により酸性 Phosphatase 反應が減弱乃至消失するが部分的には尚

活性の強い腫瘍細胞が残存する。

9. 骨轉移を來した精上皮腫は原發巢よりははるかに強いアルカリ性Phosphatase反應を示した。

10. ショック死腎では兩種 Phosphatase 共高度に減弱を示した。

第3篇 2, 3 實驗的處置による泌尿性器組織 Phosphatase の消長に就て

Report 3. Histochemical Findings of the Phosphatases in the Urogenital System under some Experimental Procedures.

緒 言

著者は第1編に於て正常泌尿性器に就き、第2篇に於て臨床的に日常取扱う數種の泌尿器科疾患に就き組織化學的方法により Phosphatase の觀察を行つた。腎に何等かの病的侵襲が加えられると細尿管上皮の al-Ph は比較的速かに減弱するが ac-Ph は影響が比較的少ないことを認め、又炎症や腫瘍組織の毛細血管 Phosphatase の態度等に就ても興味ある知見を得た。

本篇では前篇の成績に對應し、腎及び附屬性器に種々の實驗的處置を興えた際の Phosphatase の消長に就き觀察を行つた。

實驗方法

實驗動物にはラツテ (120~180 g) を用いた。Phosphatase 反應は第1篇に於て述べた改變法により、第一標本につき al-Ph 及び ac-Ph 反應を行い觀察した。同時にヘマトキシリン、エオジン標本を作製し組織學的檢索に供した。對照動物にはなるべく同腹仔を用い同様の反應操作を行い觀察した。

實驗成績

I, 機械的腎障碍

機械的に腎機能障碍を起させるため第1群のラツテは腎莖血管を結紮し全く血流を停止せしめ、第2群は尿管を結紮し尿の流通障碍を來させて腎 Phosphatase 反應の消長を時間的に觀察した。

1. 腎莖血管結紮腎

肉眼的には腎莖血管結紮後3時間では色調が暗赤色となるが、6時間では更に腫脹が加わり12時間では鬱血腫脹は著明となり24時間で最も高度となるが、色調は褪色を示し3日では既に汚灰白色の壊死斑を認め7日群では周囲を結合織に包まれた壊死塊に近くなつていた。組織學的には3時間群では細尿管上皮の混濁、毛細血管の擴張及び局部的出血を認めるが、6時間では既に細尿管上皮は混濁腫脹、核染色不良、出血斑の増加等の變化が明かになり24時間ではかゝる變性は最高潮に達するが、3日以後では既に無構造の壊死組織に過ぎぬ。

Phosphatase 反應: al-Ph は3時間で明かに減弱した反應を曲細尿管上皮に示し、腎盂粘膜、粘膜下層の反應も正常に比し弱い。6時間では反應は全く特異性を失ない腎皮質に瀰蔓性に弱く反應を示し12時間迄痕跡狀に残るが24時間では全く消失する。ac-Ph は3時間では核の反應は略々正常に近いが原形質内の反應は減弱し6時間では核及び原形質内の反應は低下し所により陰性化している。12時間では少數の上皮細胞及び核に弱陽性であるのみで非特異的に瀰蔓性に反應する。24時間では全く陰性である。即ち al-Ph より遅れて不活性化されることが認められた。

2. 尿管結紮腎

尿管結紮後24時間、48時間、72時間及び96時間後の腎 Phosphatase を觀察した。

肉眼的には、24 時間では腎は軽微な腫脹を示し、断面は稍々貧血状で腎盂は僅かに擴張している。この様な變化は時間の経過と共に著明になるが、次第に腎實質の混濁が加わり腎盂擴張は 72 時間、92 時間では判然としてくる。組織學的には細尿管上皮は 24 時間では軽度の混濁、糸絨體周邊の出血、細尿管腔の擴張等を認める。しかし 48 時間では主として皮質に多くの出血斑を認め細尿管上皮の混濁及び管腔の擴張は一層明かとなり、72 時間では上皮は扁平化し 96 時間では遂に扁平萎縮し核は染色不良となり、ボウマン氏囊以下細尿管は著しく擴張している。

Phosphatase 反應： al-Ph は 24 時間で既に曲細尿管部で濃淡不整の反應を示すに至り出血部位では痕跡狀に反應するのみである。又正常に近く反應するのは糸絨體に近い近側曲細尿管部であつて遠く離れるに従い減弱する如き像も認められる。48 時間では更に反應減弱し極く小部分に正常反應を呈するのみである。72 時間では扁平化された上皮に線狀に反應を示すのみとなり 96 時間では全く痕跡狀にのみ残存し、時に糸絨體に弱い反應を認める程度となる。ac-Ph は 24 時間では未だ細胞内及び核に正常と同様の強さで反應するが、部分的には稍々減後している。48 時間後の反應は 24 時間後のそれと大差なく唯減弱部位が擴まつた程度であるが、96 時間では唯核にのみ弱陽性に殘存するに至る。

小 括

1. 腎 Phosphatase に最も速かな影響を与えるものは血行停止で、3 時間で多大の活性低下を示し、6 時間でその特性を失ない 12 時間では痕跡狀である。ac-Ph は al-Ph より遅れて不活化される。

反應の低下は腎實質に均等である。

2. 尿流通障礙の腎 Phosphatase 之の影響は血行停止ほど激烈でない。24 時間で區々な反應低下を見るが 72 時間でも尙反應が殘存する細尿管がある。しかし 96 時間では大部分は反應消失し ac-Ph が核内に弱陽性に反應するのみである。

3. 組織學的變性に比し Phosphatase 作用の

低下は速かで且つ明瞭である。

II. 代償性肥大腎

片側腎摘出後の殘存腎に就て Phosphatase の消長を觀察した。

殘存腎は 1 週間は既に對照に較べ代償性肥大が認められ 2 週間では更に明かとなり、30 日では著明に肥大していた。組織學的には糸絨體及び細尿管上皮は對照に較べ稍々大きく管腔も廣くなつてゐる。特に糸絨體にはすべて萎縮乃至は變性等は見られないで充實した大きさを有している。

Phosphatase 反應： al-Ph も ac-Ph も正常の通りであつた。即ち al-Ph は近側曲細尿管部で強陽性で糸絨體では時に弱陽性に瀰蔓性に反應を認めた。ac-Ph は糸絨體及び曲細尿管等の上皮竝に核に陽性であり、集合管部、乳頭管部では稍々増強を示した。

全般として異常部位の出現はない。

小 括

代償性肥大腎では Phosphatase 反應は全く正常で異常部位への出現はなかつた。

III. 腎毒物質投與による影響

腎毒物質として普遍的な亞砒酸ソーダ、昇汞及びアセトスルファミンの 3 種を、輕い腎障害を起さす目的で比較的少量用い、腎 Phosphatase との變化を觀察した。

1. 亞砒酸ソーダ投與群

健康ラツテ 3 群に毎珎 10 mg の割で亞砒酸ソーダを皮下に注射し 24 時間、48 時間及び 96 時間後に屠殺して腎 Phosphatase を觀察した。

肉眼的には腎は正常大で暗赤色を呈し断面は充血を認める。組織學的には 24 時間で既に糸絨體の毛細管蹄係の腫大充血、曲細尿管部の混濁腫脹及び毛細血管の擴張が認められ時間の経過に従い血栓形成も現れるが 96 時間ではこの様な變性は甚だ輕微に殘るのみで恢復を示す像である。

Phosphatase 反應： 24 時間では al-Ph 反應は著明に低下し 48 時間で最も低下が著しいが、96 時間では却つて正常に近い活性を示す部位が多くなる。ac-Ph も 24 時間より 48 時間にかけて活性低下が認められるが 96 時間では正常の反應となり

乳頭管部上皮にも中等度に反応が生じた。ac-Phの活性低下はal-Phのそれに比較してはるかに軽度であつた。

2. 昇汞投與群

3群のラツテに毎肝8.0mgの割に昇汞を皮下に注射し24時間、48時間及び96時間後に屠殺し腎Phosphataseを觀察した。

肉眼的に腎は24時間では貧血状で剖面は軽度に混濁していたが、48時間でも大體同様の變化であつた。しかし96時間では反對に充血状であつた。

組織學的には絲毯體は軽度に浮腫状を呈するのみであるが曲細尿管特に遠側部上皮の混濁腫脹、上皮の管腔内脱落及び圓柱形成等が24時間群でも48時間群でも認められた。しかし96時間ではこれ等の變性は僅かに残存するのみで、毛細血管の充血、赤血球圓柱の形成等が代つて認められた。

Phosphatase 反應：al-Phは近側曲細尿管部で24時間では軽度の減弱を示し、48時間では著明に減弱し僅かに弱陽性に反應するのみとなる。脱落した上皮細胞には中等度に反應が認められる。96時間では減弱はしているが、前者よりは活性が稍々増強して來ている。ac-Phは24時間、48時間共に正常に近い反應を示すが、部分的には弱陽性となつている所もある。96時間では殆ど正常の活性を示す。

3. アセトスルフアミン投與群

3群のラツテにアセトスルフアミン毎肝200mgの割に注射し24時間、48時間及び96時間後に屠殺し腎Phosphataseを觀察した。

腎は肉眼的には全例共著變はなかつた。組織學的には24時間及び48時間群で曲細尿管上皮に軽度の混濁及び管腔の擴張が認められたが96時間では正常組織像を示した。

Phosphatase 反應：al-Phは24時間では大なる活性低下は認められず、48時間で反應の減弱を示すが、96時間では全く正常の反應であつた。ac-Phは3群共著變はなかつた。

小 括

1. 上述3種の軽い腎障碍の中では昇汞が最も強い組織學的變性を起し且つPhosphatase反應

に及ぼす影響も大であり、アセトスルフアミンが最も弱い。

2. 腎毒投與後48時間でPhosphataseの活性は最も低下するが、96時間では既に恢復し或は恢復し始めている。かゝる所見は組織學的所見とよく一致する。

3. 最も影響をうけるのはal-Phであつてac-Phには殆ど變化なくともal-Phには著明な活性低下が認められる。

4. 脱落した細尿管上皮は初期ではPhosphataseを含有している。

IV. 去勢及び發情物質投與の腎竝に雄性附屬性器への影響

本實驗では成熟雄性ラツテに對し去勢術、女性ホルモン、男性ホルモン投與の腎及び雄性附屬性器のPhosphataseに及ぼす影響に就て觀察した。

1. 去勢術施行群

成熟ラツテに兩側除睪術を行い術後21日に屠殺し腎、前立腺及び精囊腺に就てPhosphatase反應を觀察した。

肉眼的には腎は著變なく前立腺は對照の5分の1程度に萎縮し精囊腺も同じ程度に萎縮し且つ蒼白色を呈していた。組織學的には腎は著變なく、前立腺では腺上皮は萎縮して低くなり間質も同じく萎縮しているが、背葉や前葉では腺組織よりは間質の方が多い様な像を呈し、腹葉は全體として最も著明な萎縮を示し、精囊腺でも上皮及び間質に高度の萎縮が認められる。(重量は個體差が大きいため以降省略)

Phosphatase 反應：al-Ph腎では正常に反應を示すが前立腺腹葉上皮は反應極めて低下し大部分は弱陽性となつている。背葉及び前葉の上皮下及び筋層でも正常より反應が低下し弱陽性にすぎぬ精囊腺でも上皮下及び筋層の反應は著しく低下している。しかるにac-Phは腎では正常であるが、前立腺や精囊腺の上皮の核、上皮組織、筋層で寧ろ正常よりは強い反應を示す。特に背葉及び前葉で著明である。

2. 去勢後男性ホルモン投與群

成熟ラツテに去勢術を施し直ちにTestosterone

0.1 mg を毎日皮下注射を行い 21 日後屠殺 Phosphatase 反應に供した。

肉眼的には腎は對照に比し腫大し剖面は軽度に混濁し、前立腺、精囊腺共に色調は正常であるが對照に比し3分の2大で尙萎縮している。分泌物の貯溜も少ない。組織學的には腎皮質の被膜に近く細尿管上皮の混濁と間質の浮腫が認められた。前立腺上皮は正常より低く筋層も薄い。上皮の化生はないが、前葉では上皮脱落が認められた。精囊腺でも同様に腺上皮筋層の軽い萎縮が認められた。

Phosphatase 反應：腎 al-Ph は一般に活性低下し組織學的に變性の認められる部位では消失している。ac-Ph は尿管上皮の反應は低下しているが、核では正常に活性を示す。前立腺腹葉上皮では al-Ph は正常と同じく強陽性で、前葉背葉でも上皮下及び筋層に中等度陽性である。精囊腺上皮下及び筋層でも正常に反應する。ac-Ph は兩腺の上皮下層及び筋層に中等度陽性で、上皮の核の反應も正常である。

3. 去勢後女性ホルモン投與群

成熟雄性ラツテに去勢術を施し直ちに Hexosterol 0.5mg を 21 日間連日皮下注射し、注射終了後屠殺して Phosphatase 反應に供した。

肉眼的に腎は對照に比し稍々腫大し剖面は混濁している。前立腺は萎縮しているが去勢群に比しさほど高度でなく、各葉も判別し得る程度であつた。前立腺は分泌物に乏しく蒼白で菲薄となつていた。兩腺共對照に比し約3分の1大と認められた。組織學的には腎では曲細尿管上部皮の軽度の混濁、絲毯體の萎縮、管腔の擴張及び所々の上皮細胞の剝離等が主な變化である。前立腺は腺腔狭小となり上皮は低く核は強く濃染する。前葉及び背葉では筋層の肥厚が著明で、且つ浮腫が認められる。又前葉では上皮化生を認める。精囊腺では腺小葉は乏しくなり腺腔は狭小となつてゐるが、著明なのは前立腺と同様な筋層の肥厚である。腺上皮は所々に配列不同、核の異形を示した。

Phosphatase 反應：腎皮質の al-Ph は明かに活性低下し多くは管腔内壁に沿ひ弱い反應を示し

ている。ac-Ph は變性高度な部位では弱い反應を示すのみであるが核では中等度に反應する。前立腺腹葉上皮の al-Ph 反應は陰性化しているが前葉及び背葉の筋層の反應は強くなつてゐる。化生上皮の核には al-Ph が反應し、その上皮組織の反應も增強が認められる。ac-Ph は上皮の核に強陽性で、肥厚した筋層には瀰蔓性に中等度に反應する。精囊腺では al-Ph は前立腺と同じく上皮下及び筋層に強い反應を示すが特に上皮組織で著明に增強している。ac-Ph は上皮の核に陽性を示すが、化生を示す如き場合は反應は增強している。上皮組織、筋層では瀰蔓状に陽性である。

小 括

1. 去勢ラツテに Testosterone 0.1 mg 及び Hexosterol 0.5 mg を 21 日間投與することにより腎障害を來し腎 Phosphatase 反應は減弱する。去勢のみでは腎は正常で Phosphatase 反應も亦正常である。

2. 去勢 21 日後の前立腺及び精囊腺 al-Ph は著明に活性が低下する。しかし ac-Ph は却つて濃縮された如くで寧ろ正常より強い反應を示す。

3. 去勢術による附屬性器 Phosphatase の活性低下は Testosterone 投與により正常に近く迄上昇するとされているが、本實驗の投與量程度(0.1 mg) では常態の Phosphatase 活性までは上昇しない。

4. 去勢後 Hexosterol を投與すると Phosphatase は上皮結合組織及び肥厚した筋層に增強し、又化生上皮の核にも旺盛な活性を示す。かかる變化は主として al-Ph であつて ac-Ph は正常に反應する。

5. Hexosterol の Phosphatase 作用への影響は、主として前立腺に見られ精囊腺では軽度である。

總括並に考按

著者は本篇に於ては實驗的に種々の腎障害を起しそれによる腎 Phosphatase の消長と、去勢並に去勢後の發情物質投與による腎及び附屬性器の Phosphatase に及ぼす影響について觀察した。

前篇で臨牀的に觀察した所によれば腎 Phosphatase

tase は疾病の侵襲により顕著な活性低下を示した
が実験的にも甚だ敏感に腎障害に反応するのを認
めることができた。

1. 機械的腎障害による腎 Phosphatase の消
長は al-Ph に関して武内等(1943)の報告に接する
のみである。著者は腎血行停止或は尿管結紮等の
處置を施した後に時間的觀察を試みた結果血行停
止が最も速かに Phosphatase の活性を失わしめ
ることを知つた。即ち術後3時間で反應は低下し
6時間で本酵素はその特性を失ない、12時間では
腎組織に痕跡狀に證明されるのみである。之に對
し尿管結紮による尿流通障礙では24時間では活性
は僅かに低下するが48時間で明らかな低下を示し
96時間で大半消失するのであるから血行停止が酵
素作用に及ぼす影響は甚大であると言えるのであ
る。前篇でショック死腎で Phosphatase 作用の
極度の低下を知つたのであるが本症が急性腎血流
障礙による虚血が主要な役割をなしていることを
想起すれば本實驗成績もよく説明せられるのであ
る。

al-Ph と ac-Ph の反應を比較すると ac-Ph は
常に al-Ph よりは永く活性を保持した。このこと
は ac-Ph は腎では主として核内に證明されるとい
う組織學的特性と同時に al-Ph とは異なつた酵素
學的特性によるものであろうが、臨床的觀察とも
一致していることが認められた。この點に關して
は將來の研究に俟つ所が多い。

2. 腎の代償性肥大が比較的速に行われるこ
とに關しては既に多くの報告があり又組織學的に
も研究(市川等, 1934)されている。著者はラツテ
で片側腎摘出後30日迄の代償性肥大腎の Phos-
phatase を觀察したが、反應は正常で特別な増強
や異常出現は認めなかつた。全般的に反應は均等
な正常反應で充實した感を受けた。兩側腎機能が
正常である際は必ずしもすべての腎組織が働くも
のでなく偏腎となつてはじめて代償的に全能力を
發揮するという見解に一致した所見であり、又異
常反應が認められないことは偏腎でも尙腎機能を
保持するに充分量の Phosphatase を有してい
ると言えると思う。

3. 腎毒投與による實驗的腎障害は Schlayer 等
(1907)以來多くの機能的、病理學的研究が行われ
た。Mac Nider(1912)により、ウラン、昇汞及び
クローム酸加里は細尿管系を侵し、亞砒酸、カン
タリヂン及びヂフテリー毒は主として血管系を侵
することが明らかにされている。又砒素やサルフォ
ンアマイドは所謂 Lower nephron-nephrosis を起
す原因となり得ることも明らかにされた。(Lucké,
1946. 市川・高安, 1951)

實驗的腎毒物質投與による腎 Phosphatase の
消長はすべて al-Ph について觀察された。即ち、
Breedis 等(1943)は硝酸ウラン投與と腎結石形成
につき、Hepler(1945)は各種腎毒物質投與による
變性と石灰沈着との關係につき、Wachstein(1946)
は本酵素と Lipase との關係につき、前田(1951)
は腎毒物質投與による各種臓器の al-Ph の消長に
つき報告した。著者は亞砒酸、昇汞及びアセトス
ルフアミンの比較的少量投與により惹起される腎
變性による兩種 Phosphatase の變化を觀察した。
al-Ph は最も速かに影響をうけ24時間で反應減弱
を認め48時間では最も低下するが96時間では恢復
が認められた。最も強い變性は昇汞で起り本酵素
の活性低下も亦大であるが管腔内脱落上皮は24時
間、最も48時間でも活性を保持していることを認め
た、しかし、96時間ではかかる變化は消失してい
る。Breedis 等はこのような Phosphatase を含
む脱落上皮が腎の石灰沈着、ひいては結石形成を
惹起するという見解を有しているが、Heplerは反
對の見解である。著者の成績では Phosphatase を
有する脱落上皮は48時間迄認められ96時間では恢
復し、又腎全體としては Phosphatase の活性低
下が認められたに過ぎず、酵素作用を有する上皮
が長く細尿管腔に止まつているという像は得なかつ
た。

アセトスルフアミンでは極めて軽い腎障害を得
たのみであつた。Phosphatase 反應も著しい變化
はなく、ac-Ph は殆ど正常状態を維持した。しか
し遠側曲細尿管の變性は認められたのであるから
所謂 Lower nephron-nephrosis と言える徴候は
輕微乍ら示した。砒素や昇汞では全曲細尿管の變

附 圖

寫眞 1 アゾ結合法

腎 al-Ph (6×40)

寫眞 4

精上皮腫 al-Ph (6×40)

寫眞 2 改變第1法

腎 ac-Ph (6×40)

寫眞 5

精上皮腫骨轉移集 (al-Ph) (6×40)

寫眞 3 前立腺肥大症

ac-Ph (6×40)

寫眞 6

膀胱乳頭狀癌 (al-Pn) (6×40)

寫眞 7

尿管結紮腎 4 時間後 (al-Ph) (6×40)

寫眞 8

昇汞投與腎 24時間後 (al-Ph) (6×40)

寫眞 9

去勢ラッテ前立腺 (al Ph) (6×40)

寫眞 10

女性ホルモン投與ラッテ前立腺 (al-Ph) (6×40)

寫眞 11

同上腎 (al-Ph) (6×40)

寫眞 12

男性ホルモン投與ラッテ前立腺(ac-Ph) (6×40)

性を認めたので Phosphatase 反應の變化も著しかったが、アセトスルフアミン群のような軽い變化ではたとえ遠側曲細尿管部に變化はあつても、該部には元來 al-Ph は存在しないから本反應を以て之を窺知することは不適當である。

4. 去勢乃至は發情物質投與による附屬性器の組織學的研究は古くは Hütt (1927), Leydolf (1930) 以來おびただしい數にのぼるが、最近の前立腺 Phosphatase の研究の進歩に伴い酸素とホルモンとの關係に就て更に多くの研究が行われるようになった。

Phosphatase とホルモンとの關係については、Gutman (1938, 39), 高松・馬渡 (1944), Pazos and Huggins (1945), Huggins (1945, 47), Atkinson (1948), Soulairac and Thibault (1948) Dempsy (1949), Nara and Fiore (1949), Bern (1951) 等の al-Ph に就ての報告があり、それ等研究者の略々一致した見解は去勢により性器 al-Ph は全般的乃至は局部的に消失し Androgen 投與により再現し Estrogen 投與により間質 al-Ph が正常に残存するというのである。

著者は去勢竝に去勢後の Testosterone 及び Hexosterol 投與群について腎及び附屬性器の兩種 Phosphatase を觀察した。即ちラツテの前立腺は去勢21日で al-Ph は正常反應部位(腹葉上皮, 筋層, 背葉前葉等の上皮下層)に痕跡狀となるが ac-Ph は却つて反應が増強した如く濃縮して認められる。之に Testosterone を投與すると al-Ph 活性は明かに再現してくるが正常迄は恢復しない。反對に Hexosterol を投與すると al-Ph は腺上皮下層特に肥厚を來した筋層に反應増強し上皮化生を來した際は その部位の核内にも反應を認めるといつた特異の活性を示すのである。ac-Ph にはこの際さほどの變化は認められない。精囊腺に於ては Phosphatase は前立腺に似た反應を呈するが兩種 Phosphatase 共消長の差は少ない。

Bern は去勢ラツテに Estrogen を投與することにより通常は al-Ph に陰性の前立腺前葉上皮が強陽性に反應すると言うが、著者の觀察では之等は前葉の化生上皮の核の al-Ph である。前葉では

所謂 squamous metaplasia が起り易いことは Lassagne (1933) や Burrows (1935) により明らかにされているが、精囊腺上皮でも Hexosterol 投與により化生を認め、その核には al-Ph が反應した。

前立腺と精囊腺の滑平筋層が女性ホルモンの投與により肥厚しこれに al-Ph が強く反應するということは Soulairac-Thibault (1938) により記載され、その後諸家により確認された。著者はこれについて兩種 Phosphatase を觀察し al-Ph は増強するが ac-Ph には特別な變化を見なかつた。Phosphatase が線維蛋白の合成にあずかるという Bradfield (1946) 等の見解に従えば Estrogen は前立腺及び精囊腺の結合組織に筋層の al-Ph を刺激してそれ等組織の肥厚を惹起せしめるということになる。前立腺癌の女性ホルモン大量投與の際腫瘍に常に發生する顯著な結合組織化はかく説明することも出来る。ac-Ph はこの際特別な役割はないようである。

猿や犬などの前立腺は去勢或は女性ホルモン投與により急速な ac-Ph の活性低下を、反對に男性ホルモン投與では對照の數倍の活性増強を呈するという所見 (Gutman et al 1939, Pazos et al 1945) は著者のラツテによる組織學的研究では得られないで ac-Ph は常に大差ない態度であつた。Stafford 等 (1949) によれば幼若ラツテでは猿や犬の實驗によつて得たと同じ成績を得るというが、Gutman (1938) は反對に著者と同じ成績を得ている。この原因は前立腺 ac-Ph の存在部位の種屬的差異によるためと考えられる。即ち ac-Ph は人や猿では前立腺上皮に主として含まれるがラツテでは上皮でなく筋層及び結合組織であつて、Androgen を投與しても筋層や結合組織の ac-Ph には大なる變化は認められないのである。

5. Testosterone 及び Hexosterol を投與されたラツテは腎に程度の差はあれ細尿管の變性を認め al-Ph は反應低下し ac-Ph は部分的に輕度の減弱を示した。大量の發情物質投與による浮腫の發生についてはさきに Deansly (1939) が Estrogen 投與による精囊腺上皮下層の浮腫發生を報告し、

Zuckerman (1940)及び Barrows(1945)等も皮膚の浮腫につき報告している。この原因はEstrogenが水分及び電解質の平衡失調を來すためであろうといわれている。腎障碍については岩下(1949)がその存在に言及しているが、著者も之を全實驗例で認めた。組織學的には腎の變性は高度ではないが al-Ph は明らかに影響されて活性低下を示した。去勢ラツテ群では腎に組織學的變化を認めず且つ Phosphatase 反應も正常である點から發情物質の投與が直接或は間接の原因であることは明かである。

前立腺癌の臨床例では動物實驗に見るが如き腎障碍の症狀に接することは稀であるが、女性ホルモン療法が愈々大量投與の傾向にあるので、この様な危険は念頭におく必要がある。

結 論

本篇に於ては實驗的腎障碍及び去勢並に去勢後の發情物質投與による腎、附屬性器 Phosphatase の消長に就き觀察した。

1. 腎アルカリ性 Phosphatase は血流停止により最も速かに活性低下を示すが尿鬱滞では徐々に低下する。酸性 Phosphatase は遅れて反應低下を示す。

2. 腎毒物質投與による腎障碍では昇汞が最も強く腎アルカリ性 Phosphatase の活性を低下せしめ、亜砒酸ソーダ、サルフォンアマイドが之に次ぐが、投與後96時間では凡て酵素作用の恢復が認められた。

3. 代償性肥大腎では正常範囲内の Phosphatase 分布で異常部位出現や増強は認められない。

4. 去勢施行によりラツテの前立腺及び精囊腺は高度にアルカリ性 Phosphatase の活性低下を示すが、酸性 Phosphatase は却て正常より強い反應を示す。

5. 去勢後 Androgen 投與により前立腺及び精囊腺のアルカリ性 Phosphatase は正常に近い活性を保持するが酸性 Phosphatase には著變はない。

9. 去勢後 Estrogen 投與により肥厚を來した前立腺上皮下の筋層にアルカリ性 Phosphatase の

増強が認められるが、精囊腺では變化は軽度である。

7. 發情物質投與により腎アルカリ性 Phosphatase は一様に活性低下を示した。

本論文は東京大學市川篤二教授の御校閲を得た。特に記して深謝の意を表するものである。

本研究に終始懇篤なる指導及び校閲を賜つた恩師原田彰教授及び病理學教室高松英雄博士に對し深甚なる謝意を表す。尙發情物質の提供は帝國臟器新延藥學博士及び皆川氏の御厚意によるものである。

文 獻

- 1) Atkinson and Elftman: Endocrinology, **40**, 30, 1947. —2) Bauer: Ztschr. Vitamin-Hormon. und Fermentforsch., **2**, 507, 1948. —3) Berg et al.: Am. J. Physiol., **133**, 82, 1941. —4) Berger: Arch. Path., **43**, 620, 1947. —5) Bern: Endocrinology, **48**, 25, 1951. —6) Bern: Am. J. Anat., **84**, 231, 1939. —7) Biddulph et al.: Endocrinology, **38**, 358, 1946. —8) Biesel and Biesel: Cancer Res., **4**, 751, 1944. —9) Blum: Lancet., **2**, 75, July 15, 1944. —10) Bradfield: Nature, **157**, 876, 1946. —11) Bradfield: Exper. Cell. Res., Suppl., **1**, 338, 1949. —12) Buchwald and Hudson: Endocrinology, **37**, 78, 1944. —13) Buchwald and Hudson: Ibid., **37**, 301, 1945. —14) Bunting: Proc. Soc. exp. Biol. and Med., **67**, 370, 1948. —15) Burrows: Am. J. Cancer, **23**, 490, 1931. —16) Carroll: J. Urol., **57**, 42, 1947. —17) Clark, Jr. et al.: J. cl. Endocrinology, **11**, 84, 1950. —18) Cordonnier and Miller: J. Urol., **66**, 12, 1951. —19) Danielli and Catcheside: Nature, **156**, 294, 1945. —20) Danielli: J. exp. Biol., **22**, 110, 1946. —21) David et al.: Endocrinology, **44**, 1, 1949. —22) Davis and Massu: Nature, **160**, 295, 1947. —23) Delory: Brit. M. J., **1**, 566, 1947. —24) 出來: 日泌尿會誌, **41**, 47, 1950. —25) Dempsey and Wisloki: Am. J. Anat., **80**, 1, 1947. —26) Dempsey et al.: Endocrinology, **44**, 88, 1949. —27) Emmell: Anat. Rec., **96**, 423, 1946. —28) Fisherman et al.: J. Urol., **59**, 1198, 1948. —29) Gomori: Proc. Soc. exp. Biol. and Med., **42**, 23, 1939. —30) Gomori: Arch. Path., **32**, 189, 1941. —31) Gomori: Proc. Soc. exp. Biol. and Med., **70**, 7, 1949. —32) Gomori: Am. J. Path., **19**, 197, 1943. —33) Green: Proc. Soc. exp. Biol. and Med., **57**, 82, 1944. —34) Gutman and Gutman: Proc. Soc. exp. Biol. and Med., **39**, 529, 1938. —35) Gutman and Gutman: Ibid., **41**, 227, 1939. —36) Gutman and Gutman: Ibid., **48**, 687, 1941. —37) Hepler et al: Arch. Path., **39**, 133, 1945. —38)

- Heck and Tessier: *J. Urol.*, **62**, 488, 1949. —39) Hepler and Simonds: *Arch. Path.*, **40**, 37, 1945. —40) Huggins: *Arch. Surg.*, **22**, 377, 1931. —41) Huggins: *Biochem. J.*, **25**, 728, 1931. —42) Huggins and Clark: *J. exp. Med.*, **72**, 747, 1940. —43) Huggins and Mc Donald: *J. Urol.*, **52**, 472, 1944. —44) Huggins: *Physiol. Rev.*, **25**, 281, 1945. —45) Huggins and Talalay: *J. Biol. Chem.*, **159**, 399, 1945. —46) Huggins: *Harvey Lectures*, 42, 148, 1947. —47) Huggins and Webster: *J. Urol.*, **59**, 258, 1948. —48) 市川, 大越: *治療*, **32**, 3 號, 1950. —49) 岩下: *治療*, **32**, 3 號, 1949. —50) Jeener: *Nature*, **159**, 578, 1947. —51) Kabat and Furth: *Am. J. Path.*, **17**, 306, 1941. —52) Kay: *Brit. J. exp. Path.*, **10**, 250, 1929. —53) Kenneth et al.: *Endocrinology*, **35**, 73, 1944. —54) Kirk: *Urol. & Cutan. Rev.*, **53**, 683, 1949. —55) Kochakian and Fox: *J. Biol. Chem.*, **153**, 669, 1944. —56) Kochakian and vail: *Ibid.*, **156**, 779, 1944. —57) Kochakian: *Am. J. Physiol.*, **152**, 1948. —58) Kochakian: *Science*, **3**, 581, 1950. —59) 兒玉: *滿洲醫誌*, 附錄號, 291, 1942. —60) 兒玉: *滿洲醫誌*, **36**, 850, 1942. —61) 兒玉: *滿洲醫誌*, **37**, 19, 1942. —62) Krugelis: *J. Cell. and Comp. Physiol.*, **19**, 376, 1941. —63) 久保, 高松: *日本醫學及び健康保險*, **3302**, 14, 1942. —64) 久保, 高松: *日病會誌*, **33**, 219, 1943. —65) 久保, 高松: 第40回病理學會總會特別講演要旨, 1951. —66) Kutscher und Wolbergs: *Ztschr. f. Physiol. Chem.*, **236**, 273, 1935. —67) Lacassagne: *C. R. Soc. Biol. Paris*, **113**, 590, 1933. —68) Lison: *Bull. Histol. Tech. Micro.*, **25**, 23, 1948. —69) Lundquis: *Nature*, **158**, 710, 1946. —70) 中山: *日泌會誌*, **42**, 339, 1951. —71) Mc Shan et al.: *Arch. Biochem.*, **16**, 379, 1948. —72) Menten et al.: *J. Biol. Chem.*, **153**, 471, 1944. —73) Meyer et al.: *Endocrinology*, **41**, 35, 1947. —74) Montagna and Noback: *Anat. Rec.*, **96**, 111, 1946. —75) Moog: *Biochem. Rev.*, **21**, 1946. —76) Moore et al.: *Am. J. Anat.*, **45**, 71, 1936. —77) Moore et al.: *ibid.*, **45**, 109, 1936. —78) 馬渡: *日病會誌*, **34**, 37, 1943. —79) Newman et al.: *Am. J. Path.*, **26**, 257, 1950. —80) Noback and Paff: *Anat. Rec.*, **109**, 71, 1951. —81) 野崎: *皮と泌誌*, **13**, 197, 1951. —82) 大月: *滿洲醫誌*, **36**, 897, 1942. —83) 大月: *滿洲醫誌*, **37**, 93, 1942. —84) 大月: *滿洲醫誌*, **38**, 29, 1943. —85) 小澤: *臨床皮泌誌*, **5**, 238, 1951. —86) 小澤, 辻: *日泌尿會誌*, **43**, 1952. —87) Pazos and Huggins: *Endocrinology*, **36**, 416, 1945. —88) Regens and Wilkins: *J. Lab. and Clin. Med.*, **20**, 250, 1934. —89) Robinson: *Biochem. J.*, **17**, 286, 1923. —90) Roch and Mougne: *Compt. rend. Sci. de biol.*, **136**, 1942. —91) Ross and Ely: *J. Cell. and Comp. Physiol.*, **34**, 71, 1949. —92) Russel et al.: *Arch. Path.*, **38**, 1944. —93) Scott and Huggins: *Endocrinology*, **30**, 107, 1942. —94) Soulairac and Thibault: *C. R. Acad. Sci. Paris.*, **227**, 446, 1948. —95) Soulairac and Thibault: *Sci. Biol. Paris*, **142**, 1512, 1948. —96) Stafford et al.: *Endocrinology*, **41**, 45, 1947. —97) Stafford and Atkinson: *Science*, **107**, 297, 1948. —98) Stafford et al.: *Proc. Soc. exp. Biol. and Med.*, **71**, 353, 1949. —99) Steadman et al.: *Endocrinology*, **37**, 89, 1945. —100) 高松: *日病會誌*, **27**, 935, 1937. —101) 高松: *滿洲醫誌*, **29**, 1351, 1938. —102) Takamatsu: *Tranc. Societ. Path. Japon.*, **29**, 492, 1938. —103) Takamatsu: *Ibid.*, **30**, 120, 1940. —104) Takamatsu et al.: *Ibid.*, **31**, 34, 1940. —105) 高松: *東京醫事新誌*, **3161**, **3182**, 1939. —106) 高松: *日本醫學及び健康保險*, **3200**, 1940. —107) 高松: *日本學術協會報告*, **16**, 143, 1940. —108) 高松, 武内: *滿洲醫誌附錄號*, **363**, 1942. —109) 高松: *滿洲醫誌*, **37**, 457, 1942. —110) 高松: *滿洲醫誌附錄*, **333**, 1942. —111) 高松: *滿洲醫誌*, **37**, 1355, 1942. —112) 高松: *滿洲醫誌*, **37**, 57, 1942. —113) 高松, 小澤, 井崎: (近刊). —114) Takamatsu et al.: *Tranc. Societ. Path. Japon.*, **39**, 1950. —115) Takamatsu et al.: *Ibid.*, **40**, 1951. —116) Vail and Kochakian: *Am. J. Physiol.*, **150**, 560, 1947. —117) Wachstein: *Am. J. Path.*, **22**, 658, 1946. —118) Wachstein: *Arch. Path.*, **43**, 503, 1947. —119) Watkinson et al.: *Brit. Med. J.*, **2**, 492, 1944. —120) Wilmer: *J. exp. Biol.*, **19**, 11, 1942. —121) Wilmer: *J. exp. Med.*, **78**, 225, 1943. —122) Wilmer: *Arch. Path.*, **37**, 227, 1944. —123) Wislocki: *Endocrinology*, **44**, 167, 1949. —124) Wolbergs: *Ztschr. f. Physiol. Chem.*, **238**, 23, 1936. —125) Wolf et al.: *Am. J. Path.*, **19**, 423, 1943. —126) Woodard and Dean: *J. Urol.*, **57**, 158, 1947. —127) Yokoyama and Stowell: *Anat. Rec.*, **109**, 139, 1950. —128) Zorzoli and Stowell: *Ibid.*, **97**, 495, 1947. —129) 前田: *日病會誌*, **38**, 92, 1949. —130) 前田: *日病會誌* (近刊).