分化 8-16 細胞期におけるハムスター卵子の 酵素組織化学的研究

石 田 一 夫

(新潟大学農学部畜産学科)

DALCQ¹⁾ は、ラットの卵子では 8 細胞期において分割球の分化が行なわれると述べている。HAMILTON & SAMUEL もハムスターの卵子で、8 細胞期において分割球が分化して blastocyst²⁾ を形成すると報告している。最近、石田³⁾ は発生初期におけるハムスターの卵子について詳細にしらべたところ、排卵後 70~76 時間の 8 細胞期の卵子は、4 個のほぼ大きさの等しい球形の inner cell と、それらを取り巻く 4 個の扁平な trophoblast とに分化していることを観察した。排卵後 74~77 時間においては、16 細胞期の分化卵子も出現し、8 個の inner cell と、同数の trophoblast とが区別された。これらの卵子には、小さい lecithocoel が認められたが、真の blastocyst の出現するのは排卵後 76 時間からであったと述べている。発生初期における卵管卵子の酵素組織化学的研究は、これまでに、数名の研究者によって報告されているが^{1,4~13)}、分化 8-16 細胞卵子を取り扱ったものはきわめて少ない。MULNARD⁸⁾ と DALCQ¹⁾ は、マウスの分化 8-16 細胞卵子について acid phosphatase の検出を行ない、inner cell にこの酵素が特異的に出現することを報告しているが、これ以外の酵素について観察した報告はまったく見当たらない。

この実験は、ハムスターの分化 8-16 細胞期の卵子について、各種の phosphatases, dehydrogenases および nonspecific esterase を検出し、8 細胞期の卵子および blastocyst と比較したものである。

実験材料ならびに方法

実験動物として、ハムスター (*Mesocricetus auratus*) を用いた。実験はハムスターの環境をなるべく一定にするために、10 月と 11 月に限って行なった。まず、

post-estrous discharge¹⁴⁾ を検査して性周期を確認し、発情予定日の午後 5 時と 6 時の間に発情の開始をみたハムスターを 1 晩雄と交配させた。翌朝、post-estrous discharge の観察を行なうとともに、腔内の精子の有無をしらべた。ハムスターは発情開始後 8 時間で排卵することが報告されているから¹⁵⁾、午後 5~6 時に発情を開始したハムスターは、翌日の午前 1~2 時に排卵するものと推定された。交配したハムスターは、石田³⁾ が記載した time scheme に従って、8 細胞卵子は排卵後 60~70 時間、分化 8-16 細胞卵子は 70~75 時間、blastocyst は 76~80 時間に、それぞれ殺された。

と殺後速かに子宮を摘出して、TC Tyrode 液 (Difco) で洗って卵子を時計皿の中に採集した。卵子の透明帯は 0.02% α -chymotrypsin 液で除去された¹⁶⁾。このように処理された卵子は直ちに 3% glutaraldehyde Lock 液 (cacodylate で pH 7.8 に調製) に 5 分間半固定し¹⁾、酵素の検出に供した。

検出した酵素は acid phosphatase (Acid Pase)^{17~19)}、alkaline phosphatase (Alk Pase)^{17,20)} adenosine-tri-phosphatase (ATPase)²¹⁾、glucose-6-phosphatase (G-6-Pase)²¹⁾、5' nucleotidase (5' Ntidase)²¹⁾、nonspecific esterase (Etase)²²⁾、succinate dehydrogenase (SDH)²³⁾、および malate (MDH)、isocitrate (IDH)、 β -hydroxybutyrate (β -HbDH)、lactate (LDH)、glucose-6-phosphate (G-6-PDH)、glutamate (GDH)、 α -glycerophosphate dehydrogenases (α -GDH) である。それぞれの酵素について使用した基質は、前報に示したとおりである。

処理された卵子は、あらかじめワセリン・パラフィン (9:1) をカバーガラスの四隅に位置するようにおいたスライドガラスの中央に移し、注意しながらカバーガラスをかぶせ、その四隅を静かにしておして卵子を圧迫した。

実験結果

8 細胞期の卵子、分化 8-16 細胞期の卵子および blastocyst について、phosphatases, nonspecific esterase, dehydrogenases の検出を試みたところ、

Enzymohistochemical studies of differentiated 8~16 cell eggs of the hamster.

ISHIDA, Kazuo (Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture, Niigata University, Niigata 950)

Jap. J. Animal Reprod. 18 (3), 1972.

Table 1. Enzyme activities of 8-cell eggs, differentiated 8-16 cell eggs and blastocysts

Enzymes	Eggs				
	8-Cell	Differentiated 8-16 cell		Blastocyst	
		Inner cell	Trophoblast	Inner cell	Trophoblast
Acid Pase	2	4	1	4	1
Alk Pase	4	4	4	4	4
ATPase	3	3	3	3	3
G-6-Pase			nonspecific		
5' Ntidase			nonspecific		
Etase	2	1	2	1	2
SDH	1	1	1	1	1
MDH (NAD, NADP)	3	2	3	2	3
IDH (NAD, NADP)	2	2	2	2	2
β -HbDH	2	1	2	1	2
LDH	3	2	3	2	3
G-6-PDH	1	1	1	1	1
GDH	2	2	2	2	2
α -GDH	2	1	2	1	2

Notes: 1 trace, 2 weak, 3 moderate, 4 intense.

Table 1 に示したような成績が得られた。

Acid phosphatase: Acid Pase の検出には GOMORI の金属塩法と Burstone 法を BARKA が改良した naphthol AS 法を併用した。前者では細胞質に粗な黒褐色顆粒が出現し (Figs. 1, 2, 3), 後者では粗な橙色顆粒が出現して酵素の存在を知ることが出来た (Fig. 4)。Table 1 にみられるように, Acid Pase は 8 細胞期の卵子では比較的少なく, それぞれの分割球は弱い活性を示したが, 分化 8-16 細胞期の卵子では inner cell にきわめて強い活性が現われた。これに反して, trophoblast の活性はきわめて微弱であった。blastocyst においても, 分化卵子と類似の反応が観察された。

Alkaline phosphatase: Alk Pase の検出には GOMORI の金属塩法と BURSTONE の naphthol AS 法を行なったが, 前者がすぐれていた。後者は反応が弱く, 観察には不適當であった。Gomori 法によって, 細胞質に粗な黒褐色の顆粒が出現し, 酵素の存在が証明された (Fig. 5)。その活性はいずれの時期の卵子においてもきわめて高く, 分割球, inner cell または trophoblast の間に差異を認めることは出来なかった。

Adenosine-tri-phosphatase: ATPase は WAHSTIN & MEISEL の金属塩法によって検出したが, いずれの時期の卵子においても細胞の周辺部が褐色に染色され,

かなりの活性を示した。発生の時期による酵素活性の変化はみられなかった。

Glucose-6-phosphatase および 5' nucleotidase: これらの酵素の検出にも Wachstein & Meisel 法を用いた。細胞質に黄褐色の顆粒が出現したので, 酵素の存在を思わせたが, glycerophosphate を基質にして反応させたところ同様な像がみられたので, 基質特異性のないことがわかった。従って, これらの酵素の存在を確認することは出来なかった。

Nonspecific esterase: Etase の検出には BURSTONE の naphthol AS 法を用いた。酵素の存在部位は青色を呈した (Fig. 6)。8 細胞期の卵子の分割球はいずれも弱い活性を示したが, 分化卵子および blastocyst においては, trophoblast には弱い活性がみられたが, inner cell ではほとんど活性を示さず痕跡的であった。

Dehydrogenases: SDH の検出は NACHLAS らの方法によったが, その他の dehydrogenases はすべて BARKA & ANDERSON の方法を用いた。いずれの酵素も青色の diformazan によって, その活性が認められた (Figs. 7, 8, 9)。Table 1 にみられるように, 8 細胞期の卵子においては, MDH (NADP) と LDH はかなり強い活性を示し, IDH (NAD, NADP), β -HbDH, GDH および α -GDH は弱く, SDH と G-6-PDH は痕

跡的であった。分割球の間における酵素活性のちがいはみられなかった。分化卵子において、MDH, LDH, β -HbDH, α -GDH 活性は、trophoblast では 8 細胞期の卵子の分割球のものと変わらなかったが、inner cell の活性はいずれも低下した。これに対し、SDH, IDH, G-6-PDH および GDH は inner cell と trophoblast の間に活性のちがいはみられず、また、8 細胞期の卵子の分割球の活性と同じであった。blastocyst においても分化卵子とまったく同様の傾向が認められた。

考 察

発生初期におけるほ乳動物の卵子の組織化学的研究は、これまでいくつかの報告がみられる。すなわち、DALCQ^{1,4,5)} はマウスとラット、MULNARD⁶⁾ はマウスを用いて phosphatases の観察を行ない、ELMINGER & LUDWIG⁹⁾ はハムスターで Alk Pase と diaphorase, ISHIDA^{11,12)} はハムスターと家兎で phosphorylase, UDPG-glycogen transferase, nonspecific esterase, monoamine oxidase および各種の dehydrogenases, LIN ら⁶⁾ はマウスで各種の dehydrogenases, ISHIDA & CHANG⁷⁾ はハムスターと家兎で SDH, SUGAWARA & HAFEZ¹⁰⁾ は家兎で各種の dehydrogenases について行なっている。また、SMITH & WILSON¹³⁾ はマウスの着床期における blastocyst の Acid Pase について報告している。DALCQ^{4,5)} は blastocyst に Acid Pase および Alk Pase の存在を証明し、前者は inner cell に特異的に強く現われることを述べているが、最近、DALCQ¹⁾ と MULNARD⁶⁾ は Gomori 法を用いて分化細胞卵子を観察し、inner cell に Acid Pase が強く出現することを報告している。本実験においては、Gomori 法と Burstone 法の Barka 改色法を用いてハムスターの分化卵子を観察したところ、inner cell に Acid Pase が強く現われ、DALCQ や MULNARD の結果によく一致していた。その他の報告では、分化卵子を取り扱ったものはまったくみられない。

8 細胞期の卵子と blastocyst について、LIN ら⁶⁾ はマウスを用いて観察し、MDH, α -GDH, G-6-PDH, GDH はいずれも 8 細胞期の卵子でかなりの活性を示しており、blastocyst ではさらに強まるが、 β -HbDH はいずれの卵子においても活性が弱いことを述べている。しかしながら、blastocyst において inner cell と trophoblast との間における酵素活性の比較については触れていない。SMITH & WILSON は着床期におけるマウスの blastocyst の Acid Pase について観察し、交

配後 90 時間の blastocyst では inner cell, trophoblast ともに Acid Pase をもっているが、交配後 92~94 時間のものでは inner cell の Acid Pase は消失し、trophoblast にも活性がみられるという。さらに、交配後 94~96 時間のものでは inner cell, trophoblast ともに Acid Pase 活性は認められなかったと述べている。SUGAWARA & HAFEZ¹⁰⁾ は家兎の卵子の G-1-PDH, G-6-PDH, GDH, α -GDH, LDH, MDH, IDH, SDH について観察し、morula および blastocyst の酵素活性は、一般に、分割初期の卵子にくらべて強く、また、酵素活性は G-1-PDH, G-6-PDH, α -GDH が高く、その他のものは低かったといっている。酵素活性はいずれも inner cell が trophoblast よりも強かったと述べている。本実験において、ハムスターの初期の blastocyst (排卵後 76~80 時間) では、Acid Pase は trophoblast にもごく少量みられたが、大部分は inner cell に認められ、SMITH & WILSON¹³⁾ の着床時のマウスの blastocyst における Acid Pase の分布とは趣を異にしていた。また、SUGAWARA & HAFEZ¹⁰⁾ は家兎の blastocyst の dehydrogenase 活性は trophoblast よりも inner cell につよく現われたといっているが、本実験におけるハムスターの blastocyst では、むしろ逆の分布状態を示すものが多かった。

要 約

排卵後 70~76 時間にみられるハムスターの分化 8-16 細胞卵子について、phosphatases, nonspecific esterase および dehydrogenases を組織化学的に観察し、8 細胞期の卵子および blastocyst と比較した。

8 細胞期の卵子において、Alk Pase 活性は強く、ATPase は中等度、Acid Pase は弱かった。Acid Pase および Alk Pase は細胞質に様に分布していたが、ATPase は細胞質周辺部に局在していた。G-6-Pase と 5'Ntidase は基質特異性がなく、存在を確認することは出来なかった。分化卵子と blastocyst において、Alk Pase と ATPase の活性は inner cell と trophoblast との間に差異はみられなかったが、Acid Pase は trophoblast より inner cell に強く現われた。

Etase 活性は、いずれの時期の卵子においても弱かったが、分化卵子と blastocyst では inner cell より trophoblast につよくみられた。

8 細胞期の卵子において、MDH と LDH の活性は中等度であったが、その他の dehydrogenase 活性は弱かった。分化卵子と trophoblast において、MDH, β -

HbDH, LDH および α -GDH 活性は inner cell よりも trophoblast につよく現われた。SDH, IDH, G-6-PDH, GDH については、両種の細胞の間に活性のちがいはみられなかった。

この研究は VII Wold Congress on Fertility and Sterility, Tokyo/Kyoto, 1971 において講演した。

(1972, 4, 11 受付)

文 献

- 1) DALCQ, A. M.: personal communication, 1966.
- 2) HAMILTON, W. J. & D. M. SAMUEL: *J. Anat.*, **90**, 395, 1956.
- 3) 石田 (一): 本誌, **17**, 25, 1971.
- 4) DALCQ, A. M.: *Studies on Fertility* **7**, 113, 1955.
- 5) DALCQ, A. M.: Introduction to general embryology, Oxford Univ. Press, 1957.
- 6) LIN, C. H., C. F. HUANG & T. K. CHANG: *Acta Biol. Exp. Sinica*, **9**, 281, 1964.
- 7) ISHIDA, K. & M. C. CHANG: *J. Histochem. Cytochem.*, **13**, 470, 1965.
- 8) MULNARD, J. G.: Ciba Foundation Symposium on Preimplantation Stages of Pregnancy, p. 123, 1965.
- 9) ELMINGER, P. & K. S. LUDWIG: *Experientia*, **21**, 635, 1965.
- 10) SUGAWARA, S. & E. S. E. HAFEZ: *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, **126**, 1967.
- 11) ISHIDA, K.: *Arch. histol. jap.*, **29**, 447, 1968.
- 12) ISHIDA, K.: *Jap. J. Fertil. Steril.*, **14**, 126, 1969.
- 13) SMITH, M. S. R. & I. B. WILSON: *J. Embryol. Exp. Morph.*, **25**, 165, 1971.
- 14) ORSINI, M. W.: *Proc. Animal Care Panell*, **11**, 193, 1961.
- 15) HARVEY, E. B., R. YANAGIMACHI & M. C. CHANG: *J. Exp. Zool.*, **146**, 231, 1961.
- 16) TOYODA, Y. & M. C. CHANG: *Nature*, **220**, 589, 1968.
- 17) GOMORI, G.: Microscopic histochemistry, The Univ. of Chicago Press, Chicago, 1952.
- 18) BURSTONE, M. S.: *J. Nat. Cancer Inst.*, **21**, 523, 1958.
- 19) BARKA, T.: *Nature*, **187**, 248, 1960.
- 20) BURSTONE, M. S.: *J. Histochem. Cytochem.*, **9**, 146, 1961.
- 21) BANCROFT, J. D.: An introduction to histochemical technique, Butterworths, London, 1967.
- 22) BURSTONE, M. S.: *J. Nat. Cancer Inst.*, **18**, 167, 1957.
- 23) NACHLAS, M. M., K. C. TSOU, E. D. SOUZA, C. T. CHENG & A. M. SELIGMAN: *J. Histochem. Cytochem.*, **5**, 420, 1957.
- 24) BARKA, T. & P. J. ANDERSON: Histochemistry, Hoeber Medical Division, Harper & Row Publishers, New York, 1963.
- 25) 石田 (一): 本誌, **17**, 110, 1972.

Explanation of Figures

All pictures were taken a magnification of $\times 250$.

- Fig. 1. 8-Cell egg·Acid Pase Gomori method
- Fig. 2. Differentiated 8-cell egg·Acid Pase Gomori method
- Fig. 3. Blastocyst·Acid Pase Gomori method
- Fig. 4. Differentiated 16-cell egg·Acid Pase Burstone method, modified by BARKA
- Eig. 5. Differentiated 16-cell egg·Alk Pase Gomori method
- Fig. 6. Differentiated 8-cell egg·Etase Burstone method
- Fig. 7. Differentiated 16-cell egg·MDH (NAD) Barka & Andersen method
- Fig. 8. Differentiated 16-cell egg·IDH (NAD) Barka & Anderson method
- Fig. 9. Differentiated 16-cell egg·LDH Barka & Anderson method

PLATE

Summary

Enzymohistochemical demonstrations of phosphatases, nonspecific esterase and dehydrogenases in differentiated 8-16 cell eggs which appear 70 to 76 hours after ovulation were carried out in this study. For comparison, 8-cell eggs before differentiation and early blastocysts were observed.

Phosphatases: In 8-cell eggs, alkaline phosphatase activity was intense, adenosine-tri-phosphatase moderate, and acid phosphatase weak. Acid and alkaline phosphatases were spread throughout the cytoplasm, while adenosine-tri-phosphatase localized near the cell membrane. Concerning differentiated eggs and blastocysts, acid phosphatase activity was much stronger in inner cells than in trophoblasts, while the activities of alkaline and adenosine-tri-phosphatase showed no local differences. With all the eggs from the three stages, the presence of glucose-6-phosphatase and 5' nucleotidase was not confirmed, because they were nonspecific to the substrates.

Nonspecific esterase: In eggs at every stage, nonspecific esterase activity was weak, though it spread throughout the cytoplasm. In differentiated eggs and blastocysts, its activity was stronger in trophoblast than in inner cells.

Dehydrogenases: In 8-cell eggs, activities of malate and lactate dehydrogenases were moderate, while those of other dehydrogenases were weak or feeble. In differentiated eggs and blastocysts, local changes were observed in the strength of some dehydrogenase activities; activities of malate, β -hydroxybutyrate, lactate and α -glycerophosphate dehydrogenases were stronger in trophoblasts than in inner cells of such eggs. As for succinate, isocitrate, glucose-6-phosphate, glutamate dehydrogenases, the strength of their activities showed no differences between inner cells and trophoblasts.