Prostaglandin $F_{2\alpha}$ のラットの黄体血管及び黄体機能に対する作用

松本公一郎・松尾三郎・酒井利孝・津田 健・

柴田邦治・穂本 晃・無量林堯

(小野薬品工業株式会社 中央研究所)

ラット¹⁾や羊²⁾その他多くの動物において, prostaglandin $F_{2\alpha}$ ($PGF_{2\alpha}$) が黄体退化作用を有することはよく知られているが, そのメカニズムについて定説はない。McCRACKEN ら^{3,4)}は, $PGF_{2\alpha}$ が子宮から分泌されて黄体に作用する機序は, 子宮静脈-卵巣動脈間の counter-current diffusion によると説明した。一方, $PGF_{2\alpha}$ は血管収縮作用⁵⁾を有することが知られており, 卵巣動脈あるいは子宮静脈-卵巣動脈の収縮作用による血流の減少作用が黄体退化作用と関連して考えられるようになった。PHARRISS ら⁶⁾は卵巣の血流量が, GODING ら⁷⁾及び NOVY ら⁸⁾は黄体血流量の減少が黄体退化の原因であることを示唆し, BEHRMAN ら⁹⁾は卵巣で JANSON ら¹⁰⁾は黄体での血流量に影響なく progesterone (P) 分泌を抑制したという相反する報告がある。

著者らは, 本報において microangiography による外因性 $PGF_{2\alpha}$ 及び noradrenaline (NA) の黄体血管に対する作用を観察し, 黄体機能との相互の関連性について考察したので報告する。

実験材料及び方法

供試動物は生後 8 週令の未経産 Wistar 系ラットである。これを同系雄ラットと交配させ, 腔スメアー中に精子を認めた日を妊娠 0 日目として妊娠 17 日目に実験に供した。 $PGF_{2\alpha}$ (小野薬品) は 50 mM リン酸緩衝液 (pH .4) に溶解して, NA はノルアドリナリン® (三共) を生理食塩液で希釈して使用した。

1. 黄体の微小血管に対する作用

ウレタン麻酔下で開腹し, 消化管及び子宮を体外に引き出して腹部大動脈を露出し, 腹腔内に温めた生理食塩

The effect of prostaglandin $F_{2\alpha}$ on luteal microvasculature and luteal function in rats.

MATSUMOTO, Kimiichiro, Saburo MATSUO, Toshitaka SAKAI, Takeshi TSUDA, Kuniharu SHIBATA, Akira AKIMOTO, & Takashi MURYOBAYASHI (Research Institute, Ono Pharmaceutical Co. Ltd., 3-1-1, Sakurai, Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618)

Japan. J. Anim. Reprod. 24 (1), 1678.

Fig. 1. Schema of cannulization in microangiography.

液を満した。図1に示すように子宮と卵巣を切り離し, 左卵巣の動静脈に糸をかけておく。大動脈は右腎動脈直下, 左卵巣動脈より約 1.5 cm 下及び約 3 cm 下を静脈と分離し糸をかけ, カニューレ (金属製内径 0.7 mm) を挿入した。卵巣の灌流は, 頸部静脈の切開と同時に右腎動脈直下の大動脈を結紮し, 直ちにヘパリン (250 U/ml) を含む生理食塩液 (37°C) 5 ml をカニューレを介して注入した後, 直ちに微小炭末を含む 5%ゼラチン・生理食塩液 (37°C) 5 ml を注入することによって行った。注入圧は, 注入ポンプとカニューレの間に設置した水銀マンオメーターにより 130~140 mmHg で一定になるようにした。注入が終わると圧がかかった状態で左卵巣動静脈を結紮して卵巣を取り出した。卵巣は直ちに 0~5°C の生理食塩液に浸し, 約 2 時間後, 周囲の脂肪を除去し 5°C に冷した Bouin 液に浸して冷蔵庫中に 24 時間放置した。その後常法に従ってパラフィン包埋を行い,

20 μ の透徹切片を作製し顕微鏡にて黄体内の微小血管像を観察した。

黄体内の微小血管状態の指標としては、微小炭末で内部を充満した血管の太さ及び網目状構造の状態を観察し、次の四段階の評価を行った (Plate 1)。

卅: 黄体全体の毛細血管は口径が 9~11 μ の太いものが支配的で鮮明な微小炭末分布の網目状構造が認められる (No. 1)

卅: 黄体全体の毛細血管は口径が 2~2.5 μ の細いものが支配的で鮮明な網目状構造が認められる (No. 2)

+: 網目構造が部分的に途切れを生じ不鮮明になっている (No. 3)

±: 黄体全体の網目状構造がくずれ、断片的な血管像しか認められない (No. 4)

薬物は、卵巢灌流を行う 60 秒前 (PGF_{2 α}) または 30 秒前 (NA) に頸部静脈内に投与した。

2. 全身血圧に対する作用

ウレタン麻酔下で頸動脈にポリエチレンカテーテルを挿入、圧トランスジューサー (MP-24-S, 日本光電) を介して、平均血圧をポリグラフ (RM-85, 日本光電) に記録した。薬物は尾静脈及び背部皮下に投与した。

3. 胎仔に及ぼす影響

妊娠 17 日目の 10 時及び 16 時に PGF_{2 α} または NA を

ラット尾静脈あるいは背部皮下に投与し、妊娠 20 日目にて全てのラットを屠殺剖検して、子宮重量、着床数、生胎仔数を調べた。各母体の総着床数から生胎仔数を差引いた数を死胎仔数 (流産胎仔数+子宮内死胎仔数) とし、総着床数に対する百分比をもって胎仔死亡率とした。

実験結果

1. 黄体の微小血管に対する作用

(1) 妊娠黄体の微小血管像 (Plate II): 炭末分布から観察されるラットの妊娠黄体の微小循環は、卵巢動脈から分かれ、黄体周囲に分布した小動脈からさらに枝分かれして黄体表面の結合組織を貫き、黄体内に入り込んだ多数の細動脈により灌流されている。この細動脈はすぐに分散し、毛細血管として黄体細胞を包囲しながら迂曲し網目状の毛細血管網を形成する。黄体細胞からのこの毛細血管網は黄体中心に向かって進み、中心にある集合静脈に合流し黄体外に出る (No. 5)。無処置群は 7 頭の妊娠ラットから得た 39 個の黄体について観察した。その結果、表 1 に示すように、36 個 (92.3%) の黄体には鮮明な網目状構造が観察され、その内の 27 個 (69.2%) の黄体の毛細血管は口径が 9~11 μ の太いものが支配的であった (No. 5)。

(2) NA による影響: NA を黄体灌流の 30 秒前に投

Table 1. Effect of prostaglandin F_{2 α} (PGF_{2 α}) and noradrenaline (NA) on microvasculature of corpus luteum (CL) of rats

Groups		No. of animals	No. of CL observed	No. of CL microvascularized as stages (%)			
				卅	卅	+	±
Control		7	39	27 (69.2)	9 (23.1)	2 (5.1)	1 (2.6)
NA	10 μ g/kg	5	27	8 (29.6)	9 (33.3)	5 (18.5)	5 (18.5)
	50 μ g/kg	5	26	1 (3.8)	6 (23.1)	7 (26.9)	12 (46.2)
	50 μ g/kg	5	22	0 (0)	12 (54.5)	6 (27.3)	4 (18.2)
PGF _{2α}	125 μ g/kg	5	27	1 (3.7)	9 (33.3)	13 (48.2)	4 (14.8)
	250 μ g/kg	5	22	3 (13.6)	2 (9.1)	11 (50.0)	6 (27.3)

Four stages of luteal microvasculature.

卅: a multitude of thick microvasculature (9~11 μ in diameter) is observed as a whole, and the network is clear (Photo 1).

卅: a multitude of thin microvasculature (2~2.5 μ in diameter) is observed as a whole, and the network is clear (Photo 2).

+: the network is partially broken and obscure (Photo 3).

±: a broken network is observed, and the fragmental vessels only are observed in corpus luteum (Photo 4).

与した場合、黄体の微小循環障害を示唆する次のとき成績 (表 1) が得られた。すなわち、10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ の投与では、5 頭の動物から得た 27 個の黄体中 17 個 (62.9%) に明瞭な網目状構造が観察され、その内 8 個 (29.6%) は太い毛細血管が支配的であり、9 個は細い毛細血管が支配的であった (No. 6)。他の 10 個 (37%) の黄体には網目状構造のくずれ (部分的: 18.5%, 全体的: 18.5%) が観察され、無処置と比較すると明らかな差がみられた。50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 投与では、網目状構造のくずれが增強した。つまり 5 頭の動物から得た 26 個の黄体中 19 個 (73%) に網目状構造のくずれが全体的に観察され、その内の 12 個 (46.2%) は、ほとんどの毛細血管が点状にしかみえないものもあった (No. 7)。

(3) $\text{PGF}_{2\alpha}$ による影響: $\text{PGF}_{2\alpha}$ を黄体灌流の 1 分前に静脈内投与した場合、表 1 に示すように用量に応じた黄体の微小循環の抑制が認められた。 $\text{PGF}_{2\alpha}$ 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 投与では、5 頭の妊娠ラットから得た 22 個の黄体中 12 個 (54.5%) は細い (2~2.5 μ) 毛細血管が支配的でありながら鮮明な網目状構造が観察された (No. 8) が、他の 6 個 (27.3%) は部分的、4 個 (18.2%) は全体的に炭末分布の網目状構造のくずれが観察された。また $\text{PGF}_{2\alpha}$ 125 $\mu\text{g}/\text{kg}$ では 5 頭の動物から得た 27 個の黄体中 17 個 (63%) に網目状構造のくずれ (部分的: 48.2%, 全体的: 14.8%) が観察された (No. 9)。250 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 投与ではさらにその率が増加し 5 頭から得た 22 個の観察黄体中 17 個 (77.3%) に網目状構造のくずれ (部分的: 50%, 全体的: 27.3%) が観察された (No. 10)。

2. 全身血圧に対する作用

$\text{PGF}_{2\alpha}$ は頸動脈圧に対して二相性または三相性の変化を示した。すなわち、5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (約最小作用量) ~100 $\mu\text{g}/\text{kg}$ の投与量では一過性の下降後、上昇作用が認められた。

NA は 0.5~50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ の投与量によって 2~5 分間持続する上昇作用を示した。

皮下投与においては、 $\text{PGF}_{2\alpha}$ 及び NA はいずれも 1 mg/kg で同程度の血圧上昇作用を示した。

3. 胎仔に及ぼす影響

静脈内投与では $\text{PGF}_{2\alpha}$ (250 $\mu\text{g}/\text{kg}$) 及び NA (50 $\mu\text{g}/\text{kg}$) の両投与群とも胎仔に影響を及ぼさなかった。一方、皮下投与では $\text{PGF}_{2\alpha}$ 250 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 以上の投与群において著明な胎仔死を認めた。250, 500 及び 1000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ の投与群はそれぞれ 77.3, 83.8 及び 100% と高い胎仔死率を示し、子宮重量も有意に軽かった。NA 投与群では、1000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ でもほとんど胎仔の死を認めなかった (表 2)。

考 察

$\text{PGF}_{2\alpha}$ は動物において黄体退化作用を有するが、その機構についての定説はない。著者らは、報告者によって必ずしも一致した結果をみない黄体循環に対する作用について、microangiography による炭末分布を顕微鏡的に観察することによって黄体の微小血管に対する作用を追究した。その結果、 $\text{PGF}_{2\alpha}$ は 50~250 $\mu\text{g}/\text{kg}$ の静脈内投与で用量に応じた黄体血管収縮作用を示し、NA

Fig. 2. Effects of prostaglandin $\text{F}_{2\alpha}$ ($\text{PGF}_{2\alpha}$) and noradrenaline (NA) on arterial blood pressure in rats.

Table 2. Effects of prostaglandin $F_{2\alpha}$ and noradrenaline on fetal mortality, administered in rats at day 17 of pregnancy (sacrificed on day 20)

Groups	Doses ($\mu\text{g/kg}$, b. i. d.)	route	No. of effective cases/No. treated	Mortality rate (%)	Total fetal weight in uterus (g) Mean $\pm$ S.E.
Control	Vehicle	sc	0/4	6.6	61.7 $\pm$ 5.6
Noradrenaline	50	iv	0/5	0	63.2 $\pm$ 2.8
	10,000	sc	0/5	1.9	58.0 $\pm$ 4.4
	250	iv	0/5	0	58.0 $\pm$ 4.4
	100	sc	0/5	5.8	62.2 $\pm$ 8.0
Prostaglandin $F_{2\alpha}$	250	sc	5/9	77.3	23.3 $\pm$ 7.4*
	500	sc	7/9	83.8	15.6 $\pm$ 8.0*
	1,000	sc	4/4	100	3.6 $\pm$ 1.5*

* Significantly different from control, $p < 0.05$

The 'effective cases' referred to those retained no live fetuses regardless of dead fetuses in the same uterus.

Abortion rate shows the proportion of the aborted and resorbing conceptuses to the implanted ones.

も 10~50 $\mu\text{g/kg}$ で同様な作用を示した。この収縮作用の強度は、PGF $_{2\alpha}$ 50 $\mu\text{g/kg}$ ならびに NA 10 $\mu\text{g/kg}$ の投与量においてはほぼ等しい結果であったが、頸動脈圧の上昇作用は NA の方が強いように見受けられた。また PGF $_{2\alpha}$ の末梢血管収縮作用が、NA に比較して黄体血管で高度に特異的であるとは思われなかった。

本実験において、妊娠 17 日目の無処置ラットの黄体は豊富な微小循環網を持つことが明らかとなったが、この部位における毛細血管の発達と十分な血液循環が、黄体細胞への O $_2$ やステロイド前駆物質の供給、黄体細胞から標的臓器へのステロイドホルモンの分泌などのために重要であろうと推察される。ABDUL-KARIM ら¹¹⁾も、ウサギにおいて妊娠 16~20 日目の黄体血流量は最大となり、progesterone 分泌の極期と一致するため、増加した血流量が活発なステロイド生合成と関係あるのではないかと唆しているように、黄体細胞への血流の持続的減少は黄体機能の低下につながるかも知れない。

著者ら^{12,18)}は、ラットにおける PGF $_{2\alpha}$ の胎仔の斃死や分娩誘発作用は黄体退化作用の結果起こるものと考えているので、本報においては黄体機能を知る一指標として妊娠 17 日目投与が胎仔に及ぼす影響についても観察したところ、PGF $_{2\alpha}$ または NA の静脈内投与では、黄体血管を収縮させた量の 2 回投与（6 時間間隔）によっていずれも胎仔の斃死を認めなかった。そこで、静脈内投与より持続性が期待できる皮下投与によって、同程度の血圧上昇作用を示した PGF $_{2\alpha}$ または NA の 1 mg/kg を 2 回投与（6 時間間隔）したところ、PGF $_{2\alpha}$ は 100% の胎仔斃死率を示したのに反し、NA は全く作用を示さ

なかった。

本実験は黄体血管収縮作用と黄体機能との相互関係を推察するにはなお不十分であるが、上記の結果や、*in vitro* においても PGF $_{2\alpha}$ が progesterone 合成の低下を招く^{14,15)} ことなどから、PGF $_{2\alpha}$ による黄体血管収縮作用は黄体退化作用の主因として結びつかない単なる血管に対する薬理作用であるかも知れない。この薬理作用が、黄体退化の一要因となりうるか否かは今後に残された問題である。

要 約

妊娠 17 日目のラットを用い、microangiography によって黄体の微小血管に対する PGF $_{2\alpha}$ の作用を検討し、次の知見を得た。

1. 黄体の微小血管に対し、PGF $_{2\alpha}$ は 50, 125 及び 250 $\mu\text{g/kg}$ (iv) により用量に応じた著明な収縮作用を示す所見が認められた。noradrenaline (NA) では、10 及び 50 $\mu\text{g/kg}$ (iv) により同様な変化が認められた。

2. 全身血圧に対し、静脈内投与では PGF $_{2\alpha}$ の 5~100 $\mu\text{g/kg}$, NA の 0.5~50 $\mu\text{g/kg}$ で上昇作用が認められた。皮下投与では、両者とも 1 mg/kg で血圧上昇作用が認められた。

3. 胎仔に及ぼす影響について、PGF $_{2\alpha}$ 250 $\mu\text{g/kg}$ 及び NA 50 $\mu\text{g/kg}$ の静脈内投与 (b. i. d.) によっていずれも胎仔の斃死を認めなかった。一方、皮下投与 (b. i. d.) においては、PGF $_{2\alpha}$ 1 mg/kg によって 100% の胎仔斃死率が認められたが、同量の NA では認められなかった。

以上の結果は、PGF_{2α} 及び NA が、いずれも著明に黄体の微小循環を抑制するのに対し、黄体機能の低下は PGF_{2α} によってのみ見られることを示すものである。

稿を終わるにあたり、御校閲をいただきました大阪府立大学蘭守龍雄教授に深謝いたします。

(1977. 8. 1 受付)

文 献

- 1) PHARRISS, B. B. & L. J. WYNGARDEN: *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* **130**, 92, 1969.
- 2) MCCracken, J. A., M. E., GLEW & R. J. SCARAMUZZI: *J. Clin. Endocrinol. Metab.* **30**, 544, 1970.
- 3) MCCracken, J. A., J. C. CARLSON, M. E. GLEW, J. R., GODING, D. T. BAIRD, K. GREEN & B. SAMUELSSON: *Nature New Biol.* **238**, 129, 1972.
- 4) MCCracken, J. A.: *Ann. NY Acad. Sci.* **180**, 456, 1971.
- 5) DUCHARME, D. W., J. R. WEEKES & R. G. MONTGOMERY: *J. Pharm. Exptl. Therapeut.* **160**, 1, 1968.
- 6) PHARRISS, B. B. & L. J. WYNGARDEN: *Proc. Soc. Exptl. Biol. Med.* **130**, 92, 1969.
- 7) GODING, J. R., D. T. BAIRD, I. A. GUMMING & J. A. MCCracken: *Acta Endocrinol. (Suppl.)* **158**, 169, 1972.
- 8) NOVY, M. J. & M. J. COOK: *Am. J. Obstet. Gynecol.* **117**, 381, 1973.
- 9) BEHRMAN, H. R., K. YOSHINAGA & R. O. GREEP: *Ann. NY Acad. Sci.* **180**, 426, 1970.
- 10) JANSON, P. O., I. ALBRECHT & K. AHREN: *Acta Endocrinol.* **79**, 337, 1975.
- 11) ABDUL-KARIM, R. W. & N. BRUCE: *Fert. Ster.* **24**, 44, 1973.
- 12) 松本(公)・柴田(邦)・酒井(利)・津田(健)・杉山(正)・佐藤(恵)・藤田(常): 応用薬理 **10**, 753, 1975.
- 13) 松本(公)・酒井(利)・津田(健)・小出(達)・穂本(晃)・西垣(善)・柴田(邦): 家畜繁殖誌 **24** (2), 印刷中.
- 14) O'GRADY, J. P., E. I. KOHORN, R. H. GLASS, B. V. CALDWELL, W. A. BROCK & L. SPEROFF: *J. Reprod. Fert.* **30**, 153, 1972.
- 15) McNATTY, K. P., K. M., HENDERSON, & R. S. SAMERS: *J. Endocrinol.* **67**, 231, 1975.

Summary

Using rats on day 17 of pregnancy, the effect of prostaglandin F_{2α} (PGF_{2α}) on luteal vasculature was investigated with the technique of microangiography.

1. After intravenous administration of PGF_{2α} in doses of 50, 250 μg/kg as a single injection, remarkable constriction of luteal vasculature was observed dose-dependently. The similar response was caused by noradrenaline (NA) in doses of 10 and 50 μg/kg.

2. When PGF_{2α} with doses of 5 to 100 μg/kg and NA of 0.5 to 50 μg/kg were administered, a rise in blood pressure were observed. Subcutaneous administration of PGF_{2α} or NA 1 mg/kg had also similar response on blood pressure.

3. Intravenously administered PGF_{2α} 250 μg/kg and NA 50 μg/kg (b. i. d.) had no effect on fetal mortality in rats. Whereas PGF_{2α} 1.0 mg/kg (b. i. d.) administered subcutaneously was enough to induce fetal mortality in a all animals, but the same dose of NA was not.

In present report, it is suggested that PGF_{2α} and NA suppress the luteal circulation remarkably but PGF_{2α} only plays a role in reduction of luteal function.

PLATE I

Plate I. Comparative diagrammatic presentation of luteal microvasculature.

- No. 1** (≡): a multitude of thick microvasculature as a whole, and clear network.
No. 2 (≡): a multitude of thin microvasculature as a whole, and clear network.
No. 3 (+): partially broken and obscure network.
No. 4 (±): a broken network and fragmental vessels only.

PLATE II

Plate II. Effect of prostaglandin $F_{2\alpha}$ ($PGF_{2\alpha}$) and noradrenaline (NA) on luteal microvasculature.

No. 5	Control	(++)	No. 8	$PGF_{2\alpha}$ 50 $\mu g/kg$	(+)
No. 6	NA 10 $\mu g/kg$	(+)	No. 9	$PGF_{2\alpha}$ 125 $\mu g/kg$	(+)
No. 7	NA 50 $\mu g/kg$	(±)	No. 10	$PGF_{2\alpha}$ 250 $\mu g/kg$	(±)