一 研 究 一

スナネズミの卵子における脂肪及び関連酵素の
組織化学的研究

新村末雄・佐藤栄治・石田一夫

(新潟大学農学部 畜産学科)

スナネズミ (*Meriones unguiculatus*) はキヌゲネズミ科に属するげっ歯動物で、わが国で実験動物化された唯一の動物であると言われている。最近、米国でその特性が明らかにされるに至り注目されるようになったが、繁殖生理の分野における基礎的研究はきわめて少ない。スナネズミの卵子については MARSTON とその共同研究者¹⁻⁴⁾が排卵、受精などの生殖現象について観察しているが、卵子の組織化学的性質については調べていない。

本実験は卵管及び子宮内のスナネズミの卵子について、細胞質に含まれている脂肪小滴の組織化学的性質と発生過程における量的変化を観察し、 α -glycerophosphate dehydrogenase (α -GPDH), β -hydroxybutyrate dehydrogenase (β -HBDH), non-specific esterase (Etase) 及び Δ^5 - 3β -hydroxysteroid dehydrogenase (Δ^5 - 3β -HSD) の検出を行って脂肪代謝について検討したものである。

材料及び方法

成熟したスナネズミ (体重 70 ~ 90 g) 70 匹をコイトロン (EA-8 HW) 内で飼育した。室内の温度は 20°C で、点燈は午前 4 時から午後 6 時までの 14 時間である。

卵子は過排卵処理によって採取した。過排卵の誘起は PMS (セロトロピン, 帝国臓器) を 20IU 注射し、75 時間後に HCG (ゴナトロピン, 帝国臓器) を 20IU 注射して行った。過排卵処理を受けた雌は直ちに雄と同居させた。観察した卵子の発生時期と HCG 注射後の時間は次の通りである。すなわち、1 細胞卵子 (HCG 注射後 19 時間), 2 細胞卵子 (43 時間), 4 細胞卵子 (91 時間), 8 細胞卵子 (115 時間), 桑実胚 (139 時間) 及び胞胚 (163 時間) である。

脂肪の検出は sudan 脂肪一般染色, Nile blue sulfate 中性脂肪染色, CIACCIO 類脂肪染色, SCHULTZ コレステリン反応, 岡本・上田・加藤高級脂肪酸染色によって行った⁵⁾。 α -GPDH 及び β -HBDH は BARKA & ANDERSON の方法⁶⁾, Etase は BURSTONE の方法⁷⁾, Δ^5 - 3β -HSD (基質 dehydroepiandrosterone) は DICKMANN & DEY の方法⁸⁾に従ってそれぞれ検出した。処理した卵子はあらかじめワセリンパラフィンのカバーガラスの四隅に置いたスライドガラスの中央に移し、カバーガラスをかぶせ静かに押して卵子を圧し、顕微鏡下で観察した。

結 果

1 細胞期から桑実期までのスナネズミの卵子には、大小さまざまな sudan IV 好性の脂肪小滴が多数含まれていたが (図 1), 胞胚では少なかった (図 2)。この脂肪小滴は CIACCIO 染色に陽性であったので (図 3), 類脂肪を含んでいることが推察されたが, Nile blue sulfate 染色, SCHULTZ 反応及び岡本・上田・加藤染色には陰性であったので、中性脂肪、コレステリン及び高級脂肪酸は含んでいないように思われた。

α -GPDH, β -HBDH 及び Δ^5 - 3β -HSD の活性はジホルマザン顆粒として観察された。ジホルマザン顆粒は基質を除いた液に浸漬した卵子には出現しなかった。 α -GPDH 及び β -HBDH の活性は 1 細胞期から胞胚期まで常に弱く (図 4, 5), Δ^5 - 3β -HSD 活性は常に強かった (図 6)。いずれの酵素活性も透明帯と卵卵腔には見られなかった。Etase 活性は 1 細胞期から胞胚期までの卵子には検出されなかった。

考 察

マウス, ラット, ハムスターなどのげっ歯動物の卵子はグリコゲンを多量に含有しているが、脂肪はほとんど含んでいないと言われている⁹⁾。しかし、スナネズミの卵子は多量の脂肪を含んでおり、げっ歯動物ではあるがマウス, ラット及びハムスターの卵子とは貯蔵物質が異

Histochemical studies of lipids and related enzymes in Mongolian gerbil eggs.

NIIMURA, Sueo, Yoji SATO & Kazuo ISHIDA (Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture, Niigata University, Niigata 950-21)

Japan. J. Anim. Reprod. 24 (4), 1978.

なっていることが明らかとなった。また、脂肪の量はイス、ブタ、ウシなどの脂肪蓄積型の卵子⁹⁾に匹敵しているように推察された。本実験において、スナネズミの卵子に蓄積されている脂肪は桑実期までは常に多量に含まれているが、胞胚期に著しく減少していることが明らかとなった。この時期における脂肪の減少は、桑実胚が胞胚に移行する際にエネルギー源として脂肪を消費しているためと考えられる。

マウス及びハムスターの卵子において、 α -GPDH 及び β -HBDH の活性は 1 細胞期から胞胚期まで常に認められており¹⁰⁻¹²⁾、ハムスターでは Δ^5 - β -HSD 活性も見られるという^{12,18)}。本実験において、1 細胞期から胞胚期までのスナネズミの卵子に α -GPDH、 β -HBDH 及び Δ^5 - β -HSD の活性が観察されたことから、スナネズミの卵子もマウスやハムスターの卵子と同様に糖と脂肪の相互転換、脂肪酸代謝、ステロイド合成などの能力を有することが推察された。

要 約

1 細胞期から胞胚期までのスナネズミの卵子について、細胞質に含まれている脂肪小滴の組織化学的性質と発生過程における量的変化を観察し、あわせて、脂肪代謝に関連している酵素の検出を試みた。

スナネズミの卵子には類脂肪からなるいろいろな大きさの脂肪小滴が含まれていた。この脂肪小滴は 1 細胞期から桑実期までの卵子には多量見られたが、胞胚では少なかった。1 細胞期から胞胚期までの卵子には常に弱い α -GPDH 及び β -HBDH の活性と強い Δ^5 - β -HSD 活性 (基質 dehydroepiandrosterone) が見られたが、Etase 活性は検出されなかった。これらのことから、スナネズ

ミの卵子は糖と脂肪の相互転換、脂肪酸代謝、ステロイド合成などの能力を持っていることが推察された。

(1978. 4. 22 受付)

文 献

- 1) MARSTON, J. H. & M. C. CHANG: *Anat. Rec.* 148, 387, 1964.
- 2) MARSTON, J. H., R. YANAGIMACHI, M. C. CHANG & D. M. HUNT: *Anat. Rec.* 148, 417, 1964.
- 3) MARSTON, J. H. & M. C. CHANG: *J. Lab. Anim. Care* 15, 34, 1965.
- 4) MARSTON, J. H. & M. C. CHANG: *J. Embryol. Exp. Morph.* 15, 169, 1966.
- 5) 岡本(耕)・上田(政)・前田(隆)・水谷(明):顕微鏡的組織化学, 第3版, 医学書院 pp. 333, 339, 343, 349, 354, 1965.
- 6) BARKA, T. & P. J. ANDERSON: *Histochemistry*, Hoeber Medical Division, Harper & Row, Publishers, Inc., p. 296, 1965.
- 7) BURSTONE, M. S.: *J. Nat. Cancer Inst.* 18, 167, 1957.
- 8) DICKMANN, Z. & S. K. DEY: *J. Reprod. Fert.* 35, 615, 1973.
- 9) ISHIDA, K.: *Arch. Histol. Jap.* 19, 547, 1960.
- 10) SKINNER, A. & R. G. SPECTOR: *Experientia* 24, 905, 1968.
- 11) LIN, C. H., C. F. HUAG & T. K. CHANG: *Acta Biol. Exp. Sinica* 9, 281, 1964.
- 12) ISHIDA, K.: *Fertility and Sterility*, HASEGAWA, T., M. HAYASHI, F. J. EBLING & I. W. HENDERSON, Eds., *Excerpta Medica* Amsterdam, American Elsevier Publishing Co. Inc., p. 717, 1973.
- 13) 新村(末)・石田(一): 本誌 22, 13, 1976.

Summary

The present experiment was to make clear the histochemical natures and quantitative fluctuation of lipid droplets contained in the cytoplasm of Mongolian gerbil eggs from 1-cell to blastocyst stage. The activities of enzymes related to fat metabolism in the eggs were also investigated.

Different sizes of lipid droplets composed of lipoids were contained in the cytoplasm of Mongolian gerbil eggs. The droplets were abundant in the eggs from 1-cell to morula stage, but less in blastocysts. There could be found weak activities of α -glycerophosphate dehydrogenase and of β -hydroxybutyrate dehydrogenase and a strong activity of Δ^5 - β -hydroxysteroid dehydrogenase (dehydroepiandrosterone as the substrate), but no non-specific esterase activity in the eggs throughout their early development.

From the results obtained here, it seems that Mongolian gerbil eggs may have abilities of fatty acid metabolism, steroid synthesis and interconversion between carbohydrates and lipids.

PLATE

All pictures are Mongolian gerbil eggs taken at a magnification of $\times 400$.

Fig. 1. Lipid droplets in a 1-cell egg (sudan IV stain).

Fig. 2. Lipid droplets in a blastocyst (sudan IV stain).

Fig. 3. Lipoids in a 1-cell egg (Ciaccio stain).

Fig. 4. α -GPDH activity in a 2-cell egg (Barka & Anderson method).

Fig. 5. β -HBDH activity in a morula (Barka & Anderson method).

Fig. 6. 4^5 - 3^{β} -HSD activity in a blastocyst (Dickmann & Dey method).