下垂体摘出未成熟ラットの精子形成に対する FSH および Testosterone 投与の影響

横 木 勇 逸・小 笠 晃

(農林水産省家畜衛試)

精子形成のホルモン支配を、形態学的に解析するために、未成熟ラット (26~40 日齢) において下垂体摘出後 14~60 日間を経てから、各種のホルモンを投与する精子形成回復実験が行われている¹⁻⁴⁾。これらの研究においては FSH, LH (ICSH) あるいは androgen の精上皮に対する作用はそれぞれ単一では極めて乏しく、またこの場合に精細胞の発育は、厚糸期の精母細胞あるいは未成熟精子細胞から先の段階に進まないことが認められている。いっぽう FSH と LH を同時に投与すると、完成した精子が生産され、精上皮周期が開始される。

LH は Leydig 細胞を刺激し、androgen、主として testosterone を生産するので、FSH と testosterone を同時に投与すれば、精子形成の開始は可能であると推察される。WOODS & SIMPSON⁵⁾ は、40 日齢の下垂体摘出 (垂摘) ラットを用いた実験で、このことを立証した。しかし LOSTROH³⁾ は、28 日齢で垂摘したラットに testosterone と純度の高い FSH を併用すると精上皮は、精子細胞の段階で変性に陥り、精子形成の開始は起らないと報告した。その後著者ら⁴⁾ は、26 日齢垂摘ラットに高純度の FSH と testosterone propionate (TP) を同時に 35 日間連続投与すると、精子細胞は変態過程の step 13 まで発育することを認めたので、本研究ではホルモン投与期間をさらに延長して精子細胞の発育について検討した。

実験材料および方法

供試動物は、Wistar 系未成熟雄ラット 39 頭で、このうち 25 頭は、26 日齢に下垂体を摘出した後、30 日間を経てから一部 (12 頭) をホルモン処置群に、他 (13 頭) を垂摘対照に供した。残りの 14 頭は、垂摘を行わず無処置の正常対照として用いた。

Effect of FSH and testosterone propionate on spermatogenesis in the hypophysectomized immature male rats.

YOKOKI, Yuitsu & Akira OGASA (National Institute of Animal Health, Yatabe, Ibaraki 305)

Japan. J. Anim. Reprod., 26 (4), 1980.

ホルモン処置群は、NIH-FSH-S11 (200 μ g), testosterone propionate (東京化成, TP: 800 μ g) の単独投与群及び FSH (200 μ g) と TP (800 μ g) 併用投与群の 3 群である。

垂摘対照群は、垂摘後 30 日間無処置で経過した 57 日齢 (ホルモン投与開始時) 及び垂摘後 80 日間無処置で経過した 107 日齢でそれぞれ解剖した 2 群を設け、正常対照群は、26 日齢 (垂摘時) 及び 107 日齢で解剖した 2 群を設けた。

FSH は、生理食塩液に溶解し (200 μ g/0.1 ml), TP は、局方ゴマ油に溶解して (800 μ g/0.1 ml), それぞれ 0.1 ml の溶解液を 1 日 1 回、56 日齢から連日 50 日間皮下注射した。

ホルモン処置の 3 群の解剖は、いずれも 107 日齢で実施した。各生殖器官は、解剖後直ちに秤量し、精巣についてはブェン液、Zenker-formol 液で固定後パラフィン包埋し、厚さ 3 μ m の薄切標本を作製し、ヘマトキシリン・エオジン及び PAS-ヘマトキシリン染色を施して鏡検した。

精細管上皮の周期の分類、精細胞数の算定及び補正は LEBLOND & CLERMONT⁵⁾, CLERMONT & MORGENTHAU⁶⁾ の方法に準じて行った。精子の出現及び運動性の検査は、解剖時、精巣上体尾部より採取した精子材料について鏡検により実施した。また血液中 androgen の測定は、各群 2 頭のラットから解剖時に心臓採血により採取したヘパリン加血液を使用し、牧野ら⁷⁾ の RIA 法に準拠し、実施した。

成 績

1. 体重および生殖器重量 (表 1)

体重及び副腎重量については、107 日齢垂摘対照群とホルモン処置群との間に有意差は認められなかった。またこれら各群の副腎重量は、正常対照群に比較しその減少が極めて著しかった。

精巣重量については、107 日齢垂摘対照群と 57 日齢垂摘対照群との間に有意差はみられなかった。またこれ

Table 1. Weight of testes and accessory sex glands in hypophysectomized immature male rats treated with FSH and/or testosterone propionate (TP)

	Exp. group	No. of rats	Body weight (g)	Testis (mg)	Epididymis (mg)	Seminal vesicle (mg)	Ventral prostate (mg)	Adrenal gland (mg)
Hypox. ^{a)}	(μ g/day)							
	FSH 200	3	87.3	130.6 $\pm$ 11.9**	77.0 $\pm$ 3.6***c)	5.6 $\pm$ 2.5	3.7 $\pm$ 1.5	7.3 $\pm$ 1.5
	TP 800	4	92.9	137.7 $\pm$ 17.7**	460.1 $\pm$ 41.3***	1521.7 $\pm$ 119.3***	335.7 $\pm$ 53.2***	5.3 $\pm$ 0.5
	FSH 200							
	TP 800	5	98.2	522.2 $\pm$ 174.2***	557.0 $\pm$ 91.4***	1513.7 $\pm$ 123.9***	418.5 $\pm$ 34.1***	6.0 $\pm$ 1.4
	Day of autopsy							
Non-Treated	57	7	72.2*	92.3 $\pm$ 7.4	40.3 $\pm$ 5.6**	7.5 $\pm$ 2.4	5.6 $\pm$ 1.5	8.0 $\pm$ 1.0
	107	6	88.7	98.3 $\pm$ 14.5	30.3 $\pm$ 3.3	7.2 $\pm$ 1.8	4.3 $\pm$ 1.6	7.0 $\pm$ 3.1
Non-Hypox.	Day of autopsy							
	26	7	56.1	370.9 $\pm$ 27.2	74.3 $\pm$ 6.2	12.1 $\pm$ 0.4	25.0 $\pm$ 3.7	19.2 $\pm$ 4.7
	107	7	413.9	2780.0 $\pm$ 178.3	1231.6 $\pm$ 194.4	1058.1 $\pm$ 247.7	511.3 $\pm$ 121.7	63.8 $\pm$ 5.3

a) Wistar-Imamichi strain rats were hypophysectomized at 26 days of age. b) Daily subcutaneous injections of the hormone began 30 days after hypophysectomy and continued over a period of 50 days. c) Mean $\pm$ Standard deviation. Significantly different from Hypox. Non-Treated Cont. at 107 days of age at * $p<0.5$, ** $p<0.01$ or *** $p<0.001$.

ら両群の精巣重量は、垂摘時の 26 日齢正常対照群のそれの約 1/4 であった。FSH 及び TP 単独投与群の精巣重量は、垂摘対照群のそれに比較し、有意の増加を示したが、26 日齢正常対照群の重量には達しなかった。FSH・TP 併用投与群の精巣重量は、FSH 及び TP 単独投与群のそれの約 4 倍であった。しかし 107 日齢正常対照群と比較するとその重量は約 1/5 であった。

副生殖器官重量は、精巣上体を除き、FSH 単独投与群

と垂摘対照群との間に、有意差はみられなかった。しかし TP 単独投与群ならびに、FSH・TP 併用投与群は、FSH 単独投与群と比較すると、精巣上体で 6~7 倍、精囊腺で約 270 倍、前立腺で約 90~110 倍の著しい重量増加を認めた。

2. 精巣組織の観察所見

a) 精細管の発育 (表 2)

精細管の発育は、精巣重量の増加反応と同様、FSH

Table 2. Diameter of seminiferous tubule in hypophysectomized immature male rats treated with FSH and/or testosterone propionate (TP)

		Exp. group	No. of rats	Diameter of tubule (μm)
Hypox.	Treated	($\mu\text{g/day}$)		
		FSH 200	3	79.9 $\pm$ 1.8***
		TP 800	4	81.5 $\pm$ 10.3***
		FSH 200 TP 800	5	145.7 $\pm$ 21.9***
	Non-Treated	Day of autopsy		
		57	7	68.3 $\pm$ 6.0
		107	6	67.4 $\pm$ 5.0
Non-Hypox.	Non-Treated	Day of autopsy		
		26	7	128.8 $\pm$ 0.6
		107	7	227.7 $\pm$ 17.7

Mean $\pm$ Standard deviation. See the footnote of Table 1.

Table 3. Percentage of the number of seminiferous tubules containing different stage of germ cells in testicular cross sections

		Exp. group	No. of rats	% of tubules containing spermatocytes only	% of tubules containing steps 1-3 spermatids	% of tubules containing steps 4-7 spermatids	% of tubules containing steps 8-14 spermatids	% of tubules containing steps 15-19 spermatids
Hypox.	Treated	($\mu\text{g/day}$)						
		FSH 200	3	99.7	0.19	0.04	0.0	0.0
		TP 800	4	99.5	0.3	0.2	0.0	0.0
		FSH 200 TP 800	5	3.0	29.9	25.1	23.2	18.8
	Non-Treated	Day of autopsy						
		57	7	99.9	0.002	0.0	0.0	0.0
		107	6	99.9	0.005	0.003	0.0	0.0
	Non-Hypox.	Day of autopsy						
		26	7	94.6	5.4	0.0	0.0	0.0
		107	7	0.0	16.6	25.9	15.0	42.5

Percentage based on evaluation of 350-500 cross sections of seminiferous tubules.

及び TP 単独投与群では、垂摘対照群を若干上廻る程度であったが、FSH・TP 併用投与群では、これらに比較し口径は約 1.8 倍に増大し、107 日齢正常対照群の約 2/3 に達した。

b) 精細管の精子形成所見 (表 3)

57 日齢、107 日齢の垂摘対照群では、精巣横断面の大多数の精細管において、精細胞の発育は精母細胞の段階で停止していた。まれに step 1~3, 4~7 の精子細胞が 2~3 個みられたが、いずれも核濃縮、核崩壊などの退行変性像を呈した。

FSH 及び TP 単独投与群も 99% 以上の精細管において、精細胞の発育は、精母細胞の段階で停止していた。また step 7 の精子細胞を含む精細管を少数認めたが、垂摘対照と同様、精子細胞核は退行変性を示し、step 8 以降の段階に発育したものは全くみられなかった。

FSH・TP 併用投与群では、精上皮周期の全段階の全段階の精細胞を認めたが、step 15~19 の成熟期精子細胞の存在する精細管の比率は 18.8% で、正常対照群の

42.5% と比べて少なかった。しかし step 1~3, 8~14 の精子細胞を含む精細管の出現割合は大きかった。なお FSH 及び TP 単独投与群の Sertoli 細胞は、未成熟の状態であり (写真 1, 2), 垂摘対照群との間に形態学的な差は認められなかったが、FSH・TP 併用投与群では成熟した状態を示した。

c) 精上皮細胞の量的検討 (表 4)

A 型精祖細胞数は、各対照群及びホルモン処置群間に著しい差はなかった。

Preleptotene 期精母細胞数は 107 日齢垂摘対照群に比較し、FSH 及び TP 単独投与群では、著しい差はなかった。FSH・TP 併用投与群ではその増加がみられ、107 日齢正常対照群の約 2/3 に達した

Pachytene 期精母細胞数は、preleptotene 期精母細胞数と同様の傾向を示した。しかし preleptotene 期精母細胞から pachytene 期精母細胞に発育する細胞数は、107 日齢正常対照群を除きいずれの群も著しい減少を認めた。

Step 7 精子細胞は、垂摘対照群及び 26 日齢正常対照

Table 4. Distribution of germ cells in tubular cross section of hypophysectomized immature male rats treated with FSH and/or testosterone propionate (TP)

Exp. group				No. of rats	Type-A spermatogonia		Preleptotene spermatocytes		Pachytene spermatocytes		Step-7 spermatids	
					crude	corrected*	crude	corrected*	crude	corrected*	crude	corrected*
Hypox.	Treated	(μg/day)										
		FSH	200	3	2.1 ± 1.4	0.32 ± 0.15	28.1 ± 4.8	4.1 ± 1.1	2.6 ± 2.4	0.29 ± 0.26	0.5 ± 0.9	0.06 ± 0.12
		TP	800	4	2.0 ± 1.0	0.34 ± 0.18	28.9 ± 5.9	5.3 ± 1.0	1.1 ± 1.9	0.87 ± 0.31	2.8 ± 2.7	0.4 ± 0.4
		FSH TP	200 800	5	1.2 ± 0.9	± 0.36 0.26	38.8 ± 11.1	11.3 ± 3.2	28.1 ± 10.0	6.2 ± 2.0	47.6 ± 24.9	11.9 ± 5.9
	Non-Treated	Day of autopsy										
		56		7	2.5 ± 1.9	0.34 ± 0.26	18.8 ± 5.5	2.6 ± 0.8	0.13 ± 0.05	0.04 ± 0.11	0.0	0.0
		107		6	2.9 ± 1.2	0.43 ± 0.17	24.7 ± 3.5	4.0 ± 0.6	2.8 ± 1.9	0.4 ± 0.3	0.0	0.0
Non-Hypox.	Non-Treated	Day of autoasy										
		26		7	1.7 ± 0.9	0.42 ± 0.23	56.3 ± 6.5	14.0 ± 2.2	37.2 ± 7.9	6.8 ± 1.6	0.0	0.0
		107		7	0.9 ± 1.0	0.37 ± 0.33	44.7 ± 8.5	18.9 ± 4.1	58.6 ± 8.7	17.5 ± 3.4	154.2 ± 26.8	51.9 ± 7.2

Counts of type A spermatogonia and preleptotene and pachytene spermatocytes and step-7 spermatids were obtained at stage VII of the cycle.

* The results of counting were corrected by using Abercrombie's formula and Clermont & Morgentaler's method.

Table 5. Cell population of seminiferous tubules in hypophysectomized immature male rats treated with FSH and/or testosterone propionate (TP)

Exp. group		Spermatogonia			Spermatocytes				
		stage VII T-A	stage XII T-A**	stage V T-B	stage VII PL	stage XII L	stage V T	stage VII P	stage XII P
FSH plus TP	crude	1.2	2.5	19.9	38.8	47.6	30.9	28.1	29.3
	correct*	0.05	0.09	0.8	1.5	1.9	1.3	1.1	1.1
Normal at 107 days	crude	0.9	4.0	20.2	44.7	54.9	55.6	58.6	62.3
	correct*	0.04	0.18	0.9	2.1	2.4	2.5	2.7	2.8

Exp. group		Spermatids					Sertoli cells		
		stage V s-5	stage VII s-7	stage XII s-12	stage V s-17	stage VII s-19	stage V	stage VII	stage XII
FSH plus TP	crude	51.2	47.6	42.9	3.5	1.3	26.1	27.1	24.7
	correct*	2.1	1.9	1.7	0.1	0.06			
Normal at 107 days	crude	145.9	154.2	164.2	130.6	135.6	22.6	21.4	22.6
	correct*	6.5	6.3	7.3	5.8	6.3			

*: Ratio of the count of germ cells to the Sertoli cells.

T-A: Type A₁ spermatogonia, T-A**: Type A₂ spermatogonia, T-B: Type B spermatogonia, PL: Preleptotene spermatocyte, L: Leptotene spermatocyte, T: Transition form, P: Pachytene spermatocyte, s-5: step 5 spermatid, s-7: step 7 spermatid, s-12: step 12 spermatid, s-17: step 17 spermatid, s-19: step 19 spermatid.**Table 6.** Examination of spermatozoa in cauda epididymides

		Exp. group		No. of rats	Sperm appearance			Sperm motility	
					-	+	‡	-	‡
Hypox.	Treated	FSH	200	3	3			3	
		TP	800	4	4			4	
		FSH TP	200 800	5		5*		5	
	Non-Treated	Day of autopsy							
			57	7	7			7	
			107	6	6			6	
Non-Hypox.	Non-Treated	Day of autopsy							
			26	7	7			7	
			107	7			7		7

* Spermatozoan debris (3/5)

- sperm not present or immotile + poor ‡ very good

Table 7. Androgen levels in blood in hypophysectomized immature male rats treated with FSH and/or testosterone propionate (TP)

Exp. group		No. of rats	Androgen concentration (ng/ml)	
			T	DHT
FSH	200	2	0.56	ND
TP	800	2	23.7	0.98
FSH TP	200 800	2	18.0	1.72
Hpox. non-treated autopsy at 107 days		2	0.61	ND

T: testosterone DHT: dihydrotestosterone

群には認められなかった。FSH・TP 併用投与群では、FSH 及び TP 単独投与群に比較して、細胞数は著しく増加し、step 19 成熟精子に発育することを認めた (写真 3)。しかし 107 日齢正常対照群のそれに比較し約 1/4 であった。

d) 正常対照群と FSH・TP 併用投与群との精子形成の比較 (表 5)

FSH・TP 併用投与群における精祖細胞, preleptotene 期精母細胞は、正常対照群に近い値を示したが、transition form 以降の精母細胞の発育程度は劣りその数は、正常対照群の約 1/2 を示した。また step 12 迄の精子細胞数は、正常対照群の約 1/3 を維持したが、step 17, 19 の成熟期精子細胞は極めて少なく、かつ変性に陥っているものが多く認められた。

3. 精巢上体尾部の精子 (表 6)

精巢上体尾部から採取した精子の懸滴標本では、FSH・TP 併用投与群の全例に精子の出現を認めたが、量的には僅少であった。また 5 頭中 3 頭において、精子の多くに著しい膨化変性を認めた。

4. 血液中の androgen 濃度 (表 7)

血中の testosterone (T) 濃度は、TP 単独投与群 (23.7 ng/ml) 及び FSH・TP 併用投与群 (18.0 ng/ml) において高い値を示した。しかし FSH 単独投与群 (0.56 ng/ml) 及び 107 日齢垂摘対照群 (0.61 ng/ml) では低い値を示し、かつ両者に差異は認められなかった。FSH・TP 併用投与群の dihydrotestosterone (DHT) 濃度 (1.72 ng/ml) は、TP 単独投与群 (0.98 ng/ml) のそれに比較して高かった。しかし FSH 単独投与群及び 107 日齢垂摘対照群では、DHT の血中濃度が低く、測定不能であった。

考 察

精子形成の再開におけるホルモン支配について垂摘未成熟ラットを用い検討した結果、FSH 及び TP 単独投与では、これまでの報告と同様、精子形成は開始されないが、FSH と TP 併用投与では精子形成が誘起されることを認めた。

FSH は Sertoli 細胞に作用し、androgen 結合蛋白 (ABP) を産生することが明らかにされている^{8,11)}。WEDDINGTON ら¹²⁾は、未成熟ラットにおいて垂摘後直ちに testosterone を投与すると ABP の生産を維持することを認めた。さらに垂摘後一定期間を経て、ABP の消失した未成熟ラットに T を投与しても ABP の産生は起らないが、FSH を投与するとその生産が再び開始されることを認めている^{12,13)}。ABP に関するこれらの研究は、垂摘ラットの精子形成に対する T 作用の差異、すなわち垂摘後直ちに T 投与を開始すると精子形成の維持が可能であるが、垂摘後一定期間経てから始めると精子形成の維持ないし再開が困難であるという違いを合理的に説明するものと考えられる。これらの実験成績は、垂摘未成熟ラットで一定期間を経たものにおいても、FSH と TP を併用投与すれば、精子形成を誘起する可能性を示唆するものである。しかし LOSTROH⁹⁾は、FSH (NIH-FSH-S1) と TP 併用投与で、精子形成が再開しなかったことを報告しており、本実験結果とも一致しない。この不一致の理由については以下の如き諸要因考えられる。本実験に用いた未成熟ラットの垂摘日齢は 26 日で、LOSTROH のものより 2 日早く、使用した FSH はより高純度 (<0.01 NIH-LH-S1 unit/mg, 卵巣アスコルビン酸減少法) の標品であった。ホルモン投与の開始は LOSTROH の垂摘後 60 日であるのに対し、30 日と

早期であり、さらにホルモンの投与量は LOSTROH に比較し FSH (NIH-FSH-S11 の力価は NIH-FSH-S1 の 1.15 単位/mg に相当) は約 2.3 倍、TP は 1/4 倍の効力を持つものであった。したがってこれらの諸要因の内、垂摘後のホルモン投与開始時期が 30 日間早かったことは精上皮のホルモンに対する感受性の差をもたらしたと考えられる。また前述したように FSH は Sertoli 細胞に作用し、ABP を生産するとともに FSH リセプターを増加させる作用を持ち、さらに FSH と T の協力作用によってそれが一層増加することが認められている¹⁴⁾。本実験の FSH 投与量は、Sertoli 細胞の FSH リセプターを増加させ、ABP の生産分泌が高められ、精子生産まで進行させることが出来る程度に精細管内環境が整えられたと推察され、一方 LOSTROH³⁾ の用いた量がこの反応を誘起するには不十分であったとも考えられる。

ところで LOSTROH³⁾ は、T に換えて LH (100 μ g) を併用投与した時、受胎可能な精子を生産しようと報告している。本実験で用いた T の用量は垂摘成熟ラットの精子形成を維持する量である¹⁵⁾。垂摘成熟ラットに TP 750 μ g 皮下注射した時、血中 T 濃度は 12.5 ± 2.2 ng/ml で、その時の精巣内 T 濃度は 25.3 ± 2.9 ng/ml と正常 (31.7 ± 2.1 ng/ml) に近いレベルを呈すると報告されている¹⁶⁾。本実験での TP 用量で、血中 T 濃度が 18.0 ng/ml に維持されたことから、精巣内 T 濃度は、成熟垂摘動物に受胎能力を持つ精子を生産させるに十分な量であったと推察される。しかし本実験の結果では、運動性を持つ精子の生産はえられず、T により制御されているとされる pachytene 期以降の精母細胞^{4,17)} および FSH と androgen が要求されているとされる精子細胞の変態過程¹⁷⁾は、正常ラットに比べ著しく劣っていることを認め、FSH と LH を併用した成績と明らかな相違をみた。このことは、精巣の T 濃度が正常値を維持したとしても、精子形成におよぼす作用は極めて不完全であったことを示している。仮に精子形成の促進において、T が DHT に転換される必要があるとすれば、この相違は合理的に説明がつくであろう。すなわち T から DHT への代謝に関与する 5α 還元酵素は LH の支配下にあり¹⁸⁾、T では、 5α 還元酵素活性を回復させる能力がないため¹⁹⁾、本実験条件では、T から DHT への転換率が低く DHT の要求量は満たされなかったものと思われる。恐らく精細管における精子形成にも、他の androgen 標的細胞と同様、T から DHT に転換する系が重要な役割をはたしているのではないかと考えられ

た。

さらに塩田・鈴木ら²⁰⁾は、一旦廃絶したラットの精子形成が androgen とプロラクチン (PRL) によって回復出来ることを示唆するとともに、androgen は PRL 分泌促進作用を介して精子形成に寄与すると述べている。またこの過程には生長ホルモンの関与も古くから示唆されている。従って量的な精子形成機能の促進には、これらのホルモン作用も要求されるものと考えられる。

要 約

26 日齢で垂摘した未成熟ラットを用い、垂摘後 30 日間を経た 57 日齢より 50 日間、FSH (200 μ g) および TP (800 μ g) を単独投与、さらに FSH (200 μ g)、TP (800 μ g) を併用投与し、精子形成におよぼすこれらホルモンの影響について検討した。

1) 精巣重量は、FSH および TP 単独投与群では、垂摘対照群を若干上廻る値を示したが、垂摘時 (26 日齢) の精巣重量 (370.9 mg) には達しなかった。FSH・TP 併用投与群では、各単独投与群に比較し、約 4 倍 (522.2 mg) の増加を認めた。

2) FSH および TP 単独投与群の 99.5% の精細管において、垂摘対照群と同様、精母細胞の段階で精細胞の発育が停止した。いっぽう FSH・TP 併用投与群では、単独投与群に比較し、step 7 精子細胞の増加は著しく、さらに step 19 の精子細胞を含む精細管も若干認められた。しかし 107 日齢正常対照群と比較すると FSH・TP 併用投与群では、pachytene 期以降の精母細胞および step 17 以降の精子細胞の発育程度は著しく劣っていた。

4) 精巣上体尾部の精子は、FSH・TP 併用投与においてのみ認められたが、その量は極めて少なく、5 頭中 3 頭に認められた精子の多くは、著しく膨化変性を示した。

5) 血中の androgen 濃度は、TP 単独投与群と FSH・TP 併用投与群において、testosterone (T) はそれぞれ 23.7, 18.0 ng/ml, dihydrotestosterone (DHT) は、それぞれ 0.98, 1.72 ng/ml であり、FSH 単独投与群と 107 日齢垂摘対照群の T (0.56, 0.61 ng/ml)、及び DHT 濃度 (ND, ND) に比較し高い値を示した。

7) 以上の成績から垂摘未成熟ラットに高用量の FSH と TP を長期間投与すると完成した精子の形成を認めたが、量的には極めて少なく、運動性を欠いた精子が生産された。このことは、恐らく精子形成にも T から DHT に転換する系が重要な役割をはたしているの

ではないかと考えられた。(要旨は 1976 年 第 82 回日本獣医学会に発表)

おわりに、ご校閲をいただいた当場飼料安全性研究部中原達夫部長に深謝します。またホルモンを測定していただいた百目鬼主任研究官に厚くお礼申し上げます。
(1980. 5. 29 受付)

文 献

- 1) WOODS, M. C & M. E. SIMPSON: *Endocrinology*, **69**, 91, 1961.
- 2) LOSTROH, A. J., R. JOHNSON & C. W. JORDAN, JR: *Acta Endocrinol*, **44**, 536, 1963.
- 3) LOSTROH, A. J.: *Endocrinology*, **85**, 438, 1969.
- 4) 小笠(晃)・横木(勇): 本誌, **23**, 159, 1977.
- 5) LEBLOND, C. P & Y. CLERMONT: *Amer. J. Anat.* **90**, 167, 1955.
- 6) CLERMONT, Y. & H. MORGENTHAU: *Endocrinology*, **57**, 369, 1955.
- 7) 牧野(拓): 日内分泌学誌, **49**, 629, 1973.
- 8) HANSSON, V., E. REUCH, O. TRYGSTAD & O. TORGENSEN: *Nature New Biology*, **246**, 56, 1973.
- 9) HANSSON, V., O. TRYGSTAD, F. S. FRENCH, W. S. MCLEAN, A. A. SMITH, D. J. TINDALL, S. C. WEDDINGTON, P. PETRUSZ, S. N. NAYFEH & E. M. RITZEN: *Nature*, **250**, 387, 1974.
- 10) HANSSON, V., S. C. WEDDINGTON, W. S. MCLEAN, A. A. SMITH, S. N. NAYFEH, F. S. FRENCH & E. M. RITZEN: *J. Reprod. Fert.*, **44**, 363, 1975.
- 11) ORTH, J. & A. K. CHRISTENSEN: *Endocrinology*, **101**, 262, 1977.
- 12) WEDDINGTON, S. C, V. HANSSON, E. M. RITZEN, L. HAGENAS, F. S. FRENCH & S. N. NAYFEH: *Nature*, **254**, 145, 1975.
- 13) SANBORN, B. M., J. S. H. ELKINGTON, M. CHOWDHURY, R. K. TCHOLAKIAN & E. STEINBERGER: *Endocrinology*, **96**, 304, 1975.
- 14) TUSTUI, K. & S. ISHII: *Gen. Comp. Endocrinol.*, **36**, 297, 1978.
- 15) MATUYAMA, S., Y. YOKOKI & A. OGASA: *Nat. Inst. Anim. Hlth Quart*, **11**, 46, 1971.
- 16) HARRIS, M. E & A. BARTKE: *Endocrinology*, **95**, 701, 1974.
- 17) STEINBERGER, E. & G. E. DUCKETT: *J. Reprod. Fert. Suppl.*, **2**, 75, 1967.
- 18) NAYFEH, S. N.: In Hormonal regulation of spermatogenesis (FRENCH, F. S., V. HANSSON, E. M. RITZEN & S. N. NAYFEH ed.) 53, New York and London, 1975.
- 19) CHAMES, H. E., M. DYM & H. G. M. RAJ: *Biol. Reprod.* **21**, 241, 1979.
- 20) 塩田(邦)・鈴木(善): 第 87 回日本獣医学会講演要旨集, 68, 1979.

PLATE

Explanation of Figures

Paraffin sections, $3\mu\text{m}$ in thickness, of testes from rats which were hypophysectomized at 26 days of age and subjected to various hormone treatments once daily for 50 days, beginning 30 days after hypophysectomy. Fixed in Zenker-formal, PAS-hematoxylin. $\times 1000$.

Fig. 1. Animals were injected with $200\mu\text{g}$ of FSH. Note that tubules are small and pachytene spermatocytes and spermatids are very few in number. Sertoli cells are not stimulated.

Fig. 2. Animals were injected with $800\mu\text{g}$ of TP. Note that tubules are small and pachytene spermatocytes are sparse. Spermatids are occasionally observed.

Fig. 3. Animals were injected with $200\mu\text{g}$ of FSH plus $800\mu\text{g}$ of TP. Note that tubules are large in size. Pachytene spermatocytes and step-7 spermatids increased in number. Very few spermatids have developed into the step-19, the maturation phase.

Fig. 4. Hypophysectomized controls. Tubules are small. Pachytene spermatocytes are present, but very few.

Summary

Immature male rats hypophysectomized at 26 days of age were injected subcutaneously with (1) NIH-FSH (200 μ g), (2) testosterone propionate (TP, 800 μ g), (3) FSH (200 μ g) plus TP (800 μ g) once a day for 50 consecutive days after an interim of 30 days from hypophysectomy. They were examined for the effects of these hormones on spermatogenesis.

(1) The testes increased slightly in weight in rats treated with FSH or TP alone, as compared with those of hypophysectomized control rats. Further weight gain was achieved by administration of FSH plus TP.

(2) Spermatogenesis was arrested at the primary spermatocyte stage in 99.5% of the seminiferous tubules in rats treated with FSH or TP alone. On the other hand, in the group of rats injected simultaneously with FSH and TP, there were a few seminiferous tubules containing step 19 spermatids and a remarkable increase was observed in step 7 spermatids, as compared with the group injected with FSH or TP alone. The development of spermatocytes in transitional form and the process of metamorphosis from step 17 spermatids were very poor in the rats treated with FSH plus TP, as compared with the intact rats of a normal control group at 107 days of age.

(3) A few spermatozoa appeared in smears prepared from the cauda epididymidis of the rats treated with FSH plus TP. Most of them carried degenerative characteristics.

(4) Androgen concentrations of blood in the rats treated with TP, and FSH plus TP (testosterone; 23.7 and 18.0 ng/ml, and dihydrotestosterone; 0.98 and 1.72 ng/ml, respectively) were higher than those in the rats treated with FSH alone and in control rats at 107 days after hypophysectomy.

(5) It was suggested that the conversion system of testosterone to DHT in addition to the direct effects of FSH and TP might be played an important role for the production of spermatozoa and preservation of their fertilizing capacity. Spermatozoa were produced by simultaneous injection with FSH and TP for a long time, but they were small in number and lacking in viability.